



O'ZMU XABARLARI

БЕСТНИК НУУЗ

ACTA NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2024

3/1/1

Tabiiy fanlar
turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor

Bosh muharrir o'rinnbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m f.d., professor

Tahrir hay'ati:

Sabirov R.Z. – b.f.d., akademik

Aripov T.F. – b.f.d., akademik

Salixov SH.I. – f.-m.f.d., prof.

Otajonov Sh. – f.-m.f.d., prof.

Tojiboyev K.SH. – b.f.d., akademik

Sattarov J.S. – b.f.d., akademik

Abduraxmanov T. – b.f.n.

Qodirova Sh. – k.f.d.

Xaitboyev A.X. – k.f.d.

Mahkamov M.A. – k.f.d., prof

Umarov A.Z. – g.-m.f.n., dots.

Hikmatov F. – tex.f.d., prof.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2024

Bakirov J. Kroton aldegidi, tiokarbamidning va vermkulit asosida kaefsv-1 markali antikorrozion qoplama olish.....	298
Berdiyorov O., Nuraliyev S., Nurmonov S., Qodirov O. Sintetik yog' kislotalarini paraffin asosida katalitik sintezi	303
Bo'riyeva D., Abdushukurov A., Nurmatov D., Xajiyeva Z. Pikolin kislotaning toluidine izomerlari bilan reaksiyasidan sintez qilingan amid hosilalarining tuzilishini zamonaviy fizik-kimyoviy tadqiqot usullari yordamida tasdiqlash.....	306
Valijanova L., Qo'qonboyev I., Maxmudov R. Tomarix ramossisima o'simligining fenol birikmalari.....	311
G'ulomova I. Limon kislotosasi asosida polimerlar sintezi va ularning fizik-kimyoviy xossalari	315
Jurayev X., Yaxshiyeva Z. Monitoring lead and cadmium in wastewater	318
Ziyadullayev O., Otamuxamedova G., Tirkasheva S., Nenaydenko V., Abdurahmonova S. Yangi katalitik sistemalarda atsetilen spirtlaridan diindiollar sintez qilish jarayoni.....	322
Zufarov O., Serkayev K., Influence of refiring process on oxidative stability of sunflower oil	326
Ibragimov T., Talipova X., Xandamov D., Taniyev O. Angren faollangan kaolini va Dehqonobod bentonitining adsorbsiya konstantalari qiymatini aniqlash.....	330
Ирназаров Ш., Суванова Ф. Исследование альтернативных методов щелочной рафинации хлопкового масла.....	334
Курязов Р., Насруллаева, Бозоров Х. Синтез новых трициклических пирроло[2,3- <i>d</i>]пirimидинов и их противоопухоловая активность.....	337
Maxkamova N., Xaitbaev A. Xitozan asosida olingan polimer kompozitida mis (II) ioni sorbsiyasining fizik kimyoviy xossalari	341
Мирзакулов Х., Насридинова, Садиков Б. Энергосберегающая технология производства кормового монокальцийфосфата на основе экстракционной фосфорной кислоты и известняка.....	344
Mirxodjayeva D., Turabdjanov S., Sanayev E., Azamatov U. Arpa donining kimyoviy tarkibi va funksional xususiyatlarini o'rganish asosida tadqiqot obyektini tanlash.....	348
Mixliyev O. Dehqonobod koni dolomitini sulfat kislotosasi parchalash orqali magniy sulfatini olish.....	352
Муратова С., Нурманов С. Влияние некоторых факторов на каталитический синтез виниловых эфиров карбоновых кислот.....	356
Murodova S. Organik kimyoda "aromatik uglevodordlarning nomlanishi, izomeriyasi va olinish usullari" mavzusini o'qitishda zamonaviy kimyoviy kompyuter dasturlaridan foydalanish.....	360
Murtazaqulov M., Fayzullayev Y., Usmonova X., Bekchanov D., Muhammediyev M. Tabiiy gazni tozalashda ishlataligan alkanolaminlarni parchalanish mahsulotlaridan tozalash	364
Nazarov S., Muzaffarov J., Rajabov Sh., Khamidov A. Morphological properties of anodic aluminum oxide membranes synthesized in oxalic acid.....	367
Nurmatov D., Abdushukurov A., Bo'riyeva D., Yusupov M. 4-karboksipiridinming p- anizidin, p- bromanilin, 2,6 -ksilidin, 2,4-dixloranilinlar bilan amidlarini olish reaksiyalari	371
Omanov B., Xatamova M. Laboratoriya asetilenni gidratlab aseton olish texnologiyasi	374
Ruziyev E., Ruziyev J., Usmonova B. Yer osti suvlarinining mineral tarkibi va radioaktivligini analitik baholash.....	378
Saiddobozov S., Nurmanov S., Mirxamitova D. Inden asosida sintez qilingan polimetilenindensulfo kationitning ekspolatsion xossalari o'rganish	382
Saliyeva M., Ziyadullayev O., Abduraxmonova S., Talipov R. Ayrim geteroatomli aldegidlarni atsetilen ishtirokida alkinillash reaksiyalari.....	386
Sodikov M., Ergashev L., Sobirova R. Grinyar-iotsich reaksiyasini asosida atsetilen spirtlari va ularning oddiy efirlari sintezi ..	390
Toshtemirov A., To'rayev X., Umbarov I., Ashurov J., Jalilov A. Zn (II) ioni va 1,10- fenantrolin asosida yangi kompleks sintezi va tadqiqoti	393
To'ychiyev D., Kadirova N., Rafikov A. To'qimachilik korxonalarini chiqindi momig'i va makulatura asosida qadoqlash qog'ozini olish	396
To'rayev G., Todjiyev J., Turabov N., Navruzov F., To'ychiyeva X., Tuliayev B. Mis(II) ionini 5mmfsagns bilan kompleks hosil qilish reaksiyasining optimal sharoitlarini aniqlash.....	400
Уринова З., Бабаев Т., Каримов М. Полимерные формы антибактериального соединения этония	404
Хазраткулова С., Зокирова Н. Физико-химические свойства полимеров на основе н-замещенных акриламидов природных оксикислот	408
Xayrullayev G., Doniyorov K., Ergashova E., Uzaqberganova G., Torambetov B., Kadirova Sh. 3,3'-disulfanidilbis(1h-1,2,4-triazol-5-amin)ning temir(II)sulfat bilan kompleks birikmasi sintezi va tadqiqoti	413
Xalmurotova Z., Abduraxmonova U., Turemuratov Sh. Mentolning xloratsetillanish reaksiyasini amalgal oshirish va kimyoviy identifikatsiyalash	417
Хамидов Ш., Садиков И., Абдукаимов А., Рихсев А., Зайцева О., Хайтбаев А. Использование иммуноферментного анализа для раннего выявления антител к treponema pallidum.....	420
Xatamova M. Izosianatlar va karbamatlarni sintez qilish usullari	424
Xudoyerberdiyev I., Abdullayeva N., Uluxxodjayeva S., Mahkamov M. Polianilin va nio asosidagi polimer kompozitsiyalar ..	428
Xo'sinova Sh., Abdullayeva Z., Xudoyerberganov O., Eshchanov E., Sobirova N. Nikel (II) formiatining natriy atsetati bilan kompleks birikmasi sintezi va tuzilishi	432
Hamroyev U., Hamrayeva G. Bojxona rasmiylashtiruvida transport vositalarini tasmiflashda identifikatsiyalashning asosiy mezonlari	436
Chulpanov K., Tukhtav K., Jumaboev F., Xazratqulova S. Farmasevtika fakultetlarida neorganik kimyonlari o'qitishda interfaol usullaridan foydalanish	440
Sharipova S. Aktivatsion usulida maxsus toza vanadiyning tahlili	444
Shukurov Sh., Dilmuradov S., Mamadaliev J., Mirzoev A., Abduxaliquov F., Turdaliev J., Xudoynazarov I. «Biosolvent» preparatini Navoiy viloyatidagi sho'rangan tuproq tarkibidagi tuzlarni yuvilish samaradorligiga ta'sirini o'rganish	447
Yusupov F., Xursandov B., Yuldoshev F., Dusmatova A., Kucharov A. Oltingugurtli asfaltbetonning fizik-mekanik xossalari tadqiq qilish	450
Yusupova M., Ashirov M., Smanova Z. Optik analitik sensorlar	453
Fizika	
Abduvohidov A., Khamidov V., Davletova P. Thermal analysis around black hole in $f(Q)$ gravity	457



Odiljon ZIYADULLAYEV,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti ilmiy ishlari va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, kimyo fanlari doktori

E-mail: bulak2000@yandex.ru

Go'zal OTAMUXAMEDOVA,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, ilmiy - tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori

Sarvinoz TIRKASHEVA,

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Tabiiy fanlar fakulteti kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrsi o'qituvchisi, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori

Valentin NENAYDENKO,

Moskva davlat universiteti Organik kimyo kafedra mudiri, kimyo fanlari doktori

Saida ABDURAXMANOVA Sabidovna,

O'zbekiston Milliy Universiteti, Kimyo fakulteti, umumiy va neft-gaz kimyo kafedrasi katta o'qituvchisi, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori

O'zMU professori M.Mahkamov taqrizi asosida

PROCESS OF SYNTHESIS OF DIINDIOLS FROM ACETYLENE ALCOHOL IN NEW CATALYTIC SYSTEMS

Annotation

In this work, diacetylene diols are formed based on the reaction of homolytic coupling of terminal acetylene alcohols with aliphatic, alicyclic, aromatic and heterocyclic molecules using copper (I) chloride as a catalyst, N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine as a ligand, carbon tetrachloride as oxidizing agent, methanol as solvent. The most optimal conditions for the dimerization of terminal acetylene alcohols were determined and the reaction kinetics were analyzed. Synthesized diacetylene diols were identified, their composition, purity, structure and specific constants were proved by modern physico-chemical methods.

Key words: Terminal acetylene alcohols, diacetylene diols, dimerization, catalytic system, reaction mechanism, product yield.

ПРОЦЕСС СИНТЕЗА ДИИНДИОЛОВ ИЗ АЦЕТИЛЕНОВОГО СПИРТА В НОВЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Аннотация

В данной работе диацетилен диолы образуются на основе реакции гомолитического сочетания концевых ацетиленовых спиртов с алифатическими, алициклическими, ароматическими и гетероциклическими молекулами с использованием в качестве катализатора хлорида меди (I), N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамина в качестве лиганда, тетрахлорметан в качестве окислителя, метанол в качестве растворителя. Определены наиболее оптимальные условия димеризации концевых ацетиленовых спиртов и проанализирована кинетика реакции. Синтезированные диацетиленовые диолы идентифицированы, их состав, чистота, структура и собственные константы доказаны современными физико-химическими методами.

Ключевые слова: Терминальные ацетиленовые спирты, диацетилен диолы, димеризация, каталитической системы, механизм реакции, продукт.

YANGI KATALITIK SISTEMALarda ATSETILEN SPIRTLARIDAN DIINDIOLLAR SINTEZ QILISH JARAYONI

Annotatsiya

Ushbu ishda katalizator sifatida mis (I) xlorid, ligand sifatida N,N,N',N'- tetrametiletendiamin, oksidlovchi agent tetraxlorometan va erituvchi metanol yordamida molekulasi alifatik, alisiklik, aromatik va geterosiklik saqlagan terminal atsetilen spirlarining oksidlanish bilan boradigan gomolitik birikish reaksiysi asosida diatsetilen diollari sintezi tadqiq qilingan. Terminal atsetilen spirlarining dimerlanish jarayonining eng muqobil sharoitlari aniqlangan va reaksiya kinetikasi tahlil qilingan. Sintez qilingan diatsetilen diollari identifikasiyalangan, ularning xususiy konstantalari, tuzilishi, tozaligi va tarkibi zamonaliviy fizik-kimyoviy tadqiqot usullari yordamida isbotlangan.

Kalit so'zlar: Terminal atsetilen spirlari, diatsetilen diollari, dimerlanish, katalitik sistema, reaksiya mexanizmi, mahsulot unumi.

Kirish. Respublikamizda dunyo bozorida raqobatbardosh yangi turdag'i atsetilen birikmalarini sintez qilishda mahalliy xom-ashyo va ikkilamchi chiqindi mahsulotlaridan maqsadli foydalanish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalgalashmoqda. Bu borada selektiv katalitik sistemalarda terminal atsetilen spirlari, diollari va diindiollari sintez qilish usullari va texnologiyalarini topish, ularni identifikasiyalash, texnik hamda texnologik parametrlarini ishlab chiqish va ulardan samarali biologik faol moddalarni yaratishga yo'naltirilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar muhim amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.


Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Propargil spirlari kimyoviy sintezda keng tarqalgan xom ashyo bo'lib, qimmatli sintetik oraliq mahsulotlar yoki dorivor preparatlarning o'zagi sifatida keng qo'llanilishi mumkinligi sababli juda qadrlanadi [1-3]. Shanxay an'anaviy Xitoy tibbiyot universiteti professori Changhong Wang va uning ilmiy jamoasi tomonidan poliatsetilen birikmalar asosida yangi avlod katalitik sistemalar yordamida 90% unumgacha turli xil biologik faoliyka ega bo'lgan atsetilen

diollarini sintez qilingan va olingan mahsulotlarning farmakologik va biologik funktsiyalari bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan [4]. *Launaea capitata* (Spreng) yovvoyi o'simligi ekstrakti kolonkali xromatografiya yordamida tozalanib poliatsetilen hosilalari olingan, jumladan, (3*S*, 8*E*)-deken-8-diol-4,6-diol-1,3, (3*S*)-dekatrien-4,6,8-diol-1,3, (3*S*)-(6*E*, 12*E*)-tetradekadieni-8,10-diol-1,3 va (3*S*)-(6*E*, 12*E*)-tetradekadien-8,10-diol-1-ol-3-O-b-D-glukopiranozid ajratib olingan va fermentlarga qarshi yangi ingibitorlarni ishlab chiqish uchun xom ashyo sifatida taklif qilingan [5].


Tadqiqot metodologiyasi. Termik bardoshli shliflangan besh og'izli kolbada dastlab ekvimolyar nisbatda olingan 3,3,4-trimetilpentin-1-ol-3 va TMEDA ning emulsiyasi 60 minut davomida tayyorlandi. So'ngra uchbu emulsiyaga 120 ml CuCl ning metanoldagi suspenziyasi 60 minut davomida aralashtirildi. Kolbadagi eritmaga (katalitik komponentga) 20 °C haroratida 2 mol miqdordagi tetraxlormetan 11 soat davomida aralashtirildi va 24 soat tindirishga qo'yildi. Tindirilgan aralashma tarkibidagi erituvchi (MeOH) oddiy sharoitda bug'latildi, organik va anorganik komponent 300 ml suv eritildi va suv fazasi 300 ml dixlormetan (3x200 ml) bilan ekstraktsiya qilindi. Organik qatlamlar Na₂SO₄ orqali quritildi. Erituvchi vakuumda bug'latildi va qolgan mahsulotni silikagel 60 kolonkali xromatografiyada turli elyuentlar (CH₂Cl₂:MeOH 100:1, 30:1) orqali o'tkazildi. Natijada 215 g (86%) oq kukun 2,2,3,8,9,9-geksametildekadien-4,6-diol-3,8 (3) mahsulot sintez qilindi.

Ushbu usul bo'yicha 1-etinilsiklopentanol, 2-fenilbutin-3-ol-2 va 2-(furani-2)butin-3-ol-2 kabi terminal atsetilen spirlarining dimerlanish jarayoni olib borildi va mos ravishdagi diiindollar, jumladan 185 g (85%) 1,1'-(butadiin-1,3-diil-1,4)bis(siklopentanol-1) (1), 148 g (51%) 2,7-difeniloktadien-3,5-diol-2,7 (2) va 176 g (65%) 2,7-di(furani-2)oktadien-3,5-diol-2,7 (4) sintez qilindi.


Tahsil va natijalar. Tadqiqot obyekti sifatida tanlangan terminal atsetilen spirlarining oksidlanish bilan boradigan birikish reaksiysi katalizator sifatida mis (I)-xlorid, ligand sifatida *N,N,N',N'*-tetrametiletendiamin (TMEDA), promator tetraxlormetan (CCl₄) va erituvchi metanol (MeOH) yordamida amalga oshirildi. Natijada molekulasida ikkita uch bog' va ikkita gidroksil guruhi hamda alifatik, aromatik, siklik va geterosiklik o'rinxbosalar saqlagan diatsetilen diollar sintez qilindi. Birikish reaksiysi umumiy sxemasi va mexanizmi adapbiyot manbaalari asosida quyidagicha taklif etildi [6].



Jarayonda dastlab katalizator CuCl ligand TMEDA bilan ta'sirlashib mis (I) kompleks tuzini hosil qiladi.



Hosil bo'lgan mis (I) kompleks tuzi sistemaga qo'shilagan CCl₄ yordamida oksidlanib mis (II) kompleks tuziga aylanishi hisobiga sistemada trixlormetan anioni hosil bo'ladi. Ushbu jarayonda CCl₄ bir vaqtning o'zida ham erituvchi ham oksidlovchi vazifasini bajaradi.




Sistemada trixlormetan anioni uchbog'ga birikkan harakatchan vodorodni biriktirib trixlormetan molekulasini va deprotonlangan atsetilen spirti anionini hosil qiladi.




Hosil bo'lgan anion asos TMEDA ishtirokida sistemadagi kompleks katalitik sistema- mis (II) kompleks tuzi bilan ta'sirlashib mis (II) π-kompleksini hosil qiladi.


TMEDA tarkibidagi ikkita azot atomining bog' hosil qilishda ishtirok etmagan juft elektronlari hisobiga alkindagi vodorodni va mis (II) kompleks tuzi tarkibidagi xlor bilan donor-aktseptor bog' hosil qilib reaksiya borishini osonlashtiradi.



Xuddi shunday tartibda kompleks tuz molekulasi dagi ikkinchi mis atomi ham alkinning ekvivalent miqdori bilan ta'sirlashadi.



Hosil bo'lgan oraliq mahsulotning oksidlanib elimirnashidan mis (I) kompleks va yangi C-C bog' hosil bo'lish hisobiga diatsetilen diol olinadi.



Tadqiqot obyekti hisoblangan diatsetilen diollari unumiga va jarayon selektivligiga ta'sir qiluvchi katalizator, reagent va substratlarning tabiatini va miqdorini, harorat va reaksiya davomiyligi ta'siri tizimli tahlil qilindi.

Bunda dastlab diatsetilen diollari sintezi uchun aproton erituvchi- tetragidrofuran (TGF) va proton erituvchilar- metanol (MeOH) va etanol (EtOH)larning mahsulot unumiga ta'siri o'rGANildi. Dastlab dimerlanish jarayoni aproton erituvchi TGF da olib borildi va mahsulot unumdorligi past bo'lganligi sababli, keyingi tadqiqotlar aproton erituvchilarda olib borildi (1-Jadval).

1-Jadval


**Diatsetilen diollari unumiga katalizator va erituvchilar tabiatini ta'siri
(ligand TMEDA, harorat 20 °C, reaksiya davomiyligi 12 soat)**

Erituvchi	Katalizator	Mahsulot unumi, %			
		I	II	III	IV
TGF	CuCl	49	47	12	26
	CuCl	86	85	51	65
	CuBr	65	63	32	42
MeOH	CuI	58	56	24	39
	CuCl	79	77	43	58
	CuBr	58	56	25	39
EtOH	CuI	50	49	17	31

Qutbli proton erituvchilarda reagentlarning dissotsiyalanish darajasi yuqori bo'lishi hisobiga ionlarning to'qnashuvlari maksimum o'tdi. Jadvaldan ko'rinish turibdiki, dielektrik konstantasi va dipol momenti EtOH ga nisbatan yuqori bo'lgan MeOH da diindiollar sintezida yuqori samaradorlikka erishildi.

Mahsulot unumiga katalizator tabiatini ta'siri o'rGANildi. Bunda reaksiya CuCl da olib borilganda diindiollar- 1- 86%, 2- 85%, 3- 51% va 4-65% unum bilan eng yuqori selektivlikni namoyon qildi. Misning 3d elektron qobiqchasi uning ligandlar bilan donor-akseptor bog' hosil qilish imkoniyatini beradi va bu misning bir valentli kationidan ikki valentli kationiga o'tishi natijasidagi oksidlanish-qaytarilish jarayonlariga asoslangan gomolitik birikish reaksiyasi uchun juda qulay hisoblanadi [7]. Ma'lumki, mis (I) galogenidlarda yadro zaryad va elektromanfiylik yoddan fторga tomon ortib boradi ammo fторning aktivligi juda yuqori bo'lganligi sababli mis (I) fторid barqaror holatda mavjud bo'la olmaydi va tezda mis (II) fторidga o'tadi [8]. Shu sababli jarayonda mis (I) xloridning boshqa katalizatorlar bilan taqqoslanganda yuqori katalitik faoliytni namoyon qildi.

Diatsetilen diollari unumiga harorat ta'sirini o'rGANish va jarayon uchun muqabil sharoitini aniqlash maqsadida, reaksiyalar 10 °C dan 30 °C gacha bo'lgan intervallarda olib borildi (1-Rasm). Reaksiya 20 °C da olib borilganda diatsetilen diollar unumi eng yuqori chiqishi aniqlandi.

**1-Rasm. Diindiollar unumiga harorat ta'siri**

Rasmdan ko'riniib turganidek, harorat 0 dan 20 °C gacha oshirilganda, diindiollar unumdarligi oshib borishi kuzatildi. Ya'ni jarayonda boshlang'ich moddalar dissotsiyalanishi va katalizator selektivligi ham harorat ko'tarilgan sari faollanishi aniqlandi va diindiollar unumi 1- 79% dan 86% ga, 2- 77% dan 85% ga, 3- 40% dan 51% ga va 4- 57% dan 65% ga ko'tarilishi aniqlandi. Biroq harorat 30 °Cga ko'tarilganda katalizator va ligandning selektivligi kamayishi hisobiga qaytar jarayon va polimerlanish sodir bo'lishi unumming pasayishiga olib keldi.

CuCl/TMEDA/CCl₄ katalitik sistema mol miqdori 0,1:2,0:2,2 mol nisbatlarda olinganda sistemada molekula va ionlarning maksimum g'alayonlangan holatga o'tishi kuzatildi, ya'ni faollanish energiyasi kamayishi hisobiga oraliq mahsulot barqarorligi ortdi va katalizator o'zining eng yuqori faolligini namoyon qildi.

Dimerlanish jarayoni 6÷18 soat interval oralig'ida olib borildi. 6÷12 soat oralig'ida mahsulot unumi oshib borishi kuzatildi. 12 soatda mahsulot unumi maksimum chiqishi kuzatildi. Biroq reaksiya davomiyligini yana ortishi sistemada hosil bo'lgan dimer mahsulotlarining degidratlamishi va polimerlanishi asosida qo'shimcha mahsulot sifatida poliatsetilen birikmalari hosil bo'lishi hisobiga diindiollar unumi pasayishi kuzatildi.

2-Jadval**Diindiollar unumiga reaksiya davomiyligi ca CuCl:TMEDA:CCl₄ miqdori mol nisbati ta'siri (harorat 20 °C, erituvchi MeOH)**

Miqdoriy nisbatlar	CuCl	TMEDA	CCl ₄	Mahsulot unumi, %			
				I	II	III	IV
reaksiya davomiyligi 6 soat							
0,05	1,5	2,0	60	58	16	32	
0,1	2,0	2,2	79	77	34	49	
0,2	2,5	2,5	72	70	41	44	
reaksiya davomiyligi 12 soat							
0,05	1,5	2,0	68	66	32	47	
0,1	2,0	2,2	86	85	51	65	
0,2	2,5	2,5	81	79	45	61	
reaksiya davomiyligi 18 soat							
0,05	1,5	2,0	65	64	30	44	
0,1	2,0	2,2	84	81	48	61	
0,2	2,5	2,5	78	75	43	57	

Sintez qilingan diatsetilen diollarining tozaligi, tarkibi, tuzilishi va xususiy xossalari zamonaviy IQ-, ¹H-YaMR, ¹³C-YaMR spektroskopiya, mass spektrometriya, xromatografik (YQX, KX), kvant-kimyoviy, biologik va boshqa fizik-kimyoviy tadqiqot usullari yordamida tahlil qilindi va identifikasiyalandi.

Xulosa va takliflar. Ilk bor terminal atsetilen spirtlarini oksidlanishi bilan boradigan gomolitik birikish reaksiyasi asosida diatsetilen diindiollar sintez qilish usuli ishlab chiqildi, jarayon uchun muqobil sharoit topildi, reaksiya mexanizmi taklif etildi.

Terminal atsetilen spirtlar molekulasida radikallar tabiatи va ularning fazoviy ta'sir etish xossasiga ko'ra ularning dimerlanish jarayonining faollanish qatori aniqlandi. Unga ko'ra mahsulot unumi- 3 < 4 < 2 < 1 qatori bo'yicha oshib borishi isbotlandi.

ADABIYOTLAR

- Krzysztof Kuciński, Alicja Luczak, Aliaksei Mankouski, Grzegorz Hreczycho Base-catalyzed addition of silylacetylenes to ketones: a route to protected tertiary propargyl alcohols // Organic Chemistry Frontiers, 2023. Volume 10, Issue 11, Pages 2752-2759.
- S.Jiang, S.Du, R.Yang, F.Jin, Z.-Z. Zhou, W.-F. Tian, X.-R.Song, Q.Xiao Bronsted Acid Promoted Sulfenylation of Propargylic Alcohols: Synthesis of Triaryl Allenyl Sulfones under Mild Conditions // European Journal of Organic Chemistry 2023. p.e202201377.
- A.R.Pandey, D.K.Tiwari, A.Prakhar, D.P.Mishra, S.K.Sharma A review towards synthesis of heterocycles using propargyl alcohols and propargyl amines // Monatshefte für Chemie, 2022. Volume 153, pp. 383-407.
- Qi Xie, Changhong Wang Polyacetylenes in herbal medicine: A comprehensive review of its occurrence, pharmacology, toxicology, and pharmacokinetics (2014–2021) // Phytochemistry, 2022. Volume 201, pp. 113-288.
- Fatma M. Abdel Bar, Amira Mira, Ahmed I. Foudah, Manal A. Alossaimi, Shatha F. Alkanhal, Alanoud M. Aldaej and Mai H. ElNaggar In Vitro and In Silico Investigation of Polyacetylenes from *Launaea capitata* (Spreng.) Dandy as Potential COX-2, 5-LOX, and BchE Inhibitors // *Molecules*, 2023. Volume 28, Issue 8, pp. 3526.
- Tirkashova S.I., Ziyadullaev O.E., Samatov S.B., Buriyev F.X., Ikramov A. Dimerization of some terminal acetylene alcohols / VI North Caucasus Organic Chemistry Symposium, Stovropol (Russia), 2022. p. 133.
- Rabia Akhtar, Ameer Fawad Zahoor Transition metal catalyzed Glaser and Glaser-Hay coupling reactions: Scope, classical/green methodologies and synthetic applications // Synthetic Communications, 2020. Volume 50, Issue 22, pp. 3337-3368.
- Housecroft Catherine E., Alan G. Sharpe Inorganic Chemistry: – Harlow: Pearson Education, 2008. pp. 737-738.