



Аманов Бахтур Хушбакович, 1981 йил 18 октябрда Сурхондарё вилояти, Ангор туманида туғилган, биология фанлари доктори.

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти Табиий фанлар факультети Генетика ва эволюцион биология кафедраси муdiri ҳамда Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти хузуридаги Илмий кенгаш илмий котиби.

Генофонд-2, Ангор, ТошДУУ-130, Нисо навларининг муаллифи ва ҳаммуаллифи, 2 та патент эгаси.

Б.Х. Аманов томонидан 3 та монография ҳамда 200 ортиқ илмий мақолалар маъралий ва хорижий нашрларда чоп этилган.



Абдус Фозил Рашидович, 1982 йил 30 январда Қашқадарё вилояти, Гузар туманида туғилган, қишлоқхўжалиги фанлари доктори.

Тошкент давлат аграр университети «Қишлоқ хўжалиги ақиллари генетикаси, селекцияси ва уруғчилик» кафедрасида профессор лавозинида фаолият юритиши билан бир вақтда университетнинг «Илмий инновациялар» бўлими бошлиги ва Тошкент давлат аграр университети хузуридаги илмий даражадор берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда раис ўринбосари лавозимларида фаолият юритиб келмоқда.

ТошДУУ – 100, СП – 7701 ва СП – 7721 навларининг муаллифи ва ҳаммуаллифи, 1 та патент эгаси.

Ф.Р. Абдус томонидан 2007-2021 йилларда илмий-тадқиқот ишлари бўйича жами 61 та илмий иш чоп этиб, шулардан, 28 та си, жумладан 28 та си республика ва 10 та си хорижий журналларда нашр қилинган, 2 та монография, 1 та ўқув қўлағида чоп этилган.

Б.Х. АМАНОВ, Ф.Р.АБДУШЕВ



**ПЕРУ ЁЎЛА ТУРЛАРИНИНГ ТУРИЧИ ВА ТУРЛАРАРО
ДУРАТАЙЛАНИШ АСОСИДА ГЕНЕТИК ЖИХАТДАН
БОЎЛИШЛАН ТИЗМАЛАР ЯРАТИШИ**

ТОШКЕНТ – 2021

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИК ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА
ИНСТИТУТИ**

Б.Х. АМАНОВ, Ф.Р. АБДИЕВ

**ПЕРУ ҒЎЗА ТУРЛАРИНИ ТУРИЧИ ВА ТУРЛАРАРО ДУРАҒАЙЛАШ АСОСИДА
ГЕНЕТИК ЖИХАТДАН БОЙТИЛГАН ТИЗМАЛАР ЯРАТИШ**



«LESSON PRESS» НАШРИЁТИ

ТОШКЕНТ – 2021

Аманов Б.Х., Абдиев Ф.Р. Перу ғўза турларини туричи ва турлараро дуратайлаш асосида генетик жихатдан бойитилган тизмалар яратиш //Монография. Тошкент: "Наврўз" нашриёти, 2021. - 218 б.

Ушбу монография Перу ғўза турларининг генетик хилма-хиликларини туричи ва турлараро чаতিштириш асосида олинган дуратай авлодларида белги-хусусиятларни ирсийланиши, ўзарувчанлиги, коррелятив боғлиқлиги, юқори авлод дуратайлари ҳамда тизмаларида кимматли хўжалик белгиларни шаклланишига оид экспериментлар асосида ёзилган.

Ушбу монографиядан генетиклар, селекционерлар, ўсимликшунос олимлар, бакалавр ва магистр талабалар фойдаланишлари мумкин.

Масъул муҳаррир: академик, А.А.Абдуллаев.

Тақризчилар: к/х.ф.д. Ф.Б.Намозов.

б.ф.д. А.Н.Хўжанов.

Тошкент вилояти чирчиқ давлат педагогика институти Илмий Кенгашининг 2021 йил 21 майдати 10-сонли бёёномаси билан тасдиқланган.

КИРИШ

Бугунги кунда жаҳонда ишлаб чиқаришнинг замонавий талабларида жавоб бера оладиган, серхосил, тола чиқими юқори, касаллик, зараркунанда ва мухитнинг нуқудай омилларига чидамли ғўза навларини яратиш, тақомиллаштириш ва наводорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2018-2019 йилларда дунё миқёсида ҳар йили пахта хом ашёсини ишлаб чиқариш миқдори 25,9 млн. тоннани ташкил этиши кутилмоқда¹. Бу эса жаҳон пахта бозорида толаси киммат баҳоланадиган ингичка толали ғўзанинг янги навларини яратишда, уларнинг кимматли хўжалик белгиларини, жумладан, тезпишарлик, хосилдорлик, тола чиқими ва сифати кўрсаткичларини ҳамда турли стресс омилларга чидамлигини ошириш лозимлигини кўрсатади. Бу йўналишдаги илмий тадқиқотлар *Gossypium L.* туркумига мансуб ингичка толали Перу ғўза турларининг ирсий потенциалидан генетик-селекцион тадқиқотларда кент фойдаланиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Жаҳонда ингичка толали ғўзанинг кимматли-хўжалик кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган илмий изланишларда коллекция намуналаридан кент фойдаланишга катта эътибор берилмоқда. Бу намуналар дуратайларида морфобиология, жумладан кимматли-хўжалик белгиларининг ирсийланиши, ўзарувчанлиги, наслдан-наслга берилиши ва ўзаро корреляцион боғлиқлигининг генетик конуниятларини аниқлашга доир катта қўламада тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бунда ингичка толали ғўзанинг тезпишарлик, хосилдорлик, кўсак йиркилиги, тола сифати ва чиқимининг ирсий бошқарилиш хусусиятларини аниқлаш, потенциал билан назорат қилинадиган микдорий белгиларнинг кўрсаткичларини ошириш, дуратайлашда ингичка толали турлар ва туричи хилма-хиликларидан кент қўламада фойдаланиш асосида янги истиқболли тизма ва навлар яратиш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Интичка тоғали ғўзада кўпчилик талкикотлар тизмалар ва навлараро дурағайлашда кимматли-хўжалик белгиларининг ирсийланиши, ўзгарувчанлиги ҳамда корреляциси ўрганишга бағишланган (И.К. Максименко, 1958; В.А. Автономов, 1973; О.Х. Кимсанбаев, 2004; П.Ш. Ибрагимов, В.А. Автономов, 1993; Ф.Р. Абдиев, 2011; К.О. Хударганов, 2012; Н.Э. Чоршанбиев, 2018; Ж.Х. Ахмедов, Х. Чориева 2018). Хусусан, Ф. Джаникулов, О. Нарбаевлар (2002) ғўзанинг ёввойи *G.dalwīnii* Watt тури устида радиация услуги ёрдамида талкикотлар ишлари олиб боришган. Ёввойи *G.dalwīnii* Watt тури очик дала шароитида биринчи йили хосил бермаган ва бу фотопериодик ҳолатни йўқотиш учун радиомутация усулидан фойдаланган ҳолда мутант тизмалар яратишга эришилган. А.А. Абдуллаев ва бошқалар (2006) ғўзанинг *G.barbadense* L. айрим туричи хилма-хилликларини дурағайлаш асосида F₁ ўсимликларида ҳаётчан, ҳосилдор комбинацияларни, кейинги авлодларда эса юқори трансрессив ўзгарувчанлик натижасида ноёб рекомбинантлар ажратиб олишган.

Интичка тоғали ғўза турларида молекуллар генетика асослари, цитологик, биокимёвий ва анатомик белгиларни ўрганиш бўйича ҳам катор талкикотлар олиб борилган ва олинган натижалар Р.К. Шадманов (1986), М.Ф. Санамъян (2014), А.Ал. Абдуллаев (2017), Ф.Н. Кушанов (2017), Н.В. Грабовцев (2017), Л.Ф. Wendel, Р.С. Ретсу (1990), Л.Е. Endrizzi, E.L. Turcotte, R.J. Kolbe (1985) ва бошқа олимлар ишларида ёритилган.

Бирок, айнан ғўзанинг *G.barbadense* L. туричи хилма-хилликларининг ўзаро ҳамда ёввойи *G.dalwīnii* Watt тури билан чагилштиришдан олинган дурағайларида морфоҳўжалик белгиларининг ирсийланиш, ўзгарувчанлик ва ўзаро коррелятив боғлиқлик хусусиятларини ва селекция учун аҳамиятини аниқлаган ҳолда дурағай генотипларидан янги селекцион ашёлар яратиш ва навларасига етказиш бўйича саноқли талкикотлар олиб борилган. Юқорида келтирилган маълумотлар ишнинг долзарблигини асослайди. Қолаверса, ушбу йўналишда олиб борилган талкикот натижалари асосида *G.barbadense* L. турининг рудерал, маданий тропик ва субтропик шакллари

ҳамда ёввойи *G.dalwīnii* Watt турининг кимматли генларини ғўзанинг маданий навларга олиб ўтиш имконияти яратилади.

G.barbadense L. туричи хилма-хилликларининг ўзаро ва *G.dalwīnii* Watt тури билан дурағайларида морфоҳўжалик белгиларининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлигини тавсифлаш асосида ирсияти бойитилган янги тизмалар яратиш ҳамда селекцияда қўлладан иборат.

G.barbadense L. турининг туричи хилма-хилликлари ва *G.dalwīnii* Watt турининг морфобиологик ва хўжалик белгиларини киёсий таҳлил қилиш; интичка тоғали ғўзанинг туричи ва турлараро дурағайларида морфоҳўжалик белгиларининг ирсийланиш ва ўзгарувчанлик хусусиятларини гибридологик таҳлил қилиш;

ажратиб олинган оилаларда айрим морфоҳўжалик белгиларининг ўзаро корреляцисини аниқлаш; энг яхши кўрсаткичли тизмани морфоҳўжалик белгилари бўйича навларасида такомиллаштириш ва барқарорлаштириш;

янги интичка тоғали ғўза навили Давлат нав синовининг Грунт назоратига топшириш ва республиканинг жанубий минтақасида морфоҳўжалик кўрсаткичларини талқин қилишга қаратилган.

І БОБ, GOSSYPUM L., ТУРКУМІН А МАНСУБ ЁЎЗА
ТУРДЛАРИНИНГ ДУРАГАЙЛАРИДА МОРФОБИОЛОГИК
БЕЛГИЛАРИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ, ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ ВА
КОРРЕЛЯЦИЯСИ.

1.1-§. Ёўза турларининг дурагайларида морфо-хўжалик белгиларининг генетик-селекцион таъкикотлар таҳлили.

Мавлүмки, *Gossypium* L. туркумита мансуб Перу ғўза турларини турчи хилма-хилликларининг биологик потенциалидан фойдаланши, улар асоснда кимматли гермпизматли донорлар олиш бу турларнинг турчи биоморфологик хилма-хиллигини ўрганишни талаб этади. Интичка толали *G. barbadense* L. тури ғўзаси энг ёш ва пластик тур бўлиб, унинг ватани Перу кисиобланали.

Шуни таъкидлаш керакки, кўп йиллардан бери илгичка тоғлали ғўза номлари унинг хилма-хил номлари ва экологик ўзгаришлар (навлар) билан боғлиқ. Турли вақтларда *G. barbidentse* L. ғўза турининг 15 та яқин синоними мавжуд бўлган Р.А. Фухел [1992]. Қадимий илмий манбаalarda қайд этилишича, кўпинча *G. vitifolium*, *G. reticulatum*, *G. brasiliense*, *G. acuminatum* чекланган микдорда морфологик белгиларга асосланган бўлиб, улар оралик фенотип мойиллик билан оддий ирсийланиш хусусиятига эга эди. Ёввойи *G. damonii* тури бундан мустафо, барча турларнинг номлари битта *G. barbidentse* L. тури билан алмаштирилди. Барча турларнинг факат *brasiliense* ва *damonii* хилма-хилликлари интраспецифик бўлиб қолди [J.V. Hutchinson, R.A. Slow, S.G. Stephens [1947], лекин *G. damonii* эса алоҳида тур сифатида тавсифланган J.F. Wendel, R.G. Percy [1990], F. Liu et al. [2016], L.V. Hoffmann et al. [2018].

Ҳозирги кунда жаҳон пахтачилигида ғўзанини *G. barbadense* L. турти 9
фонзини ташқил этади. Дунё мамлакатларидан АҚШда етиштирилиб, Си-
Айленд номи билан машҳур бўлган ҳамда кейинчалик Си-Айленд ғўза
навлари Африканинг Миср водийларига кириб келган ва узун инчиچка тоғлаги

Миср навлари сифатида кенг майдонларда етиштирилиб келинмоқда.
А.М.Абдалла [2001].

Gossypium L. туркумининг туричи ва турларо дурағайлаш генетик тахлили асосида ёввойи, рудерал, маданий тропик шакллар деярли ўрғанилмаган, лекин насларнинг селекциядаги имкониятларини аниқлаганлар Ж.А. Мусаев [1956], Д.Б. Бабаев [1963], А.М. El-Zahaby et al. [2012], S.C. Natland [1939], W.R. Meredith [2000], E.R. Norton et al. [2002].

Полиморф ғўза турларининг туричи хилма-хилликлари бу борада кам ўрганилган бўлиб А.А. Абдуллаев ва бош. [1972], Б.Х. Аманов [2007, 2010, 2012, 2015], С.М.Ризаева [1996], З.А.Эрназарова [1998], Д.Қ.Эрназарова [2008], Б.Х.Аманов, С.М.Ризаева, Ф.Х. Абдуллаев [2014], Х.А.Мўминов [2016], Ф.У.Рафиева [2017], Ф.У.Рафиева, С.М.Ризаева [2014], Б.А.Сирожиiddинов [2014, 2015, 2017], С.А.Усманов, Ф.Р. Абдиев ва бошқалар [2011, 2012], С.Л. Витбакег et al. [1999], P.A. Fluxell et al. [1992], R.G. Regey [2009], Wendel J.F., R.C. Stone [2003].

Перу ғўза турларининг туричи хилма-хилликлари деярли ўрғанилмаганлиги.

Ф.М. Мәуер [1938] гүзанин тетрапloid ва дипloid (*G. barbadense* L. x *G. thurberi* Tod.) x *G. arboreum* L. турларини ўзаро чагштириб, (AD_2 , D_1 ва A_2 геномларни ўз ичига олган, натижада ота-она турларининг қимматли хўжалик белги ва хусусиятларини ўзида мужассамлаштирган ноёб декомбинатларни амалий селекция таджикот ишларига тавсия этган.

S. C. Nanland [1939] ўзи тақлиф қилган гипотезага кўра, *Gossypium* L. туркумига мансуб турларнинг турлараро дуратайларидани бузилишлар структуравий фарқланиш учунгина эмас, балки бир-бирига боғлиқ бўлмаган генетик муносабатлар ҳам бўлиши мумкин. Бунга эпистатик ёки аллеллар ўртасидати муносабатларни келтириш мумкин. Иккита бир-биридан фарқланувчи алоҳида барқарорлашган популяцияда дуратай-авлодлари учун зарарли, ammo популяция учун ўзаро боғлиқ бўлмаган бўлган мутациялар йингилиб боради. Вақтлар ўтиши билан мутациялар изоляцияланган (бошқа

турлардан) турларда тулпанади ва қачонки изоляцияон тўсиқлар бузилганда 2 та турни аралашувига тўсиқлик қилувчи қучли тўсиққа айланади.

А.А. Абдуллаев [1974] олиб борган илмий изланишларида, *ғўзанинг G. barbadesse* L. турига мансуб айрим туричи хилма-хилликларидаги морфологик ва ҳўжалик белгиларига тавсифи асосида *subr. vifibolm* кенжа тури селекция жараёнида алоҳида ўрин тутишини айтиб ўтган ҳамда донор сифатида фойдаланишни тавсия этган. Бундан ташқари *ғўзанинг* ёввойи *G. darwini* Watt турини келгуси илмий тадқиқот ишларида кенг жалб қилишни тавсия берган, чунки ушбу тур шўрга жуда чидамли эканлиги аниқланган.

Т.К. Махмудов, Л.Д. Садыкова, Ф.Х. Мамедовлар [1982] олиб борган илмий изланишларида, *ғўзанинг* тетраплоид ва диплоид турлар ўртасида турлараро дуралайлаш ишлари ўтказилган. *G. hisutim* L. га мансуб нав намуналарини А, В, С, D, Е геномли маданий диплоид турлар билан чагиштириб, пушсиз триплоидлар формалар олинган. Ушбу олинган дурай ўсимликларни қолқичин ёрдамида хромосома сонини қаррали ошириб пушсиз *G. hisutim* L. х *G. sinii* L., *G. arboreum* L. х *G. hisutim* L., *G. hisutim* L. х *G. raimondii*, *G. barbadesse* L. х *G. raimondii*, *G. barbadesse* L. х *G. arboreum* L. амфилиплоидларни *G. hisutim* L. билан чагиштириб, *G. hisutim* L. турининг қимматли ҳўжалик белгиларига яқин бўлган шакллар ажратиб олинган ҳамда селекция тадқиқотлар учун бошланғич манба сифатида тавсия этганлар.

Ўзанинг 5 та тетраплоид турлар ўртасида дуралайлаш олиб борганлар ва бунинг натижасида ушбу турлар бир-бири билан чагиша олишини ҳамда сунъий чагиштириллар ёрдамида авлод бериш қобилиятига эга дуралайлар олиш мумкинлиги келтириб ўтилган J.E. Endrizzi, E.L. Turcotte, R.J. Kohel [1985, 1994].

D.R. DeJorode, J.F. Wendel [1992] дар қайд этилича, *ғўзанинг Gossypium* L. туркумига мансуб тетраплоид *G. tomentosum* Nutt, *G. muselinum* Meis ex Watt, *G. darwini* Watt ва *G. hisutim* L. турларининг қоллекциялари ўртасида

қўшаб илмий изланишлар олиб борганлар. Жумладан, *Gossypium* L. туркумининг ёввойи ва примитив турларидан қўпчилиги қун узунлигига тавсирчан ва узун қун шароитида умуман гулдамаслиги кузатишган ҳамда бу эса ҳар хил экзотик турлардан селекция тадқиқот изланишларида фойдаланиш учун имкон бермаслигини таъкидлаганлар.

S.S. Mehetе [1993] қайд этилича, *ғўзанинг Gossypium* L. туркумига мансуб турларини генетик тақомиллаштиришда туричи ва турлараро дуралайлаш услуби жуда қимматли аҳамиятга эга эканлигини ҳамда чагиштиришда иштирок этаётган ёввойи *ғўза* турларининг фойдали белги-хусусиятларини маданий навларга ўтказиш алоҳида қасб этишини таъкидлаган.

С.М. Ризаева [1996] олиб борган изланишларида, *ғўзанинг Malvaceae* оиласига қирувчи турлари ўртасида турлараро дуралайлаш ишларини олиб борганлар, яъни тетраплоид ва диплоид *G. hisutim* L., *G. raimondii* Ulb., *G. thurberi* Tod., *G. darwintonii* Kell., *G. Molteschianum* Anderss., *G. trilobum* (Mocvet Sesse ex DC) Skovsted, *G. atrovirens* Keatney, *G. harknessii* Brande. турлари ўртасида дуралайлаш ишлари олиб борилган ва ноёб рекомбинант шакллар ажратиб олган ҳамда амалий селекция ишларига тавсия этилган.

S.D. Tanksley, J.C. Nelson [2006] тадқиқотларида, *ғўзанинг* ёввойи термиплазмага эга бўлган шакллардан *ғўза* хосилдорлигини ошириш, абиотик омилларга, касалликларга чидамлилик ва тола сифатини яхшиловчи ашё сифатида фойдаланиш, бундай ёввойи шакллар элита тизмаларининг хусусиятларини яхшиловчи аллел генларни ўзида сақлаши мумкин деб таъкидлайдилар.

А.А. Абдуллаев ва бошқалар [2006] олиб борган илмий изланишларида, *ғўзанинг* ёввойи аждоқларининг фойдали белги ва хусусиятларини маданий навларни яратишдаги имкониятларини ўрганиш борасидаги изланишлари натижасида, *Gossypium* L. туркуми турларидан генетика-селекция тадқиқотларда умуми фойдаланиш концепцияси ишлаб чиқилган, шунингдек, ёввойи *ғўза* турларини туричи ва турлараро

дуратайлаш натикаларига кўра, ўрганилган турларнинг филогенетик муносабатларини белгиловчи 5 та гуруҳга бўлинган. Жумладан, *G. barbadeuse* L. турчи хилма-хилликлари 1-2 чи гуруҳга киритилиб, ўзаро яхши чапишиши, F₁ авлодида ҳосилдор ўсимликлар ҳосил қилиши, турларро чапиштирилганда (АД₁ × АД₂) яхши чапишиши, шу билан бирга нисбатан узоклиги, F₁ авлодлари ҳаётчан, ҳосилдор эканлиги, кейинги авлодларда юқори трансгрессия ҳолати кузатилиши натижасида ноёб рекомбинант шакллар ажратиб олинган.

Ф. Джаникулов [2002] олиб борган илмий изланишларида, *Gossypium* L. туркумига мансуб бир қанча гўза турларининг турчи хилма-хилликларни яъни, *G. davidsonii* var. *sonaristicum*, (2n=26), *G. thibetii* (2n=26), *G. hirsutum* L. (2n=52), *G. tricuspidatum* subsp. *purpurascens* var. *gambica*, var. *el salvador*, var. *prereste*, var. *oigospertum* ва *G. hirsutum* L. subsp. *glabrum* var. *matig-galane*, (2n=52) *G. darwinii* Watt ҳамда *G. muselimum* Meitz ёввойи ва примитив турларни тадқиқот учун жалб этган. Танлаб олинган бошланғич манбаларни ⁶⁰Со ёрдамида у-нурлантириш, ³²P радиоактив моддасидан фойдаланиб, В-нурлантириш усуллари ҳамда паст частотали электромагнит майдони воситасида 200 га яқин мутант тизмалар яратилган. Ёввойи *G. darwinii* Watt ва *G. hirsutum* L. турлари ва турчи хилма-хилликлари шўрланган тулпрокларга чидамлилигини ўрганиб, *G. darwinii* кучли шўрланишга чидамли эканлигини аниқлаган. Ёзанинг *G. barbadeuse* L. турчи хилма-хилликлари ушбу аспектда жуда кам, деярли ўрганилмаган, лекин ёввойи *G. darwinii* Watt тури қисман ўрганилган.

Ф. Джаникулов, О. Нарбаевлар [2002] олиб борган илмий тадқиқотларида, гўзанинг ёввойи *G. darwinii* Watt (АД₂) тури устида радиация услуби ёрдамида тадқиқотлар ишларини олиб борган. Ўрганилган ёввойи *G. darwinii* Watt тури очик дала шаротида биринчи йили ҳосил бермаган ва бу фотопериодик ҳолатни йўқотиш учун радиомутация усулидан фойдаланилган ҳамда мутант шакл олинган. Шундан кейин ҳосил терилган ва сақлаш учун қолдирилган.

Д.К. Эрнзарова [2008] гўзанинг тетраплоид *G. hirsutum* L. турчи хилма-хилликларига мансуб ёввойи, рудерал (ярим ёввойи) subsp. *puscatum* var. *hori*, subsp. *texicanum* var. *peruvianum* (Jucatan), subsp. *peruvianum* var. subsp. *texicanum*, var. *microcarpum* *raimieri* кенжа турларини маданий навлар билан дуратайлаш асосида қимматли хўжалик белгиларга эга бўлган фойдали донорлар ажратиб олинган.

Ф.Н. Кушанов [2017] олиб борган узок йиллик тадқиқот ишларида, UPGMA ва NJ ген муҳандислик лойиҳалари асосида ўрганилган тур ва шаклларнинг (*G. hirsutum* L.-Наманган-77 нави, var. *el-salvador*, var. *matig galane*; *G. barbadeuse* L.- subsp. *darwinii*, Термиз-14 нави) филогенетик дарахтини тузиб чиқишга муваффақ бўлган. Жумладан, қўтиландек *G. barbadeuse* L. турининг биологик хилма-хиллигига мансуб шакллар генетик структураси бўйича битта кластерга биришган. Ёввойи *G. darwinii* турини чапиштириш асосида олинган F₂-F₃ дуратайларида фотопериодизм сезувчанлик хусусиятини аниқлаш бўйича фенотипик кузатувлар олиб борган.

Н.Н. Набиева, С.М. Ризаева, Х.Ю. Тўйчиевлар [2012] гўзанинг *Gossypium* L. туркуми Карпас (Maier) Fluk. қичик туркумига мансуб тетраплоид *G. hirsutum* L., *G. barbadeuse* L. турчи хилма-хилликларини ва ёввойи *G. darwinii* Watt турини турларро дуратайлаш ишлари олиб борилган. Турларро F₁ ўсимликларида ва ота-она шаклларида энг муҳим қимматли хўжалик белгиларидан тола узунлиги, тола қичими, тола индекси ва 1000 дона чигит вазни каби кўрсаткичларининг ирсийланиши ва ўзгартувчанлиги ўрганилган.

Б.А. Сирожиiddинов [2014] қайд этилишича, гўзанинг Эски Дунё диплоид *G. arboreum* L. турининг турчи хилма-хилликлари (subsp. *obtusifolium*, subsp. *perene*, subsp. *panicum*) ва Австралия ёввойи турлари (*G. australe*, *G. nelsonii*) билан турларро дуратайлаш асосида олинган ва F₁ дуратай комбинацияларида тола узунлиги белгиси кўрсаткичларининг ирсийланиши таҳлилга кўра, тола узунлиги бўйича энг юқори кўрсаткич намоён этиб,

доминантлик даражаси $h_r=1,3$ тўлиқ доминантлик ҳолатида яъни иккбий гетерозис, баъзи комбинაციаларда эса салбий гетерозис ирсийланиш ҳолатлари кузатишган.

Ш.Э. Намазов [2014] қайд этишича, ғўзани ёввойи дилпюид турларини турлараро *G. imber* Tod. x *G. kaimonii* Ulb. дурағайлаш натижасида амфилипидлар ва улар иштирокида олинган ўсимликлар юзасидан тадқиқотлар олиб борган ва олинган узун толали, тола чикими юқори ҳамда мойдор дурағай намуналарда хўжалик учун кимматли бўлган белгилар ўртасидаги салбий боғланишларни турлараро дурағайлаш ёрдамида бўзилганлигини кўрсатиб берган. Бир хосил шохида кўсаклар тупининг марказидан четига томон узоклашган сайин толанинг узунлиги, метрик номери ошиб бориши ва етилган толалар фоизи ҳамда толанинг пишиклиги камайишини аниқлаган.

И.Р. Мenezes, F.A. Saiotto, L.V. Hoffmann [2014] олиб борган тадқиқотларида, ғўзанинг тетрапloid турлар яъни, *G. mistelini* Mierts ex Watt, *G. hispidum* L., *G. barbadense* L. турларини турлараро чапштириш ишлари олиб борилган. Олинган дурағай ўсимликлар эса амалий селекция ишларида бошлангич материал сифатида кенг фойдаланиш мумкинлигини айтиб ўтганлар.

Ф.У. Рафиева [2017] ўз илмий изланишларида, *Gossypium* L. туркумига мансуб тетрапloid ғўза турларидан *G. mistelini* Mierts ex Watt, турини *G. hispidum* L., *G. barbadense* L. *G. darwinii* Watt. турларининг туричи хилма-хилликлари билан ўзаро дурағайлаш асосида амалий селекция жараёнлари учун кимматли хўжалик белгиларга эга бўлган ноёб янги рекомбинант шакллар олиштига муваффақ бўлган.

Б.А. Сирожиiddинов [2017] кўп йиллик тадқиқотлар натижасида экспериментал полипloidия услубларини кўллаш асосида геномлараро дурағайлаш асосида янги генотипларга эга бўлган дурағай шакллари гексапloid даражасига кўтариб, улардан генетика ва амалий селекциясида самарали фойдаланиш имкониятлари тўғрисидаги янги маълумотлар

олинган. Ўрганилган ёввойи дилпюид ғўза турларининг маданий навлар (тетрапloid) билан кийин дурағайланиши, айни оналик сифатида иштирок этганида умуман дурағайланмаслиги, яъни протерандрия ходисаси (оналик устунчаси ва чагнчилар турли вақтда етилиши) ҳамда турли географик экотипларга мансублиги билан боғлиқ бўлиши, бу ҳолатлар дурағайланган турлар ўртасида маълум генетик тўсик пайдо қилиши қайд этилган.

Х.А. Мўминов [2017] ўз изланишларида, ғўзанинг полиморф дилпюид *G. herbaceum* L. ва *G. arboreum* L. турларининг туричи генетик хилма-хилликларини ва шаклларини туричи ҳамда турлараро дурағайлаш асосида ғўзанинг кимматли хўжалик белгиларидан битта кўсакдаги пахта вазни, 1000 дона чигит вазни, тола узунлиги, тола чикими ва тола индекси каби энг муҳим кўрсаткичларини таҳлил қилган ҳамда селекция тадқиқотлари учун рекомбинантлар ажратиб олган.

Ўзанинг тетрапloid *G. hispidum* L. ва *G. barbadense* L. турларини турлараро дурағайлаш натижасида генотипларнинг янги комбинაციаларини хосил бўлиши кузатилган ҳамда бу эса табиғатдаги хар битта турларни табиғий популяцияда саклашни қийинлаштиришини ва ирсий ўзгартуванликнинг бош сабабчиси эканлигини исботлаб берганлар N.C. Ellstrand et al. [1999], A.D. Adams, et al. [2017], B. Valakishna et al. [2017], Gohil S.B., et al. [2017] Mehmet Çoban et al. [2017].

Кўпйиллик селекционер олимлар ўз илмий изланишларида туричи, турлараро ва навлараро дурағайлаш асосида янги шакллар олиш, фойдали белги ва хусусиятларга эга бўлган кимматли манбалар олиш мумкинлигини кўрсатиб берганлар В.А. Автономов [1948], И.К. Максименко [1958], Дж.Х. Ахмедов [2008], В.А. Автономов [2006, 2010], Р.Р. Эганбердиев [2008], К.О. Хударганов [2012], М.А. Лиу [2000], S.Taofik, A. Stojilova [2000], Khan et al. [2004, 2009], Jia Zhao-dong, Sun Jing, Zhang Tian-zhen [2006], Mei Yong-Jun et al. [2006], A.M. Zaman et al. [2012], Deyi Shao et al. [2016], T.G.Jawahar, B.R. Patil [2017].

Дурагайлаш натижасида олинган ёўза авлодларида, генларнинг қайта комбинацияланиши натижасида кимматли хўжалик белгиларида узоқ муддатли ажралиш жараёни кетади (дурагайлаш услубига боғлиқ равишда 8-10, 15-20 йил ва ундан ортиқ). Дурагай ўсимликларида ўзарувчанлик кўлами ва белгиларнинг вариацияси секин-аста кискаради, уларда маълум микдорда нисбатан стабиллашув жараёни қоз беради. Шу билан бир каторда, дурагай манбаларнинг қисқа муддатда стабиллашув жараёни, уларни селекцион олинга, тизма ва навлар даражасига етказишнинг селекцион-генетик услублари ишлаб чиқилган. Ишлаб чиқилган услублардан бири мақсадли танлов хисобланади, ammo бу ҳолда факатгина фенотипик барқарорлашувига эришилади. Тадқиқотлар шунни кўрсатадики, бундай ҳолатда манбаларнинг кўпгина цито-генетик бузилиши, яъни бирхилликка эга бўлмаган тизма ва навларни келтириб чиқаради. Шунини инобатга олган ҳолда, узоқ муддатли яққа танловлар генетик бирхилчилиكنи тасдиқловчи гибридологик таҳлиллар билан бойитилиши муҳим аҳамиятга эга.

Ўзанинг *G. barbadense* L. турига мансуб интичка тоғали навлари тоғалининг сифати юқорилиги, касалликлардан ялғизта чидамчилиги ва бошқа фойдали белгилари сабабли генетика-селекция тадқиқотлари билан шуғулланган Марказий Осиё давлатлари яъни, асосан Ўзбекистон, Тожикистон ва Туркманистонлик олимлар эътиборини ҳамisha жалб этиб келган. Бу йўналишдаги тадқиқотлар Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти; Тожикистон илмий-тадқиқот деҳқончилик институти Вахш филиали; Тожикистон кишлок хўжалик институти; Туркманистон интичка тоғали ўзанинг селекцияси ва уруғчилиги илмий-тадқиқот институти (собик Йолатан селекция станцияси); Туркманистон Республикаси ФА Ботаника институти, М.И. Калинин номидаги Туркманистон кишлок хўжалик институтиларида олиб борилмоқда М.И. Иксанов [1993].

Р.С. Назаров ва бошқалар [2017] маълумотига кўра, Ўзбекистон Республикасида ҳозирги кунгача жуذا кўплаб интичка тоғали навлар яратилган бўлиб, жумладан Термиз-7, Термиз-8, Термиз-14, Термиз-15 ва Термиз-31 навлари яратилган. Кейинчалик интичка тоғали навлар (С-6029, С-6030, С-6032, С-6037, С-6040, С-6042, Карши-8, Карши-9, Сурхон-2, Сурхон-3, Сурхон-5, Сурхон-7, Сурхон-9, Сурхон-14, Сурхон-16, Сурхон-18, Сурхон-100, Сурхон-101, Сурхон-102, Сурхон-103) яратилган ва районлаштирилган. Сўнги йилларда дунё пахта бозорида юқори сифатли тоға сотиб олишга талаб ортганилиги сабабли I-а, I-в, I, II тип интичка тоғали навлар яратиш зарурлиги билан чамбарчас боғлиқдир.

Маълумки, юқори сифатли тоға сотиш тўхтаб қолганлиги туфайли Республикамаизда интичка тоғали ёўза навлари экин майдонлари бирдан қискариб кетди. Жумладан, 1988-1999 йиллар оралигида Республикамаиз жанубий минтакаларида интичка тоғали ёўза навлари экин майдони 200 минг гектардан 8 минг гектаргача камайди ва ўрта тоғали пахта майдонлари кент миқдорда экилган. Чунки ўрта тоғали ва интичка тоғали ёўза навлари пахтаи нархи тенглашиб қолган эди. Айниқса, III ва IV тип пахта тоғали ўртасидаги фарқ жуذا сезиларли даражада эмасди В.А. Автономов [1992].

В.А. Автономов [2008] маълумотларига кўра, мамлакатимиз 2001 йилда интичка тоғали *G. barbadense* L. тури ёўза навларининг экин майдони 23 минг гектарни ташкил этган бўлса, 2008 йилга келиб интичка тоғали Термиз-31, Сурхон-9 ва Сурхон-14 навлари 6,5 минг гектар майдонга экилиши айтиб ўтилган.

М.И. Иксанов [2010] маълумотларига кўра, дурагайлаш учун бошланғич манба навларини танлашда ирсий асослари бойитилган (кент шажарали) замонавий селекция навларини танлаш зарур. Жумладан, яратилган янги интичка тоғали “Сурхон-16” навида ҳар бир бошланғич манба шакллари ўз ичига 40-42 та ўзбек, туркман ва тожик селекцияси шажараларини олади, улар эса ўз вақтида *G. barbadense* L. турига мансуб ёўза навлари асосида яратилган.

Мавлумки, республикамизнинг жанубий минтақларида ғўзаларнинг ўсиб ривожланиши даврларида ҳаво ҳароратининг кескин исиб кетиши, гармселнинг тез-тез эсиши туфайли ва беда кандаласи каби омилларнинг салбий таъсири натижасида ўрта тоғли ғўза навларининг ҳосил элементлари жиддий зарар етказмоқда. Шундан келиб чиққан ҳолда, жанубий вилоятларда ингичка тоғли ғўзанинг стресс омилларга ва ҳашаротларга чидамли навларини жорий этиш керак бўлади. Ҳозирги вақтда асосан кўшни давлатдан келтирилган ингичка тоғли ғўза нави экилмоқда. Масалан, 2018 йилда Сурхондарё вилоятига 20 минг гектар атрофида ингичка тоғли ғўза навлари экилган.

G. barbadense L. турига мансуб ғўза навлари кечпишарлиги, кам ҳосил ва майда кўсакли бўлганлиги учун кам майдонларда экилади. И.А.Каримов 2008 йил Сурхондарё вилояти Халқ депутатлари пленумида ички ва ташқи бозор талабини тўла қондирадиган, дунё талабларига мос биринчи тип тоғла берадиган ингичка тоғли ғўза навларини яратиш зарурлигини таъкидлаганди. Мамлакатимизда ингичка тоғли пахта етиштиришни йўлга қўйиш давлат иқтисодига катта фойда келтиради. Шу сабабли, *G. barbadense* L. тури ғўза навларининг тезпишар ва юқори ҳосилли навларни яратиш ва экин майдонларини кенгайтириш масалалари юзга келади М.А. Бахши ва бош. [2009]. Ингичка тоғли ғўза навлари ўрта тоғли навларнинг асосий касаллиги бўлган вертициллёз вилт касаллига жуда чидамли эканлиги айтиб ўтилган. Бундан ташқари ингичка тоғли ғўза навларини етиштириш агротехнологиялари ҳақида мавлумотлар берилган Ж.Х. Аҳмедов [2017].

Ингичка тоғли пахтани доимий етиштириш давлатимизнинг ташқи бозорни таъминлаш салоҳиятини оширади ва савдо ҳамкорлари олдига ишончли ҳамда доимий ўрнига эга бўлади. Жаҳон пахта бозорида *G. barbadense* L. турининг танқислиги сабабли АҚШ Пима навлари экин майдонини 80 мингдан 110 минг гектарга оширган. Масалан, Ҳиндистон ўзининг ингичка тоғли навлари тоғлидан ташқари кўшимча 150 минг тонна АҚШ ларидан Пима тоғли сотиб олади М.И. Иксанов [2006, 2009].

Жаҳон пахта селекцияси дастурларини асосий максати-ҳосилли ошириш ва тоғла сифатини яхшилашдан иборатдир И.Ю. Абдурахманов [2008]. Ингичка тоғли *G. barbadense* L. турига мансуб ғўза навлари биологик хусусиятлари бўйича юқори иссиқлик ҳароратларига жуда талабчан бўлиб, жанубий ҳудудларида унча катта бўлмаган майдонларда етиштирилади. Мамлакатда ингичка тоғли пахта етиштиришни йўлга қўйиш давлат иқтисодига катта фойда келтиради. Бўни йўлга қўйиш учун *G. barbadense* L. тури ғўза навларининг тезпишар, тоғли сифатли ва юқори ҳосилли навларни яратиш ва экин майдонларини кенгайтириш муҳим роль ўйнайди А.А. Abdullaeв et al. [2013], Lon L. Hınze et al. [2016], Zhang J.F., et al. [2017].

Ж.Х. Аҳмедов, Х. Чориева [2018] қайд этишича, Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари ғўзаларнинг ўсиб ривожланиши даврларида ҳароратнинг кескин кўтарилиши, гармселнинг тез-тез эсиши туфайли етиштирилаётган ўрта тоғли ғўза навларининг ҳосил элементлари тўқилишга олиб келиши ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтганлар. Бундан ташқари янги ингичка тоғли ғўзанинг Термиз-202, Термиз-208 навларининг кимматли хўжалик белгилари ҳақида мавлумотлар келтирилган. Термиз-202 ва Термиз-208 навлари кўсакларнинг очилиши суръати юқорилиги айтиб ўтилган.

Мавлумки, ингичка тоғли ғўза навларининг асосий камчиликларидан бири бу уларнинг ҳосилдорлигининг пастлиги, кечпишарлиғидир. Кейинги йилларда туричи ва турлараро дурағайлашнинг турли услублари асосида (оддий, кўш, мураккаб, конвергент дурағайлаш, молекуляр генетика) ингичка тоғли ғўзалар селекциясида катта ютуқларга эришилган. Ёўзанинг ҳосилдорлиқни белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бири тоғла чиқими бўлиб, ирсийланиш характери ва ўзгартувчанлиги ўрганиш асосида белгининг ота-она генотипларига боғлиқ эканлиги ҳамда ҳар хил турларни дурағайлаш орқали тоғла чиқими ва сифати бўйича кенг микёсдаги трансгрессиясига эришиш мумкинлиги аниқланган М. Иксанов ва бош. [2006], Б. Мамаракхматов

[2005], Т.И. Мухитдинов [2009], Т.М. Сиф, Д.С. Насел [1973], J. Jenkins [2007].

Х. Бабамурадов [1977] ўз тажрибаларида, ғўзанинг қимматли хўжалик белгиларидан бири битта кўсақати пахта вази белгиси ташки мухит таъсирида кам ўзарувчан, яъни нисбатан паратилик барқарор ҳисобланади. Кўсақ йириклигининг ўзарувчанлигини ўрганиш натижасида бу белгининг генотип таъсирида ирсийланиши аниқланган. Биринчи авлод дурагайларида белгининг оралик ирсийланиши даражасида намён бўлиши ҳамда F_2 ўсимликларида рўй берадиган ажраллиш жараёни бу белгининг кўлчилик микдорий белгилар каби полиген эканлигидан, яъни унинг назоратида бир канча генлар иштирок этишидан далолат беради.

Або-El-Zahab, El-Kilany [1979] олиб борган изланишларида, ғўзанинг интичка тоғали *G. barbadense* L. турига мансуб 6 нави дивалел дурагайлаш асосида олинган F_1 - F_2 ўсимликларини ўрганишган. Ҳосил шохлари сони, чигит микдори ва ўсимликнинг умумий маҳсулдорлиги белгилари бўйича гетерозис самараси борлигини қайд этганлар.

С.Г. Инге-Вечтомов [2007] қайд этилишича, юксақ ўсимликларда микдорий белгиларнинг юзага чиқишида генетик омиг билан бир қаторда ташки мухитнинг ҳам таъсири катта бўлиб, кўп ҳолларда бундай белгилар ҳеч қайси генетик қонуниятга бўйсунмаган ҳолда ирсийлангандек туюлади. Микдорий белгиларнинг ўзига хос хусусиятлари уларнинг жуда кенг ўзарувчанликка эга эканлиги, кўп микдордаги ўзаро таъсир қилувчи генлар билан бошқарилиши, юқорида қайд этилгандек модификацион ўзарувчанликка учрашидир. Бу белгиларнинг ирсийланишини сифат белгиларини ўрганишган усуллар билан аниқлаб бўлмайди. Бу ерда муайян белгига таъсир кўрсатувчи генларга нисбатан “кучли ген” ва “кучсиз ген” атамалари қўлланилади. Бу иккала вариант оралигида эса оралик ҳолдаги кўринишлар ҳам юзата келади. Шунингдек, генларнинг плейотроп таъсири туфайли бир ген муайян белгига нисбатан кучли, бошқасига нисбатан кучсиз ген ҳисобланиши ҳам мумкин. Кўп микдордаги генлар бўйича ажраллишдани

ўзарувчанлик полиген ўзарувчанлик ҳисобланади. Ўсимликдаги микдорий белгиларнинг ташки мухит таъсиридаги ўзарувчанлиги эса паратиликдир. Бунда ҳам ушбу ўзарувчанликка генотипнинг таъсири канчалик эканини аниқлаш лозим бўлади. Бунинг учун эса белгининг ўзарувчанлик коэффициенти ҳисоблаб чиқарилади. Микдорий белгиларни алоҳида таҳлил қилишдан кўра уларнинг мажмуини таҳлил қилиш қимматли хўжалик белгиларининг мажмуига эга бўлган навлар яратиш учун муҳимроқдир. Бундай таҳлил кўп ўлчамли статистик усулларни қўллаш орқали амалга оширилади.

Қ.О. Хударганов [2018] қайд этилишича, ғўзанинг *G. barbadense* L. турига мансуб генетик жиҳатдан келиб чиқиши ҳар хил бўлган навлараро дурагайлаш ишлари олиб борилган. Бекросс дурагайлаш йўли билан олинган F_1 ўсимликларида ирсийланиш асосан танлаб олинган навлар кўрсаткичига боғлиқ ҳолда кечганлигини аниқлаган. Агар бекросс чагштиришда навлар ишлатилган бўлса, хўжалик белгиларидан бири тола чикими белгиси навлараро дурагайлардагига нисбатан 1,5 % юқори бўлган бўлса, иштирок этган навларда эса сезиларли даражада камайганлигини аниқлаган.

Ш. Акмурадов, Р. Бердымурадов, А. Чапау [1990] олиб борган илмий изланишларида, интичка тоғали *G. barbadense* L. ғўза навларини дурагайлаш асосида олинган ўсимликларида мофологик белгиларнинг ирсийланиши ва ўзарувчанлигини ўрганиш бўйича тажриба олиб борилган. Бошланғич манба сифатида баланд бўйли навлар 9883-И, 9871-И ва паст бўйли Т-8006, Т-8005 тизмалари танлаб олинган. Олинган дурагайлар қайта Т-8006, Т-8005 тизмалари билан бекросс дурагайлаш ўтказилган. Тадқиқот натижалари таҳлилга кўра, самарали бекросс учун доминант белгилни бошланғич навларни танлаш ва паст бўйли навларни яратиш учун 3 марта тўйинтирувчи чагштириш етарли бўлиши қайд этилган.

П.Ш. Ибрагимов, В.А. Автономов [1993] ларнинг олиб борган илмий изланишларида, *G. barbadense* L. турига мансуб бошланғич манба сифатида

9871-И, 9929-И, Аш-24, Термиз-16, Гиза-45 навлари танлаб олинган ҳамда дурағайлаш ўтказилиб, кимматли хўжалик белгилар яъни, тезпишарлик, хосилдорлик, битта кўсақдаги пахта вази, битта ўсимликдаги кўсақлар сони, тола узунлиги, тола чиқими каби белгиларнинг ирсийланиши ўрганилган. Дурағайлаш натижасида олинган 20 та F₁ ўсимликларидан биттасида гетерозис эффекти, олтигасида оралик, иккитасида паст кўрсаткичлар ва битта дурағайда депрессия намоён бўлганлиги аниқланган. F₂ ўсимликларида бу белгилар бўйича кенг ўзгариувчанлик кўлами кузатилган.

А.Р. Тяминов [1994] таджикотларида, ингичка толали *G. barbadense* L. фўза навларининг эртапишарлик ва тола чиқими бўйича комбинацион имкониятлари ўрганилиб, бошлангич манба сифатида 9926-И, 9891-И, Қарши-7, 9883-И, 9872-И, МЛ-108, Қарши-8, Аш-81 навларини танлаб олган. Ўрганилган Қарши-7, МЛ-108, Қарши-8 ва 9891-И навларини эртапишарлик белгиси бўйича донор сифатида, 9926-И, МЛ-108, Аш-81 навлари эса тола чиқими белгиси бўйича селекцион таджикотлар учун донор сифатида тавсия этган.

Ш. Ақмурадов [1996] ўз илмий изланишларида, фўзанинг ингичка толали навлари дурағайларида кимматли хўжалик белгиларнинг ирсийланиши ва ўзгариувчанлигини ўрганиш бўйича бошлангич манба сифатида 9883-И, 9871-И, Т-8006, Т-8005 нав ва тизмалари иштирок этган. Танлаб олинган бошлангич манбалар ўртасида тоқросс дурағайлаш ўтказилган ва фўзанинг кимматли хўжалик белгилари оралик ҳолда ирсийланиши аниқланган, асосан бошлангич манбалар томонга ўзгаришини кузатган.

Маълумки, пактачиликда тезпишарлик белгисини ўрганиш-асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Шунинг учун, тезпишар фўза навлари факат шимоллий туманлар учун эмас, балки исик районларда ҳам ноқулай об-ҳаво бошланмасдан хосилни эртарок ва юқори сифатли қилиб қисқа муддатда териб олиш жууда зарурдир.

Фўзанинг турларо дурағайларида энг муҳим тезпишарлик белгисининг ирсийланиш жараёнини ўрганишда ушбу кўрсаткични хосил қилувчи омиллардан ҳисобланган шоналашгана бўлган давр ҳамда ушбу белгининг шаклланишида бекросснинг тавсири катта эканлиги, уни бошлангич манба сифатида қандай намуна катташасётганлигига узвий боғлиқлиги ҳақида фикр айтиб ўтилган Х.Бабамурадов, Д. Аҳмедов [1987], Б. Мамараҳимов ва бош. [2000], С. Одипов ва бош. [2005], С.Ф. Бобоєв [2017], Б. Мамараҳимов [2005].

А.А. Абдуллаев [1974] таъкидлашича, фўзанинг ўрта толали *G. hisutium* L. тури навларида тезпишарлик белгиси жихатидан кескин фарқ қиладиган ҳар хил навларнинг бутун тушлардаги ва асосий шохлардаги барглари текшириш асосида қуйидагича хулосага келган. 1) ҳар хил шохлардаги ўрта баргларнинг катталиқ белгилари ва жами барг сатҳи фўза навларининг тез пишшишлтига боғлиқ; 2) барглар қанча майда ва кам бўлса, фўза тули шунча яхшироқ куёш нуридан ижобий фойдаланади, тулпроқ ва унинг атрофидати ҳаво шунча кўпроқ исийди. Далада фўза хатто қалин бўлганда ҳам тезпишар навлар қулайроқ исиклик, ёруғлик ва ҳаво режимини вужудга келтиради, яъни фўзанинг тез етилиши учун умуман қулайроқ микро иқлим вужудга келиши керак.

Академик С.С. Содиков таъкидлашича, «фўзанинг тезпишарлик белгиси барча ёпик уруғли ўсимликларда бўладиган жараён каби уруғнинг униб чиқишидан тўлиқ уруғ ҳосил бўлиши ҳамда бир тул ўсимликда илк кўсақ очилишгача бўлган кетма-кетлик ва ривожланиш босқичларини ўтиши билан аниқланади. Бунда тулдаги кўсақларни кетма-кет очилиши жадаллигини ҳамда совуқ тушгунга қадар ва умумий ҳосилни инобатга олиш керак» М.Ф. Абзалов, Н.Р. Баратова [2011].

Маълумки, тезпишарлик белгиси мураккаб полиген белги бўлиб, уни белгилувчи даврларнинг узунлиги турли даражада ўзгариувчандир. Мана шу жихатдан тезпишарлик-хўжалик ва муҳим таркибий белгилардан бири бўлиб, уруғ экилиши ва ўсимлик ривожланиши бошлангандан то ўсимликда чипт

хосил бўлиб кўсак очилгунча бўлган давр ўтиш кетма-кетлиги билан аникланади Г.Р.Холмуродова [2014], Р.Ю.Дашева [2015].

М.Г. Valosh, Q.В Valosh [2004] олиб борган илмий изланишларида, ғўза навларини дурагайлаш натижасида олинган ўсимликларнинг морфологик белгилари бўйича аниқлаш учун кенг тажрибавар олиб борганлар. Уларнинг кузатишича, хосил шохининг пастки бўғинда киска бўлиши, бўғин оралиғининг қисқалиги, барглارнинг ўртача ва кичик бўлиши, кўсак вазни ўртачалиги ва кўсак очилиши даражаси юқори бўлиши-эргатишар ғўза навларининг муҳим хусусиятларидан бири эканлиги кайд қилинган.

A.R. Lakho et al [2007] кайд этишича, ғўзанинг морфологик белгиларидан бири бўлган биринчи хосил шох пастки бўғинда жойлашиши навлар учун тезпишарлик белгиси ҳисобланади. W.A.Jatoi et al [2012] таъкидлашича, ғўза ўсимлигидаги хосил шохлари пастда жойлашиши билан тезпишарлик ва иссиқка чидамлик ўртасида кучли боғлиқлик борлиги кайд этилган.

Kausar Nawas Shah et al. [2010] таъкидлашича, ғўзанинг энг муҳим бўлган тезпишарлик кўрсаткичига комплекс қимматли белгилар, яъни морфологик, физиологик, муҳит шароити ва генетик белгилар тавсир қилишнинг аниқланганлар.

З.З. Раҳмонов, З.Т. Бўстонов [2010] олиб борган илмий изланишларида, F_2 ўсимликларининг F_1 авлодга нисбатан тезпишарлик белгиси бўйича сезиларли даражада юқори кўрсаткич намён қилганлигини, эргатишар белгиси бўйича рекомбинантларнинг пайдо бўлиши билан тушунтириш мумкин. Бу эса, F_2 ўсимликларида тезпишар ўсимликларни танлаш орқали белгини яхшилаш мумкинлигини кайд этилган.

Ал-Алжар тажриба хўжалигида 2004-2006 йиллар давомида ингичка толали ғўза намуналари ўсимликларининг 50% гуллаш, 50% кўсакларининг очилиши каби фазалари таҳлил қилинган. Ўрганилган хусусиятларида генетик ўзгаришларни назорат қилишда аллел бўлмаган тенлар /ўзаро тавсир қилишнинг аниқланганлар. Бундан ташқари, ўрганилаётган белгиларнинг

ирсийланиши кўшимчади ва кўшимчади бўлмаган генетик тавсири билан назорат қилиниши, лекин энг кўп ўрганилаётган хусусиятларнинг генетик ўзгаришнинг назорат қилишда доминант ген тавсири катта эканлиги кўрсатиб ўтилган. Иккала белги учун, ҳар бир ўсимлик учун биринчи гул очилиш ва кўсакнинг пишиб етилиши каби ҳар икки ҳолда ҳам бошланғич манбаарга нисбатан сезиларли салбий гетерозис ҳолатда ирсийланиши аниқланган. Бундан ташқари ғўзанинг муҳим компонентларидан бири бўлган битта ўсимликдаги кўсаклар сони хосилдорлиқнинг ошшини таъминлаб беради. Адабиёт манбааларидан маълумки, келиб чиқиши яқин шаклларни дурагайлаш, кўсаклар сони бўйича гетерозис натижаси ҳамма ҳолатларда ҳам кузатилмайдди. Кўп сонли кўсак шаклларни ва бошқа сон белгиларини олиш учун ўзарувчанлиқнинг кенг қўламга эга дурагай популяцияси бўлиши керак [78; 615-621-6.].

K.R. Dhamaunhi, K. Subashree [2016] олиб борган тадқиқотларида, ғўзанинг *G. barbadense* L. турига мансуб 10 та истиқболли ССВ-5, ССВ-11, ССВ-17, ССВ-26, ССВ-27, ССВ-28, ССВ-29, ССВ-30, ССВ-33 ва ССВ-36 генотипларини хосил элементлари белгиларини тезпишарлик белгиси бўйича баҳолаганлар. Ўрганилган 3 та истиқболли ССВ-5, ССВ-29 ва ССВ-36 намуналарида генотиплари биринчи хосил шохининг пастда жойлашиши, биринчи гул очилиши ва биринчи кўсак пишишигача бўлган даврнинг қисқалиги бўйича тезпишарлик белгисини аниқлашган ҳамда дурагайларда белгиларнинг ўзарувчанлиги ва ирсийланишини кузатганлар.

У. Қаюмов, В.А. Автономов, Ш.Э. Намазов [2017] илмий изланишларида, туричи ва турлараро дурагайлаш натижасида олинган ўсимликларда тезпишарлик белгисининг наслдан-наслга ўтиши ўрта ва юқори даражада бўлиб, тезпишар ўсимликларни F_2 авлодидан бошлаб танлаш ишларини олиб бориш мақсадга мувофиқлиги айтилган.

Ғўзанинг энг қимматли хўжалик белгилари битта кўсакдаги пахта вазни, тола узунлиги, тола чикими, тола индекси каби энг муҳим белгилар ҳисобланади. Кўпгаб маҳаллий ва чет эл олимлари ушбу қимматли хўжалик

белгилар бўйича изланишлар олиб борганлар В.А.Автономов [1973], Ал.А.Абдуллаев ва бош. [2010], О.Х.Кимсанбаев [2004], Ш.Э.Намозов [2008], Ж.Х. Ахмедов [2018], Т.И. Мухиддинов [2018], S. Abo et al. [2009], К.Р.М. Dhamaunah [2010], К.В. Eswari et al. [2016], Ehtisham Shakeel Khokha et al. [2017], N.V. Mohan Kinnari et al. [2017].

Н.Г. Симонгулян, П.Ш. Ибрагимов [1985] кайд этишича, *ғўзанинг *G. barbadense* L.* турига мансуб Ап-25 навида асосий кимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган тола узунлиги ва чикими рецессив генлар билан бошқарилишини аниқлаганлар.

О.Х. Кимсанбаев [2004] ғўзанинг ингичка толали намуналарида бир тип ўсимликдаги хосили белгиси бўйича тизма МЛ-104 да УЖҚ юкори бўлиб, 0,612 га, Термиз-16 навида эса шу белги бўйича 0,538 га тенг бўлган. Ингичка толали нав ва тизмаларда тола узунлиги катта захирата эга бўлиб, йиллар бўйича 38-41-42 мм га тебраниб турган. Т-3962 ва Т-204 тизмалари УЖҚ бўйича энг яхши ҳисобланиб (кўрсаткичлари мос равишда 0,612 ва 0,022), дурагайлашта жорий қилинган. Бу белгининг шаклланишида ноаддитив генлар роли муҳимлиги кузатилган.

М.А. Khan, A.S. Latik, Z.A. Soomro [2004] ғўзанинг тетраплоид *G. hisutium* L. турига мансуб истикболи Stoneville-213, HG-6-1-N, Fregobast-83 ва AG-hisutium-87 навларининг дурагайларида айрим кимматли хўжалик белгилар ирсийланишида генлар тавсирини аниқлаш учун таджикотлар олиб боришган. Ўрганилган дурагайларда кимматли хўжалик белгилари яъни, тола чикими ва тола индекси асосан доминант генлар, ўсимликка тўғри келадиган хосил эса қисман доминант генлар билан бошқарилиши аниқлашган.

П.Ш. Ибрагимов [2003] кайд этишича, ғўзанинг ингичка толали навларини яратиш учун хўжалик белгилари яхшилланган донорлар ажратиб олинган. Масалан, махсулдорлик белгиси бўйича Термиз-31, 9301-И, Қарши-2, 6465-В, Сурхон-2; тола чикими белгиси бўйича 9006-И, МЛ-107, Термиз-10, Ашхабод-84, Ашхабод-81, Л-200, Қарши-6, Ашхабод-32; тола сифат

кўрсаткичлари бўйича С-6030, Ашхабод-32, 9871-И, Ашхабод-84, Тиза-45, Ашхабод-75 каби навларга ажратилган.

Л.А. Deshpande, K.S. Baig, V.P. Nagare [2003] таджикотлари натижасига кўра, 30 та F₁ комбинацияларида хосилдорлик кўрсаткичлари бўйича УЖҚ ва МКЖларини аниқлаш учун синаб кўришган. Хосилдорлик ва унинг кўпгина таркибий қисмлари бўйича УЖҚ РА-402, ЛА-1993 ва РА-478 навларида юкори бўлган. Дурагайларда тола чикими ва чигит хосили бўйича юкори махсулдорликка, шунингдек МКЖ бўйича эса РА-402 х РА-415, шунингдек РА-183 х РА-368 ва РА-402 х РА-375 комбинацияларда юкори аддитив ва ноаддитив генлар самараси остида эканлиги маълум бўлган.

А. Stoirova [2004] ўз таджикотларида, ингичка толали *G. barbadense* L. ва ўрта толали *G. hisutium* L. турларига мансуб 40 та нав ва 6 та тизмалар ўртасида турлараро дурагайлаш олиб бориб, кимматли хўжалик белгилардан тола чикими ва тола узунлиги генларнинг аддитив ва ноаддитив эффекти тавсирини ирсийланишини кўрсатиб ўтган ҳамда амалий селекция учун яхши комбинатор навларни аниқлаган.

Ja Zhao-dong, Sun Jing, Zhang Tian-zhen [2006] ғўзанинг тетраплоид (*G. barbadense* L. х *G. hisutium* L.) турларини турлараро дурагайлаш асосида олинган ўсимликларда хосил элементлари аддитив ва доминантлик самаралари билан, тола индекси ва чикими бўйича эса аддитив генлар самараси (33,0-42,2%) билан бошқарилиши кўрсатилган.

А. Stoirova, I. Saldzhiev [2015] кайд этишича, ўрганилган Болгария ғўза навларини турлараро чагиштириш асосида олинган дурагайларининг хўжалик белгиларидан тола чикими ва тола узунлиги кўрсаткичлар генларининг аддитив ва ноаддитив эффекти тавсирини ирсийланиши аниқланган ҳамда амалий селекция таджикотлари учун яхши рекомбинант шакллар ажратиб олинган.

Ғўзанинг асосий сифат белгиларидан бири тола пишиклигида биринчи навбатда аддитив генлар тавсири, тола чўзилувчанлигида ҳам аддитив ва доминант генлар тавсири кузатилган. Толанинг микронефри ва узунлигида

эса асосан доминант генлар таъсири сезилган. Шунингдек, тола кўрсаткичлари: -микронейри, пишиклиги, узунлиги, бир хил ўлчамлик индекси ва ҳўзилувчанлигида ҳам аддитив генлар таъсири кучли эканлиги кўринган С.Т. Shearham et al. [2003].

Mei Yong-Jin ва бошқалар [2006] 3 йил давомида 9 та нав ва уларнинг F₁ 20 та комбинацияларида толанинг 5 та кўрсаткичи MINQUE (Q) усули ёрдамида аддитив ва доминант генлар самарасини ўргатганлар. Тола кўрсаткичлари F₁ авлодида асосан аддитив генлар билан, тола узунлиги, бир хиллиги ва пишиклиги эса доминант генлар билан бошқарилиши аниқланган. Тола сифати бўйича яхши бошлангич нав сифатида Zajading ва Xinhai 8 навлари селекция учун танланган. Толани сифат белгилари бўйича энг яхши навлар чаतिштирилганда салбий гетерозис ҳолатида ирсийланиши кузатишган.

И.В. Пуртова [2005] фўза селекциясида танловнинг самарадорлигини бирмунча ошириш учун ота-она шакллардан устун бўлган ва юкори ирсийланиш коэффициентига эга бўлган элита ўсимликларини танлаб олиш зарур. Ирсийланиш коэффициенти тўғри аниқлаш учун тахлил қилинаётган ўсимликлар сони 30 дан кам бўлмаслиги зарур. Дурагай популяциясида танлов олиб боришда ирсийланиш коэффициенти кўлланилиши ўртача квадратик оғишни ҳисобга олган ҳолда белгилар мажмуи бўйича яқка танлов ишларини олиб бориш самарали бўлиши қайд этилган.

У.Л. Уап ва бошқалар [2005] қайд этишча, ўрганилган фўза дурагайларида тола хусусиятлари белгисининг ирсийланиши бўйича ҳар хил тола таъсифига эга 20 та дурагай комбинациялар билан фўзанинг 5 та тизмаси иштирокида тахлил қилинган. Тола узунлиги белгиси бир маромада ўраб олган муҳит омилларига кучли боғлиқ бўлиб, толанинг бошқа хусусиятлари, асосан, генетик назорат қилиниши кузатишган. Генотип ва муҳит мустақамлиги ёки тола узунлиги белгиси ўзаро алоқасининг таъсири аниқланмаган, ammo тола ингичқалиги, устушлик натижаси, толанинг

узунлиги бўйича етарлича аддитив ва оналик натижалари қайд этилган. Аддитив натижалар толанинг барча хусусиятларида устушлик қилган ҳамда юкори устушлик натижаси эса 11,5% ни ташкил этган, уларнинг наслийлиги 45,2-77,6% оралик чегарада бўлган. Улар F₁ ўсимликларда толанинг ҳосасини ота-онанинг ўртача кўрсаткичлари бўйича олдиндан айтиш мумкин, селекция сифатини эса бошлангич дурагай авлодларидаёқ кўриш мумкин деб тахмин қилганлар.

А. Сиддиков [2008] олиб борган илмий тадқиқотларида, фўза ўсимлигида ўтказилган оддий дурагайлаш натижасида олинган ўсимликларда ўсув даври давоийлиги асосан салбий оралик ва доминант ҳолатида ирсийланган, фўзанинг махсулдорлиги ҳисобланган бир тул ўсимликлари кўсаклар сони, қиммати хўжалик белгилардан битта кўсакдаги пахта вази ва 1000 дона чигит вази белгиси бўйича ижобий доминант ва оралик ҳолатда ирсийланиш кузатишган, бир тул ўсимлик ҳосили, тола чиқими ва тола узунлиги эса ўта доминант, яъни ижобий гетерозис ёки оралик ҳолати доминантлик даражалари аниқланган. Бундан ташқари, ўрганилган F₂ ўсимликларда йирик кўсақли бўлган дурагайлар учинчи бўғинда ҳам ушбу хусусиятни сақлаб қолганлиги ёки аксинча, иккинчи авлодда майда кўсақли бўлган дурагайлар F₃ ўсимликларда ҳам ирсийланиш коэффициенти паст кўрсаткиччи намоён қилганлиги аниқланган. Маҳаллий навларда эса белгининг бошқарилишида рессеив генларнинг иштироки кўпроқ ва уларни чаतिштиришдан олинган дурагайларда белги бўйича танловни қамлада F₃-F₄ авлоддан амалга ошириш зарурлигини айтиб ўтган.

С.А. Усманов ва бошқалар [2007] олиб борган тадқиқотларида, фўзанинг интйча толали намуналарида хўжалик белгиларидан бири бўлган битта кўсакдаги пахта вази-ўсимлик махсулдорлигининг асосий тарқибий қисмларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам генетик-селекцион изланишларда ушбу белгининг намоён бўлиши, ирсийланиши ва ўзарувчанлигини ўрганишга алоҳида эътибор берилишини қайд этганлар.

М. Ф. Абзалов [1991] таъкидлашчида, ғўзанинг миклорий белгилар бўйича бир гуруҳ навларнинг дурагайларида аниқланган генетик конуният бошқа бир гуруҳ навларнинг дурагайларида бошқача бўлиши мумкин. Бу куйидан муҳим генетик-селекцион кўрсаткичлар-устунлик даражаси, эпистаз, комбинатсион қобилят, наслдан-наслга берилиш даражаси ва бошқаларига тааллуқлидир.

М.Х. Кимсанбоев, В.А. Автономов, О.Х. Кимсанбоевлар [2009] кайд этишчида, ғўзанинг интичка толали *G. barbadeuse* L. турига мансуб географик узок навлараро дурагайлаш натижасида олинган F_2 ўсимликларида битта ўсимлик махсуддорлигининг наслдан наслга берилиши $h^2=0,30-0,99$ бўлган бўлса, F_3 ўсимликларида ирсийланиш эса $h^2=0,60-0,78$ бўлганлиги кайд этилган.

Р.Р. Эгамбердиев, В.А. Автономов, М.Х. Кимсанбоев [2009] илмий изланишларида, ғўзанинг интичка толали F_1 ўсимликларида битта кўсаклати пахтаининг вазни асосан оралик ҳолда ирсийланишини аниқлашган. Бошлангич манбадан бирита томон оғиш кузатишган ҳамда бошлангич ашёларнинг оталик ёки оналик сифатида келишига кўра турлича бўлган. Ўрганилган бир қатор комбинатсияларда белги бўйича ижобий гетерозис ҳолати кузатишган. Дурагайлаш натижасида олинган F_2 ўсимликларида битта кўсаклати пахта вазни белгининг наслдан наслга берилишини аниқлаш ушбу белгининг генотипик ўзгартувчанлигининг таъминланганлиги ўртача ва кучли даражада ($h^2=36,0-h^2=94,0\%$) эканлигини аниқлашган.

I.A. Samad, Mohamed et al [2005] таъкидлашчида, *G. barbadeuse* L. турига мансуб ғўза навларининг F_1 ўсимликлари комбинатсияларини икки хил тулпроқ шароитида пахта ҳосили ва унинг таркибий қисмлари бўйича тадқиқот олиб боришган. Иккала шароитда ҳам барча белгилар аддитив ва ноаддитив генлар назорати остида эканлигини аниқлашган. Қулай шароитида бир ўсимликка тўғри келувчи пахта ҳосили ва битта кўсаклати пахта вазни белгилари назоратида аддитив генлар, ноқулай тулпроқ шароитида эса ноаддитив генлар таъсири остида эканлигини таъкидлашган. Wt/Vt

тахлилига кўра, F_1 авлодида тўлиқ устулик, F_2 авлодида эса тўлиқсиз устулик ҳолати кайд этилган.

О.Х. Кимсанбоев, Р.Р. Эгамбердиев, В.А. Автономовлар [2011] ўз илмий изланишларида, ғўзанинг интичка толали тизма ва навлари (Т-112, Т-120, Т-121, Гиза-45, Гиза-70, Гиза-70, Гиза-75, Гиза-76, Гиза-77, Гиза-80, Гиза-83, Гиза-86) ўртасида дурагайлаш ишлари ўтказилиши натижасида олинган F_1 ўсимликларининг доминантлик даражаси ҳамда F_2 - F_3 ўсимликларининг тола чиқими белгисини наслдан наслга берилиши аниқланган. Ўрганилган F_1 ўсимликларининг доминантлик даражаси асосан оралик, доминант, ўта доминант ҳолатда ирсийланиши ва F_2 ўсимликларида тола чиқими белгисининг ирсийланиши $h^2=0,32-0,94$, F_3 авлодида $h^2=0,001-0,96$ бўлганлигини кузатишган.

С.Ғ. Бобоев ва бошқалар [2011] олиб борган илмий тадқиқотларида, ғўза селекционисида геномлараро мураккаб дурагайлаш асосида яратилган Т-175/270, Т-583-584/07, Т-1178/237 тизмаларида белгилар бўйича юқори ўзгартувчанликка эришиш мумкинлигини айтиб ўтганлар. Ўзгартувчанлик даражасининг юқори бўлиши барча ўрганилган белгилар бўйича танлов имкониятларини ошириб, хўжалик белгилари бўйича ишлаб чиқаришда экилаётган навлардан устун бўлган янги тизмаларни яратишни таъминлаб, турлараро дурагайлашнинг самараси юқори эканлигини кўрсатиб беришган.

Д.Д. Ахмедов ва бошқалар [2014] илмий изланишларида, ғўзанинг *G. barbadeuse* L. намуналарини (Т-1, Т-2, Т-3, 9709-И, Термиз-31 (st), 9906-И, 8763-И (ind), Аш-34, Ленинабад-19, 9153-И) дурагайлаш натижасида олинган F_1 ўсимликларида доминантлик даражаси ва F_2 ўсимликларида генотипик ўзгартувчанликни аниқлаш учун ирсийланиш коэффицентини ўргатганлар. Ғўзанинг генотипик ўзгартувчанлиги эса $h^2=9,0$ дан $h^2=90,0$ демак олинган дурагай комбинатсияларида белгилар паст, ўрта ва юқори ҳолатда ирсийланиши аниқланган.

С.А. Усманов, Ф.А. Абдиев, К.О. Хударгановлар [2014] таъкидлашчида, интичка толали ғўза ўсимлигида қимматли хўжалик белгилар ва гуллаш

типининг ўзарувчанлиги хусусиятларини тахлили шуни кўрсатдики, F₁ дурағай комбинацияларда тўлиқсиз доминант йирик кўсақли дурағайларда намён бўлган, бошқа комбинацияларда гетерозис ҳолати намён бўлган. Ўрганилган F₂ ўсимликларда битта кўсақли пахта вази белгиси F₁ ўсимликларга нисбатан пасайиши аниқланган ҳамда F₃ ўсимликларда битта кўсақли пахта вази, тола чикими белгисининг ўртача ҳолатда ирсийланганлиги кузатилган. Дурағайлаш асосида олинган F₃ ўсимликлари ҳазмоғам гулли ва 81,0-100,0% клейстоғам гулли ўсимликлар сонининг белгилари ўртача қийматлари F₂ ўсимликларига қараганда юқори бўлиши қайд этилган.

Д.Д. Аҳмедов, В.А. Автономов [2009] олиб борган илмий тадқиқотларида, ғўзанинг ингичка тоғали тизма ва навларини ўзаро дурағайлаш натижасида F₁-F₂ ўсимликларининг тола узунлиги белгиси бўйича доминантлик кўрсаткичлари ва ирсийланиш коэффицентини тахлил қилган. Тадқиқот натижалари жараёнида белгиларни устуңлик (hr) кўрсаткичлари салбий тўлиқ устуңлиқдати гетерозисча самараси намён бўлган ва наслдан-насла ўтиш коэффицентини F₂ ўсимликларда генотипик ўзарувчанлик $h^2=40,0\%$ дан $h^2=90,0\%$ гача намён бўлган. Ёъни, дурағай аялдоларга асосланган ҳолда белгининг наслдан насла берилиши ўрта ва юқори ирсийланиши кузатилган.

К.О. Хударганов, С.А. Усманов [2015] олиб борган изланишларида, ғўзанинг *G. barbadense* L. турига мансуб намуналари, яъни T-741 x Сурхон-16 комбинациясидан яққа танловлар натижасида ҳосилдор, тоғали асосан I-типта мансуб, штапель узунлиги 39-40 мм. ни ташкил этган истиқболли T-856 тизмаси ажратиб олинган. Ушбу тизма асосида клейстоғам гул типта мансуб ингичка тоғали ғўзанинг СП-7701 нави яратилган. Мақсур навада хўжалик белгиларидан бири бўлган битта кўсақли пахта вази ўртача 3,2-3,3 г., ҳосилдорлиги ўртача 42,1 ц/га, тола чикими 39,2-39,4%, тола миронефри 3,9-4,1, тола узунлиги 1,38 дюйм, солиштирма узалиш кучи 40,5-41,9 гк/тексни ташкил этган.

Вик.А. Автономов ва бошқалар [2015] қайд этилишича, ғўзанинг қимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган тола чикими бўйича олинган натижалар шуни кўрсатдики, тажрибада иштирок этган F₂ комбинацияларида тола чикими белгиси кўрсаткичларининг наслдан-насла берилиш даражаси h^2 нинг генотипик ўзарувчанлиги дурағай комбинацияларига боғлиқ равишда 0,09 дан 90 гача бўлиб, паст, ўрта ва юқори даражада бўлганлиги намён бўлган.

Ғўзанинг келиб чиқиши узок бўлган намуналарни ўзаро чапштириш асосида F₂ ўсимликларига асосий қимматли хўжалик белги кўрсаткичларининг наслдан-насла берилиш даражаси ўртача ва кучли даражада, морфобиологик кўрсаткичлар-биринчи ҳосил шохининг жойлашиш ўрни ва бош поя баландлиги-ўртача даражада, бир туپ ўсимлиқдати ҳосил шохлари ва кўсақлар сони-кучсиз ва ўртача даражада бўлган К.О.Хударганов ва бош. [2015, 2017].

G. barbadense L. турига мансуб маҳаллий ғўза навлари устида дурағайлаш ишлари олиб борилган. Ўрганилган F₁ ўсимликларига битта кўсақли пахта вази, битта ўсимлиқдати кўсақлар сони, хўжалик маҳсулдорлиги ва умумий маҳсулдорлик каби қимматли-хўжалик белгиларининг ирсийланиши асосан ижобий ўта устуңлик ҳолатида кечили аниқланган ҳамда ғўза навларининг F₂ ўсимликларига қимматли хўжалик белгилари бўйича юқори кўрсаткичларга эга ноёб рекомбинантларнинг ажратиб чиқиш даражаси чапштиришда қатнашадиган бошланғич манбаларга ва уларнинг комбинацион қобилиятига боғлиқлиги очиб берилган Н.Э.Чоршанбиев [2018], S.M. Nabiev, N.E. Chorshanbiev [2017].

Юқорида келтирилган илмий манбалардаги фикрларни назарда тутиб, Перу ғўзу турларининг туричи ва турлараро биохимия-хилликларида фойдаланиш натижасида қимматли-хўжалик белгиларига баҳо берил, селекциядаги имкониятларини аниқлаш, ноёб генетик потенциалга эга бўлган бошланғич манбалар яратиш муаммолари ханузгача деярли ҳал этилмаганлигини кўрсатди.

1.2-§. Ғўзада морфоҳўжалик белгиларининг узвий боғлиқлиги

Ғўза ўсимлигида морфобиологик хўжалик белгиларининг ирсийланишининг асосий хусусиятларидан бири уларнинг ўзаро узвий боғлиқлигидадир. Шундан келиб чиққан ҳолда, ғўзада олиб борилган кўплаб илмий изланишларда морфоҳўжалик белгиларнинг корреляциясини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Бу белгиларнинг бўйича бир қатор олимларнинг илмий изланишларида ушбу йўналишдаги кўплаб ишлар ўз ифодасини топган. Ғўзанинг қимматли хўжалик белгилари орасидаги корреляциясини ўрганиш борасида кўплаб илмий изланишлар амалга оширилган. Т.Д.Алпамберенов [2011], И.Т.Қаҳҳаров [2005], С.А. Усмонов, К.О. Хударганов [2014], Ал.А.Абдуллаев ва бош. [2013], П.Ш. Ибрагимов, Ш.Б. Амантурдиев [1996, 2002], К. Ashokkumar, R. Ravikeshavan [2010], R. Muthu, G. Kandasamy, M. Jayaramchandran [2004], S.M. Nabiev, N.E. Snotsharbiev [2002], Silvetooth J.C., Galadima A. [2006]. Лекин, шунга қарамадан бу борадаги илмий изланишларни давом эттирилиши талаб этилади.

J.B. Hutchinson [1959] олиб борган тадқиқотларида, ғўзанинг қимматли хўжалик белгиларидан битта кўсакдаги пахта вази ирсийланиши ва битта кўсакдаги пахта вази билан чигит вази орасидаги ижобий ёки салбий боғланиш бор ёки йўқлигини ўрганиб, бу белги полиген тарзда ирсийланишини аниқлаган.

В.М. Бочарова [1979] олиб борган илмий изланишларида, ғўзанинг ингичка тоғали намуналари ўртасида тоғалининг сифат кўрсаткичлари яъни, тоғла узунлиги билан унинг ингичкалиги, тоғла узунлиги билан унинг пишқиллиги ҳамда тоғла пишқиллиги билан ингичкалиги ўртасида салбий боғланиш мавжудлигини аниқлаган ҳамда бундай салбий боғланиш амалий селекция жараёнида юқорида ўрганилган белгиларнинг битта ўсимликда мутасам бўлишига тўқинлик килишини айтиб ўтган.

С.А. Закиров [1973] изланишларида, ғўза генетик коллекциясининг айрим тизмаларини ўзаро чапиштириш асосида олинган дурагайларда айрим

сифат ва миқдорий белгиларнинг ирсийланишидаги ўзаро боғлиқлиги ўрганилган. Ўрганилган F_2 ўсимликлари орасида панжасимон бўлинма ва оралик (панжасимон бўлмалли) барт пластинкаларига эга бўлган ўсимликларнинг хосилдорлик бўйича кўрсаткичлари панжасимон кесик бартли ўсимликларнинг кўрсаткичидан юқори бўлиши аниқланган.

К. Тесое, М. Пўлатов [1985] олиб борган изланишларида, ғўзанинг ингичка тоғали *G. barbadeuse* L. турига мансуб намуналарида тоғла чиқими ва индекси юқори бўлган дурагай комбинацияларда кўпинча 1000 донга чигит оғирлиги енгил бўлиши билан ажралиб турган. Бу эса тоғла чиқими ва чигит вази ўртасида боғлиқлик борлигини қайд этишган.

Ш. Турабеков, С. Мусаева [1986] ўз тажрибаларида, ғўзанинг тизмалараро дурагайлаш асосида олинган ўсимликларида морфологик белги гулён бартлар шакли билан айрим қимматли хўжалик белгиларнинг ирсийланишидаги ўзаро боғлиқлигини ўрганиб, ландшафсимон шаклга эга бўлган гулён бартлар билан тоғла чиқими, тоғла индекси ва 1000 донга чигит вази ўртасида кучсиз алоқа мавжудлигини аниқлашган.

Zhou Youqiao, Bie Shu [1991] қайд этилишича, ғўзанинг тезпишарлик белгиси тоғла узунлиги ва пишқиллиги билан салбий, тоғла ингичкалиги ва йўқонлиги целлюлоза таркиби билан ижобий боғлиқлик борлигини кузатишган.

С. Султоновнинг [1997] илмий изланишларида, ўрта тоғали ғўза нав намуналарида морфологик белгилардан бири бўлган гуллари оналик тумшукчалари узунлигининг ўзгариши билан хўжалик белгилари ҳам маълум бир миқдорда ўзгариб боришини аниқлаган ҳамда ғўза гулининг оналик тумшукчаси қалта бўлган T-4346 тизмаси, тумшукчаси узун бўлган T-838 WR/198 тизмасига қараганда қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрта ва кучли корреляция намоён бўлиши қайд этилган.

Маълумки, дурагайлаш натижасида олинган ўсимликларда шундай бир генетик қонуният ва хусусиятлар борки, буни генетика, селекция ва уруғчилик ишларида четлаб ўтиш мумкин эмас. Бу ҳам бўлса белги ва

хусусиятларнинг узвий боғлиқлиги, яъни корреляция боғланиш кучи ёки даражаси кўрсаткичларидир. Корреляция боғланишларининг келиб чиқиши белги ва хусусиятларни белгиловчи генлар ва бу генлар хромосомаларининг аллел (ўхшаш) ва ноаллел қисмларида жойлашганлигига боғлиқ. Хромосомаларнинг авлоддан авлодга бутунтай ўтиши ёки аллел қисмлари билан алмашуви натижасида ўтганлиги сабабли ижобий ёки салбий натижалар келиб чиқади.

Т.Х. Кулиев, Ж. Шодмонов [2004] қайд этишча, ғўзанинг муҳим хўжалик белгиларидан бири тола узунлиги асосан кўсакнинг оғирлиги билан ижобий боғланганлиги, эрта тулға кирган ўсимликларнинг ҳаммасида ҳам кўсаклари эрта пишиб етилмаслигини кузатишган. Уларнинг қайд этишча, бу жараёнга бошқа омиллар ҳам таъсир қилиши мумкин. Бир нав иккинчи навадан асосан коррелятив турухлар ўртасидаги боғланишлар даражаси билан фарқ қилишини аниқлашган. Ўрганилган 108-Ф навида белгилар ўртасидаги коррелятив боғланишлар учун танланган Кирғиз-3, С-6524 навларида нисбатан кучли бўлганлигини унинг мосланувчанлик даражаси юқори эканлигини белгилайди.

Ўзани турлараро дургайлаш натижасида олинган мураккаб дургайларда тезпишарлик белгисининг F_2F_3 ўсимликлари шунинг кўрсаткичи, белгининг шаклланишига тупроқнинг шўрланиш даражаси сезиларли даражада таъсир кўрсатади, яъни, F_2F_3 ўсимликларида ўзгарувчанлик тоза муҳитга нисбатан паст бўлади, шўр муҳит дургайларнинг кенгишар бўлишига олиб келади. Лекин, турлараро дургайларда бошқа хўжалик белгилар махмуласига эга, тезпишар ва шўрга чидамли генотишлар ажралиб чиқади. Ўзанинг тезпишарлик ва ҳосилдорлик белгилари орасида коррелятив боғлиқлик мавжудлиги қайд этилган. Х.Мунасов ва бош. [2002], О.Кўчоров ва бош. [2000].

П.Ш. Ибрагимов [2003] ўзанинг илмий изланишларида, ғўзанинг *G.viridulense* L. турига мансуб ғўза навларини ковариацион тахлил услуби билан ва уларнинг F_1 авлодларида генетик, фенотипик ва паратирик

боғланишларни ўргатган. Бунинг натижасида, ғўзанинг қиматли хўжалик белгиларидан тола узунлигининг тола чиқими ва маҳсулдорлиги билан ўзаро боғлиқлиги сезиларли даражада бўлишини аниқлаган ҳамда оддий ўзаро боғлиқликларни бузилиши натижасида юқори авлод мураккаб дургайлар ичидан юқори қиматли хўжалик белгиларга эга бўлган комплекс янги тизмаларни ажратиб олган.

Ўзанинг қиматли хўжалик белгилари ўртасидаги коррелятив боғланишлар даражасини учта турухга ажратганлар. Биринчи турухга кучли боғланган белгилар-бигта кўсакдаги пахта вазни ва унинг таркибидати чигит сони, иккинчи турухга, ўрта даражада боғланган белгилар тола чиқими ва тола индекси, учинчи турухни кучсиз боғланган боғланган белгилар тола узунлиги, 1000 дона чигит вазни ва чангланмаган чигитлар сони таъкил этади, деб таъкидлаган Ф.Р. Абдиев [2011].

Т. Толиевдиев, З. Раҳмонов [2005] ўтказган таъқиқотларида, ғўзанинг қиматли-хўжалик белгиларидан бири бўлган эртапишарлик ўртасида теккари ва кенпишарлик билан тўғри корреляцион боғлиқлик борлиги аниқлашган.

Н.Э. Чоршанбиев, С.М. Набиев [2005] илмий изланишларида, ғўза ўсимлигида тезпишарлик белгиси билан ҳосил шохларининг сони орасида корреляцион боғлиқлик йўқлигини, тезпишарлик белгиси билан кўсак сони ва ғўзанинг ҳосилдорлик белгиси ўртасида салбий корреляцион боғлиқлик мавжудлигини кузатишган.

Ф.Х. Жумаев ва бошқалар [2005] қайд этишча, ғўза навларининг эртапишарлиги улардаги морфобиологик ва асосий хўжалик белгилари билан узвий боғлиқлиги тахлил қилинган. Ўрганилган нав қанча эртапишар бўлса, уларда hs (биринчи ҳосил шох) пастдаги бўғинларда ҳосил бўлиб, унда битта кўсакдаги пахта вазни ва 1000 дона чигит вазни ҳам нисбатан енгилроқ бўлиши мумкинлиги аниқланган.

В.А. Автономов [2006] олиб борган илмий изланишларида, ғўзанинг *G.hirsutum* L. турига мансуб намуналарини (С-4727, 02757, 02654, 159-Ф, С-

1973 ва 133) ўзаро дурағайлаш натижасида олинган F_2 ўсимликларида тола узунлиги бошқа кимматли хўжалик белгилари билан корреляциясини ўргатган. Ёўзанинг асосий кимматли хўжалик белгиларидан тола узунлиги, тола чикими, битта кўсакдаги пахта вази, бир тул ўсимлигининг маҳсулдорлиги, ўсув даври, бош поёда биринчи ҳосил шохининг жойлашиши бағандлиги каби белгилар орасида боғлиқлик кузатилмаган. Ажратиб олинган дурағай авлодларда юқорида санаб ўтилган белгилар боғланмаган ҳолда ирсийланиши қайд этилганлиги сабабли, F_2 ўсимликларида тола вази намуналарни танлаш имконияти юқори бўлганлиги аниқланган.

Б. Алпашов ва бошқалар [2007] таъкидлашича, ёўза намуналарини кўш дурағайлаш услуби асосида олинган Т-550 тизмасида кўсак вази ва микронейр кўрсаткичлари ўртасида мавжуд бўлган коррелятив боғлиқлар намоён бўлган, яъни кўсак вази қанчалик йирик бўлгани билан уларнинг тола вази дағдлашиши ва микронейр кўрсаткичи ҳам бирмунча юқори бўлганлигини аниқлашган ҳамда кўш дурағайлаш натижасида олинган оилаларда кўсак вази, тола узунлиги ва тола чикими каби белгилар ўртасида коррелятив боғлиқликлар ҳам оддий дурағайлаш услубида олинган оилаларга нисбатан бирмунча ижобий томонга силжиганлиги қайд этилган.

Ёўзанинг *G. barbadense* L. турига мансуб географик узок бўлган дурағайларнинг юқори авлодларида айрим хўжалик белгилари орасидаги генетик боғлиқлиқни ўргатган. Уларнинг таҳлилига кўра, ўзгарувчанлик коэффициенти F_8 авлодига бориб, деярли барча белгилар бўйича андоза навлардан фарқланмаган, тола чикими ортиши билан унинг узунлиги, битта кўсакдаги пахта вази ортиши билан узунлиги, 1000 дона чигит вазининг ортиши билан тола чикими камайиши кузатилган. Бундан ташқари, 1000 дона чигит вази боғлиқлигини шохланиш тили билан корреляцияси тахлил қилинган С.А. Усманов ва бош. [2007, 2015].

Н.Э. Чоршанбиев [2006, 2008] олиб борган ўз илмий изланишларида, *G. barbadense* L. турининг Сурхон-9, Термиз-32, Дуру Гавхар, Бухоро-7, Сурхон-10 навлари ва уларни дурағайлаш натижасида олинган F_1 авлодида

кимматли хўжалик белгиларининг корреляцияси ўрганилган. Натижаатар таҳлилга кўра, тола узунлиги билан чикими ўртасида кучсиз манфий корреляция мавжудлиги, тола узунлиги билан кўсаклар сони ўртасидаги боғлиқлик йўқлиги, кўсак оғирлиги билан кўсаклар сони ўртасида кучли манфий корреляция борлиги аниқланган ва белгилар ўртасидаги фенотипик корреляция генотипга боғлиқ равишда ўзгаради деган хулосага келган.

А.Б. Амантурдиев, Р.Т. Кимларнинг [2009] илмий тадқиқотларида, ёўзанинг кимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган битта кўсакдаги пахта вази мураккаб микдорий белги бўлиб, дурағайлаш асосида олинган F_1 - F_2 ўсимликларида бошланғич манбаларнинг комбинацион кобильтига боғлиқ ҳолда оралик, позитив ва негатив гетерозиснинг намоён бўлиши билан доминант ва юқори доминант ҳолда ирсийланиши кузатишган. Ўрганилган ушбу дурағайларда белгилар бўйича кучсиз боғлиқлик ҳамда чагатириш асосида олинган дурағайларда битта кўсакдаги пахта вази билан бир тул ўсимлигининг маҳсулдорлиги ўртасида сезиларли даражадаги ижобий корреляция борлиги аниқлашган.

А.Б. Амантурдиев [2009] қайд этишича, ёўзанинг ўрта ва ингичка толали намуналарини дурағайлаш асосида олинган F_2 - F_3 ўсимликларида кимматли хўжалик белгиларидан тола чикими ва узунлиги, тола чикими ва кўсак йириклиги белгилари орасида сезиларли даражада боғлиқлик йўқлигини аниқлаган ҳамда F_2 - F_3 ўсимликларида бу белгилар билан ҳосил шох икенжа типлари ўртасида ҳам аниқ боғланиш йўқлиги қайд этилган.

М.Х. Кимсанбаев, Вик.А. Автономов [2009] олиб борган тадқиқотларида, келиб чиқиши узок бўлган ингичка толали ёўза намуналарини дурағайлаш асосида олинган F_2 ўсимликларининг бир тул ўсимлигида ҳосилдорлик билан тола чикими ўртасида ўзаро боғлиқлиги ўрганилиб, бу белгилар орасида боғлиқлик йўқлигини таъкидлашган ва серхосил, юқори тола чикимига эга бўлган ингичка толали янги ёўза навларини яратиш мумкинлигини аниқлашган.

Sh. Salahuddin et al. [2010] маълумотларида, ғўзанинг *G.hirsutum* L. турининг миксдорий белгилар ўртасида ўзаро боғлиқлик хусусиятлари таҳлил қилинган. Миксдорий белгиларнинг натижалари юкори даражада ижобий корреляцияга ($r=+0,567$) эга эканлигин кайд этишган. Ўрганилган ҳар битта ўсимлик билан пахта ҳосили ўртасида ижобий корреляция ($r=+0,959$) ҳолатини кузатишган. Ёўзанинг симподиал шохларнинг таъсири ҳосил учун жуда катта эканлиги ҳамда ўсимлик баландлиги ва ўсимликдаги моноподиал шохлар пахта ҳосилига боғлиқ эмаслигини аниқлашган.

Ф.Р. Абдиев [2011] олиб борган илимий изланишларида, ғўзанинг *G.barbidentate* L. турига мансуб географик келиб чиқиши жиҳатдан узок бўлган 010972 намунасини Т-817 тизмаси билан ўзаро дурагайлаш (σ Т-817 х 3010972) х Т-817 натижасида олинган беккросс популяцияларнинг юкори F_8 дан ажратилган ўсимлик ва бу бўғинлардаги йирик кўсақли (4,2 г. дан юкори бўлган) ўсимликларда кимматли-хўжалик белгиларнинг ўзгарувчанлигини ҳамда улар орасидаги корреляцион боғлиқликларни ўрганиш асосида амалий селекция учун йирик кўсақли ноёб оила ва тизмалар ажратиб олган.

М.И. Иксанов [2011] ўз тажрибаларида, ғўзанинг *G.barbidentate* L. турига мансуб янги ғўза навларини яратиш бўйича кўпгина селекция ишларини олиб борган. Бунинг натижасида, сўнгги йилларда янги ўта тезпишар ва кўсақ очилиш юкори бўлган Сурхон-14, Сурхон-16 ва Сурхон-18 навлари яратилган. Ушбу навлар тезпишарликдан ташқари, кўпгина кимматли хўжалик белгилари юкори ҳосили, тола чиқими (37,5% гача) ва тола сифати (1А, 1Б типга) эга бўлди. Бундан кўриниб турибдики, кўп йиллик селекция ва мақсадли танлаш ишлари натижасида тезпишарлик ва ҳосилдорлик ўртасидаги салбий корреляция, шунингдек тезпишарлик ва тола сифати ўртасидаги ўзаро боғлиқликни бузишга эришган.

Х.Ю. Тўйчиев, З.Б. Куразов [2011] илимий изланишларида, ғўзанинг ўрта толали нав ва тизмаларида кимматли хўжалик белгиларидан тола узунлигининг битта кўсақдаги пахта вазни, 1000 донга чигит вазни ҳамда

тезпишарлик белгиси билан гуруҳлараро ижобий ва салбий, тола чиқими билан салбий, тола индекси билан Бухоро-6 навида салбий, Наманган-77, Қўлайсин, Т-343, Т-360 ларда ижобий корреляция коэффициентига эгалигини айтиб ўтган.

К.О. Хударганов [2018] олиб борган изланишларида, интичка толали ғўза намуналари ўртасида чаतिштириш асосида олинган дурагайларда тола чиқими билан 1000 донга чигит вазни ўртасида салбий ($r=-0,39$ дан $r=-0,52$ гача) боғланиш мавжудлиги кайд этилган бўлса, тола индекси билан тола чиқими ва 1000 донга чигит вазни орасида ўртача ижобий ($r=+0,44$ дан $r=+0,58$ гача) боғланишни кузатган ҳамда битта кўсақдаги пахта вазни билан тола чиқими ва тола узунлиги орасида, тола узунлиги билан 1000 донга чигит вазни ва тола индекси, гулларнинг хили билан битта кўсақдаги пахта вазни, 1000 донга чигит вазни, тола узунлиги каби белгилари орасида ўзаро боғланишлар мавжуд эмаслиги аниқланган.

С.А. Усманов ва бошқалар [2011] кайд этилишча, интичка толали ғўза турига мансуб юкори авлод дурагайларида битта кўсақдаги пахта вазни тола сифат кўрсаткичлари билан (Регуболлика “Сифат” маркази томонидан замонавий NVI дастгоҳида аниқланган), яъни, микронейр (Mic), солиштирма узилиш кучи (Str), юкори ўртача узунлик (Len) билан ўзаро боғлиқликлари ўрганилган. Юкори авлод дурагайларида толанинг технологик кўрсаткичлари бўйича мақсадли селекция тадқиқотларини олиб бориш имкониятлари кенглиги аниқланган ҳамда улар орасидан тола сифати юкори бўлган интрогрессив шакллар ажратиб олишган.

О.Х. Кимсанбоев ва бошқалар [2013] илимий изланишларида, ғўзанинг интичка ва ўрта толали намуналарини ўзаро дурагайлаш натижасида олинган F_2 ўсимликларида тола узунлиги, тола чиқими, битта кўсақдаги пахта вазни, бир тулп ўсимлик ҳосилдорлиги, ўсув даврининг давомийлиги ва биринчи ҳосил шохининг жойланиш баландлиги белгилари орасидаги корреляцион боғлиқлик ўрганилган, улар орасида ўрта ва кучли корреляция мавжуд эмаслигини аниқлашган.

Х.Ю. Тўйчиев, Х.Ю. Тўйчиева [2014] олиб борган изланишларида, битта ўсимлиқдати ҳосилдорлик билан айрим хўжалик белгилар орасидати коррелятив ўрганиш натижалари асосида нав ва тизмаларда, яъни битта тулпатаи кўсаклар сони орасидати корреляция дээрли барча турухларда мавжудлигини кўрсатган. Бундан ташқари, битта ўсимлик ҳосилдорлиги билан 1000 дона чигит вази орасидати корреляция коэффициенти барча нав ва тизмаларда йиллар давомида турухлараро ўзгарувчан ҳолатларда намоён бўлиб, бу белгилар орасида ҳам салбий томонга боғланишларни ўзиш мумкинлиги аниқлашган.

Ф.Р. Абдиев ва бошқалар [2014] ғўзанинг *G. barbadesense* L. турига мансуб келиб чиқиши географик узок бўлган туричи хилини нав ва тизмалар билан ўзаро чагиптириш асосида олинган юкори авлод дурагай ўсимлиқларида ғўзанинг қимматли хўжалик белгиларида битта кўсақдати пахта вази билан тола чиқими ўртасидати ўзаро боғлиқликлари ўрганишган. Олинган натижалар таҳлилга кўра, битта кўсақдати пахта вази билан тола чиқими ўртасида ўртача боғланиш кузатишган.

С.А. Усманов ва бошқалар [2014] ғўзанинг *G. barbadesense* L. турига мансуб юкори авлод бекрессе дурагай авлодларидан кўсаклари 3 чанокли, 4 чанокли, 5 чанокли 50 та намуналар алоқиди-алоқиди териб олинган ва уларда бир катор қимматли хўжалик белгиларнинг ўзаро коррелятив боғлиқлиги таҳлил қилинган. Ўрганилган битта кўсақдати пахта вази битта дўшпақдати пахта вази ва дўшпақдати чигитлар сони белгилари билан ҳамда битта дўшпақдати пахта вази билан дўшпақдати чигитлар сони белгиси билан ўзаро кучли ижобий боғланишларни аниқлашган. Бундан ташқари, битта дўшпақдати чигитлар сони билан 1000 дона чигит вази ўртасида кучсиз ва ўрта салбий корреляцион боғлиқлик кузатишган. Шундай ҳулосага келиш мумкинки, битта дўшпақда чигитлар сони канча кўп бўлса, 1000 дона чигитнинг вази шунча паст бўлишини аниқлашган.

Р.К. Вауару et al. [2015] минтакавий кишлоқ хўжалиги Лам, Фарм, Гунтур, Андра Прадеш илмий текшириш станцияларида пахта етиштиришда

ҳосилдорлик омиллари ўртасида корреляция боғлиқлиқни ўрганиш учун *Gossypium hirsutum* L. турига мансуб намуналарида ғўзанинг 17 та морфо-хўжалик белгилари учун 63 та генотип билан амалга оширилган. Жумладан, монопоидиялар сони, битта кўсақдати пахта вази, ўсимлиқдати нисбий хлорофил таркиби, бўғим оралик узунлиги каби белгилар фенотипик ва генотипик даражаларда ғўзанинг уруғлик ҳосили билан ижобий корреляция борлигини кайд этишган.

Генетик ўзгарувчанлиқни аниқлаш мақсадида ғўза ва унинг компонентлари ўртасида корреляцион боғлиқлик ўрганилган. Тадқиқот учун Viscontol дурагайларидан фойдаланилган. Генотиплар барча белгилар учун кенг донрадаги ўзгарувчанлиқни намоён этган. 50 % гача туллар сони, ўсимлик бўйи ва бўғимлар сони, монопоидиялар сони, симпоидиялар сони генотип ва фенотип даражасига чигитнинг маҳсулдорлиги билан ижобий корреляция борлиги аниқланган. Тола чиқими, монопоидиялар сони, ўсимлиқларнинг 50 % туллаши, битта кўсақдати пахта вази белгилари генотип сифатида ғўза уруғи ҳосилдорлиги юкори ижобий тўғридан-тўғри таъсир даражасини намоён қилмаслигини кайд этиб, фенотипик даражада эканини айтиб ўтилган. Бу белгилар ўрта толали *G. hirsutum* L. турининг ғўза уруғининг ҳосилини яхшилаш учун танлов мезони сифатида қабул қилиниш мумкинлиги кўрсатиб ўтилган М.В. Раппаг et al. [2015].

Ғўзанинг янги тизма ва навларининг тола ҳажминини таъминловчи белгилари ўрганилган. Бунда тола ҳосилдорлиги, тола чиқими, тола индекси ва 1000 дона чигит вази каби белгилари таҳлил қилинган. 1000 дона чигит ҳажми билан 1000 дона чигит вази орасидати корреляция коэффициентлари 0,18 дан 0,62 бўлганлиги аниқланган. Энг кучли даражадаги корреляция Жавлон, Т-403, ЛБТ тизмаларида кузатишган. Ўрганилган бошқа тизмаларда эса бу белгилар орасидати корреляция сезиларли даражада, бўлмаганлиги кузатишган. Чигит ҳажми билан тола чиқими белгилари ўртасидати боғланиши ҳам турли даражада кузатишган. Энг юкори боғлиқлик коэффициенти (0,53) Т-116 тизмасида аниқланган ва бошқа тизмаларда эса

корреляция коэффициенти 0,20-0,44 гача бўлган. Бундан ташқари, тола индекси билан чигит ҳажми ўртасида юқори ижобий боғлиқлик борлиги аниқланган. Ўранишган барча тизмаларда боғланиш юқори даражада, яъни йирик чигитлардаги толаларнинг сони ва унинг вазни бевосита ижобий боғланишта олиб келиши аниқланган. Шунинг учун йирик чигитларга эга бўлган намуналар юқори тола маҳсулдорлигини намён этган. Бу ўз навбатида, юқори тола ҳосилдорлиги билан тола маҳсулдорлиги ўртасида бевосита боғланиш борлигига асосланган. Энг юқори тола ҳосилдорлигига эга бўлган наваларни яратишда яқка тановларнинг чигит вазни, тола индекси ва тола чикими бўйича танлаш ва чикитга чиқариш ишларини жадаллаштириш лозимлигини айтиб ўтганлар П.Ш. Ибрагимов [2016].

Ал.А. Абдуллаев [2017] илмий изланишларида, молекулар генетик усулб асосида ғўзанинг *G. barbadense* L. турига мансуб 288 намуналарнинг морфобиологик, кимматли хўжалик белгилар ва толанинг сифати кўрсаткичлари ўртасида белгиларнинг боғлиқлиги ўрганилган. Жумладан, ғўзанинг сифат белгиларидан микронейр билан тола узунлиги ($r = -0,56$; $p = 0,001$) сезиларли салбий корреляция кузатишган бўлса, микронейр тола индекси нисбатан паст ($0,272$; $p = 0,001$) ижобий корреляция кузатишган. Бундан ташқари, ўсимлик бўйи билан биринчи ҳосил шохи ($0,341$; $p \leq 0,001$), ўсимлик бўйи билан умумий бўғинлар сони ($0,725$; $p \leq 0,001$), ўсимлик бўйи билан гултожибардлаги антоцидан доғ ($0,299$; $p \leq 0,001$), биринчи ҳосил шохи билан монопоидиялар сони ($0,165$; $p \leq 0,01$), биринчи ҳосил шохи билан шохланиш типи ($0,250$; $p \leq 0,001$), кўсаклар сони билан шохланиш типи (-237 ; $p \leq 0,01$), кўсаклар сони билан тул шакли ($-0,240$; $p \leq 0,001$) белгилар ўртасида боғлиқлик белгилари ўрганилган.

Ғўзанинг терраплонд *G. hispania* L. турига мансуб намуналарида морфо-хўжалик белгиларнинг хусусиятлари ва уларнинг туғридан-туғри ва бېлвосита оқибатлари ўртасидаги муносабатларини топиш бўйича корреляцион таҳлиллар ўтказилган. Генотиплар ўртасида сезиларли фарк борлиги аниқланган. Морфо-хўжалик белгилардан битта кўсақдаги пахта вазни монопоидиялар сони билан, кўсаклар сони эса оғирлиги билан, тола

узунлиги эса тола чикими белгилари билан ижобий корреляция борлиги кайд этилган. Тадкикот натижалар таҳлили кўра, ўсув даврининг давомийлиги, монопоидиялар сони, кўсаклар сони, бўғинлар сони, битта кўсақдаги пахта вазни, тола ингичкалиги каби морфо-хўжалик белгилар туғридан-туғри пахта ҳосилдорлигига ижобий таъсир этиши аниқланган. Гуллашгача бўлган даврда ўсимликларнинг ўсиши, ўсимлик бўйи тола чикимига нисбатан салбий корреляция борлигини аниқлашганлар М.Абдуллаев et al. [2016].

Shakil Ahmad et al. [2016] илмий изланишларида, ғўзанинг ўрта толали турида морфологик белгиларнинг тола сифати белгилари ўртасида корреляцион боғлиқлик кўрсаткичлари ўрганилган. Олинган маълумотлар корреляцион таҳлили аҳамиятли даражада таҳлил қилинган. Тадкикотнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, ўсимлик бўйи, биринчи ҳосил шохи, симподиал шохлар сони, битта кўсақдаги пахта вазни, 1000 дона чигит вазни, тола мустаҳкамлиги, толанинг узиллиш кучи, толанинг солиштирма кучи ўртасида узвий боғланиш аниқлашган. Олинган натижаларнинг корреляцион таҳлили эса ($r = +0,01$; $r = +0,05$) кучсиз ижобий боғлиқлик борлиги кузатишган.

С.М. Набиев ва бошқалар [2016] кайд этилишча, ғўзанинг сув билан оптимал таъминланганлик ва сув танқислиги шароитларида ғўзанинг навалари ва уларнинг F_1 ўсимликларида баргнинг муҳим физиологик ва морфологик кўрсаткичлари ўртасидаги корреляция генотипик таркиб (навар, F_1) ва сув билан таъминланганлик шароитлари билан бир қаторда уруғларни олиш шароитларида ҳам боғлиқлиги аниқланган.

С.Ғ. Бобоевнинг [2017] илмий изланишларида, ғўзанинг генотипларо дурағайлаш асосида олинган янги турларро мураккаб ва бекросс F_2 ўсимликларида кимматли хўжалик белгилар ўртасида корреляцион боғлиқлик ўрганилган. Ўранишган ғўзанинг кимматли хўжалик белгилари тола чикими ва тола узунлиги орасидаги боғлиқлик ўртача ижобийдан ($r = +0,39$) юқори ижобийгача ($r = +0,62$), тола узунлиги ва микронейри-ўртача ижобий корреляция ($r = +0,55$), шунингдек, тола узунлигининг тола пишкилиги билан ўртача ижобий ($r = +0,50$) корреляция кўрсаткичларга эга

эканлиги ҳамда турлараро мураккаб дуратайлаш асосида айрим кимматли хўжалик белгилари орасидан тескари коррелятив боғлиқликни бузиш мумкин ва ушбу белгилар бўйича танлов ишларини корреляция коэффициентига асосланган ҳолда олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

К. Kumar, J.M. Nidagundi, A.C. Nosaman [2017] илмий изланишларида, ўзнинг ўрта тоғали *G. hisyam* L. турига мансуб 10 та намуналарни бошлангич манба сифатида фойдаланиб, дуратайлаш натижасида 45 та ўсимлик авлодлари олинган. Дуратайлаш натижасида олинган ўсимликларнинг касалликка чидамли хусусиятлари ва морфо-хўжалик белгилари, яъни вилт, ўсимликдаги монопоидиллар сони, биринчи ҳосил шохи ҳар бир ўсимликнинг репродуктив нуктаси, тола индекси, тола чикими, ўсимлик бўйи каби белгиларнинг корреляцияси ўрганилган. Ўрганилган бу белгилар ўза ҳосилдорлигини ошириш учун муҳим танлов мезонлари сифатида қаралаш кераклиги айтилган.

Юқорида келтирилган илмий манбалардаги фикрларни тутиб, Перу ўза турларининг туричи биохилма-хилликларининг генетик потенциалидан амалий селекцияда самарали фойдаланиш имкониятларини излаш ва тақомиллаштириш ўза генетикасининг долзарб муаммоларидан бўлиб, ўз ечимини кутмоқда. Биз ўз изланишларимизда дунё коллекциясида сақланмаётган *G. barbadense* L. турига мансуб туричи хилма-хилликлари ҳозирга қадар эътибор берилмаган, уни маҳаллий ўза навлари билан чағиштириш натижасида олинган дуратайларнинг юқори авлодларида кимматли хўжалик белгиларининг ирсийланиши, ўзгарувчанлиги ва кимматли хўжалик белгилари орасида ўзаро корреляцияни ўрганиш, шунингдек, туричи ва турлараро юқори авлод дуратай популяцияси ўсимликлари орасидан ажратиб олинган селекция тизманинг оиналарида яқка танловлар асосида генетик бирхилликка эга бўлган тизма ва навлар яратилишга қаратилган.

II БОБ. ПЕРУ ЎЗА ТУРЛАРИ ВАКИЛЛАРИНИНГ МАНБАЛАРИ, ЎРГАНИШ УСЎЛЛАРИ ВА ШАРОИТИ

2.1-§. Тадқиқот ўтказилган жой ва унинг шароити

Тадқиқотлар Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти Ўза систематикаси ва интродукцияси лабораториясининг дада тажриба майдонида, Зағитота тажриба станцияси ҳамда Дўрмон тажриба базаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожлантириш вазирлигининг «Ўرғучиликни ривожлантириш маркази» ДУК га қарашли Сухондарё вилояти «Сухон» бирламчи хўжалигида 2006-2018 йиллар давомида бақарилган.

2.2-§. Тадқиқот манбаи

Изланишларда *Gossypium* L. туркумининг *Karpos* (Maue) Fux. кичик туркуми полиморф тури *G. barbadense* L. турининг туричи хилма-хилликлари ва ёввойи *G. darwinii* Watt тури ҳамда туричи ва турлараро дуратайлаш асосида олинган F₁, F₂ оилалар, тизмалар ҳамда навлар манба сифатида ишлатилди.

Ф.М. Мауер [1954] ва Р.А. Фухелл [1992], А.А. Абдуллаев, В.П. Клят [2006] системалардан фойдаланилди:

Туркум. *Gossypium* L.

Кенжа туркум. *Karpos* Raf. aprl. m.

Секция. *Meghibascelata* Tod. em. m.

Тур: *G. barbadense* L.

Кенжа тур ва шакллари: subsp. *ridetale* Maue,

f. *risco*.

f. *ratat*.

f. *ishan nigra* (ок тоғали),

f. *ishan nigra* (новотран тоғали).

Кенжа тур ва шакллари: subsp. *vitifolium* (Lam) Maue.
subsp. *vitifolium*,

f. brasiliense,
f. brasiliense (қизил поян).

Кенжа тур ва шакллари: *subsp. eubarbadiense* Malet.

Аш-8, Қарши-8, Термиз-31 навлари

Тур: *G. darwinii* Watt.

Аш-8 нави. Туркманистонлик олимлар томонидан яратилган. Морфологик ва ҳужалик белгилари: тик, тарақайлаган, барглари ўртача эчиликда жойлашган, асосий пояннинг бўйи 60,0-110,0 см, ўртача антоциан кизаришга эга, кучсиз тукланган, бўғинлар умумий сони 16-24 та, биринчи ҳосил шохлар (hs) 4-6 бўғинда, моноподиал шохлар сони 4-5 та, ҳосил шохлар сони 22-24 та, бўғинлар оралиғи 4,0-6,0 см. Ўртача катталиқда (10,0 х 19,0 см), яшил, 3-5 бўлмали кучсиз тукланган, нектардони 3 та, думалоқ, рангсиз, барг банди 10,-12,0 см ўртача антоциан кизаришга эга. Гули ўртача катталиқда, ўртача очилувчан, гулбанди 0,5-2,5 см, гулбёнбаргчаси 3 та, қораксимон, учки қисми 5-10 та типчаги (0,2-1,0 см), гулбёнбаргининг ташқи нектардони 3 та, думалоқ, рангсиз, ички нектардони йўқ, гулкосачабарглари тўлқинсимон, оч яшил, гултожибарглари 5 та оч сарик, гулбарг юза қисми аник кўринувчан госсипол безчалари билан қопланган, асосида тўқ қизил доғи бор, оталик устуңчаси цилиндрсимон, чандонлар ва чанг дончалар тўқ сарик ранг, оналиги уч устуңчали, оталик устуңчасидан 0,5-1,0 см туртиб чиққан. Кўсаги ўртача катталиқда, тўқ яшил, нотекис чуқурчали, туҳумсимон, ўткир учли, сирти госсипол безчалар билан қопланган, 3-4 чанокли. Битта очилган кўсақдаги пахта вазни 2,8-4,0 г, чигитлари ўртача катталиқда, тола ранги оқ, ҳосилдор.

Қарин-8 нави. Пахта селекцияси, уручилиқ египтириш агротехнологияси илмий текшириш институтида Мл-112=(Мл-104 х Мл-107), Мл-107=(Мл-101 х 7318-В) дуралайлаш йўли билан яратилган. Нав муаллифи А.Р. Тяминов. *G. barbadiense* L. турига мансуб. Морфологик ва ҳужалик белгилари: ўсимлик қомлақт, барглари ўртача эчиликда жойлашган, асосий пояннинг бўйи 70,0-80,0 см, йитик, бўғинлар умумий сони 20-25 та,

биринчи симподиал ҳосил шохи (hs) 3-4 бўғинда, моноподиал шохлар сони 1 та, ҳосил шохлар сони 18-22 та, бўғинлар оралиғи 3,0-6,0 см. Ўртача катталиқда (10,0 х 16,0 см), яшил, 3-5 бўлмали, тукланиши кучсиз, нектардони 1 та, думалоқ, рангсиз, барг банди 12,0 см, ўртача антоциан кизаришга эга. Гули ўртача катталиқда, ўртача очилувчан, гул банди 2,0-4,0 см, гулбёнбаргчаси 2 та, қораксимон, учки қисми 6-12 типчаги (0,2-2,0 см), гулбёнбарг ташқи ва ички нектардони йўқ, гулкосачабарги тўлқинсимон, оч сарик, гулбарг юза қисми аник кўринувчан госсипол безчалар билан қопланган, асосида тўқ қизил доғи бор, оталик устуңчаси цилиндрсимон, чандонлар ва чанг дончалар тўқ сарик ранг, оналиги уч устуңчали, оталик устуңчасидан 0, 3-0,5 см туртиб чиққан. Кўсаги тўқ яшил, туҳумсимон нотекис чуқурчали, ўткир учли, сирти госсипол безчалари билан қопланган, 3-4 чанокли. Битта очилган кўсақдаги пахта вазни 2,2-3,2 г, чигитлари ўртача катталиқда, тола ранги оқ, эрталишар, ҳосилдор.

Термиз-31 нави. Пахта селекцияси, уручилиқ египтириш агротехнологияси илмий текшириш институтининг Сурхондарё филиалида 6608-В х Термиз-11 навларини дуралайлаш йўли билан яратилган. Нав муаллифлари: А.А. Творогова, А.Н. Авлиёқулов, Ш.И. Иброҳимов. *G. barbadiense* L. турига мансуб. 1998 йилдан районлаштирилган. Морфологияси ва ҳужалик учун қимматли белгилари: тули қонуссимон, шаклда чекланган типда шохлайди. Тик ўсади. Бўйи 100,0-120,0 см. Ўсув шохи 0-1 та, ҳосил шохлари «нол» типда баъзан 1-2 та узун ҳосил шохлари учрайди. Унда 2-3 та кўсак бўлади. Пояси яшил рангда, кейинчалик жигаррангта қиради. Биринчи ҳосил шохи 3-4 бўғинда жойлашган. Барги 3-5 бўлакци, 18-30 см, ўткир чуқур кесилган, ўртадаги бўлакчаси чўзик-туҳумсимон, учи чўзик. Гули оч сарик ранг, катталиғи 2-3 см, доғлари бор, чандонлари тўқ сарик. Кўсаги туҳумсимон, қонуссимон, ўткир тумшукли, усти қалин чуқурчали, яши очилади, пахтаси тўқилмайди. Ҳосилдорлиги тектарида 39,1-47,8 ц, кўсақдаги пахтанинг вазни ўртача 2,7-3,4 г, кўчат уніб чиққандан биринчи кўсак очилгунча бўлган давр 118-123 кун. Толаси

ок-пушти рангда, Ш типга мансуб, толасининг штапель узунлиги 36,5 мм, солиштирма узлиши кучи 30,6 гк/текс, чизикли зичлиги 164 м/текс, тола чикиши 32,7-34,3%. Микронейр кўрсаткичлари 4,4-4,7 mic.

G. barbadense L. туричи хилма-хилликларига мансуб кенжа тури, шакллари ва ёввойи *G. darwinii* Watt тури I-липовида келтирилган.

2.3-§. Таджикот услублари

Ўзанинг *G. barbadense* L. турига мансуб туричи генетик хилма-хилликларининг ва ёввойи *G. darwinii* Watt турининг узун кунга талабчанлиги турлича бўлганлиги сабабли, бир хил пайтда гулга кириши ва гуллашнинг таъминлаш ҳамда дурағайлаш ишларини олиб бориш мақсадида сунъий киска кун шароитлари яратилди. Биз тажриба учун олган туричи хилма-хилликлари киска кунга кучли талабчан бўлганлиги учун, Вагнер челакларида, махсус фотопериодик уйчалар остида киска кун шароитида (10 соатлик ёруғлик) ўстирилиб, парвариш қилинди. Туричи генетик хилма-хилликларида дурағайлаш ишлари умумий қабул қилинган услуб асосида олиб борилди.

G. barbadense L. туричи хилма-хилликларининг ва ёввойи *G. darwinii* Watt турининг чигитлари майда, бир-бирига ёпишиб кетганлиги, каттик «тошсимон» кобиклилиги учун, тўғридан-тўғри очик дала шароитида экиб ўстириш жуда қийин. Шундан келиб чиққан ҳолда, аввалига уруғларни тез ундириб олиш мақсадида чигитнинг микропиляр қисми кесилиб, дистилланган сувда ювилиб, филтр коғози кўйилган Петри косачасида (чашка) 30-35°C иссиқликдаги термостатда 24 соатга кўйилди. Термостатда униб чиққан уруғларни 1:1:1 нисбатда гўн, тупроқ, кум аралаштирмаси солиб тайёрланган коғоз идишчаларга феврал ойининг охири март ойининг бошларида экилди. Ўза кўчатлари (бошлангич манбалар, F₁-ўсимликлари) 2-3 чинбарт ҳосил қилгандан сўнг Вагнер челакларига қайта экилди. F₂ ўсимликлар, оилалар ва тизмалар тўғридан-тўғри очик тажриба даласида ва дурағайлаш асосида олинган туричи ва турларо F₁-ўсимликлари бутун ўсув

даври давомида Вагнер челакларида махсус фотопериодик уйчаларда ўстирилди.

Ўсув даврининг охирида бошлангич манбалар, дурағайлаш асосида олинган туричи ва турларо F₁-F₂ ўсимликлар, оилалар, тизмалар ўсимликларининг морфобиологик белгиларига (асосий понинг бўйи, ранги, туқланиши, асосий поядаги бўғинлар сони, уларнинг узунлиги, шохланиш типин (симподиал, моноподиал), барг ва шохларнинг асосий пойда жойланиши, биринчи ҳосил шохининг жойлашиши, барг шакли, ранги, туқланиши, барг ширадонларининг сони, шакли, ранги, гулёнбарглар сони, шакли, ранги, ўлчами, тишчаларнинг сони, гулкосачабарглар шакли, ранги, гултожибарглар ранги, сони, узунлиги, кенглиги, асосида доғнинг бор ёки йўқлиги, чанг усунчасининг ҳолати, ранги, кўсак шакли, катталиги, узунлиги, ранги, кўсак юзасининг характери, чаноклар сони, чигитнинг шакли, туқланиши) махсус классификатор асосида тавсиф берилди Н.Демешов ва бош [1989].

Бошлангич манбалар ва F₁-ўсимликларининг бир тул ўсимликдаги мева элементлари ва жами кўсаклар ҳамда битта очилган кўсакдаги уруғланган, ҳаётчан ва яхши ривожланган уруғлар сони ҳисобланади. Бунинг учун ҳар битта ўсимликдан 10 тадан яхши пишиб етилган кўсак йиғиб олинди ва ҳар битта кўсакдаги тўлиқ ва пуч уруғлар сони аниқлаб чиқилди.

Шу билан бирга, *G. barbadense* L. туричи генетик хилма-хилликларининг ва *G. darwinii* Watt турининг ва шакллари дурағайлаш асосида олинган туричи ва турларо F₁-F₂ ўсимликларининг морфобиологик (кун узунлигига талабчанлик, шохланиш типин, антоциан рангли ўсимликлар ирсийланиши) белгиларининг ирсийланиши ўрганилди.

Ўрганилган биринчи бўғин дурағайларида белгиларнинг доминантлик даражасини G.E.Veal ва R.E. Atkins [1965] ишларида келтирилган S. Wright формуласи бўйича аниқланди:

$$hP = \frac{F_1 - MP}{P - MP}$$

hr – доминантлик коэффициенти;

F₁ – дурагайнинг ўртача арифметик кўрсаткичи;

MP – иккала ота-она шакл белгисининг ўртача арифметик кўрсаткичи;

P – энг яхши ота ёки она шакл белгисининг ўртача арифметик кўрсаткичи.

hr = 0 – доминантлик йўқ;

0 < hr < ±1, 0 – оралик доминантлик;

hr = ±1, 0 – тўлиқ доминантлик;

hr > ±1, 0 – ўта доминантлик.

Иккинчи ва учинчи бўғин дурагайларида белгининг авлоддан-авлодга берилиш кўрсаткичи (h^2) S. N. Walter [1982] формуласи асосида ҳисоблаб чиқилган.

$$h^2 = \frac{\delta^2 F_2 - \delta^2 F_1 + \delta^2 P_1 + \delta^2 P_2}{\delta^2 F_2}$$

$\delta^2 F_1$ - F₁ ўсимликларининг дисперсияси;

$\delta^2 F_2$ - F₂ ўсимликларининг дисперсияси;

$\delta^2 P_1$ - она ўсимлигининг дисперсияси;

$\delta^2 P_2$ - ота ўсимлигининг дисперсияси;

Олиб борилган барча амалий тажрибалар асосида олинган микдорий натижалар кўрсаткичлари катта ва кичик танланмаларда статистик ишловдан ўтказилди [4; 351-6.]. Бунда, хусусан қуйидаги формулалардан фойдаланилди:

$$\bar{x} = A + bx \quad G = i \sqrt{\sum \frac{fx^2}{n}} - b^2 \quad m\% = \frac{m}{\bar{x}}$$

$$V = \frac{Gx100}{\bar{x}} \quad m = \frac{G}{\sqrt{n}} \quad \text{бу ерда:}$$

A - синфларнинг марказий қиймати; b - тузатма бўлиб, қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади: $b = \frac{\sum fxa}{n}$;

i - синфлар оралиғи; f - частоталарни оғиши;

M - ўртача арифметик микдор; G - ўртача квадратик оғиш;

X - вариантлар йиғиндиси; m - ўртача арифметик ҳатolik;

n - танланманинг ҳажми; V - ўзгарувчанлик коэффициенти;

m% - танланган қузатишнинг аниқлиги ёки фозили ҳато.

$$\bar{x} = \frac{\sum X}{n} \quad G = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$V = \frac{Gx100}{\bar{x}} \quad m = \frac{G}{\sqrt{n}}$$

x - ўртача арифметик микдор; G - ўртача арифметик оғиш;

X - вариантлар йиғиндиси m - ўртача арифметик ҳатolik;

n - танланманинг ҳажми; V - ўзгарувчанлик коэффициенти.

Дурагайларида белгиларнинг корреляцион боғланиши қуйидаги формулалар ёрдамида аниқланди:

$$r = \frac{\sum XY - (\sum X \cdot \sum Y) / n}{\sqrt{(\sum X^2 - (\sum X)^2 / n) \cdot (\sum Y^2 - (\sum Y)^2 / n)}} \quad m = \sqrt{\frac{1 - r^2}{n - 2}} \quad r = \frac{r}{Sr}$$

бунда: r - корреляция коэффициенти +1 ва -1 оралиғида бўлади;

X, Y - белгиларнинг микдорий кўрсаткичи;

x, y - белгиларнинг ўртача кўрсаткичи;

m - корреляция коэффициенти ни стандарт ҳатolik;

n - қузатишлар сони;

tr - корреляцияни маъжудлик критерияси.

Генотипик дисперсиянинг умумий фенотипик дисперсияга нисбати белгининг наслдан-наслга берилиш даражаси (h^2) R. W. Allard [1956] формуласи бўйича аниқланди:

$$h^2 = \frac{\sigma^2 F_1 - \sigma^2 F_1 + \sigma^2 F_1 + \sigma^2 F_2}{3}$$

$h^2 - F_2$ дуратайларда белгининг наслдан-наслга берилиши;

$\sigma^2 F_1$ - биринчи авлод дисперсияси;

$\sigma^2 F_2$ - иккинчи авлод дисперсияси;

$\sigma^2 F_1$ - биринчи ота-она дисперсияси;

$\sigma^2 F_2$ - иккинчи ота-она дисперсияси.

Ўза ўсимлигининг барча морфобиологик белгилари Canon A-80 фотоаппаратда расмга туширилди ҳамда микрорий ўлчов ишлари CAS MWP-1200 электрон тарозиди амалга оширилди.

Толанинг сифат кўрсаткичлари OzDSt 604-2001 стандартига асосан Республика «Сифат» маркази томонидан замонавий NVI дастгоҳда аниқланди. Барча йилларда олинган юқори авлод дуратайларида кимматли хўжалик белгиларининг ўзгарувчанлиги андоза навлар билан ўзаро таққослаб ўрганилди ва олинган амалий тадқиқот натижаларининг соғли кўрсаткичлари Б.А. Доспехов [1979] усулида статистик ишловдан ўтказилди.

Перу ўза турларининг ёввойи, ярим ёввойи, маданий тропик ҳамда субтропик шаклларида манба сифатида фойдаланилди. *G. barbadense* L. турини генетик хилма-хилликларини ўзаро ва *G. darwinii* Watt турини дуратайлаш асосида олинган турини ва турлараро F_1 - F_2 ўсимликларининг морфобиологик (кун узулигига талабчанлик, шохланиш типини, антоциан рангли ўсимликлар ирсийланиши) белгиларининг ирсийланиши ўрганилди. Бундан ташқари ажратиб олинган оилаларнинг корреляцион боғлиқлиги аниқланди.

Ш БОБ. ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ. ПЕРУ ЎЗА ТУРЛАРИНИНГ ТУРИЧИ ВА ТУРЛАРАРО F_1 - F_2 ЎСИМЛИКЛАРИДА МОРФОБИОЛОГИК ВА КИММАТЛИ-ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ ҲАМДА ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ

3.1-§. Перу ўза турларини турини ва турлараро чагишиши, дуратай кўсак туғилиши ва кўсакларда тўлиқ уруғлар фози

Мальгумки, *Gossypium* L. туркумига мансуб турларни турини ва турлараро дуратайлаш, ўзанинг истикболли тизма ва навларини яратиш борасида, фойдали белгилли донорлар сифатида амалий селекцияда фойдаланиш имкониятини белгилловчи асосий омиллардан биридир. Ўза ёввойи турларининг селекция жараёнида фойдаланиш ва ўзанинг дунёвий коллекциясидаги полиморф турларнинг хилма-хиллигини ўрганишда дуратайлаш услубининг аҳамияти катта бўлиб, амалий селекция учун фойдали белгилли донорлар олиш имконини беради. Селекция жараёнида тезлаштириш, ёввойи ҳолда ўсувчи тур хилма-хилликларининг фойдали белгилларини маданий турлар геномига интрогрессиялаш жараёнининг истикболлини белгилловчи асосий муаммоларини ечишдир.

Дуратайлаш жараёнида кўсак ва кўсакдаги уруғларнинг туғилиш натижаларининг юқори ва паст бўлиши чагиштиришда фойдаланилаётган тур ва шаклларидаги филогенетик жиҳатдан узок-яқинлигига боғлиқдир. Шу билан бирга дуратайлаш натижалари ўза турларининг биологик белгиларидан бири туғлаш биологизиси билан ҳамбарчас боғлиқдир.

Турини ва турлараро дуратайлаш услуби, ўза генофондини фойдали белгилар билан бойитишнинг асосий манбаларидан бири бўлиб ҳисобланади. *G. barbadense* L. турини биохилма-хилликларининг ярим ёввойи, маданий тропик кенжа турлари ва шаклларида, маданий субтропик навларининг ўзаро ҳамда *G. darwinii* Watt тури билан яхши чагишиши,

дўрагай кўсақлар тутилиши эса 33,3-100,0 %, дўрагай кўсақларда тўлик уруғлар тутилиши 33,3-95,2 % ни ташкил этганлиги аниқланди (3.1-жадвал).

Ўрғанилган турлар, кенжа турлар ва шакллари чагиштириш натижасида олинган дўрагай комбинациялари 9 та гуруҳга бўлиб тахлил қилинди.

Турлараро ёввойи *G.darwinii* Watt тури билан *G.barbadense* L. турига мансуб рудерал кенжа тур шакллари чагиштирилганда дўрагай кўсақлар тутилиши 33,3-91,6 % ни, улардаги тўлик уруғлар тутилиши 65,3-94,0 % ни ташкил этди. Ўрғанилган дўрагай кўсақлар ва улардаги тўлик уруғлар тутилишининг юқори кўрсаткичлари ёввойи *G.darwinii* Watt x *f. ishan nigeria* (новотранг толали) реципрок комбинацияларида кузатилиди (мос равишда 85,7-91,6 %; 80,9-90,4 %). Аксинча, дўрагай кўсақлар тутилишининг паст кўрсаткичлари (33,3 %) *G.darwinii* Watt x *f. ishan nigeria* (оқ толали) реципрок комбинацияларида кузатилиди. Дўрагай кўсақларда тўлик уруғлар тутилиш фойзи юқори (90,3-94,0 %) бўлиди. Ёўзани ёввойи *G.darwinii* Watt турини ярим ёввойи кенжа турига мансуб *f. pisco* шакли билан ўзаро реципрок чагиштирилганда, дўрагай кўсақлар тутилиш фойзи (35,2-66,6 %) ва улардаги тўлик уруғлар тутилиш фойзи (65,3-73,0 %) нисбатан паст эканлиги аниқланди.

Ёввойи *G.darwinii* Watt тури билан *G.barbadense* L. туричи хилма-хилликларидан маданий пропик шакллари чагиштирилганда дўрагай кўсақлар тутилиши 40,0-75,0 % ни, улардаги тўлик уруғлар тутилиши 51,6-87,7 % ни ташкил этиши кузатилиди. *G.darwinii* Watt x *subsp. vitifolium* кенжа турининг реципрок комбинацияларида дўрагай кўсақ тутилиши ўртача 63,6-75,0 % ни, кўсақда тўлик уруғлар тутилиши бўйича энг юқори кўрсаткич *G.darwinii* Watt x *f. brasiliense* (қизил пояли) комбинациясида 87,7 % ни ташкил этган бўлса ва *f. brasiliense* x *G.darwinii* Watt ўзаро чагиштирилганда дўрагай кўсақлар тутилиши паст 50,0 % ни, кўсақдаги тўлик уруғлар тутилиши ҳам 44,5 % ни ташкил этди.

3.1-жадвал

Дўрагай кўсақларнинг ва кўсақлардаги тўлик уруғлар тутилишининг фойзи

№	Туричи дурагай комбинациялари	Чатиштирилган сон, дон	Тугилган кўсақлар, сон и, дон	Кўсақ тутилиш фойзи, %	Уруғлар сон, дон		Тўлиқ уруғлар тутилиши фойзи, %			
					Тўқ	Пуч	$\bar{x} \pm S\bar{x}$	limit	S	V %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Турлараро дурагайлаш (<i>G.barbadense</i> L. x <i>G.darwinii</i> Watt)										
<i>G.darwinii</i> Watt x <i>ruderalis</i> (ярим ёввойи)										
1	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.parnat</i>	15	5	33,3	72	5	93,5 ± 0,46	90-96	1,4	1,5
2	<i>f.parnat</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	15	9	60,0	110	21	83,9 ± 0,32	82-85	1,0	1,2
3	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.pisco</i>	17	6	35,2	66	35	65,3 ± 0,52	62-68	1,6	2,5
4	<i>f.pisco</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	9	6	66,6	38	17	73,0 ± 0,47	71-75	1,4	2,0
5	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	12	4	33,3	56	6	90,3 ± 0,54	88-94	1,7	1,8
6	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	12	4	33,3	63	4	94,0 ± 0,47	92-96	1,4	1,5
7	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	12	11	91,6	166	39	80,9 ± 0,75	77-84	2,3	2,9
8	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	14	12	85,7	171	18	90,4 ± 0,54	88-94	1,7	1,8
<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>vitifolium</i> (маданий тропик)										
9	<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>vitifolium</i>	12	9	75,0	42	13	72,1 ± 0,19	60-81	7,3	10,1
10	subsp. <i>vitifolium</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	11	7	63,6	35	15	68,6 ± 0,10	61-73	6,5	9,5
11	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	7	70,0	115	16	87,7 ± 0,49	84-89	1,5	1,7
12	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	8	5	62,5	66	24	73,3 ± 0,40	72-75	1,2	1,7
13	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.brasiliense</i>	10	4	40,0	32	30	51,6 ± 0,68	48-54	2,1	4,1
14	<i>f.brasiliense</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	5	50,0	29	33	44,5 ± 0,19	40-50	4,2	9,5
<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>eubarbadense</i> (маданий навлар)										
15	<i>G.darwinii</i> Watt x Қарши-8	23	17	73,9	272	35	88,5±0,76	84-92	2,4	2,7
16	Қарши-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	19	16	83,3	63	21	75,0±0,70	73-78	2,2	2,9

17	<i>G.darwinii</i> Watt x Аш-8	11	8	72,7	82	30	73,2 ±0,36	72-75	1,1	1,5
18	Аш-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	26	21	80,7	316	74	81,0 ±0,79	77-84	2,4	3,0
Тур ичида дурагайлаш (<i>G.barbadense</i> L. x <i>G.barbadense</i> L.)										
<i>ruderalis</i> (ярим ёввойи) x <i>ruderalis</i> (ярим ёввойи)										
19	<i>f.parnat</i> x <i>f.pisco</i>	10	7	70,0	90	14	86,5 ±0,47	84-89	1,5	1,7
20	<i>f.pisco</i> x <i>f.parnat</i>	18	12	66,6	41	8	83,6 ±0,27	82-85	0,8	1,0
21	<i>f.parnat</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	12	5	41,6	52	17	75,3 ±0,65	73-78	2,0	2,7
22	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.parnat</i>	9	6	66,6	84	14	85,7 ±0,53	84-89	1,6	1,9
23	<i>f.parnat</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	18	15	83,3	69	15	82,1 ±0,55	79-84	1,7	2,1
24	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.parnat</i>	10	9	90,0	127	29	81,4 ±0,62	78-84	1,9	2,4
25	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	13	13	100,0	120	7	94,4 ±0,50	92-97	1,5	1,6
26	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	6	60,0	48	3	94,1 ±0,50	92-96	1,6	1,7
27	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.pisco</i>	12	11	91,6	112	40	73,6 ±0,37	72-75	1,1	1,5
28	<i>f.pisco</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	12	4	33,3	45	4	33,3 ±0,56	30-36	1,7	5,3
29	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.pisco</i>	12	8	66,6	122	22	84,7 ±0,26	83-86	0,8	0,9
30	<i>f.pisco</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	20	12	60,0	40	11	78,4 ±0,48	76-80	1,5	1,9
<i>ruderalis</i> (ярим ёввойи) x subsp.vitifolium (маданий тропик)										
31	<i>f.pisco</i> x subsp.vitifolium	14	7	50,0	50	9	62,5 ±0,19	56-72	6,4	10,3
32	subsp.vitifolium x <i>f.pisco</i>	10	6	60,0	40	8	44,2 ±0,11	40-51	4,9	8,1
33	subsp.vitifolium x <i>f.parnat</i>	10	7	70,0	61	6	69,3 ±0,08	65-74	3,5	5,1
34	<i>f.parnat</i> x subsp.vitifolium	12	6	50,0	43	5	57,1 ±0,07	53-60	3,3	5,8
35	subsp.vitifolium x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	5	50,0	37	7	58,1 ±0,13	48-65	5,9	10,1
36	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x subsp.vitifolium	10	6	60,0	46	10	60,8 ±0,15	53-72	6,9	11,3
37	subsp.vitifolium x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	9	90,0	67	23	69,3 ±0,12	64-79	5,3	7,7
38	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x subsp.vitifolium	10	8	80,0	72	27	64,5 ±0,13	60-73	5,6	8,7
39	<i>f.parnat</i> x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	14	9	64,2	114	14	89,0 ±0,54	86-91	1,7	1,9
40	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f.parnat</i>	20	14	70,0	189	40	82,5 ±0,56	79-84	1,7	2,1
41	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	9	5	55,5	74	16	82,2 ±0,65	79-84	1,6	2,0

42	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	13	10	76,9	139	43	76,3 ±0,53	74-84	2,0	2,7
43	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	20	15	75,0	63	13	82,8 ±0,59	80-86	1,8	2,2
44	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	11	8	72,7	115	24	82,7 ±0,58	80-86	1,8	2,2
45	<i>f.pisco</i> x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	8	80,0	23	18	56,0 ±0,68	53-59	2,1	3,8
46	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f.pisco</i>	16	5	31,2	66	15	81,4 ±0,62	78-84	1,9	2,4
47	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.parnat</i>	10	6	60,0	41	15	62,3 ±0,28	54-72	6,8	10,9
48	<i>f.parnat</i> x <i>f.brasiliense</i>	10	8	80,0	21	18	53,8 ±0,64	50-56	2,0	3,7
49	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.pisco</i>	10	5	50,0	54	26	61,1 ±0,23	57-69	5,0	8,2
50	<i>f.pisco</i> x <i>f.brasiliense</i>	15	6	40,0	49	35	58,3 ±0,70	55-62	2,2	3,8
51	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	4	40,0	71	19	57,4 ±0,72	51-63	4,3	7,5
52	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.brasiliense</i>	10	5	50,0	59	25	62,5 ±0,78	56-69	5,4	9,4
53	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	5	50,0	64	23	43,7 ±0,67	38-47	3,8	8,7
54	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.brasiliense</i>	12	5	41,6	24	28	46,1 ±0,59	44-49	1,8	4,0
<i>ruderalis</i> (ярим ёввойи) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)										
55	<i>f.pisco</i> x Қарши-8	9	6	66,6	81	4	95,2 ±0,57	92-98	1,8	1,9
56	Қарши-8 x <i>f.pisco</i>	15	12	80,0	192	33	85,3 ±0,62	83-89	1,9	2,2
57	<i>f.pisco</i> x Аш-8	24	15	62,5	42	31	57,5 ±0,48	55-60	1,5	2,6
58	Аш-8 x <i>f.pisco</i>	25	15	60,0	264	40	86,8 ±0,49	84-89	1,5	1,7
59	<i>f.parnat</i> x Қарши-8	12	12	100,0	105	16	86,7 ±0,49	84-89	1,5	1,7
60	Қарши-8 x <i>f.parnat</i>	14	9	64,2	151	15	90,9 ±0,61	88-94	1,9	2,1
61	<i>f.parnat</i> x Аш-8	11	8	72,7	112	9	92,5 ±0,56	90-95	1,7	1,9
62	Аш-8 x <i>f.parnat</i>	28	25	89,2	384	66	85,3 ±0,54	83-89	1,7	2,0
63	Қарши-8 x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	14	7	50,0	52	36	59,0 ±0,68	57-63	2,1	3,6
64	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x Қарши-8	20	16	80,0	38	6	86,3 ±0,50	84-89	1,5	1,8
65	Аш-8 x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ толали)	16	16	100,0	153	30	83,6 ±0,27	82-85	0,8	1,0
66	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x Аш-8	25	16	60,0	36	11	76,5 ±0,60	74-80	1,9	2,4
67	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x Аш-8	12	7	58,3	54	49	52,4 ±0,50	50-55	1,5	3,0
68	Аш-8 x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	17	15	88,2	217	52	80,6 ±0,50	79-84	1,5	1,9

69	Қарши-8 x <i>f. ishan nigeria</i> (н. т-ли)	25	17	68,0	228	44	83,8 ± 0,30	82-85	0,9	1,1
70	<i>f. ishan nigeria</i> (н. т-ли) x Қарши-8	14	14	100,0	86	8	91,4 ± 0,73	88-94	2,3	2,5
subsp. <i>vitifolium</i> (маданий тропик) x subsp. <i>vitifolium</i> (маданий тропик)										
71	<i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f. brasiliense</i>	10	5	50,0	51	16	76,1 ± 0,64	73-80	2,0	2,6
72	<i>f. brasiliense</i> x <i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	6	60,0	41	13	71,3 ± 0,16	64-82	6,7	9,4
73	subsp. <i>vitifolium</i> x <i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	7	70,0	38	17	63,8 ± 0,16	57-62	5,6	8,8
74	<i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли) x subsp. <i>vitifolium</i>	10	6	60,0	49	12	58,6 ± 0,18	53-69	6,2	9,6
75	subsp. <i>vitifolium</i> x <i>f. brasiliense</i>	10	6	60,0	58	23	53,8 ± 0,15	47-60	4,8	9,0
76	<i>f. brasiliense</i> x subsp. <i>vitifolium</i>	10	5	50,0	42	19	50,1 ± 0,17	43-58	5,9	11,8
subsp. <i>vitifolium</i> (маданий тропик) x subsp. <i>eubarbadense</i> (маданий навлар)										
77	subsp. <i>vitifolium</i> x Қарши-8	10	7	70,0	36	14	75,1 ± 0,26	70-83	5,5	7,4
78	Қарши-8 x subsp. <i>vitifolium</i>	15	11	73,3	42	12	77,8 ± 0,23	69-86	7,6	9,7
79	subsp. <i>vitifolium</i> x Аш-8	10	6	60,0	71	23	69,5 ± 0,24	62-74	4,3	6,2
80	Аш-8 x subsp. <i>vitifolium</i>	23	14	60,8	172	48	62,6 ± 0,28	57-70	5,2	8,3
81	<i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли) x Қарши-8	15	9	60,0	138	8	94,5 ± 0,45	92-96	1,4	1,5
82	Қарши-8 x <i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли)	18	15	83,3	179	20	70,9 ± 0,80	68-75	2,5	3,5
83	<i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли) x Аш-8	16	10	62,5	116	47	71,7 ± 0,82	68-75	2,6	3,6
84	Аш-8 x <i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли)	22	18	81,8	296	73	80,2 ± 0,53	78-84	1,6	2,1
85	Қарши-8 x <i>f. brasiliense</i>	20	12	60,0	209	28	88,1 ± 0,46	86-90	1,4	1,6
86	<i>f. brasiliense</i> x Қарши-8	15	8	53,3	76	18	81,1 ± 0,15	74-90	6,8	8,5
87	Аш-8 x <i>f. brasiliense</i>	25	19	76,0	260	49	84,1 ± 0,46	82-86	1,4	1,7
88	<i>f. brasiliense</i> x Аш-8	16	7	73,7	83	12	76,8 ± 0,11	70-85	4,8	6,3
subsp. <i>eubarbadense</i> (маданий навлар) x subsp. <i>eubarbadense</i> (маданий навлар)										
89	Аш-8 x Қарши-8	10	9	90,0	56	19	84,8 ± 0,30	83-87	0,7	1,4
90	Қарши-8 x Аш-8	10	8	80,0	35	7	92,4 ± 0,50	89-95	2,1	2,1

G. darwinii Watt тури билан маданий навлар (Қарши-8, Аш-8) чагиштирилганда, дуратай кўсақлар туғилиши (72,7-83,3 %) ва дуратай кўсақларда тўлиқ уруғлар туғилиш фойзи (73,2-88,5 %) ўртача кўрсаткичларга эга эканлиги кузатилади.

Турлараро дуратайлаш натижаларининг таҳлили шуни кўрсатдики, кўпчилик реципрок чагиштириш комбинацияларида ёввойи *G. darwinii* Watt тури оналик ўсимлиги сифатида ишлатилганда, кўсақ туғилиш кўрсаткичлари паст (33,3-40,0 %), кўсақдаги тўлиқ уруғлар туғилиш фойзи эса юқорилиги (65,3-93,5 %) аниқланди. Ярим ёввойи *f. ishan nigra* (новотранг толали), маданий Қарши-8 нави билан реципрок чагиштириш комбинациялари бундан истисно, яъни кўсақ ва кўсақдаги тўлиқ уруғларнинг туғилиш фойзининг юқорилиги кузатилади ва аксинча *G. darwinii* Watt x *f. brasiliense* комбинациясида кузатишган кўрсаткичлар эса анча паст 40,0-51,6 % эканлиги аниқланди.

G. barbadense L. туричи хилма-хилликларининг рудерал, маданий тропик ва маданий навларининг ва ёввойи *G. darwinii* Watt турининг ўзаро реципрок чагиштириш комбинациялари бўйича олинган натижалар асосида, маданий тропик *f. brasiliense* (қизил поля) шакли оналик ўсимлиги сифатида ишлатилганда дуратай кўсақ туғилиш кўрсаткичлари анча паст (31,2-60,0 %) ҳамда *f. ishan nigra* (новотранг толали) оналик ўсимлиги сифатида ишлатилганда кўсақдаги тўлиқ уруғлар туғилиш фойзи паст бўлиши (52,4 %) кузатилади.

Ўрганилган *G. barbadense* L. турининг туричи хилма-хилликларидан ярим ёввойи кенжа турига мансуб (рудерал) шаклларининг ўзаро чагиштириш, дуратай кўсақ ва кўсақдаги тўлиқ уруғлар туғилиш фойзи 33,3-100,0 %, 33,3-94,4 % га тенг бўлди. Ярим ёввойи *f. ishan nigra* (новотранг толали) x *f. ishan nigra* (оқ толали) реципрок комбинацияларида дуратай кўсақлар туғилиши юқори 60,0-100,0 % ни, кўсақдаги тўлиқ уруғлар туғилиши ҳам юқори 94,1-94,4 % ни ташкил этди. Ярим ёввойи *f. risco* x *f. ishan nigra* (оқ толали) шакллари ўзаро чагиштирилганда туғилган дуратай кўсақлар ва

кўсақдаги тўлиқ уруғлар туғилиш фони энг паст (33,3 %) кўрсаткичини ташкил этди.

G. barbadosense L. турининг ярим ёввойи ва маданий тропик кенжа турларининг шакллари ўзаро чагиштирилганда дуратай кўсақлар туғилиши 31,2-80,0 % ни, кўсақдаги тўлиқ уруғлар туғилиши 46,1-89,0 % кузатилади. Туричи *f. rrisco* x *f. brasiliense* (кизил пояли) комбинациясида кўсақ туғилиш фоиизи (80,0 %) нисбатан юкорорук эканлиги, *f. raiiai* x *f. brasiliense* (кизил пояли) комбинациясида кўсақда тўлиқ уруғлар туғилиши юкорилиги (89,0 %) кузатилади. Улар ичнда *f. brasiliense* (кизил пояли) x *f. rrisco* комбинациясида кўсақ туғилишининг кўрсаткичи (31,2 %), кўсақда тўлиқ уруғ туғилишининг энг паст фоиизи (46,1 %) *f. ishian nigetia* (новотранг толали) x *f. brasiliense* комбинациясида аникланди.

Ўрганилган ярим ёввойи ва маданий навларини ўзаро чагиштириш натижалари шуни кўрсатдики, дуратай кўсақ туғилишининг энг юкори кўрсаткичлари Аш-8 x *f. ishian nigetia* (ок толали), *f. raiiai* x Карши-8 комбинацияларида кузатилади (100,0 %), энг паст кўрсаткич Карши-8 x *f. ishian nigetia* (ок толали) комбинациясида-50 %, *f. ishian nigetia* (новотранг толали) x Аш-8 комбинациясида кўсақда тўлиқ уруғлар туғилиши паст-52,4 % ни ташкил этди.

G. barbadosense L. турининг маданий тропик кенжа тури ва шакллариини явни, subsp. *viiifolium* x *f. brasiliense* (кизил пояли) комбинациясида дуратай кўсақ туғилишининг юкори кўрсаткичи 70,0 % бўлган бўлса, *f. brasiliense* (кизил пояли) x *f. brasiliense* ва *f. brasiliense* x subsp. *viiifolium* комбинацияларини ўзаро чагиштирилганда кўсақ туғилиши бироз паст-50,0 % ни, кўсақдаги тўлиқ уруғлар туғилиши ҳам нисбатан паст-76,1 % кузатилади.

Маданий тропик кенжа тури, шакллари ва маданий навларини ўзаро чагиштириш натижаларига кўра, дуратай кўсақ ва кўсақдаги тўлиқ уруғлар туғилиш фоиизини (60,0-83,3 %, 70,9-94,5 %) кўрсатди. Маданий нав Карши-8 x *f. brasiliense* (кизил пояли) комбинациясида кўсақ туғилиши юкори

кўрсаткич 83,3 % ни, *f. brasiliense* (кизил пояли) x Карши-8 комбинациясида кўсақдаги тўлиқ уруғлар туғилиши бўйича юкори кўрсаткич 94,5 % ни ташкил этди.

Туричи ва турлараро дуратайлаш натижалари, ўрганилган *G. barbadosense* L. туричи хилма-хилликларининг ўзаро ва *G. dalvii* Watt билан ўзаро яхши чагишшини кўрсатди. Шу билан бирга, *G. dalvii* Watt тури оналик ўсимлиги сифатида ишлатилганда кўсақ туғилиши кўрсаткичларининг анча паст (33,3-40,0 %), кўсақдаги уруғлар туғилиши фоиизининг эса юкорилиги (65,5-94,0 %) аникланди.

3.2-§. Бошлангич шакллар ва F-ўсимликларида кўсақлар сони ва кўсақда тўлиқ уруғлар туғилиши

Ўза ўсимлигининг хосилдорлиги очилган кўсақлар ва битта очилган кўсақдаги туғилган тўлиқ уруғлар сони ва толанинг оғирлиги билан аникланди Н.Г. Симонгулян [1991], О.Ж. Жалилов ва бош. [2006], Ф.У. Рафиева [2012].

А. Сейитмусаев, А.И. Тишин [1996] олиб борган тадқиқотларида, ўзанинг хосилдорлигини ташкил этувчи асосий компонентлар (бир туддаги кўсақлар сони ва битта кўсақдаги пахта кўсақ ваэни) бўйича турлараро F-ўсимликларда кўпгина холларда ирсийланиш орадик ёки гетерозис холда бўлиши кайд этилган.

О.Ж. Жалилов [2006] кайд этилишча, ўзанинг районлаштирилган ўрта толали Киргиз-3, Наманган-77, С-6524, С-9070, навларида кимматли хўжалик белгиларига модификацион ўзгарувчанликнинг таъсири ўрганилган. 1998-2001 йиллардаги изланишларининг натижасидан келиб чикиб, битта кўсақдаги пахта ваэни белгисини ўртача ўзгарувчанлик коэффициенти 10,1-17,4 %, тола чикими белгиси бўйича 3,9-6,6 %, тола узунлиги белгиси бўйича бу кўрсаткич 2,2-5,9 % гача ўзгариб туришини аниклалган.

Я.А. Бобоев, Р.Г. Ким, А.Б. Амантурдиев [2009] маълумотларига кўра, кўсақ йириклиги, тола чикими ва тола узунлиги белгилари орасидagi ўзаро

боғлиқлик жуда кичик кўрсаткичда намоён бўлади. Ёўза махсуддорлиги, битта тулпада кўсақлар сони ва йириклиги бошқа кимматли хўжалик белгиларига боғлиқ бўлмаган ҳолда ирсийланади.

Юқорида келтирилган фикр ва мулоҳазаларни инобатга олган ҳолда тажрибамизда ҳосилдорликнинг асосий белгиларидан бири бўлган бир тул ўсимлиқдаги кўсақлар сони ва очилган бир дона кўсақдаги тўлиқ тутилган уруғлар фоизи тахлил қилинди.

Бир тул ўсимлиқдаги кўсақлар сонини аниқлаш бўйича олиб борилган кузатишлар натижаси, *G. barbadense* L. генетик хилма-хилликлари ҳамда ёввойи *G. darwinii* Watt тулпада кўсақлар сони 14-57 тани ташкил этиши, энг юқори кўрсаткич маданий Қарши-8 навида (57 дона), энг паст маданий тропик шаклларида яъни *f. brasiliense* (хизил пояли) (14 дона), *f. brasiliense* да 17 дона, subsp. *vitifolium* кенжа тулпада 18 дона кўсақ тутилишини кўрсатди. Рудерал шаклларида нисбатан юқорида натижалар кузатилиди. Бир тулпада тулланган кўсақлар сони 20-23 тани ташкил этди (3.2-жадвал).

Битта кўсақда тутилган тўлиқ уруғлар фоизининг тахлили натижалари *G. barbadense* L. кенжа тулларининг ярим ёввойи шаклларида асосан 74,5-80,1 %, лекин бошқалардан мустасно ярим ёввойи *f. pisco* шаклида 92,6 % ни ташкил этган бўлса, ёввойи *G. darwinii* тулпада бу кўрсаткич 78,1 % бўлди.

G. barbadense L.нинг маданий тропик ва маданий навларида бу белги бўйича нисбатан юқори натижалар кузатилиди (87,6-91,3 %). Кенжа тур ва ва шаклларида ўрғанилган белги бўйича вариация коэффициенти 7,4-18,8 % ни ташкил этди.

Турини *G. barbadense* L. турининг ярим ёввойи (рудерал) кенжа тур шакллари ўзаро дурагайлаш натижасида олинган F₁-ўсимлиқларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари тулғича бўлиб, асосан барча F₁-ўсимлиқларида бир тулпада 12-18 тадан кўсақлар тутилганлиги аниқланди.

3.2-жадвал

Бошлангич шакллар ва F₁-ўсимлиқларида кўсақлар сони ва кўсақда тўлиқ уруғлар тутилиш фоизи

№	Бошлангич манбалар ва F ₁ -ўсимликлари	Ўсимликлар сони, дона	Бир туپ ўсимликдаги кўсаклар сони, дона	Тахлил қилинган кўсаклар сони, дона	Жами уруғлар сони бир дона кўсак учун, дона	Тўлиқ уруғлар сони бир дона кўсак учун, дона	Пуч уруғлар сони бир дона кўсак учун, дона	Кўсакда тўлиқ уруғларнинг тутилиш фоизи, %			
								$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	Limit	S	V %
Бошлангич манбалар											
1	<i>G.darwinii</i> Watt	5	20	10	16,8	13,0	3,8	78,1 ± 4,5	56,0-100,0	14,4	18,5
2	subsp. <i>ruderae</i> f. <i>pisco</i>	5	15	10	17,5	16,3	1,2	92,6 ± 2,1	78,0-100,0	6,9	7,4
3	subsp. <i>ruderae</i> f. <i>pamat</i>	5	22	10	18,2	14,4	3,8	79,4 ± 3,7	50,0-90,0	11,8	14,8
4	subsp. <i>ruderae</i> f. <i>ishan nigeria</i> (ок т-ли)	5	23	10	17,0	12,5	4,5	74,5 ± 4,4	50,0-100,0	14,4	18,8
5	subsp. <i>ruderae</i> f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	5	20	10	20,1	16,0	4,1	80,1 ± 3,1	65,0-90,0	9,9	12,4
6	subsp. <i>vitifolium</i>	5	18	10	18,3	14,6	3,9	81,2 ± 2,0	76,0-100,0	7,6	8,4
7	subsp. <i>vitifolium</i> f. <i>brasiliense</i> (к. п-ли)	5	14	10	17,5	15,2	2,3	87,6 ± 3,1	70,0-100,0	9,9	11,3
8	subsp. <i>vitifolium</i> f. <i>brasiliense</i>	5	17	10	18,5	16,5	2,0	89,0 ± 2,5	75,0-100,0	7,9	8,8
9	subsp. <i>eubarbadense</i> (Аш-8 нави)	5	27	10	17,3	15,4	1,9	88,9 ± 2,7	75,0-100,0	8,1	9,7
10	subsp. <i>eubarbadense</i> (Қарши-8 нави)	5	57	10	21,5	19,4	2,1	91,3 ± 2,5	74,0-100,0	8,6	8,9
F ₁ -ўсимликлари											
1. Турлараро дурагайлаш (<i>G.barbadense</i> L. x <i>G.darwinii</i> Watt)											
<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>ruderae</i> (ярим ёввойи)											
1	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>pamat</i>	10	14	10	17,6	15,1	2,5	85,9 ± 1,9	78,0-100,0	6,1	7,1
2	f. <i>pamat</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	10	10	16,8	14,6	2,2	89,0 ± 4,1	61,0-100,0	16,1	14,8
3	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>pisco</i>	10	14	10	21,9	18,0	3,9	82,5 ± 2,5	69,0-95,0	8,1	9,8
4	f. <i>pisco</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	16	10	18,8	16,3	2,5	86,8 ± 2,0	76,0-100,0	6,3	7,3

5	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	12	10	17,5	14,3	3,2	82,9 ± 4,8	55,0-100,0	15,2	18,3
6	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	12	10	19,4	14,3	5,1	74,6 ± 4,4	55,0-95,0	13,9	18,6
7	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	15	10	17,0	12,4	4,6	73,0 ± 4,5	50,0-89,0	14,4	19,7
8	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	14	10	18,8	16,3	2,4	86,7 ± 3,5	71,0-100,0	11,1	12,8
<i>G.darwinii</i> Watt x subsp.vitifolium (маданий тропик)											
9	<i>G.darwinii</i> Watt x subsp.vitifolium	10	15	10	17,0	14,1	3,1	81,9 ± 3,1	65,0-95,0	9,4	11,2
10	subsp.vitifolium x <i>G.darwinii</i> Watt	10	13	10	16,3	14,8	2,6	78,2 ± 3,8	60,0-90,0	10,4	13,8
11	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	10	10	17,9	15,9	2,0	90,2 ± 4,4	60,0-100,0	13,9	15,4
12	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	12	10	17,6	14,3	3,3	81,2 ± 3,7	56,0-94,0	11,9	14,7
13	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.brasiliense</i>	10	14	10	19,5	15,5	3,2	79,4 ± 4,2	50,0-94,0	13,4	16,9
14	<i>f.brasiliense</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	15	10	17,3	15,2	2,2	83,4 ± 2,9	60,0-90,0	8,7	10,8
<i>G.darwinii</i> Watt x ssp.eubarbadense (маданий навлар)											
15	<i>G.darwinii</i> Watt x Қарши-8	10	16	10	19,4	16,4	3,0	84,9 ± 4,4	55,0-100,0	10,1	16,6
16	Қарши-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	10	17	10	20,1	18,2	1,9	90,2 ± 3,2	68,0-100,0	14,1	11,2
17	<i>G.darwinii</i> Watt x Ам-8	10	12	10	16,2	10,7	5,5	65,8 ± 3,4	50,0-82,0	10,8	16,4
18	Ам-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	10	18	10	21,1	18,0	3,1	85,8 ± 2,6	72,0-100,0	8,4	9,7
Тур ичида дурагайлаш (<i>G.barbadense</i> L. x <i>G.barbadense</i> L.)											
subsp. <i>ruderales</i> (ярим ёввойи) x subsp. <i>ruderales</i> (ярим ёввойи)											
19	<i>f.pamat</i> x <i>f.pisco</i>	10	14	10	16,1	14,3	1,8	88,6 ± 2,7	77,0-100,0	8,6	9,7
20	<i>f.pisco</i> x <i>f.pamat</i>	10	18	10	18,5	16,2	2,3	88,3 ± 2,7	74,0-100,0	8,7	9,9
21	<i>f.pamat</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	9	10	19,4	15,9	3,5	82,7 ± 3,4	60,0-100,0	10,8	13,1
22	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.pamat</i>	10	16	10	19,2	17,4	1,8	90,5 ± 1,3	81,0-95,0	4,2	4,6
23	<i>f.pamat</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	8	10	15,6	11,2	4,4	71,3 ± 4,8	50,0-100,0	15,4	21,6
24	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.pamat</i>	10	14	10	18,5	16,3	2,2	88,4 ± 1,7	81,0-100,0	5,6	6,3
25	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	8	10	20,2	15,3	4,9	75,7 ± 3,7	60,0-95,0	11,8	15,6
26	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	13	10	19,2	17,3	1,9	89,7 ± 2,1	74,0-100,0	6,7	7,5
27	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.pisco</i>	10	14	10	16,9	12,3	5,0	73,7 ± 3,8	57,0-90,0	12,2	16,5
28	<i>f.pisco</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	12	10	19,7	16,4	3,3	83,1 ± 2,8	65,0-94,0	8,8	10,7

29	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.pisco</i>	10	12	10	20,1	16,5	3,6	81,9 ± 0,6	50,0-88,0	1,9	2,3
30	<i>f.pisco</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	14	10	18,4	14,5	3,9	78,2 ± 1,2	50,0-88,0	3,9	5,0
subsp. <i>ruderales</i> (ярим ёввойи) x subsp.vitifolium (маданий тропик)											
31	<i>f.pisco</i> x subsp.vitifolium	10	12	10	13,7	10,2	2,8	80,2 ± 2,7	70,0-90,0	5,3	6,5
32	subsp.vitifolium x <i>f.pisco</i>	10	14	10	18,3	15,6	3,6	79,2 ± 3,4	65,0-95,0	9,1	10,9
33	subsp.vitifolium x <i>f.pamat</i>	10	11	10	16,5	12,4	3,1	82,3 ± 3,4	60,0-95,0	10,3	11,4
34	<i>f.pamat</i> x subsp.vitifolium	10	15	10	18,1	16,2	2,7	78,6 ± 2,6	70,0-90,0	5,9	7,1
35	subsp.vitifolium x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	13	10	19,2	16,4	2,8	85,1 ± 2,1	75,0-90,0	5,4	6,7
36	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x subsp.vitifolium	10	16	10	20,8	17,1	3,1	84,2 ± 2,2	70,0-100,0	7,4	9,6
37	subsp.vitifolium x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	14	10	18,1	14,3	3,9	79,2 ± 3,2	75,0-95,0	6,8	9,1
38	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x subsp.vitifolium	10	12	10	16,2	13,1	2,8	81,5 ± 2,4	65,0-95,0	9,8	11,2
39	<i>f.pamat</i> x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	13	10	14,8	13,1	1,7	88,5 ± 4,1	62,0-100,0	13,0	14,7
40	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f.pamat</i>	10	9	10	15,6	12,0	3,6	76,8 ± 3,6	55,0-89,0	11,6	15,1
41	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	15	10	21,9	19,9	2,0	90,7 ± 2,1	77,0-100,0	6,7	7,4
42	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	10	10	18,6	14,5	4,1	78,7 ± 4,4	67,0-100,0	13,9	17,6
43	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	8	10	18,4	14,4	4,0	78,1 ± 4,3	55,0-95,0	13,6	17,4
44	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	13	10	19,6	16,7	2,9	85,4 ± 1,6	74,0-91,0	5,2	6,1
45	<i>f.pisco</i> x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	9	10	19,7	15,2	4,5	77,1 ± 3,2	56,0-88,0	10,3	13,4
46	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f.pisco</i>	10	10	10	20,1	16,7	3,4	83,7 ± 1,5	74,0-91,0	4,9	5,9
47	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.pamat</i>	10	16	10	19,3	15,6	2,5	84,6 ± 2,8	60,0-100,0	13,5	16,1
48	<i>f.pamat</i> x <i>f.brasiliense</i>	10	12	10	21,9	18,4	3,5	83,7 ± 4,9	50,0-100,0	15,1	18,5
49	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.pisco</i>	10	11	10	14,1	9,5	4,8	68,2 ± 3,8	50,0-80,0	11,2	17,2
50	<i>f.pisco</i> x <i>f.brasiliense</i>	10	8	10	13,0	8,7	4,3	66,1 ± 4,1	45,0-80,0	13,0	19,7
51	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	11	10	14,6	9,1	4,2	79,2 ± 2,6	65,0-90,0	7,2	9,8
52	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.brasiliense</i>	10	14	10	20,3	15,8	3,1	83,2 ± 2,9	70,0-95,0	6,5	8,4
53	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	13	10	15,5	12,4	3,2	80,3 ± 2,4	65,0-90,0	7,8	10,2
54	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.brasiliense</i>	10	14	10	16,9	13,2	3,7	78,6 ± 2,8	60,0-90,0	8,9	11,4

											давоми
55	<i>f.pisco</i> х Қарши-8	10	21	10	23,2	20,6	2,6	89,3 ± 2,2	80,0-100,0	7,0	7,8
56	Қарши-8 х <i>f.pisco</i>	10	14	10	21,0	17,8	3,2	85,0 ± 2,5	70,0-95,0	8,	9,5
57	<i>f.pisco</i> х Аш-8	10	10	10	17,9	16,3	1,6	91,1 ± 1,9	80,0-100,0	6,1	6,7
58	Аш-8 х <i>f.pisco</i>	10	12	10	18,4	16,9	1,5	91,8 ± 2,0	79,0-100,0	6,3	6,9
59	<i>f.parnat</i> х Қарши-8	10	11	10	15,9	13,0	2,9	81,2 ± 4,2	55,0-95,0	13,5	16,6
60	Қарши-8 х <i>f.parnat</i>	10	16	10	20,2	17,4	2,8	85,4 ± 2,4	71,0-95,0	7,8	9,1
61	<i>f.parnat</i> х Аш-8	10	16	10	18,7	16,2	2,5	86,1 ± 3,5	60,0-100,0	11,0	12,8
62	Аш-8 х <i>f.parnat</i>	10	11	10	15,8	12,2	3,6	77,4 ± 4,8	57,0-100,0	15,4	19,9
63	Қарши-8 х <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	18	10	21,2	18,6	2,6	87,9 ± 4,0	63,0-96,0	12,7	14,5
64	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) х Қарши-8	10	13	10	21,3	19,6	1,7	91,9 ± 1,4	86,0-100,0	4,4	4,8
65	Аш-8 х <i>f.ishan nigeria</i> (оқ толали)	10	16	10	19,4	16,2	3,2	83,8 ± 4,3	60,0-100,0	13,6	16,2
66	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) х Аш-8	10	8	10	21,4	18,6	2,5	86,8 ± 5,0	65,0-100,0	15,9	18,3
67	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) х Аш-8	10	12	10	13,1	11,9	1,2	93,9 ± 4,1	65,0-100,0	13,0	13,8
68	Аш-8 х <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	9	10	17,7	14,5	3,2	81,1 ± 4,3	56,0-100,0	13,7	16,9
69	Қарши-8 х <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	8	10	19,2	16,3	2,9	86,3 ± 4,9	55,0-100,0	15,6	18,1
70	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) х Қарши-8	10	14	10	22,3	20,7	1,6	92,7 ± 1,9	85,0-100,0	6,2	6,7
subsp. vitifolium (маданий тропик) х subsp. vitifolium (маданий тропик)											
71	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) х <i>f.brasiliense</i>	10	12	10	20,1	16,1	4,0	80,0 ± 3,2	65,0-94,0	10,2	12,8
72	<i>f. brasiliense</i> х <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	15	10	21,6	19,8	2,3	84,3 ± 2,9	70,0-95,0	8,2	11,2
73	subsp.vitifolium х <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	16	10	19,2	17,1	3,4	83,6 ± 3,4	65,0-95,0	10,8	13,2
74	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) х subsp.vitifolium	10	15	10	18,6	16,4	2,8	80,4 ± 3,1	75,0-95,0	7,1	8,9
75	subsp.vitifolium х <i>f.brasiliense</i>	10	12	10	16,3	13,2	3,2	81,5 ± 2,8	74,0-95,0	7,3	9,4
76	<i>f.brasiliense</i> х subsp.vitifolium	10	15	10	20,3	17,6	3,6	83,4 ± 3,5	65,0-95,0	10,3	12,9
subsp. vitifolium (маданий тропик) х subsp. eubarbadense (маданий навлар)											
77	subsp.vitifolium х Қарши-8	10	15	10	18,5	15,7	2,7	81,2 ± 3,1	65,0-95,0	9,6	10,9
78	Қарши-8 х subsp.vitifolium	10	17	10	20,7	18,4	3,4	95,3 ± 2,4	75,0-100,0	7,3	10,2
79	subsp.vitifolium х Аш-8	10	14	10	18,6	15,2	3,7	84,8 ± 3,4	65,0-95,0	12,6	14,2
80	Аш-8 х subsp.vitifolium	10	16	10	17,3	15,6	3,4	80,8 ± 3,5	74,0-90,0	7,6	11,2

											давоми
81	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) х Қарши-8	10	15	10	16,3	11,6	4,7	71,4 ± 4,7	50,0-91,0	14,9	20,8
82	Қарши-8 х <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	12	10	21,1	17,2	3,9	82,6 ± 2,0	75,0-95,0	7,8	8,5
83	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) х Аш-8	10	15	10	13,1	12,2	0,9	93,1 ± 3,5	65,0-100,0	11,2	12,0
84	Аш-8 х <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	13	10	17,6	14,1	3,5	79,4 ± 4,4	65,0-100,0	14,1	17,7
85	Қарши-8 х <i>f.brasiliense</i>	10	16	10	19,6	17,7	1,9	90,2 ± 2,6	76,0-100,0	8,3	9,2
86	<i>f.brasiliense</i> х Қарши-8	10	15	10	18,2	16,7	2,8	80,3 ± 3,2	75,0-94,0	7,3	9,1
87	Аш-8 х <i>f.brasiliense</i>	10	17	10	21,2	19,5	1,7	91,4 ± 1,4	84,0-100,0	4,4	4,8
88	<i>f.brasiliense</i> х Аш-8	10	16	10	17,1	15,3	3,5	80,6 ± 3,4	74,0-91,0	7,8	11,4
subsp. eubarbadense (маданий навлар) х subsp. eubarbadense (маданий навлар)											
89	Аш-8 х Қарши-8	10	27	10	17,6	15,7	2,1	89,8 ± 2,7	77,0-100,0	8,3	10,3
90	Қарши-8 х Аш-8	10	24	10	15,6	15,3	1,8	87,8 ± 2,7	79,0-100,0	7,9	9,6

Битта кўсакда тутилган тўлик уруғлар фоизи эса асосан 81,9-90,5 % ни ташкил этди. Бу турух ичида юкорида кўрсатилган хосилдорлик белгиси бўйича паст кўрсаткичлар, яъни бир тул ўсимликда ўртача 8-9 дона кўсак тутилиши ҳамда битта кўсакда 71,3-75,7 % тўлик уруғлар тутилиши қайд этилди. Айнан шу дуратай комбинацияларида битта кўсакда тўлик уруғлар тутилиши бўйича ўзгарувчанлик амплитудаси юкори (50,0-100,0 %, 60,0-100,0 %, 60,0-95,0 %), вариация коэффиценти ҳам жуда юкори кўрсаткичларга (13,1-21,6 %) эга эканлиги аниқланди. Ушбу белги бўйича энг юкори кўрсаткичлари ярим ёввойи (рудерал) кенжа турига мансуб бўлган *f. riso*, *f. ramai* шакллари қатнашган комбинацияларида кузатилди.

Туричи ярим ёввойи (рудерал) ва маданый тропик шакллариини ўзаро дуратайлаш натижасида олинган F_1 -ўсимликларида хосилдорлик кўрсаткичлари турлича бўлиб, бир тул ўсимликдаги кўсаклар сони 8-15 донани ташкил этди. Битта кўсакдаги тўлик уруғлар тутилиши эса 66,1-90,7 % кузатилди. Юкорида кўрсатилган хосилдорлик белгилари, яъни бир тул ўсимликдаги кўсаклар сони бўйича F_1 *f. ishan nigetia* (ок тоғали) х *f. brasiliense* (қизил пояли), *f. riso* х *f. brasiliense*, *f. brasiliense* (қизил пояли) х *f. ramai*, *f. riso* х *f. brasiliense* (қизил пояли) комбинацияларида паст кўрсаткичлар 8-9 дона кўсак тутилиши ва битта кўсакда 66,1-78,1 % тўлик уруғлар тутилиши кузатилди. Юкорида келтирилган дуратай комбинацияларида ўзгарувчанлик амплитудаси юкори бўлиши (45,0-80,0 %; 55,0-95,0 %, 56,0-88,0 %; 55,0-89,0 %) натижасида, вариация коэффиценти ҳам шунга мос равишда 13,4-19,7 % ни ташкил этди.

G. barbadense L. кенжа турларига мансуб ярим ёввойи (рудерал) ва маданый тропик шакллариини ўзаро чагитштириш натижасида олинган F_1 -ўсимликларининг асосий қисмининг хосилдорлик кўрсаткичлари ўртача бўлиб, энг юкори кўрсаткичлар F_1 *f. brasiliense* (қизил пояли) х *f. ishan nigetia* (новотранг тоғали), F_1 *f. brasiliense* (қизил пояли) х *f. ishan nigetia* (ок тоғали) комбинацияларида кузатилди. Бир тул ўсимликда тутилган кўсаклар сони 13-15 та, битта кўсакда тутилган тўлик уруғлар кўрсаткичи 85,4-90,7 %

ни ташкил этди. Кўсакда тутилган тўлик уруғлар фоизи бўйича ўзгарувчанлик амплитудаси юкори бўлмади (77,0-100,0 %; 74,0-91,0 %), вариация коэффиценти шунга мос равишда (6,1-7,4 %) кузатилди. Тавқидлаб ўтиш керакики, бу иккада дуратай комбинацияларида новотранг ва ок тоғали *f. ishan nigetia* шакллари ота сифатида иштирок этган. Энг паст кўрсаткич эса F_1 *f. riso* х *f. brasiliense* дуратай комбинациясида кузатилди. Ўсимликлардаги кўсаклар сони 8 та, тўлик тутилган уруғлар фоизи 66,1 %, ўзгарувчанлик амплитудаси нисбатан юкори 45,0-80,0 %, вариация коэффиценти шунга мос равишда 19,7 % ни ташкил этди.

Ярим ёввойи шакллари маданый навлар билан чагитштиришдан хосил бўлган F_1 -ўсимликларининг хосилдорлик кўрсаткичларининг тахлил натижалари олдинги турухдан фарқ қилиши аниқланди. Энг юкори натижалар ярим ёввойи кенжа турига мансуб *f. riso* шакли иштирок этган реципрок комбинацияларида кузатилди. Масалан: F_1 *f. riso* х Қарши-8 реципрок комбинациясида тўпланган кўсаклар сони 14-21 тани ташкил этса, битта кўсакда тўлик тутилган уруғлар 85,0-89,3 % ни ташкил этди. Дуратайлаш натижасида олинган F_1 *f. riso* х Аш-8 реципрок комбинацияларида ўсимликлардаги тўпланган кўсаклар сони нисбатан кам бўлсада (10-12 та), кўсакда тўлик тутилган уруғлар фоизи нисбатан юкорилиги аниқланди (91,1-91,8 %). Юкорида санаб ўтилган дуратай комбинациялари битта кўсакда тутилган тўлик уруғлар фоизи кўрсаткичлари бўйича олинган натижаларни нисбатан бир текислиги билан ҳам фарқ қилди. Вариация коэффиценти кўрсаткичлари ҳам мос равишда юкори эмас, 6,7-9,5 % ни ташкил этди.

Туричи ярим ёввойи *f. ramai*, ок ва новотранг тоғали *f. ishan nigetia* шакллариини маданый (Аш-8 ва Қарши-8) навлари билан чагитштириш натижасида олинган дуратай комбинацияларида ўрганилган хосилдорлик кўрсаткичлари юкори бўлиб, ўсимликларда тўпланган кўсаклар сони 8 дан 19 тагача, битта кўсакда тутилган тўлик уруғлар фоизи 77,4 % дан 93,9 % ни

ташкил этди. Олинган вариация коэффициентлари 4,8 дан 19,9 гача бўлиши кузатилиди.

Маданий тропик шакллари ўзаро дурағайлаш натижасида олинган F_1 дурағай комбинацияларида ўрганилган хосилдорлик кўрсаткичлари бўйича ўртача натижага эътилоғи аниқланди.

G.barbadense L. кенжа турларига мансуб маданий тропик ва маданий навлар иштирокида олинган дурағай комбинацияларининг хосилдорлик кўрсаткичлари бошқа турруҳларникидан фарқ қилмаган ҳолда, нисбатан паст ва юқори кўрсаткичларга эга эканлиги аниқланди. Ушбу турруҳда энг юқори ва нисбатан бир текис натижалар $F_1 f. brasiliense$ (қизил пояли) х Аш-8 ва Карши-8 х *subsp. villosum* дурағай комбинацияларида кузатилиди. Кўсаклар сони 15-17 та, кўсакда тутилган тўлиқ уруғлар фоизи 93,1-95,3 %, вариация коэффициенти шунга мос ҳолда 10,2-12,0 % ни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин.

Ёввойи *G.dalwini* Watt ва *G.barbadense* L. ярим ёввойи кенжа турларининг ўзаро дурағайлаш натижасида олинган F_1 -ўсимликлариди бир туپ ўсимликдаги кўсаклар сони 10 тадан 16 тачага етган бўлса, битта кўсакдаги тўлиқ уруғлар тутилиши 73,0-89,0 % ни ташкил этди. Юқори кўрсаткич $F_1 f. rivo$ х *G.dalwini* Watt комбинациясида (16 дона), паст кўрсаткич $F_1 f. ramai$ х *G.dalwini* Watt комбинациясида (10 дона) кузатилиди. Битта кўсакдаги тўлиқ уруғлар тутилиши бўйича юқори кўрсаткич $F_1 f. ramai$ х *G.dalwini* Watt комбинациясида 89,0 % ни ташкил этган бўлса, паст кўрсаткич $F_1 f. dalwini$ Watt х $f. ishan nigeta$ (новотрант толали) комбинациясида (73,0 %) кузатилиди.

Турлараро *G.barbadense* L. маданий тропик кенжа шаклларини ёввойи *G.dalwini* Watt тури билан чагиртирилганда бир туپ ўсимликдаги кўсаклар сони 10-14 донани, битта кўсакдаги тўлиқ уруғлар тутилиши 79,4-90,2 % ни ташкил этди. Битта кўсакдаги тўлиқ уруғлар тутилиш фоизи бўйича юқори кўрсаткич турлараро $F_1 f. dalwini$ Watt х $f. brasiliense$ (қизил пояли) реципрок

комбинацияларида 81,2-90,2 % ва вариация коэффициенти юқори 14,7-15,4 % юқори эканлиги кузатилиди.

Ёввойи *G.dalwini* Watt турини *G.barbadense* L. нинг маданий навлари билан турлараро дурағайлаб олинган F_1 -ўсимликлариди бир тулдами ўсимликдаги кўсаклар сони (12-18 дона) ва битта кўсакдаги тўлиқ уруғлар тутилиш фоизи юқори (65,8-90,2 %) эканлиги кузатилиди. Фақат *G.dalwini* Watt тури она сифатида қатнашган $F_1 f. dalwini$ Watt х Аш-8 комбинациясида паст кўрсаткичлар, яъни бир тул ўсимликда тулланган кўсаклар сони 12 тани, тўлиқ уруғлар тутилиш фоизи 65,8 % ни ташкил этиб, ўрганилган реципрок комбинацияларида тўлиқ уруғлар тутилиш фоизи бўйича юқори ўзғарувчанлик амплитудаси (50,0-82,0 %; 55,0-100,0 %; 68,0-100,0 %; 72,0-100,0 %) кузатилиди ва шунга мос равишда вариация коэффициенти 9,7-16,6 % ни ташкил этди.

Шундай қилиб, *G.barbadense* L. турини хилма-хилликларини ўзаро ҳамда *G.dalwini* Watt тури билан турлараро дурағайлаш натижасида олинган F_1 ўсимликлариди битта ўсимликда тутилган кўсаклар сони ва битта кўсакда тутилган тўлиқ уруғлар фоизи каби хосилдорлик кўрсаткичларининг тақлили, энг юқори хосилдорлик кўрсаткичлари турини $F_1 f. ishan nigeta$ (новотрант толали) х Аш-8 (93,9 %) ҳамда маданий тропик ва маданий навларини ўзаро дурағайлаш натижасида олинган $F_1 f. brasiliense$ (қизил пояли) х Аш-8 ва Карши-8 х *subsp. villosum* комбинацияларида (93,1-95,3 %) кузатилиши аниқланди.

3.3-§. F_1 - F_2 ўсимликлариди ўсув даврининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги

Мавлумки, мамлакатимиз пахта етиштирувчи давлатлар ичида энг шимоллий ҳудудлардан бири бўлгани сабабли, бизнинг шароитимизда тегишлар янги навлар яратилиш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолаверади. Шунинг энг муҳим белгиларидан бири бўлган тезпишарлик-хошил ҳажминини,

пахта хом-ашёси ва толаннинг сифатини, машина терими самарадорлигини аниқловчи кимматли хўжалик компонентларидан бири эканлиги маълум.

Ўзанинг тезпишарлик белгиси полиген тарзда ирсийланиб, муржаб структурали компонент ҳисобланади. Маълумки, ғўза ўсимлигининг ўсув даврини В.А. Автономов [1973], Д.Д. Ахмедов, В.А. Автономов [2015], А.А. Абдуллаев [2005], Н.Г. Симонгулян [1968], Р.Г. Ким, А.Б. Амантурдиев [2009], М.С. Раҳманкулов [2017], С.А. Эгамбердиева [2017] 5 та даврга бўлганлар.

Уруғни экиш ва униб чиқиш, яъни уруғпалла барглари ҳосил бўлгунча, уруғнинг униб чиқишдан то биринчи чин барглар ҳосил бўлгунча, чин бардан шоналашгача, шоналашдан гуллашгача, гуллашдан қўсақлар очилгунча.

Шуни таъкидлаш лозимки, юкорида санаб ўтилган ҳар бир давр белгилари алоҳида полиген тизимлар орқали бошқарилиши аниқланган.

Перу ғўза турларига мансуб *G. barbadense* L. турининг туричи хилма-хилликларига мансуб ярим ёввойи ва маданий тропик шакллари ҳамда ёввойи *G. darwinii* Watt тури фотопериодга ўта талабчан бўлиб, ўсув даври 152-173 кунни ташкил этди. Тадқиқот учун танланган маданий Аш-8, Қарши-8 навлари узун кунга мослашган бўлиб, бу навларнинг ўсув даври 112-117 кунни ташкил этди (3.3-жадвал).

G. barbadense L. турининг туричи хилма-хилликларига мансуб ярим ёввойи шаклларини ўзаро дурағайлаш натижасида олинган F₁-ўсимликларига тезпишарлик белгисининг ирсийланиши бўйича турлича натижалар кузатилиди. Реципрок комбинацияларнинг ўсув даври 148,0-170,0 кунни ташкил этди. Ўзгарувчанлик амплитудаси юкори эмас, вариация коэффициенти шунга мос равишда 0,9-2,0 % ни ташкил этди. Дурағайлаш натижасида олинган F₁ f. *parlati* x f. *pisco* комбинациясида ўсув даври давомийлиги 148,0 кун бўлиб, тезпишарлик белгисининг ўта доминантлик ҳолда ирсийланишга эга (h²=2,3), унинг реципрок комбинациясида F₁ f. *pisco* x f. *parlati* доминантлик ҳолати кузатилмади (h²=0,0). Ўрганилган F₁ f. *parlati* x

3.3-жадвал

Бошланғич шакллар ва F₁-ўсимликларига ўсув даври белгисининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги

№	Бошланғич шакллар ва F ₁ авлод комбинациялари	Ўсув даври, кун				
		$\bar{x} \pm S\bar{x}$	Limit	S	V %	hp
Бошланғич шакллар						
1	<i>G.darwinii</i> Watt	169,0±0,44	166-170	1,4	0,8	
2	subsp. <i>ruderales</i> f. <i>pisco</i>	168,0 ± 0,35	166-169	1,1	0,6	
3	subsp. <i>ruderales</i> f. <i>parnat</i>	156,0 ± 0,48	154-159	1,5	0,9	
4	subsp. <i>ruderales</i> f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	173,0 ± 0,52	170-175	1,6	0,9	
5	subsp. <i>ruderales</i> f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	166,0 ± 0,44	164-171	2,5	1,5	
6	subsp. <i>vitifolium</i>	165,0 ± 0,42	163-170	2,4	1,8	
7	subsp. <i>vitifolium</i> f. <i>brasiliense</i> (қ. п-ли)	161,0 ± 0,47	158-163	1,4	0,9	
8	subsp. <i>vitifolium</i> f. <i>brasiliense</i>	152,0 ± 0,68	149-155	2,1	1,4	
9	subsp. <i>eubarbadense</i> (Аш-8) нави	117,0 ± 0,33	116-119	1,0	0,9	
10	subsp. <i>eubarbadense</i> (Қарши-8) нави	112,0 ± 0,37	110-113	1,1	1,0	
F ₁ -ўсимликлари						
Турлараро дурағайлаш (<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>ruderales</i> (ярим ёввойи))						
1	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>parnat</i>	141,0 ± 0,69	138-145	2,1	1,5	3,3
2	f. <i>parnat</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	151,0 ± 0,65	148-154	2,0	1,3	1,7
3	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>pisco</i>	164,0 ± 0,39	162-166	1,2	0,7	9,0
4	f. <i>pisco</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	165,0 ± 0,49	163-168	1,5	0,9	7,0
5	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	168,0 ± 0,59	165-170	1,8	1,1	1,5
6	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	163,0 ± 0,50	160-165	1,5	0,9	4,0

7	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	156,0 ± 0,59	153-159	1,8	1,2	7,6
8	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	152,0 ± 0,63	149-155	2,0	1,3	10,3
<i>G.darwinii</i> Watt x subsp.vitifolium (маданий тропик)						
9	<i>G.darwinii</i> Watt x subsp.vitifolium	165,0 ± 0,68	162-167	1,9	1,2	1,0
10	subsp.vitifolium x <i>G.darwinii</i> Watt	164,0 ± 0,57	161-166	1,7	1,1	1,5
11	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.brasiliense</i> (к. п-ли)	162,0 ± 0,69	159-165	2,1	1,3	0,75
12	<i>f.brasiliense</i> (к. п-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	160,0 ± 0,59	157-162	1,8	1,1	1,2
13	<i>G.darwinii</i> Watt x <i>f.brasiliense</i>	170,0 ± 0,73	166-173	2,3	1,3	-1,1
14	<i>f.brasiliense</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	172,0 ± 0,76	168-174	2,0	1,2	-1,3
<i>G.darwinii</i> Watt x ssp.eubabadense (маданий навлар)						
15	<i>G.darwinii</i> Watt x Қарши-8	123,0 ± 0,47	121-125	1,4	1,2	0,61
16	Қарши-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	126,0 ± 0,42	124-128	1,3	1,0	0,50
17	<i>G.darwinii</i> Watt x Аш-8	138,0 ± 0,57	135-141	1,7	1,3	0,19
18	Аш-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	136,0 ± 0,54	134-139	1,7	1,2	0,26
Туричи дурагайлаш (subsp. ruderale (ярим ёввойи) x subsp. ruderale (ярим ёввойи))						
19	<i>f.parnat</i> x <i>f.pisco</i>	148,0 ± 0,65	145-151	2,0	1,3	2,3
20	<i>f.pisco</i> x <i>f.parnat</i>	162,0 ± 0,52	160-165	1,6	1,0	0,0
21	<i>f.parnat</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	154,0 ± 0,46	152-156	1,4	0,9	1,2
22	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.parnat</i>	161,0 ± 0,53	158-163	1,6	1,0	0,41
23	<i>f.parnat</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	152,0 ± 0,66	148-154	2,1	1,3	1,8
24	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.parnat</i>	165,0 ± 0,49	163-168	1,5	0,9	-0,8
25	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	160,0 ± 0,50	157-162	1,5	0,9	2,7
26	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	169,0 ± 0,62	165-171	1,9	1,1	0,14
27	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.pisco</i>	170,0 ± 0,62	167-173	1,9	1,1	0,2
28	<i>f.pisco</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	167,0 ± 0,65	164-170	2,0	1,2	1,4
29	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.pisco</i>	157,0 ± 0,64	154-160	2,0	1,2	10,0

30	<i>f.pisco</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	156,0 ± 0,55	154-159	1,7	1,1	11,0
subsp. ruderale (ярим ёввойи) x subsp.vitifolium (маданий тропик)						
31	<i>f.pisco</i> x subsp.vitifolium	162,0 ± 0,61	159-165	2,1	1,7	3,0
32	subsp.vitifolium x <i>f.pisco</i>	163,0 ± 0,52	161-165	1,7	1,2	2,3
33	subsp.vitifolium x <i>f.parnat</i>	159,0 ± 0,62	157-162	2,2	1,6	0,33
34	<i>f.parnat</i> x subsp.vitifolium	154,0 ± 0,72	151-157	2,3	1,8	1,4
35	subsp.vitifolium x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	161,0 ± 0,61	159-164	2,1	1,5	2,0
36	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x subsp.vitifolium	162,0 ± 0,66	159-165	2,4	1,6	1,75
37	subsp.vitifolium x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	164,0 ± 0,63	160-167	2,6	1,9	3,0
38	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x subsp.vitifolium	162,0 ± 0,59	158-164	2,2	1,7	7,0
39	<i>f.parnat</i> x <i>f.brasiliense</i> (к. п-ли)	159,0 ± 0,56	157-162	1,7	1,1	-0,2
40	<i>f.brasiliense</i> (к. п-ли) x <i>f.parnat</i>	164,0 ± 0,60	162-167	1,8	1,1	-2,2
41	<i>f.brasiliense</i> (к. п-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	162,0 ± 0,47	160-164	1,4	0,9	0,6
42	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.brasiliense</i> (к. п-ли)	158,0 ± 0,67	156-161	2,1	1,3	2,2
43	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.brasiliense</i> (к. п-ли)	168,0 ± 0,52	166-170	1,6	0,9	-0,16
44	<i>f.brasiliense</i> (к. п-ли) x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	165,0 ± 0,43	163-167	1,3	0,8	0,33
45	<i>f.pisco</i> x <i>f. brasiliense</i> (к. п-ли)	158,0 ± 0,79	154-161	2,4	1,5	1,85
46	<i>f.brasiliense</i> (к. п-ли) x <i>f.pisco</i>	163,0 ± 0,42	161-165	1,3	0,8	0,42
47	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.parnat</i>	153,0 ± 0,63	151-157	2,4	1,5	0,5
48	<i>f.parnat</i> x <i>f.brasiliense</i>	161,0 ± 0,47	159-163	1,4	0,9	-3,5
49	<i>f. brasiliense</i> x <i>f. pisco</i>	162,0 ± 0,68	158-164	2,2	1,6	-0,25
50	<i>f. pisco</i> x <i>f. Brasiliense</i>	166,0 ± 0,62	163-169	1,9	1,1	-0,75
51	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	163,0 ± 0,67	161-166	1,8	1,2	-0,04
52	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>f.brasiliense</i>	167,0 ± 0,73	165-169	1,9	1,3	-0,42
53	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	161,0 ± 0,75	159-165	2,7	1,8	-0,28
54	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>f.brasiliense</i>	164,0 ± 0,82	160-164	2,5	1,5	-0,71

<i>ruderalis</i> (ярим ёввойи) x <i>subsp.eubarbadense</i> (маданий навлар)						
55	<i>f.pisco</i> x Қарши-8	130,0±0,73	127-134	2,3	1,7	0,35
56	Қарши-8 x <i>f.pisco</i>	131,0±0,57	129-135	1,7	1,3	0,32
57	<i>f.pisco</i> x Аш-8	146,0±0,38	144-148	1,2	0,8	-0,13
58	Аш-8 x <i>f.pisco</i>	167,0±0,59	165-170	1,8	1,1	-0,96
59	<i>f.parnat</i> x Қарши-8	137,0±0,56	135-140	1,7	1,2	-0,13
60	Қарши-8 x <i>f.parnat</i>	155,0±0,50	153-158	1,5	1,0	-0,95
61	<i>f.parnat</i> x Аш-8	139,0±0,50	137-142	1,5	1,1	-0,12
62	Аш-8 x <i>f.parnat</i>	149,0±0,61	147-152	1,9	1,3	-0,64
63	Қарши-8 x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	158,0±0,68	155-161	2,1	1,3	-0,50
64	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x Қарши-8	153,0±0,65	150-156	2,0	1,3	-0,34
65	Аш-8 x <i>f.ishan nigeria</i> (оқ толали)	151,0±0,71	148-154	2,2	1,4	-0,21
66	<i>f.ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x Аш-8	168,0±0,59	165-170	1,8	1,1	-0,82
67	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x Аш-8	152,0±0,55	149-154	1,7	1,1	-0,42
68	Аш-8 x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	155,0±0,47	153-157	1,4	0,9	-0,55
69	Қарши-8 x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	142,0±0,50	140-145	1,6	1,1	-0,11
70	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x Қарши-8	156,0±0,59	153-159	1,8	1,2	-0,62
<i>subsp.vitifolium</i> (маданий тропик) x <i>subsp.vitifolium</i> (маданий тропик)						
71	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f.brasiliense</i>	169,0±0,68	166-172	2,1	1,2	-2,7
72	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	164,0±0,57	162-167	1,9	1,1	-1,6
73	<i>subsp.vitifolium</i> x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	159,0±0,72	156-163	2,5	1,8	2,0
74	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>subsp.vitifolium</i>	162,0±0,63	159-164	2,2	1,5	-0,5
75	<i>subsp.vitifolium</i> x <i>f.brasiliense</i>	158,0±0,59	156-161	2,3	1,7	0,07
76	<i>f.brasiliense</i> x <i>subsp.vitifolium</i>	156,0±0,57	155-159	1,8	1,0	0,3
<i>subsp.vitifolium</i> (маданий тропик) x <i>subsp.eubarbadense</i> (маданий навлар)						
77	<i>subsp.vitifolium</i> x Қарши-8	141,0±0,78	135-143	2,9	2,1	-0,09

78	Қарши-8 x <i>subsp.vitifolium</i>	134,0±0,72	129-136	2,7	1,9	0,16
79	<i>subsp.vitifolium</i> x Аш-8	143,0±0,69	138-145	2,6	1,7	-0,08
80	Аш-8 x <i>subsp.vitifolium</i>	139,0±0,77	134-142	2,8	2,0	0,08
81	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x Қарши-8	149,0±0,62	146-153	2,6	1,8	-0,51
82	Қарши-8 x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	138,0±0,74	132-141	2,9	2,2	-0,06
83	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x Аш-8	152,0±0,65	148-155	2,6	1,9	-0,59
84	Аш-8 x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	144,0±0,68	139-146	2,4	1,6	-0,22
85	Қарши-8 x <i>f.brasiliense</i>	131,0±0,62	128-136	2,8	1,8	0,05
86	<i>f.brasiliense</i> x Қарши-8	139,0±0,53	137-142	1,9	1,4	-0,35
87	Аш-8 x <i>f.brasiliense</i>	136,0±0,73	131-139	2,5	1,7	-0,08
88	<i>f.brasiliense</i> x Аш-8	144,0±0,67	139-147	2,7	1,9	-0,54
<i>subsp.eubarbadense</i> (маданий навлар) x <i>subsp.eubarbadense</i> (маданий навлар)						
89	Аш-8 x Қарши-8	122,0±0,52	118-125	2,2	1,5	-3,0
90	Қарши-8 x Аш-8	119,0±0,64	116-123	2,0	1,3	-1,8

f. ishan nigeta (новотранг толали) комбинацияси нисбатан тезпишар, ўсув даври эса 152,0 кун, тезпишарлик белгисининг ўта доминантлик ҳолатида ирсийланиши аниқланди. Шу дуратайнинг реципрок комбинациясида эса аксинча, салбий, тўлиқсиз доминантлик ҳолати кузатилиди ($hr=0,8$). Тезпишарлик белгиси бўйича тахлил қилинаётган гуруҳ реципрок комбинацияларнинг натижаларига назар солсак, дуратайлаш асосида олинган ўсимликларнинг ўсув даври давомийлиги ёки тезпишарлиги оналик сифатида қатнашган шаклнинг хусусиятига боғлиқлигини кўрамай. Бу гуруҳ дуратайларида тезпишарлик белгиси ижобий гетерозис, тўлиқсиз ва ўта доминантлик ҳолатларида ирсийланиши кузатилиди.

Туричи ярим ёввойи ва маданий тропик шакллари ўзаро дуратайлаш натижасида олинган *F₁-ўсимликларида* тезпишарлик бўйича асосан тўлиқсиз устунлик, салбий гетерозис ҳолатидаги ирсийланиш кузатилиди (3.3-жадвал). Улардан мустасно тарзда ушбу *F₁-f. brasiliense* (қизил пояли) *x f. raima*, *F₁-f. ishan nigeta* (новотранг толали) *x f. brasiliense* (қизил пояли), *F₁-f. risco x subsp. vitifolium*, *F₁-f. ishan nigeta* (новотранг толали) *x subsp. vitifolium* реципрок комбинацияларида нисбатан тезпишар шаклларнинг ўта доминантлик ҳолатида ирсийланиши кузатилиди ($hr=2,2$; $hr=2,2$; $hr=2,3$; $hr=3$; $hr=7$).

G. batbadense L. туричи хилма-хилликларидан ярим ёввойи (рудерал) шаклларни маданий навлар билан дуратайлаш натижасида олинган *F₁-ўсимликларида* тезпишарликни асосан оралик ва тўлиқсиз устунлик ҳолатида ирсийланиш кузатилиди. Жумладан, *F₁ Қарши-8 x f. risco* дуратай комбинациясидагина салбий гетерозис ($hr=0,3$) ҳолатда ирсийланиши аниқланди.

Маданий тропик кенжа тур ва шаклларни ўзаро, яъни *F₁-f. brasiliense* (қизил пояли) *x f. brasiliense* чапиштирилганда олинган дуратай комбинациясининг ўсув даври 169,0 кунни ташкил этиб, салбий гетерозис ҳолати, яъни кечпишар шаклнинг ўта устунлиги ($hr=2,2$) аниқланди.

Факатгина *F₁ subsp. vitifolium x f. brasiliense* (қизил пояли) дуратай комбинациясида гетерозис ($hr=2$) ҳолатда ирсийланиши кузатилиди.

Маданий тропик шакллари маданий навлар билан ўзаро дуратайлаш натижасида олинган *F₁ комбинацияларининг* ўсув даври давомийлиги 149,0-161,0 кунни ташкил этди. Тезпишарлик белгиси салбий гетерозис ва тўлиқсиз устунлик ҳолатида ирсийланиш кузатилиди. Тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики, ушбу гуруҳ *F₁-ўсимликларида* эса кечпишар маданий тропик шаклларининг устунлигини кўришимиз мумкин.

Ўзанинг *G. batbadense* L. турининг туричи хилма-хилликларини ёввойи *G. darwinii* Watt тури билан дуратайлаш натижасида олинган *F₁-ўсимликларининг* ўсув даври давомийлиги белгиси 141,0-168,0 кунни, ўзарувчанлик амплитудаси эса паст бўлиб, вариация коэффициенти шунга мос равишда 0,7-1,5 % ни ташкил этди. Ярим шаклларини ёввойи *G. darwinii* Watt тури билан дуратайлаш натижасида олинган *F₁ реципрок дуратайларида* ижобий гетерозис, яъни тезпишарлик белгисининг доминантлик, ўта доминантлик ҳолатларида ирсийланиши кузатилиди. Ўзанинг тезпишарлик белгиси бўйича юқори кўрсаткичлар *F₁ G. darwinii Watt x f. raima*, *F₁-f. ishan nigeta* (новотранг толали) *x G. darwinii Watt*, *G. darwinii Watt x f. ishan nigeta* (новотранг толали), *F₁ G. darwinii Watt x f. risco*, *f. risco x G. darwinii Watt*, *f. ishan nigeta* (ок толали) *x G. darwinii Watt* дуратай комбинацияларида кузатилиди. Ўсув даврининг давомийлиги 141,0 кундан 168,0 кунгача, доминантлик коэффициенти $hr=3,3$; $hr=4,0$; $hr=7,0$; $hr=9,0$; $hr=10,3$ тенг бўлишнинг кўришимиз мумкин.

G. batbadense L. турининг маданий тропик шаклларини *G. darwinii* Watt тури билан дуратайлаш натижасида олинган *F₁-ўсимликларида* тезпишарлик белгиси бўйича тўлиқсиз (*F₁ G. darwinii Watt x f. brasiliense* (қизил пояли); $hr=0,7$), тўлиқ (*F₁ f. brasiliense* (қизил пояли) *x G. darwinii Watt*; $hr=1,2$) ва салбий гетерозис (*F₁ G. darwinii Watt x f. brasiliense*; $hr=1,1$) яъни кечпишарликнинг ўта устунлик, доминантлик ҳолати кузатилиди. Ўсув даврининг давомийлиги 170,0 кундан 172,0 кунгача, доминантлик

коэффициенти $h_r=-1,1$; $h_r=-1,3$ тенг бўлди. Ўрганилган *F₁ f. brasiliense* (қизил поязи) x *G. darwinii* Watt дурагай комбинациясида шу турухнинг бошқа дурагай комбинациялардан фарқи равишда ўта доминантлик ҳолатда ирсийланиши кузатилиди. Ўрганилган дурагайлarning ўсув даври давомийлиги 160,0 кунни, ўзарувчанлик кўлами 157,0-162,0 кунни, доминантлик коэффициенти $h_r=1,2$ ташкил этди.

Ёввойи *G. darwinii* Watt турини *G. barbidenze* L. маданний навлари билан (Аш-8, Қарши-8) дурагайлаш натижасида олинган *F₁* ўсимликларида эса, оралик ирсийланиш ҳолатлари аниқланди. Ўрганилган ушбу реципрок дурагай комбинацияларида ўсув даври давомийлиги 123,0 кундан 138,0 кунгача, доминантлик коэффициенти эса $h_r=0,1$; $h_r=0,6$ оралик ҳолатда ирсийланиши кузатилиди.

G. barbidenze L. нинг ярим ёввойи x маданний тропик, маданний тропик шакллари ўзаро, маданний тропик x маданний шакллари ва *G. darwinii* Watt турини маданний тропик кенжа тури билан дурагайлаш натижасида олинган реципрок *F₂* ўсимликларида униб чиқиш давридан, 50 % кўсақлар очилгунча бўлган давлarning ўзарувчанлик кўламлири ўрганилди (3,4-жадвал).

Ота-она намуналарида ўсув даври давомийлиги белгиси маданний Қарши-8 навида 112 кун, маданний тропик subsp. *vitifolium* кенжа турида бу 165 кунни ташкил этди. Дурагайлаш натижасида олинган *F₂* ўсимликларида тезпишарлик белгиси кўрсаткичлари нафақат сақланиб қолиши, шу билан бирга ота-онасига (маданний Қарши-8 навида 112 кун, маданний тропик subsp. *vitifolium* 165 кун) нисбатан тезпишар шакллар ҳам аниқланди. Ўрганилган *F₂* комбинацияларида ушбу белги бўйича ўзарувчанлик кўлами 6-7 синфни қамраб олди. Масалан: туричи дурагайлаш натижасида олинган *F₂* Қарши-8 x subsp. *vitifolium* комбинациясида чап томонли трансгрессив ўзарувчанлик мажмуи эканлигини кўришимиз мумкин. Ўсув даври давомийлиги белгиси бўйича ўсимликларнинг энг кўп физи 135-144 кун кўрсаткичи модал синфларга (мос равишда 38,4 %) тўғри келди. Бундан ташқари, *F₂*

3.4-жадвал

F₂ ўсимликларида 50 % ўсимликларда кўсақлар очилиши белгисининг ўзарувчанлик кўлами

Туричи ва турлараро <i>F₂</i> дурагайлар	Ўсимликлар сони ва физи, %	Синф n= 10							$\bar{x} \pm S$	S	V%	h ²
		105-114	115-124	125-134	135-144	145-154	155-164	165-174				
<i>F₂</i> subsp. <i>vitifolium</i> x Қарши-8	206	4	26	41	86	36	11	2	144,2±0,87	13,4	8,9	97,0
	100	1,9	12,7	19,9	41,7	17,4	5,4	1,0				
<i>F₂</i> Қарши-8 x subsp. <i>vitifolium</i>	213	6	28	61	82	29	7	-	135,7±0,74	12,5	8,6	96,7
	100	2,8	13,2	28,7	38,4	13,7	3,2	-				
<i>F₂</i> f. <i>brasiliense</i> x subsp. <i>vitifolium</i>	212	-	-	22	43	81	57	9	154,7±0,61	9,7	6,5	95,1
	100	-	-	10,3	20,3	38,2	26,9	4,3				
<i>F₂</i> subsp. <i>vitifolium</i> x f. <i>brasiliense</i>	208	-	-	17	46	56	78	11	159,7±0,63	10,1	6,8	94,9
	100	-	-	8,2	22,1	26,9	37,5	5,3				
<i>F₂</i> Ам-8 x f. <i>brasiliense</i>	207	3	26	45	83	39	11	-	139,3±0,78	11,4	7,3	96,9
	100	1,4	12,6	21,7	40,1	18,9	5,3	-				
<i>F₂</i> f. <i>brasiliense</i> x Ам-8	184	3	17	27	31	67	39	-	146,4±0,71	11,7	8,1	96,9
	100	1,6	9,2	14,7	16,8	36,4	21,3	-				
<i>F₂</i> subsp. <i>vitifolium</i> x <i>G. darwinii</i>	193	-	-	16	29	47	74	27	162,5±0,64	10,3	6,9	96,6
	100	-	-	8,3	15,1	24,3	38,4	13,9				
<i>F₂</i> <i>G. darwinii</i> x subsp. <i>vitifolium</i>	187	-	-	15	32	46	76	18	159,2±0,59	9,4	6,3	95,5
	100	-	-	8,1	17,2	24,5	40,6	9,6				
<i>F₂</i> subsp. <i>vitifolium</i> x f. <i>parnat</i>	203	-	-	14	43	59	74	13	156,8±0,62	9,8	6,6	89,8
	100	-	-	6,8	21,2	29,1	36,4	6,4				
<i>F₂</i> f. <i>parnat</i> x subsp. <i>vitifolium</i>	214	-	-	24	51	79	52	8	153,2±0,60	9,5	6,2	88,0
	100	-	-	11,2	23,8	36,9	24,3	3,8				

ўсимликларида кенг трансгрессив ўзарувчанлик кузатилиб, ўрганилган 213 та ўсимликлар орасидан тезпишарлик белгиси 115-124 кун бўлган 28 та шакллар ҳамда тезпишарлик белгиси 105-114 кунли 6 та рекомбинант шакллар олтига муваффақ бўлинди.

Дурагайлаш натижасида олинган F_2 ўсимликларда ўсув даври белгисининг наслдан наслга берилиш коэффициенти $h^2=88,0$ дан $h^2=97,0$ га тенг бўлди, бу эса тахлил қилинган ушбу белгининг 88,0-97,0 % и дурагай шаклнинг генотипи, 3,0-12,0 % и эса ташки мухит таъсирида ирсийланишини кўрсатади. Жумладан, туричи F_2 subsp. *villosum* × Қарши-8 дурагай комбинациясида ўсув даврининг наслдан наслга берилиш коэффициенти $h^2=97,0$ га тенг бўлди, бу эса ўсув даври белгисининг 97,0% и дурагай шаклнинг генотипи, 3% и эса ташки мухит таъсирида ирсийланганлигидан далолат беради.

Ўзанинг тезпишарлик белгиси бўйича ўзарувчанлик кўлами туричи F_2 Аш-8 × *l. visiliense* дурагай комбинациясида (6 та синф) аниқланди. Ўсимликларнинг энг кўп фойзи 135-144 кун кўрсаткичи модал синфларга (мос равишда 40,1 %) тўғри келди. Ўрганилган ушбу F_2 дурагай комбинацияларида тезпишарлик белгиси бўйича чап томонли салбий трансгрессив ўзарувчанлик, яъни бошланғич манбаларнинг энг паст кўрсаткичи чекка синфларидан 2 та синфга силжиш кайд этилди ҳамда бошланғич манбаларга нисбатан ҳам тезпишар ўсимликлар ажраллиб чиқиш ҳолати кузатилди.

Турлараро F_2 subsp. *villosum* × *G. darwinii* комбинациясида ота-она намуналарига (*G. darwinii*-169 кун, subsp. *villosum*-165 кун) нисбатан тезпишар шакллар учраган. Ўрганилган F_1 ўсимликларида ўсув даври белгисининг ўртача кўрсаткичи 159,2 кун, F_2 ўсимликларида эса бу кўрсаткич 164,0 кунли ташкил этди. Ўсимликларнинг энг кўп фойзи 155-164 кўрсаткичи модал синфларга (мос равишда 36,4 %) тўғри келганлигини кўришимиз мумкин.

Олинган тадқиқотлар натижаси шунни кўрсатдики, тезпишарлик белгиси бўйича чап томонли трансгрессив ўзарувчанлик мавжудлиги амалий селекция нуктаи назаридан муҳим аҳамиятга эга бўлиб, F_2 ўсимликлар орасидан тезпишар хусусиятга эга бўлган генотиплар олиш мумкинлигини кўрсатади. Ажратиб олган тезпишар генотиплар, яъни тезпишар тизма ва навлар яратишда қимматли манба бўла олади.

3.4-§. F_1 - F_2 ўсимликларида битта кўсакдаги пахта вази белгисининг ирсийланиши ва ўзарувчанлиги

Мазлумки, ўзанинг энг муҳим қимматли хўжалик кўрсаткичларидан бири битта кўсакдаги пахта вази ҳисобланади. Шунини инобатга олган ҳолда, олиб бориш тадқиқотларимиз асосида олинган F_1 - F_2 ўсимликларида бу белгининг ирсийланиши ва ўзарувчанлик кўлами қандай тарада кечиши ўрганилди. Бир қатор олимлар туричи ва турлараро дурагайлаш натижасида олинган F_1 - F_2 ўсимликларида кўсак йириклиги ота-она шакллари кўрсаткичидан юқори бўлганлигини ўз изланишларида келтириб ўтганлар С.Т. Жўраев [2005], Х.А. Мўминов [2013], Б.Х. Аманов [2010], Д.К. Ғолимов ва бош. [2005].

Р.Р. Раҳимбоев, Р.Ф. Зелениналар [1976] олиб борган тадқиқотларида, ўзанинг F_1 ўсимликларида кўсак йириклигининг ирсийланиши тўлиқ усугулик ҳолатда ирсийланишини аниқлаган бўлса, F_2 ўсимликларининг вариацион каторида эса, дурагайлар йирик кўсакли бошланғич манба шакллари томонга огтанлиги ва йирик кўсакка эга бўлган (трансгрессив) ўсимликлар ҳосил бўлишини полигенлар таъсиридан эканлиги кузатилган.

О.Х. Қимсанбаев [2004] лар олиб борган тадқиқотларида, F_1 -ўсимликларда кўсак йириклигининг ирсийланиши тўлиқ усугулик ҳолатда кечиши, F_2 -ўсимликларининг вариацион каторида эса, дурагайлар йирик кўсакли ота-она шакллари томонга огтанлиги ва йирик кўсакка эга бўлган (трансгрессив) ўсимликлар ҳосил бўлишини полигенлар таъсиридан эканлиги аниқланган.

тоғлиги турига мансуб келиб чиқиши узок бўлган туричи дуралайлаш натижасида юкори авлод ($F_2B_8F_{10}B_{10}$) бекросс дуралай популяцияси ўсимликларини кимматли хўжалик белгиларининг ирсийланиши ва ўзгаришчанлиги ўрганилган. Битта кўсакдаги пахта вазнини оширишда кўсакдаги чаноклар сонининг ахамияти юкори эканлиги тажрибалар асосида тасдиқланган. Юкори авлод ўсимликларидан танловлар натижасида 4-5 чанокли кўсакларни ажратиб олиш, кейинги авлодда кўсакдаги чаноклар сони бўйича ижобий натижаларга эришиш мумкинлигини кўрсатиб берган.

Тадқиқот учун танланган бошланғич намуналарнинг асосий кимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган битта кўсакдаги пахта вазни белгиси бўйича олинган кўрсаткичлардан маълум бўлдики, *G.darwinii* Watt тури ва *G.barbadense* L. ярим ёввойи шакллари, яъни, *f. pisco*, *f. parnat*, ок ва нововторант тоғлиги *f. ishan nigeria* шакллари бошқа намуналарга қараганда майда кўсакли ($1,9 \text{ г}$; $1,4 \text{ г}$; $1,9 \text{ г}$; $1,6 \text{ г}$; $1,8 \text{ г}$) маданий Қарши-8 ва Аш-8 навлари эса ўртача йирикликдаги ($2,3-3,3 \text{ г}$) кўсакларга эга эканлиги кузатилган, маданий тропик кенжа турига мансуб шакллари битта кўсакдаги пахта вазни бўйича *f. brasiliense* (қизил пояли) ва *f. vitifolium* шаклларида $2,1-2,2 \text{ г}$ ни ташкил этган бўлса, танлаб олинган бошланғич манбалар ичида маданий тропик subsp. *vitifolium* кенжа турида ушбу белги бўйича энг йирик кўсак ўртача $6,5 \text{ грамм}$ эканлиги аниқланди (3.5-жадвал).

Ўзанинг кимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган битта кўсакдаги пахта вазни кўрсаткичларининг тахлили турли биологик турухларга мансуб, *G.barbadense* L. туричи хилма-хилликларига мансуб бўлган рудерал (ярим ёввойи), маданий тропик, субтропик шакллари дуралайлаш натижасида олинган F_1 ўсимликларида бу белгининг ирсийланиши турлича кечишини кўрсатди. Кўсакдаги пахта вазни бир-биридан кам фарқ қилган икки шаклни

3.5-жадвал

Бошланғич манбалар ва F_1 -ўсимликларида битта кўсакдаги пахта вазни белгисининг ирсийланиши ва ўзгаришчанлиги

№	Бошланғич манбалар ва F ₁ авлод комбинациялари	Таҳлил қилинган кўсаклар сони, дона	Битта кўсакдаги пахта вазни, г				
			$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	Limit	S	V %	hp
Бошланғич манбалар							
1	<i>G.darwinii</i> Watt	10	1,9 ± 0,11	1,4-2,1	0,21	10,6	-
2	subsp.ruderale f.pisco	10	1,4 ± 0,12	1,2-1,8	0,19	12,4	-
3	subsp.ruderale f.parnat	10	1,9 ± 0,10	1,7-2,3	0,20	10,3	-
4	subsp.ruderale f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	1,6 ± 0,12	1,5-2,0	0,11	13,1	-
5	subsp.ruderale f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	1,8 ± 0,12	1,5-2,2	0,23	12,3	-
6	subsp.vitifolium	10	6,5 ± 0,37	4,0-7,3	0,18	12,2	-
7	subsp.vitifolium f.brasiliense (қ. п-ли)	10	2,2 ± 0,12	1,5-2,7	0,34	16,3	-
8	subsp.vitifolium f.brasiliense	10	2,1 ± 0,11	1,8-2,5	0,23	10,8	-
9	subsp.eubarbadense (Аш-8 нави)	10	3,3 ± 0,15	2,8-4,0	0,22	14,5	-
10	subsp.eubarbadense (Қарши-8 нави)	10	2,3 ± 0,13	2,0-3,0	0,42	17,9	-
F ₁ -ўсимликлари							
Турлараро дуралайлаш (<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. ruderale (ярим ёввойи))							
1	<i>G.darwinii</i> Watt x f.parnat	10	2,0 ± 0,10	1,7-2,4	0,20	9,8	0,0
2	f.parnat x <i>G.darwinii</i> Watt	10	2,1 ± 0,11	1,5-2,6	0,35	16,2	0,0
3	<i>G.darwinii</i> Watt x f.pisco	10	2,5 ± 0,12	2,0-3,2	0,38	15,0	3,4
4	f.pisco x <i>G.darwinii</i> Watt	10	2,4 ± 0,09	2,2-2,6	0,21	8,6	3,0
5	<i>G.darwinii</i> Watt x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	2,0 ± 0,13	1,6-2,6	0,26	12,9	1,6
6	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	2,1 ± 0,11	1,6-2,6	0,33	15,6	2,3
7	<i>G.darwinii</i> Watt x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	2,6 ± 0,12	2,0-3,0	0,32	12,2	15,0
8	f.ishan nigeria (н. т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	2,7 ± 0,14	2,0-3,0	0,37	13,6	17,0

G.darwinii Watt x subsp.vitifolium (маданий тропик)							
	G.darwinii Watt x subsp.vitifolium	10	3,3 ± 0,22	2,2-3,6	0,26	19,4	-0,39
10	subsp.vitifolium x G.darwinii Watt	10	3,8 ± 0,27	2,4-4,0	0,28	23,6	-0,17
11	G.darwinii Watt x f.brasiliense (қ. п-ли)	10	2,4 ± 0,11	2,0-2,8	0,27	11,0	2,3
12	f.brasiliense (қ. п-ли) x G.darwinii Watt	10	2,4 ± 0,12	2,0-3,0	0,29	12,1	2,3
13	G.darwinii Watt x f.brasiliense	10	2,8 ± 0,10	2,4-3,2	0,29	10,2	8,0
14	f.brasiliense x G.darwinii Watt	10	2,5 ± 0,13	2,0-3,0	0,26	12,2	5,0
G.darwinii Watt x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
15	G.darwinii Watt x Қарши-8	10	3,0 ± 0,18	2,2-4,2	0,56	18,2	4,5
16	Қарши-8 x G.darwinii Watt	10	2,9 ± 0,16	2,1-3,8	0,50	16,6	4,0
17	G.darwinii Watt x Ам-8	10	2,5 ± 0,12	2,0-3,0	0,39	15,7	-0,14
18	Ам-8 x G.darwinii Watt	10	2,0 ± 0,13	1,7-2,6	0,40	19,3	-0,85
Туричи дурағайлаш (subsp. ruderae (ярим ёввойи) x subsp. ruderae (ярим ёввойи))							
19	f.parnat x f.pisco	10	2,0 ± 0,13	1,6-2,6	0,26	12,7	1,4
20	f.pisco x f.parnat	10	2,5 ± 0,12	2,2-3,0	0,36	14,1	3,4
21	f.parnat x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	2,1 ± 0,12	1,7-3,0	0,39	17,9	2,3
22	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.parnat	10	2,2 ± 0,11	1,5-2,7	0,35	15,4	3,0
23	f.parnat x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	1,6 ± 0,19	1,4-2,2	0,31	18,7	-5,0
24	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.parnat	10	1,9 ± 0,09	1,8-2,2	0,18	9,3	1,0
25	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	2,9 ± 0,16	2,0-3,6	0,51	17,5	12,0
26	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	2,4 ± 0,10	2,0-3,0	0,32	13,1	7,0
27	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.pisco	10	2,2 ± 0,11	1,8-2,6	0,36	16,1	7,0
28	f.pisco x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	2,6 ± 0,11	2,0-3,0	0,29	11,2	11,0
29	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.pisco	10	2,8 ± 0,11	2,5-3,2	0,37	12,6	6,0
30	f.pisco x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	2,1 ± 0,11	1,5-2,6	0,33	15,6	2,5
subsp. ruderae (ярим ёввойи) x subsp.vitifolium (маданий тропик)							
31	f.pisco x subsp.vitifolium	10	2,8 ± 0,43	2,5-3,5	0,36	18,7	-0,45
32	subsp.vitifolium x f.pisco	10	3,4 ± 0,47	2,6-3,7	0,29	20,3	-0,21
33	subsp.vitifolium x f.parnat	10	3,7 ± 0,54	2,5-4,1	0,37	28,6	-0,21
34	f.parnat x subsp.vitifolium	10	2,9 ± 0,48	2,6-3,7	0,29	23,4	-0,56
35	subsp.vitifolium x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	3,7 ± 0,53	2,6-4,0	0,36	26,3	-0,14

G.darwinii Watt x subsp.vitifolium (маданий тропик)							
36	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x subsp.vitifolium	10	3,2 ± 0,47	2,5-3,5	0,28	19,2	-0,34
37	subsp.vitifolium x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	3,9 ± 0,54	2,4-4,5	0,29	34,6	-0,10
38	f.ishan nigeria (н. т-ли) x subsp.vitifolium	10	2,8 ± 0,58	2,1-3,4	0,23	22,4	-0,57
39	f.parnat x f.brasiliense (қ. п-ли)	10	1,8 ± 0,11	1,4-2,5	0,35	18,5	-1,6
40	f.brasiliense (қ. п-ли) x f.parnat	10	1,7 ± 0,10	1,4-2,2	0,31	17,6	-2,3
41	f.brasiliense (қ. п-ли) x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	2,7 ± 0,09	2,2-3,2	0,30	11,0	3,5
42	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.brasiliense (қ. п-ли)	10	2,0 ± 0,11	2,0-2,5	0,34	16,4	0,0
43	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.brasiliense (қ. п-ли)	10	2,2 ± 0,13	1,8-2,6	0,29	12,6	1,1
44	f.brasiliense (қ. п-ли) x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	2,7 ± 0,12	2,5-3,0	0,39	14,4	2,6
45	f.pisco x f. brasiliense (қ. п-ли)	10	2,4 ± 0,11	2,0-2,8	0,27	11,0	1,5
46	f.brasiliense (қ. п-ли) x f.pisco	10	2,3 ± 0,10	1,8-2,6	0,31	13,6	1,2
47	f.brasiliense x f.parnat	10	2,6 ± 0,18	2,4-3,1	0,28	15,6	6,0
48	f.parnat x f.brasiliense	10	2,8 ± 0,10	2,5-3,2	0,30	16,3	8,0
49	f. brasiliense x f. pisco	10	1,8 ± 0,19	1,6-2,1	0,21	10,3	0,14
50	f. pisco x f. Brasiliense	10	1,5 ± 0,12	1,4-2,0	0,18	11,6	-0,71
51	f.brasiliense x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	2,3 ± 0,27	1,3-2,6	0,26	20,2	1,8
52	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.brasiliense	10	2,2 ± 0,23	1,4-2,5	0,23	18,3	1,4
53	f.brasiliense x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	2,0 ± 0,21	1,3-2,3	0,24	18,4	0,33
54	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.brasiliense	10	1,6 ± 0,16	1,2-2,0	0,26	16,1	-2,3
ruderae (ярим ёввойи) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
55	f.pisco x Қарши-8	10	2,5 ± 0,17	1,7-3,0	0,53	20,9	1,4
56	Қарши-8 x f.pisco	10	2,0 ± 0,13	1,6-2,6	0,40	19,2	0,33
57	f.pisco x Ам-8	10	2,2 ± 0,13	1,8-2,6	0,29	13,0	-0,15
58	Ам-8 x f.pisco	10	2,4 ± 0,12	2,0-2,7	0,29	12,0	0,05
59	f.parnat x Қарши-8	10	1,7 ± 0,09	1,2-2,0	0,30	17,0	-2,0
60	Қарши-8 x f.parnat	10	2,7 ± 0,10	2,5-3,0	0,28	8,2	3,0
61	f.parnat x Ам-8	10	2,1 ± 0,11	1,5-2,7	0,34	15,7	-0,71
62	Ам-8 x f.parnat	10	2,0 ± 0,11	1,5-2,7	0,36	17,7	-0,85
63	Қарши-8 x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	2,6 ± 0,14	2,0-3,0	0,43	16,7	1,8
64	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x Қарши-8	10	2,1 ± 0,09	2,0-2,5	0,19	8,8	0,42

65	Aш-8 x <i>f. ishan nigeria</i> (оқ толали)	10	1,8 ± 0,11	1,4-2,5	0,33	17,9	-0,76
66	<i>f. ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x Aш-8	10	2,7 ± 0,12	2,5-3,0	0,39	14,4	0,29
67	<i>f. ishan nigeria</i> (н. т-ли) x Aш-8	10	2,3 ± 0,10	1,8-2,6	0,31	13,6	-0,33
68	Aш-8 x <i>f. ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	2,2 ± 0,13	1,8-3,0	0,41	18,1	-0,46
69	Қарши-8 x <i>f. ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	2,3 ± 0,12	2,0-2,8	0,37	15,7	1,0
70	<i>f. ishan nigeria</i> (н. т-ли) x Қарши-8	10	2,6 ± 0,15	2,2-3,2	0,46	17,5	2,2
subsp. vitifolium (маданий тропик) x subsp. vitifolium (маданий тропик)							
71	<i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f. brasiliense</i>	10	1,9 ± 0,12	1,5-2,2	0,23	11,9	-5,0
72	<i>f. brasiliense</i> x <i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	2,4 ± 0,19	1,5-2,7	0,25	15,4	5,0
73	subsp. vitifolium x <i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	3,5 ± 0,34	2,7-3,8	0,20	18,2	-0,39
74	<i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли) x subsp. vitifolium	10	2,8 ± 0,14	2,4-3,1	0,18	9,3	-0,72
75	subsp. vitifolium x <i>f. brasiliense</i>	10	3,6 ± 0,52	2,5-4,2	0,26	24,6	-0,31
76	<i>f. brasiliense</i> x subsp. vitifolium	10	2,7 ± 0,13	2,0-3,2	0,22	16,1	-0,72
subsp. vitifolium (маданий тропик) x subsp. eubarbadense (маданий навлар)							
77	subsp. vitifolium x Қарши-8	10	4,5 ± 0,19	3,8-4,8	0,31	17,3	0,04
78	Қарши-8 x subsp. vitifolium	10	4,3 ± 0,20	3,8-4,9	0,37	18,2	-0,04
79	subsp. vitifolium x Aш-8	10	4,2 ± 0,19	3,5-4,5	0,34	17,1	-0,43
80	Aш-8 x subsp. vitifolium	10	4,0 ± 0,21	3,4-4,5	0,32	19,2	-0,37
81	<i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли) x Қарши-8	10	1,6 ± 0,18	1,4-2,2	0,30	17,7	-13,0
82	Қарши-8 x <i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	2,2 ± 0,12	1,8-3,2	0,39	17,4	-1,0
83	<i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли) x Aш-8	10	2,4 ± 0,12	1,5-2,8	0,39	16,1	-0,63
84	Aш-8 x <i>f. brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	2,6 ± 0,07	2,5-3,0	0,18	6,7	-0,27
85	Қарши-8 x <i>f. brasiliense</i>	10	2,7 ± 0,10	2,2-3,2	0,31	11,7	5,0
86	<i>f. brasiliense</i> x Қарши-8	10	3,1 ± 0,12	2,7-3,5	0,33	12,4	9,0
87	Aш-8 x <i>f. brasiliense</i>	10	2,8 ± 0,14	2,4-3,5	0,28	14,9	0,16
88	<i>f. brasiliense</i> x Aш-8	10	2,4 ± 0,10	2,0-2,6	0,23	12,1	-0,5
subsp. eubarbadense (маданий навлар) x subsp. eubarbadense (маданий навлар)							
89	Aш-8 x Қарши-8	10	3,7 ± 0,18	3,0-4,0	0,29	16,0	1,8
90	Қарши-8 x Aш-8	10	3,5 ± 0,16	3,2-4,0	0,25	14,0	1,4

чапиштирилиб олинган ўсимликларда кучли гетерозис холати кузатилиши ва аксинча, кўсаги йирик ва майда шакллари чапиштиришдан олинган дуралайларда ўрганилаётган битта кўсакаги пахта вази белгиси оралик холатда ирсийланиши кузатилиди.

Турчи *G. barbadense* L. ярим ёввойи (рудерал) шакллари ўзаро дуралайлаш натижасида олинган F₁-ўсимликларда ўрганилаётган белги бўйича самарали натижалар кузатилиб, асосан доминантлик ва ўта доминантлик холатида ирсийланиди. Ўрганилган F₁ *f. raimi* x *f. ishan nigeria* (новотранг толали) комбинациясида белги салбий гетерозисли ўта доминантлик холатида ирсийланиши кузатилиди (h_r=5,0) ва аксинча унинг реципрок комбинациясида тўлиқ доминантлик (h_r=1,0) холатда ирсийланиши кузатилиди. Тавқидлаш лозимки, бу чапиштириш туррухиди дуралайларда ярим ёввойи *f. raimi* шакли она сифатида иштирок этганда кўсақ вази юкори ҳамда ирсийланиши эса доминантлик ёки ўта доминантлик холатидалиги аниқланди.

G. barbadense L. ярим ёввойи ва маданий тропик кенжа тур шакллари чапиштириш туррухиди дуралай комбинацияларида ўрганилаётган белги ижобий, салбий гетерозис ва оралик холатда ирсийланиши аниқланди. Энг юкори кўрсаткич F₁ *f. raimi* x *f. brasiliense* дуралайда кузатилиб, кўсакаги пахта вази 2,8 г, ўзгарувчанлик амплитудаси 2,5-3,2 г гача, доминантлик коэффиценти h_r=8,0 га тенг бўлди. Йирик кўсақли subsp. *vitifolium* кенжа турини чапиштириш асосида олинган дуралай комбинацияларида оралик холатида ирсийланиш кузатилиди, яъни F₁ subsp. *vitifolium* x *f. raimi* комбинациясида битта кўсакаги пахта вази 3,7 г, ўзгарувчанлик амплитудаси 2,5-4,1 г гача, доминантлик коэффиценти эса h_r=0,2 га тенг эканлигини кўрсатимиз мумкин.

G. barbadense L. маданий тропик x маданий шакллари дуралайлаш туррухларининг F₁ ўсимликларида бу белги асосан оралик, салбий оралик, салбий гетерозис ва ўта доминант ирсийланиш холатлари кузатилиди. Жумладан, F₁ subsp. *vitifolium* x Қарши-8 реципрок комбинациясида битта

кўсақдаги пахта вази 4,3-4,5 г, ўзарувчанлик амплитудаси эса 3,8-4,9 г ни ташкил этган бўлса, шунга мос равишда доминантлик коэффициенти $hr=0,04$; $hr=0,04$ га тенг эканлигини кўришимиз мумкин. Туричи F_1 Қарши-8 x f_1 *brasiliense* реципрок дурағай комбинациясида битта кўсақдаги пахта вази 2,7-3,1 г, ўзарувчанлик амплитудаси эса 2,2-2,7 г.; 2,7-3,5 г., доминантлик коэффициенти эса $hr=5,0$; $hr=9,0$ ўта доминант ҳолатда ирсийланиши кузатилади.

G.barbadesense L. туричи хилма-хилликларига мансуб ярим ёввойи x маданий; маданий тропик x маданий тропик дурағайлаш турухларининг F_1 комбинацияларида битта кўсақдаги пахта вази ирсийланиши бўйича ўхшаш натижалар кузатилади.


Турлараро *G.darwinii* Watt тури билан *G.barbadesense* L. ярим ёввойи шакллари ўзаро дурағайлаш натижасида олинган F_1 -ўсимликларида бу белги асосан доминант ва ўта доминант ҳолатда ирсийланиши аниқланди. Факат F_1 *G.darwinii* Watt x f_1 *raipuri* реципрок комбинацияларида оралик ирсийланиш ҳолати кузатилади ирсийланди. Шунга мос равишда кўсақдаги пахта вази 2,0-2,1 г, ўзарувчанлик амплитудаси 1,5-2,6 г га тенг бўлган бўлса, F_1 *G.darwinii* Watt x f_1 *ishan nigra* (новотрант толали) реципрок дурағай комбинациясида битта кўсақдаги пахта вази 2,6-2,7 г, ўзарувчанлик амплитудаси 2,0-3,0 г ни ташкил этди ва ўта доминант ҳолатида ($hr=15,0$; $hr=17,0$) ирсийланиши кузатилади.

Ёввойи *G.darwinii* тури ва *G.barbadesense* L. маданий тропик кенжа тур шакллари дурағайлаш натижасида олинган F_1 -ўсимликларида хўжалик белгилардан бири битта кўсақдаги пахта вази белгиси бўйича F_1 *G.darwinii* Watt x f_1 *brasiliense* реципрок комбинациясида ўта доминантлик ($hr=5,0$; $hr=8,0$) ва F_1 *G.darwinii* x *subsp. vitifolium* реципрок дурағай комбинациясида салбий оралик ($hr=-0,1$; $hr=-0,3$) ҳолатида ирсийланиши аниқланди.

G.darwinii тури билан *G.barbadesense* L. маданий навларни турлараро дурағайлаш асосида олинган F_1 -ўсимликларида ижобий ўта доминант ва салбий оралик ҳолатида ирсийланиши аниқланди. F_1 *G.darwinii* x Қарши-8

реципрок комбинацияларида ижобий ўта доминант ҳолатда ($hr=4,0$; $hr=4,5$), F_1 Аш-8 x *G.darwinii* Watt реципрок дурағайларида эса салбий оралик ҳолатида ($hr=-0,1$; $hr=-0,8$) ирсийланиши кузатилади.

Ота-она намуналарида битта кўсақдаги пахта вази белгиси маданий Қарши-8 навида 2,3 г, маданий тропик *subsp. vitifolium* кенжа турида бу кўрсаткич таянган барча бошланғич манбалардан юқори 6,5 г ни ташкил этди. F_2 ўсимликларида битта кўсақдаги пахта вази белгиси бўйича гетерозис ҳолатидаги кўрсаткичлари нафақат сакланиб қолиши, шу билан бирга ошиши аниқланди. Ўранилган F_2 ўсимликларида битта кўсақдаги пахта вази белгиси бўйича ўзарувчанлик кўлами 4-6-7 синфни камраб олди. Масалан: F_2 Қарши-8 x *subsp. vitifolium* комбинациясида ўнг томонли трансгрессив ўзарувчанлик мавжуд эканлигини кўришимиз мумкин. Тахлил қилинган ўсимликларнинг энг кўп фоизи 4,0-4,9 г кўрсаткичи модал синфдартга (мос равишда 40,8 %) тўғри келди. Бундан ташқари, F_2 ўсимликларида кенг трансгрессив ўзарувчанлик кузатилиб, ўранилган 213 та ўсимликлар орасидан битта кўсақдаги пахта вази 5,0-5,9 г бўлган 45 та шакллар ҳамда ушбу белги бўйича 6,0-7,9 г ли 27 та рекомбинант шакллар инфратиб олишта муваффақ бўлинди (2-илова, 3,6-жадвал).



F₂ ўсимликларида битта кўсагдаги пахта вазни белгисининг ўзгарувчанлик кўлами

Туричи ва турлараро F ₂ дурагай комбинациялари	Ўсимлик сони ва фонзи, %	Синф n=10							Битта қўсагдаги пахта вазни, г			
		1,0- 1,9	2,0- 2,9	3,0- 3,9	4,0- 4,9	5,0- 5,9	6,0- 6,9	7,0- 7,9	$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	S	V %	h ²
		F ₂ -ўсимликлари										
F ₂ subsp.vitifolium x Қарши-8	206	5	14	33	79	48	19	8	4,9 ±0,21	0,44	23,0	63,1
	100	2,4	6,8	16,0	38,4	23,3	9,2	3,9				
F ₂ Қарши-8 x subsp.vitifolium	213	3	12	39	87	45	18	9	4,7 ±0,22	0,45	24,3	57,7
	100	1,4	5,6	18,4	40,8	21,1	8,5	4,2				
F ₂ f.brasiliense x subsp.vitifolium	212	33	74	57	23	17	8	-	2,9 ± 0,24	0,36	20,4	59,8
	100	15,6	34,9	26,9	10,8	8,0	3,8	-				
F ₂ subsp.vitifolium x f.brasiliense	208	12	36	93	43	13	9	2	3,7 ± 0,22	0,32	19,6	50,2
	100	5,8	17,3	44,7	20,7	6,2	4,3	1				
F ₂ Ам-8 x f.brasiliense	207	24	62	94	27	-	-	-	3,4 ± 0,20	0,32	19,6	53,0
	100	11,6	29,9	45,4	13,1	-	-	-				
F ₂ f.brasiliense x Ам-8	184	27	54	82	21	-	-	-	3,1 ± 0,19	0,29	18,1	49,1
	100	14,7	29,3	44,6	11,4	-	-	-				
F ₂ subsp.vitifolium x G.darwinii	193	17	41	79	31	15	7	3	3,9 ± 0,27	0,41	21,2	69,8
	100	8,8	21,3	40,9	16,0	7,8	3,6	1,6				
F ₂ G.darwinii x subsp.vitifolium	187	23	42	76	29	11	6	-	3,5 ± 0,26	0,38	20,3	65,8
	100	12,3	22,4	40,6	15,6	5,9	3,2	-				
F ₂ subsp.vitifolium x f.parnat	203	16	38	84	42	15	5	3	3,6 ± 0,28	0,43	22,1	60,2
	100	7,9	18,7	41,4	20,7	7,4	2,4	1,5				
F ₂ f.parnat x subsp. vitifolium	214	25	42	93	37	13	4	-	3,2 ± 0,21	0,32	19,7	46,0
	100	11,7	19,6	43,5	17,3	6,1	1,8	-				

Турлараро F₂ ўсимликларида битта кўсагдаги пахта вазни белгисининг наслдан наслга берилиш коэффициенти $h^2=46,0$ дан $h^2=69,8$ га тенг бўлди, бу эса тахлил қилинган белгининг 46,0-69,8 % и дурагай шаклининг генотиби, 30,2-54,0 % и эса ташки муҳит таъсирида ирсийланишини кўрсатди. Жумладан, F₂ subsp. *vitifolium* x *G. darwinii* комбинациясида битта кўсагдаги пахта вазни белгисининг наслдан наслга берилиш коэффициенти $h^2=69,8$ % га тенг бўлди, бу эса ўрганилган битта кўсагдаги пахта вазни белгисининг 69,8 % и дурагай шаклининг генотибига, 30,2 % и эса ташки муҳит таъсирида ирсийланганлигидан далолат беради.

Ўзининг кимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган битта кўсагдаги вазни бўйича энг кам синф, яъни нисбатан тор ўзгарувчанлик кўлами F₂ Ам-8 x f. *brasiliense* реципрок комбинациясида (4 та синф) эканлиги аниқланди. Ўсимликларнинг энг кўп фоизи 3,0-3,9 г кўрсаткичли модал синфларга (мос равишда 44,6 %) тўғри келди. Ўрганилган ушбу F₂ комбинацияларида битта кўсагдаги пахта вазни белгиси бўйича чап томонли симбий трансгрессив ўзгарувчанлик, яъни бошланғич манбаларининг энг паст кўрсаткичли чекка синфларидан 2 та синфга силжиши қайд этилди ҳамда бошланғич манбаларга нисбатан ҳам йирик кўсагли ўсимликлар ажралиб чиқиб ҳолати кузатилди.

Турлараро F₂ subsp. *vitifolium* x *G. darwinii* комбинациясининг F₁ ўсимликларида битта кўсагдаги пахта вазнининг ўртача кўрсаткичи 3,8 г, F₂ ўсимликларида эса бу кўрсаткич 3,9 г ни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин. Ўсимликларнинг энг кўп фоизи 3,0-3,9 г кўрсаткичли модал синфларга (мос равишда 40,9 %) тўғри келди. Бундан ташқари, F₂ ўсимликларида кенг трансгрессив ўзгарувчанлик кузатилиб, ўрганилган 193 та ўсимликлар орасидан битта кўсагдаги пахта вазни 4,0-5,9 г бўлган 46 та индивидлар ҳамда битта кўсагдаги пахта вазни 6,0-7,9 г ли 10 та шакллар битта мунафак бўлинди. Битта кўсагдаги пахта вазни бўйича ўнг томонли трансгрессив ўзгарувчанлик мавжудлиги генетик-селекцион нуктаи назардан муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бундан ташқари subsp. *vitifolium* кенжа

турининг асосий белгиларидан бири бўлган 4-5 чаноклилик хусусияти дурагай комбинацияларида намоён бўлиди, бу эса амалий селекция жараёнида ноёб бўлган йирик кўсаки интгика тоғали тизма ва навлар яратиш мумкинлигидан далолат беради.

3.5-8. F₁-F₂ ўсимликларида тоға узунлиги белгисининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги

Ўзадаги микдорий белгиларга хўжаликда аҳамиятга эга бўлган кўп белгиларидан тоға узунлигининг генетик назорати ҳақида олимларнинг турлича қарашлари мавжуд. Н.Г. Симонгулян, С. Мухамедханов, А. Шафрин [1987] ўзанинг *G. barbadense* L. навида ушбу белги ҳам доминант, ҳам рецессив генлар ёки бу генларнинг турлича нисбати билан бошқарилишини таъкидлаган.

М.Ф. Абзалов [1991] ўзанинг ўрта тоғали турида тоғанинг шаклланиши мураккаб белги бўлиб, генларнинг ўзаро таъсири назоратида ўтишини таъкидлайди.

Ўзанинг интгика тоғали юқори авлод F₄-6 дурагайларининг 3-4 чанокли кўсақларида тоға узунлиги, битта дўшпақдони пахта вазни белгилари кўрсаткичлари сезиларли даражада юқори бўлганлиги аниқланган. Териб олинган 3-4 чанокли кўсақларни таҳлил қилган ҳамда кейинги йил чаноклар сони бўйича алоҳида экиб ўрганишган. Олинган юқори авлод дурагайларида тоға узунлиги белгиси кейинги авлодларда ҳам сақланиб қоллишини кузатишган ва селекция тадқиқот ишларига бошлангич манба сифатида тавсия этганлар С.А. Усманов, Ф.Р. Абдиев [2012].

G. barbadense L. турининг туричи хилма-хилликларининг (кенжа турлари, шакллари) ҳамда турлараро ёввойи *G. darwinii* Watt турининг тоға узунлиги белгисини ўрганиш натижасида юқори кўрсаткич, кутилганидек маданий Қарши-8 навида (37,0 мм) кузатишган бўлса, Аш-8 навида тоға узунлиги бироз паст 28,0 мм ни кайд этилиди. Ўзанинг ёввойи *G. darwinii* Watt тури эса бу кўрсаткич билан (30,5 мм) характерланди. Тоға узунлиги белгиси бўйича паст кўрсаткичлар (16,8-28,7 мм) ярим ёввойи кенжа турда

3.7-жадвал

Бошлангич манбалар ва F₁-ўсимликларида тоға узунлиги белгисининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги

№	Бошлангич манбалар ва F ₁ авлод комбинациялари	Таҳлил қилинган кўсақлар сони, дон	Тола узунлиги, мм				
			$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	limit	S	V %	hp
Бошлангич манбалар							
1	<i>G.darwinii</i> Watt	10	30,5 ± 0,60	28,0-34,0	1,90	6,2	-
2	subsp. <i>ruderale</i> f. <i>pisco</i>	10	16,8 ± 0,59	14,0-20,0	1,85	10,9	-
3	subsp. <i>ruderale</i> f. <i>parnat</i>	10	19,4 ± 0,40	18,0-22,0	1,26	6,4	-
4	subsp. <i>ruderale</i> f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	24,2 ± 0,51	23,0-28,0	1,62	6,6	-
5	subsp. <i>ruderale</i> f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	23,3 ± 0,45	22,0-26,0	1,41	6,0	-
6	subsp. <i>vitifolium</i>	10	28,5 ± 0,61	26,0-32,0	1,73	6,9	-
7	subsp. <i>vitifolium</i> f. <i>brasiliense</i> (к. п-ли)	10	24,9 ± 0,62	23,0-28,0	1,96	7,8	-
8	subsp. <i>vitifolium</i> f. <i>brasiliense</i>	10	28,7 ± 0,63	26,0-32,0	2,00	6,9	-
9	subsp. <i>eubarbadense</i> (Аш-8 нави)	10	28,0 ± 0,38	25,6-30,0	1,19	4,2	-
10	subsp. <i>eubarbadense</i> (Қарши-8 нави)	10	37,0 ± 0,60	30,0-36,0	1,89	5,6	-
F ₁ -ўсимликлари							
Турлараро дурагайлаш (<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>ruderale</i> (ярим ёввойи))							
1	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>parnat</i>	10	35,6 ± 0,18	34,6-36,3	0,58	1,6	1,9
2	f. <i>parnat</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	34,2 ± 0,30	33,0-35,3	0,95	2,7	1,6
3	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>pisco</i>	10	32,7 ± 0,66	28,6-34,6	2,09	6,3	1,3
4	f. <i>pisco</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	29,0 ± 1,21	25,3-30,0	3,81	13,1	0,78
5	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	32,5 ± 0,53	30,0-34,3	1,59	5,1	1,6
6	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	36,7 ± 0,26	35,3-38,0	0,83	2,2	2,9
7	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	35,4 ± 0,41	33,3-37,6	1,28	3,6	2,3
8	f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	35,3 ± 0,37	33,0-36,3	1,17	3,3	2,3

G.darwinii Watt x subsp.vitifolium (маданий тропик)							
9	G.darwinii Watt x subsp.vitifolium	10	29,6 ± 0,48	27,4-31,5	2,24	5,1	0,1
10	subsp.vitifolium x G.darwinii Watt	10	31,2 ± 0,75	28,0-34,0	1,83	5,3	1,7
11	G.darwinii Watt x f.brasiliense (қ. п-ли)	10	35,3 ± 0,88	30,0-38,0	2,79	7,9	2,7
12	f.brasiliense (қ. п-ли) x G.darwinii Watt	10	35,1 ± 0,98	30,0-38,0	3,11	8,8	2,6
13	G.darwinii Watt x f.brasiliense	10	35,1 ± 0,14	34,3-35,6	0,44	1,2	6,1
14	f.brasiliense x G.darwinii Watt	10	34,3 ± 0,29	32,0-37,0	1,26	4,8	5,2
G.darwinii Watt x ssp.eubarbadense (маданий навлар)							
15	G.darwinii Watt x Қарши-8	10	35,8 ± 0,96	31,0-39,6	3,03	8,4	0,63
16	Қарши-8 x G.darwinii Watt	10	36,9 ± 0,64	35,6-40,0	1,81	5,5	0,96
17	G.darwinii Watt x Аш-8	10	34,6 ± 0,33	33,0-35,6	1,05	3,0	4,2
18	Аш-8 x G.darwinii Watt	10	34,3 ± 0,30	33,0-36,0	0,95	2,7	4,0
Туричи дурагайлаш (subsp. rudemale (ярим ёввойи) x subsp. rudemale (ярим ёввойи))							
19	f.parnat x f.pisco	10	23,8 ± 0,49	21,3-26,0	1,59	6,5	4,3
20	f.pisco x f.parnat	10	21,1 ± 0,50	18,6-24,0	1,57	7,4	2,3
21	f.parnat x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	33,7 ± 0,35	32,0-34,6	1,10	3,2	4,9
22	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.parnat	10	33,2 ± 0,51	30,0-35,0	1,60	4,8	4,7
23	f.parnat x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	32,5 ± 0,55	29,6-35,0	1,74	5,3	5,7
24	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.parnat	10	32,7 ± 0,39	20,6-24,0	1,22	5,3	5,8
25	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	32,9 ± 0,51	30,6-36,0	1,60	4,8	20,3
26	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	29,3 ± 0,49	27,3-31,6	1,56	5,2	12,3
27	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.pisco	10	33,6 ± 0,40	31,3-35,3	1,26	3,7	3,5
28	f.pisco x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	31,1 ± 0,39	29,3-32,6	1,22	3,9	2,8
29	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.pisco	10	33,4 ± 0,28	32,6-35,0	0,88	2,6	4,6
30	f.pisco x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	31,9 ± 0,30	30,6-33,3	0,95	2,9	4,0
subsp. rudemale (ярим ёввойи) x subsp.vitifolium (маданий тропик)							
31	f.pisco x subsp.vitifolium	10	33,4 ± 0,37	31,0-36,0	1,82	4,3	1,8
32	subsp.vitifolium x f.pisco	10	35,6 ± 0,31	33,0-37,0	1,72	3,8	2,2
33	subsp.vitifolium x f.parnat	10	31,8 ± 0,43	28,0-33,0	1,26	5,4	1,7
34	f.parnat x subsp.vitifolium	10	29,3 ± 0,26	26,0-32,0	1,38	5,2	1,1
35	subsp.vitifolium x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	33,5 ± 0,32	30,0-35,0	1,47	4,9	3,3

давоми							
36	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x subsp.vitifolium	10	32,1 ± 0,29	30,0-35,0	1,62	5,7	2,6
37	subsp.vitifolium x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	34,2 ± 0,38	30,0-37,0	1,43	6,4	3,1
38	f.ishan nigeria (н. т-ли) x subsp.vitifolium	10	32,6 ± 0,29	30,0-34,0	1,52	4,6	2,5
39	f.parnat x f.brasiliense (қ. п-ли)	10	32,4 ± 0,55	29,0-35,0	1,74	5,3	3,7
40	f.brasiliense (қ. п-ли) x f.parnat	10	31,6 ± 0,49	28,0-33,0	1,54	4,8	3,4
41	f.brasiliense (қ. п-ли) x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	32,8 ± 0,44	30,3-35,0	1,38	4,2	10,8
42	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.brasiliense (қ. п-ли)	10	33,5 ± 0,32	32,0-35,0	1,00	2,9	11,7
43	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.brasiliense (қ. п-ли)	10	34,5 ± 0,25	33,6-36,0	0,80	2,3	28,4
44	f.brasiliense (қ. п-ли) x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	35,1 ± 0,34	34,0-36,6	1,07	3,0	30,1
45	f.pisco x f. brasiliense (қ. п-ли)	10	28,0 ± 0,17	27,6-29,0	0,53	1,8	1,7
46	f.brasiliense (қ. п-ли) x f.pisco	10	28,7 ± 0,35	26,6-29,6	1,10	3,8	1,9
47	f.brasiliense x f.parnat	10	33,7 ± 0,31	30,0-36,0	1,19	6,7	2,0
48	f.parnat x f.brasiliense	10	35,8 ± 0,42	34,0-38,0	1,32	3,6	2,5
49	f. brasiliense x f. pisco	10	31,8 ± 0,37	28,0-33,0	1,59	4,2	1,5
50	f. pisco x f. Brasiliense	10	34,9 ± 0,42	32,6-37,0	1,33	3,8	2,0
51	f.brasiliense x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	32,4 ± 0,34	29,0-35,0	1,85	6,3	2,6
52	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.brasiliense	10	30,5 ± 0,37	27,0-33,0	2,13	6,9	1,8
53	f.brasiliense x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	33,4 ± 0,43	31,0-35,0	1,69	4,8	2,7
54	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.brasiliense	10	31,1 ± 0,52	28,6-33,3	1,64	5,2	1,8
rudemale (ярим ёввойи) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
55	f.pisco x Қарши-8	10	29,4 ± 0,43	27,0-30,6	1,37	4,6	0,24
56	Қарши-8 x f.pisco	10	28,7 ± 0,49	25,6-30,3	1,53	5,3	0,17
57	f.pisco x Аш-8	10	27,7 ± 0,22	27,0-28,6	0,68	2,4	0,94
58	Аш-8 x f.pisco	10	33,0 ± 0,27	32,0-34,3	0,85	2,5	1,8
59	f.parnat x Қарши-8	10	33,0 ± 0,38	30,6-35,0	1,19	3,6	0,54
60	Қарши-8 x f.parnat	10	32,7 ± 0,44	30,0-34,3	1,38	4,2	0,51
61	f.parnat x Аш-8	10	32,4 ± 0,58	29,3-34,6	1,82	6,1	2,0
62	Аш-8 x f.parnat	10	33,2 ± 0,50	30,0-35,3	1,59	4,7	2,2
63	Қарши-8 x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	37,5 ± 0,35	36,6-40,3	1,10	2,9	1,0
64	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x Қарши-8	10	37,4 ± 0,21	37,0-39,0	0,65	1,7	1,0

							давоми
65	Аш-8 x <i>f.ishan nigeria</i> (ок толали)	10	35,7 ± 0,31	34,0-37,0	0,99	2,7	5,0
66	<i>f.ishan nigeria</i> (ок т-ли) x Аш-8	10	33,3 ± 0,34	32,0-35,3	1,07	3,2	3,7
67	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x Аш-8	10	32,8 ± 0,39	31,3-36,0	1,23	3,7	3,0
68	Аш-8 x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	35,2 ± 0,31	34,0-36,6	0,97	2,7	4,0
69	Қарши-8 x <i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	37,4 ± 0,29	36,0-40,0	0,91	2,4	1,0
70	<i>f.ishan nigeria</i> (н. т-ли) x Қарши-8	10	37,4 ± 0,21	36,3-38,3	0,66	1,7	1,0
subsp.vitifolium (маданий тропик) x subsp.vitifolium (маданий тропик)							
71	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x <i>f.brasiliense</i>	10	30,1 ± 0,26	28,6-30,6	0,82	2,7	1,7
72	<i>f.brasiliense</i> x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	32,5 ± 0,34	29,0-34,0	1,19	5,6	3,0
73	ssp.vitifolium x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	34,2 ± 0,40	30,0-36,0	1,12	6,4	4,1
74	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x subsp.vitifolium	10	32,7 ± 0,31	30,0-35,0	1,43	5,2	3,3
75	subsp.vitifolium x <i>f.brasiliense</i>	10	29,8 ± 0,24	28,0-32,0	1,23	4,2	12,0
76	<i>f.brasiliense</i> x subsp.vitifolium	10	29,4 ± 0,29	28,0-31,0	1,34	3,6	8,0
subsp.vitifolium (маданий тропик) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
77	subsp.vitifolium x Қарши-8	10	38,7 ± 0,31	37,0-41,0	1,08	4,7	1,4
78	Қарши-8 x subsp.vitifolium	10	39,1 ± 0,20	38,0-41,0	1,27	3,4	1,4
79	subsp.vitifolium x Аш-8	10	34,2 ± 0,34	32,0-37,0	1,17	5,2	23,8
80	Аш-8 x subsp.vitifolium	10	35,4 ± 0,28	33,0-37,0	0,90	4,6	28,6
81	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x Қарши-8	10	35,1 ± 0,24	34,3-36,0	0,75	2,1	0,68
82	Қарши-8 x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	35,4 ± 0,34	34,3-37,0	1,07	3,0	0,73
83	<i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли) x Аш-8	10	33,3 ± 0,39	31,6-34,2	1,22	3,6	4,4
84	Аш-8 x <i>f.brasiliense</i> (қ. п-ли)	10	33,1 ± 0,28	32,0-34,0	0,88	2,6	4,2
85	Қарши-8 x <i>f.brasiliense</i>	10	35,3 ± 0,28	34,0-38,0	0,89	2,5	0,59
86	<i>f.brasiliense</i> x Қарши-8	10	33,6 ± 0,27	31,0-35,0	1,24	3,3	0,18
87	Аш-8 x <i>f.brasiliense</i>	10	34,7 ± 0,38	33,0-36,0	1,20	3,4	18,1
88	<i>f.brasiliense</i> x Аш-8	10	32,1 ± 0,42	29,0-34,0	1,43	5,3	10,7
subsp.eubarbadense (маданий навлар) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
89	Аш-8 x Қарши-8	10	36,8 ± 0,28	34,0-38,0	1,16	4,9	0,95
90	Қарши-8 x Аш-8	10	37,6 ± 0,37	35,0-40,0	1,28	5,8	1,1

(рудерал) шаклларда энг паст кўрсаткичлар эса *f. rīso* (16,8 мм), *f. rānī* (19,4 мм), маданий тропик subsp. *vīfōlīm* кенжа турида 28,5 мм, бироз паст кўрсаткич subsp. *vīfōlīm* *f. brasiliense* (қизил поял) шаклида 24,9 мм ни таъкид этди (3.7-жадвал).

Турчи *G.vitidense* L. рудерал (ярим ёввойи) шакллари ўзаро дурағайлаш натижасида олинган F₁ ўсимликларида ўрганилаётган тола узунлиги белгиси бўйича самарали натижалар кузатилиб, ушбу турухдаги барча дурағай комбинацияларида ўта доминантлик ҳолатда ирсийланиши аниқланди. Масалан, *f. ishan nigeria* (ок толали) x *f. ishan nigeria* (новотрант толали) реципрок дурағай комбинациясида тола узунлиги белгиси бўйича кўрсаткич ($h_r=12,3$; $h_r=20,3$) ўта доминантлик ҳолатда ирсийланиши кузатилиди. Ўзанинг *G.vitidense* L. турчи ярим ёввойи x маданий тропик кенжа тур турухига мансуб шакллари турчи дурағайлаш асосида олинган F₁-ўсимликларида ўрганилаётган тола узунлиги белгиси бўйича F₁ *f. rānī* x subsp. *vīfōlīm* комбинациясида оралик ($h_r=0,9$), F₁ *f. brasiliense* x *f. rīso* дурағай комбинациясида тола узунлиги бўйича доминант ($h_r=1,5$), F₁ *f. brasiliense* (қизил поял) x *f. ishan nigeria* (ок толали) дурағай комбинацияларида тола узунлиги белги бўйича ўта доминант ($h_r=30,1$) ирсийланиш ҳолатлари кайд этилди.

G.vitidense L. рудерал кенжа турига мансуб шакллари маданий навлар билан дурағайлаш натижасида олинган F₁ ўсимликларида ўта доминантлик ва айрим ҳолларда тўлиқсиз доминантлик, оралик ҳолатда ирсийланиши аниқланган бўлса, маданий тропик x маданий навларни ўзаро чаппастириш натижасида олинган дурағайларда тола узунлиги белгиси ўта доминантлик ҳолатда ирсийланиши кузатилиди.

Тажрибада *G.vitidense* L. ярим ёввойи кенжа турига мансуб шакллари ёввойи *G.davīnī* Watt тури билан турларо дурағайлаш натижасида олинган комбинацияларида тола узунлиги белгиси бўйича ўта доминантлик шаклида, фақат F₁ *f. rīso* x *G.davīnī* Watt дурағай комбинациясида тола узунлиги белги бўйича ўртача кўрсаткичи 29,0 мм,

F₂ ўсимликларида тола узунлиги белгисининг ўзгарувчанлик кўлами

F ₂ -ўсимликларида тола узунлиги белгисининг узгарувчанлик кулами																
F ₂ дурагай комбинациялари	Ўсимлик сонини ва фони, %	Синф n=2											Тола узунлиги, мм			
		21-22,9	23-24,9	25-26,9	27-28,9	29-30,9	31-32,9	33-34,9	35-36,9	37-38,9	39-40,9	41-42,0	$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	S	V %	h ²
F ₂ -ўсимликлари																
subsp.vitifolium x Қарши-8	206	-	-	-	3	5	9	8	36	78	42	25	38,9 ± 0,18	2,5	6,9	69,8
	100	-	-	-	1,5	2,4	4,4	3,9	17,4	37,9	20,4	12,1				
Қарши-8 x subsp.vitifolium	213	-	-	-	3	6	10	25	72	43	29	25	39,3 ± 0,16	2,4	6,2	67,6
	100	-	-	-	1,4	2,8	4,7	11,8	33,8	20,2	13,6	11,7				
f.brasiliense x subsp.vitifolium	212	4	9	26	35	49	54	27	5	3	-	-	30,6 ± 0,24	3,1	11,9	77,0
	100	1,9	4,2	12,3	16,5	23,1	25,5	12,7	2,4	1,4	-	-				
subsp.vitifolium x f.brasiliense	208	2	5	18	39	43	69	20	8	4	-	-	31,4 ± 0,21	3,2	12,6	78,9
	100	1	2,4	8,6	18,8	20,7	33,2	9,6	3,8	1,9	-	-				
Ам-8 x f.brasiliense	207	-	-	4	12	24	30	58	35	23	13	8	35,4 ± 0,27	2,9	12,1	82,4
	100	-	-	1,9	5,8	11,6	14,5	28,0	16,9	11,1	6,3	3,9				
f.brasiliense x Ам-8	184	-	4	11	21	29	57	32	16	9	5	-	33,2 ± 0,25	2,6	11,7	76,6
	100	-	2,2	5,9	11,4	15,8	31,0	17,4	8,7	4,9	2,7	-				
subsp.vitifolium x G.darwinii	193	-	6	12	23	37	62	28	17	8	-	-	31,3 ± 0,17	2,3	5,9	60,1
	100	-	3,1	6,2	12,0	19,2	32,1	14,5	8,8	4,1	-	-				
G.darwinii x subsp.vitifolium	187	-	6	19	38	59	27	18	13	7	-	-	30,1 ± 0,14	2,7	11,4	69,9
	100	-	3,2	10,2	20,3	31,6	14,4	9,6	7,0	3,7	-	-				
subsp.vitifolium x f.parnat	203	5	13	21	33	67	38	14	8	4	-	-	30,8 ± 0,22	2,9	12,8	84,7
	100	2,5	6,4	10,3	16,3	33,0	18,7	6,9	3,9	2,0	-	-				
f.parnat x subsp. vitifolium	214	9	17	27	43	61	32	13	8	4	-	-	29,3 ± 0,26	3,2	12,9	86,8
	100	4,2	7,9	12,6	20,1	28,5	15,0	6,1	3,7	1,9	-	-				


Ўзгарувчанлик амплитудаси 25,3-30,0 мм ва шунга мос равишда вариация коэффициенти 13,1 % ни ташкил этган бўлса, ушбу белги бўйича доминантлик коэффициенти ($h^2=0,7$) оралик ҳолатда ирсийланиши аниқланди.

Ёввойи *G. darwinii* Watt турини *G. barbadense* L. нинг маданий тропик ва субтропик шакллари билан ўзаро чаतिштириш натижасида олинган дурагайларда тола узунлиги белгиси тўлиқсиз доминантлик, ўта доминантлик ҳолатида ирсийланиши кузатилади. Туричи ва турлараро F₁ дурагай комбинацияларида тола узунлиги ижобий доминант, ўта доминант ва айрим ҳолларда тўлиқсиз доминант ҳолатда ирсийланиши кузатилади.

Туричи ва турлараро дурагайлаш натижасида олинган F₂ ўсимликларида фўзанинг кимматли хўжалик кўрсаткичларидан бири бўлган тола узунлиги белгиси таҳлил қилинди. Ота-она намуналарида тола узунлиги белгиси subsp. *evbarbadense* кенжа турига мансуб маданий Қарши-8 навида 37,0 мм, маданий тропик subsp. *vitifolium* кенжа турига бу кўрсаткич биров пист 28,5 мм ни ташкил этди. Дурагайлаш натижасида олинган F₂ ўсимликларида ушбу белги бўйича ўзгарувчанлик кўлами 8-9 синфни қамраб олди (3-илова, 3.8-жадвал). Масалан: туричи F₂ Қарши-8 x subsp. *vitifolium* комбинациясида ўнг томонли трансгрессив ўзгарувчанлик мавжуд эканлигини кўришимиз мумкин. Таҳлил қилинган ўсимликларнинг энг кўп фонзи тола узунлиги белгиси 37,0-38,9 мм кўрсаткичли модал синфларга (шунга мос равишда 38,0 %) тўғри келди. Бундан ташқари, таҳлил қилинган F₂ ўсимликларида кенг трансгрессив ўзгарувчанлик кузатилиб, ўртанилган 213 та ўсимликлар орасидан тола узунлиги белгиси 39,0-40,9 мм бўлган 28 та шакллар ҳамда 41,0-42, мм. ли 22 та рекомбинант шакллар олишга муваффақ бўлинди.

Фўзанинг кимматли хўжалик кўрсаткичларидан бири бўлган тола узунлиги белгиси бўйича нисбатан камроқ синф, яъни нисбатан тор ўзгарувчанлик кўлами F₂ *f. parnat* x subsp. *vitifolium* реципрок дурагай комбинациясида (8 та синф) эканлиги аниқланди. Ўсимликларнинг энг кўп

фони 29,0-30,9 мм кўрсаткичи модал синфларга (мос равишда 28,5 %) тўғри келди. Ўрганилган ушбу F_2 комбинацияларида тола узунлиги белгиси бўйича чап томонли саббий трансрессив ўзгарувчанлик, яъни бошланғич манбаларнинг энг паст кўрсаткичи чекка синфларидан 3 та синфа силжиш кайди этилиди ҳамда бошланғич манбаларга нисбатан ҳам толаси узун бўлган ўсимликлар ажралиб чиқиш ҳолати кузатилиди, яъни тола узунлиги 37,0-38,9 мм бўлган 4 та трансрессив шакллар ажратиб олинган.



Ота-она шакллар ва уларнинг F_1 - F_2 ўсимликларида тола узунлиги белгисининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги.

Турлараро F_2 *G.darwini* x *subsp. vitifolium* дурагай комбинациясининг F_1 авлодида тола узунлигининг ўртача кўрсаткичи 29,6 мм, F_2 ўсимликларида эса бу кўрсаткич 30,1 мм ни ташкил этди. Тола узунлиги белгиси бўйича ўрганилган ўсимликларнинг энг кўп фони 29,0-30,9 мм кўрсаткичи модал синфларга (мос равишда 31,6 %) тўғри келди. Бундан ташқари, F_2 ўсимликларида тола узунлиги белгиси бўйича кенг трансрессив ўзгарувчанлик кузатилиди.

F_2 ўсимликларида тола узунлиги белгисининг наслдан наслга берилиш коэффициенти $h^2=60,1$ % дан $h^2=86,8$ % га тенг бўлди, бу эса тахлил қилинган белгининг 60,1-86,8 % и дурагай шаклнинг генотиби, 13,2-39,9 % и эса ташқи

муҳит таъсирида ирсийланишини кўрсатди. Масалан, туричи F_2 *f. raiini* x *subsp. vitifolium* комбинациясида тола узунлиги белгисининг наслдан-наслга берилиш коэффициенти $h^2=86,8$ % га тенг бўлди, бу эса ўрганилган тола узунлиги белгисининг 86,8 % и генлар, 13,2 % и ташқи муҳит таъсири ҳисобида ирсийланганлигини кўрсатди.

Тадқиқотлар тахлили шуни кўрсатдики, тола узунлиги белгиси бўйича туричи ва турлараро дурагайлаш натижасида олинган F_1 -ўсимликларида асосан гетерозис ҳолати кузатилган бўлса, яъни бошланғич манбаларга нисбатан юқори кўрсаткичлар кузатилиди. Ўрганилган F_2 ўсимликларида гетерозис ҳолати сақланган ҳолда, тола узунлиги юқори бўлган (41,0-42,0 мм) шакллар ажратиб олинди. Ажратиб олинган тола узунлиги юқори бўлган дурагай шакллари генетик-селекцион тадқиқотлар учун қимматли бошланғич минба сифатида фойдаланиш юқори самара беради.

3.6-§. F_1 - F_2 ўсимликларида тола чиқими белгисининг ўзгарувчанлиги ва ирсийланиши

Ўўзанинг асосий махсулоти тола чиқими ҳисобланади ва унинг миқдорини ошириш катта амалий аҳамиятга эгадир. Тола чиқимини ирсийланишини ўрганишда кўплаб маҳаллий ва чет эл олимлари илмий изланишлар олиб борганлар Ш.Э. Намазов ва бош. [2011], Н.Э. Чоршанбиев [2005], Н.Э. Чоршанбиев, С.М. Набиев, Х.Х. Матнизова [2017], Я. Бабаев ва бош. [2006], Г.Р. Холмуродова, Г.П. Джумаева [2013], Д.К. Эрназарова ва бош. [2010], У.А. Автономов et al. [2017], ғўзанинг туричи, турлараро ва нимадаро чаतिштиришлар олиб бориб, олинган дурагайларда бу белгининг ирсийланиш харақтерини ўрганиш тўғрисида изланишлар олиб боришган.

Н.Г. Симонгулян, П.Ш. Ибрагимовларнинг [1985] маълумотларида кўра, ғўзанинг интичка толали Ашхабод-25 навида тола чиқими белгисини рецессив генлар томонидан бошқарилишини аниқлаганлар. Бу эса дурагайлашда ушбу навадан фойдаланилганда, мазкур белгилар бўйича олинган ишлари уларнинг генетик моҳиятини ҳисобга олган ҳолда юқори

авлодларга ўтказиш лозимлигини билдиради. Улар шу асосда олиб борилган изланишлар натижасида вариацион каторнинг ўрта қисмида жойлашган ўсимликларнинг кейинги авлодларида тола сифати ва чикими бўйича кимматли трансгрессив шакллари пайдо бўлишини кузатишган. Ёўза асосий компонентларидан бири ҳисобланган тола чикими белгисини назорат қилувчи генлар, чагиштирилаётган ота-она шакллариининг генотипига боғлиқ бўлган ҳолда, улардан бирининг устуңлиқ ёки ўта устуңлиқ қилиши мумкинлигини аниқлаганлар.

Д.А. Мусаев, М.Ф. Абзалов [1972] ёўзани тур ичида дурағайлашда тола чикими полиген тарзда ирсийланиши ва генларнинг мураккаб ўзаро таъсири асосида юзата қелиши ҳамда икки турх генлар ёрдамида бошқарилиши кузатишган.

В.А. Автономов, П.Ш. Ибрагимов [1994] ўз тадқиқотларида, ёўзаниннг инитичка толали навларини дурағайлаш асосида олинган F₁-F₂ ўсимликларида тола чикими белгиси ота-она шаклларида нисбётан оралик ўрнини эгаллашини ҳамда ушбу белги бўйича кўрсаткичлари юқори бўлган ота-она шакллари томонига оғшини айтиб ўтишган.

M.R. Chaudry [2003] маълумотиға кўра, дунё бўйича пахта етиштирадиган кўплаб мамлакатларда яратилаётган ёўза навларини аксаритининг тола чикими 39,0-40,0 % бўлиб, гектаридан 1,3-1,7 тонна сифатли тола хомашёси олинган.

С.А. Усманов ва бошқалар [2007] томонидан *G. barbadense* L. тури географик узок бўлган дурағайларнинг юқори авлодларида айрим хўжалик белгилари орасидати генетик боғлиқлик ўрганилган. Уларнинг таҳлилига кўра, ўзгартувчанлик коэффициенти F₈ авлодига бориб деярли барча белгилар бўйича андоза навлардан фарқланмаганлигини, тола чикими орттиши билан унинг узўнлиги, битта кўсақдаги пахта вазинининг орттиши билан узўнлиги, 1000 дона чипит вазинининг орттиши билан тола чикимининг камайганлигини таъкидлашган.

Тадқиқотлар натижаларининг таҳлилидан кўриниб турибдики (3,9-жадвал), танлаб олинган бошланғич манбаларда тола чикими белгиси турлича бўлиб, маданий шаклларидаан Аш-8 ва Қарши-8 навларида кўрсаткич юқори, яъни ушбу кўрсаткич 34,0 - 37,2 % ни ташкил этган бўлса, ёўзаниннг ёввойи *G. delavii* Watt турида эса тола чикими белгиси бўйича (26 %) га тенг бўлди. Тадқиқот учун танлаб олинган бошланғич манбалар ичидан тола чикими белгиси бўйича энг паст кўрсаткич, 20,5 % ни натижа ярим ёввойи (рудерал) кенжа турига мансуб *G. rivo* шаклида бўлганлиги аниқланди.

G. barbadense L. турининг кенжа тур вакилларини чагиштириш натижасида олинган F₁ реципрок дурағайларида тола чикими белгиси асосан салбий гетерозис оралик ва айрим ҳоллардагина доминант ёки ўта доминант ҳолатларда ирсийланиши кузатишди.

Туричи ярим ёввойи шаклларини ўзаро дурағайлаш натижасида олинган F₁-ўсимликларда ўрганилаётган белги бўйича турли натижалар кузатилиб, турххдаги дурағай комбинацияларда F₁ *f. ishan nigra* (ок толали) $\times$ *f. rami* (*br*=11,0) салбий гетерозис, F₁ *f. ishan nigra* (новотранг толали) $\times$ *f. rami* (*br*=0,7) оралик, F₁ *f. rivo* $\times$ *f. ishan nigra* (новотранг толали) (*br*=2,9) комбинацияларида ўта доминантлик ҳолатлари аниқланди.

Энг юқори натижалар ярим ёввойи кенжа турига мансуб туричи шакллари *subsp. eibarbadense* кенжа турига мансуб маданий навлар (Қарши-8, Аш-8) билан чагиштириш натижасида олинган дурағай комбинацияларида кузатишди. Тола чикими белгисининг ўртача кўрсаткичлари 26,0-37,1 % ни ташкил этди. Бу дурағай комбинацияларида тола чикими оралик ёки салбий гетерозис ҳолда ирсийланди. F₁ Аш-8 $\times$ *f. ishan nigra* (ок толали), F₁ Аш-8 $\times$ *f. ishan nigra* (новотранг толали) дурағай комбинацияларида тола чикими 36,5-37,1 % ни ташкил этиб, Аш-8 нини оналик шакли сифатида иштирок этганда шундай кўрсаткичлар кузатишди. доминантлик коэффициенти *br*=0,7, *br*=0,9 тенг бўлиб, ирсийланиш оралик ҳолда, ушбу белги бўйича юқори бўлган (Аш-8 37,2 %) шаклига оғиш кузатишди. Ва аксинча, маданий Аш-8 нави оталик шакли

**Бошланғич манбалар ва F₁-ўсимликларида тола чиқими белгисининг
ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги**

ирсинланиши ва узгарувчанлиги							
№	Бошлангич манбалар ва F1 авлод комбинациялари	Тахлил қилинган қўсақлар сони, дона	Тола чиқими, %				
			$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	Limit	S	V %	hp
Бошлангич манбалар							
1	<i>G.darwinii</i> Watt	10	26,0 ± 0,42	24,0-28,0	1,33	5,1	-
2	subsp. <i>ruderales</i> f. <i>pisco</i>	10	20,5 ± 0,62	18,0-24,0	1,96	9,5	-
3	subsp. <i>ruderales</i> f. <i>parnat</i>	10	30,2 ± 0,68	28,0-33,0	2,15	7,1	-
4	subsp. <i>ruderales</i> f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	30,4 ± 0,64	28,0-33,0	2,50	6,2	-
5	subsp. <i>ruderales</i> f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	24,5 ± 0,50	22,0-27,0	1,58	6,4	-
6	subsp. <i>vitifolium</i>	10	28,4 ± 0,64	26,0-32,0	1,87	7,0	-
7	subsp. <i>vitifolium</i> f. <i>brasiliense</i> (к. п-ли)	10	29,5 ± 0,62	26,0-32,0	1,96	6,6	-
8	subsp. <i>vitifolium</i> f. <i>brasiliense</i>	10	28,4 ± 0,64	26,0-32,0	2,01	7,0	-
9	subsp. <i>eubarbadense</i> (Аш-8 нави)	10	37,2 ± 0,47	35,0-39,0	1,48	3,9	-
10	subsp. <i>eubarbadense</i> (Қарши-8 нави)	10	34,0 ± 0,63	30,0-36,0	2,00	5,8	-
F1-ўсимликлари							
Турлараро дурагайлаш (<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>ruderales</i> (ярим ёввойи))							
1	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>parnat</i>	10	29,3 ± 0,71	26,0-32,0	2,24	7,6	0,57
2	f. <i>parnat</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	29,8 ± 0,65	27,0-32,0	2,06	6,9	0,80
3	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>pisco</i>	10	25,4 ± 0,58	22,0-27,0	1,84	7,2	0,78
4	f. <i>pisco</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	20,8 ± 0,66	18,0-24,0	2,10	10,0	-0,89
5	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	37,3 ± 0,56	34,0-39,0	1,77	4,7	4,1
6	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	38,3 ± 0,68	35,0-40,0	2,16	5,6	4,5
7	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	33,0 ± 0,52	30,0-34,0	1,64	4,9	10,3
8	f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	31,0 ± 0,62	29,0-34,0	1,94	6,2	7,6
<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>vitifolium</i> (маданий тропик)							
9	<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>vitifolium</i>	10	29,3 ± 0,39	28,0-31,0	1,52	4,9	1,7

							давоми
10	subsp. <i>vitifolium</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	30,4 ± 0,43	28,0-32,0	1,47	5,1	2,6
11	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>brasiliense</i> (к. п-ли)	10	26,2 ± 0,44	24,0-28,0	1,40	5,3	-0,88
12	f. <i>brasiliense</i> (к. п-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	31,1 ± 0,55	28,0-33,0	1,73	5,5	1,9
13	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>brasiliense</i>	10	27,6 ± 0,56	26,0-30,0	1,78	6,4	0,33
14	f. <i>brasiliense</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	29,4 ± 0,62	26,0-32,0	1,62	6,8	1,8
<i>G.darwinii</i> Watt x ssp.<i>eubarbadense</i> (маданий навлар)							
15	<i>G.darwinii</i> Watt x Қарши-8	10	30,1 ± 0,66	27,0-33,0	2,08	6,9	0,02
16	Қарши-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	10	28,1 ± 0,72	24,0-30,0	2,28	8,1	-0,47
17	<i>G.darwinii</i> Watt x Аш-8	10	39,1 ± 0,48	35,0-40,0	1,52	3,8	1,3
18	Аш-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	10	36,6 ± 0,63	33,0-39,0	2,00	5,7	0,89
Турчи дурагайлаш (subsp. <i>ruderales</i> (ярим ёввойи) x subsp. <i>ruderales</i> (ярим ёввойи))							
19	f. <i>parnat</i> x f. <i>pisco</i>	10	25,2 ± 0,47	22,0-27,0	1,47	5,8	-0,03
20	f. <i>pisco</i> x f. <i>parnat</i>	10	23,7 ± 0,82	19,0-26,0	2,59	10,9	-0,34
21	f. <i>parnat</i> x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	30,1 ± 0,55	28,0-33,0	1,73	5,7	-2,0
22	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x f. <i>parnat</i>	10	29,2 ± 0,39	27,0-31,0	1,23	4,2	-11,0
23	f. <i>parnat</i> x f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	25,8 ± 0,44	23,0-28,0	1,40	5,4	-0,54
24	f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли) x f. <i>parnat</i>	10	29,4 ± 0,70	27,0-33,0	2,22	7,5	0,71
25	f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли) x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	25,8 ± 0,49	22,0-27,0	1,55	6,0	-0,55
26	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	31,2 ± 0,56	28,0-33,0	1,77	5,6	1,2
27	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x f. <i>pisco</i>	10	26,4 ± 0,40	25,0-28,0	1,26	4,7	0,19
28	f. <i>pisco</i> x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	31,3 ± 0,36	30,0-33,0	1,15	3,6	1,1
29	f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли) x f. <i>pisco</i>	10	23,5 ± 0,43	20,0-24,0	1,35	5,7	0,5
30	f. <i>pisco</i> x f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	28,3 ± 0,42	27,0-30,0	1,32	4,6	2,9
subsp. <i>ruderales</i> (ярим ёввойи) x subsp.<i>vitifolium</i> (маданий тропик)							
31	f. <i>pisco</i> x subsp. <i>vitifolium</i>	10	28,3 ± 0,47	25,0-30,0	1,52	4,9	0,97
32	subsp. <i>vitifolium</i> x f. <i>pisco</i>	10	29,6 ± 0,39	27,0-31,0	1,63	4,2	1,3
33	subsp. <i>vitifolium</i> x f. <i>parnat</i>	10	31,3 ± 0,53	27,0-33,0	1,51	6,2	2,2
34	f. <i>parnat</i> x subsp. <i>vitifolium</i>	10	30,4 ± 0,37	28,0-32,0	1,56	5,3	1,2
35	subsp. <i>vitifolium</i> x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	29,6 ± 0,42	27,0-32,0	1,63	5,8	0,2
36	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x subsp. <i>vitifolium</i>	10	31,5 ± 0,52	27,0-33,0	1,57	6,3	2,1

37	subsp.vitifolium x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	29,7 ± 0,43	27,0-32,0	1,53	5,6	1,6
38	f.ishan nigeria (н. т-ли) x subsp.vitifolium	10	27,4 ± 0,37	25,0-29,0	1,45	4,7	0,48
39	f.parnat x f.brasiliense (к. п-ли)	10	28,4 ± 0,50	27,0-32,0	1,58	5,5	-4,1
40	f.brasiliense (к. п-ли) x f.parnat	10	25,6 ± 0,54	23,0-28,0	1,71	5,4	-12,1
41	f.brasiliense (к. п-ли) x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	30,5 ± 0,56	29,0-33,0	1,78	5,8	1,4
42	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.brasiliense (к. п-ли)	10	32,2 ± 0,55	30,0-35,0	1,75	5,4	2,0
43	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.brasiliense (к. п-ли)	10	32,6 ± 0,22	32,0-34,0	1,70	2,1	5,8
44	f.brasiliense (к. п-ли) x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	31,2 ± 0,47	29,0-33,0	1,48	4,7	2,7
45	f.pisco x f. brasiliense (к. п-ли)	10	25,2 ± 0,55	22,0-27,0	1,75	6,9	0,04
46	f.brasiliense (к. п-ли) x f.pisco	10	27,6 ± 0,33	26,0-30,0	1,05	3,8	0,57
47	f.brasiliense x f.parnat	10	28,6 ± 0,29	26,0-30,0	1,29	4,7	-0,77
48	f.parnat x f.brasiliense	10	27,0 ± 0,42	25,0-29,0	1,33	4,9	-2,5
49	f. brasiliense x f. pisco	10	30,4 ± 0,47	27,0-32,0	1,82	5,7	1,5
50	f. pisco x f. Brasiliense	10	29,5 ± 0,60	27,0-33,0	1,90	6,4	1,2
51	f.brasiliense x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	31,1 ± 0,42	28,0-33,0	1,72	5,6	1,7
52	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.brasiliense	10	30,8 ± 0,53	27,0-33,0	1,64	6,6	1,4
53	f.brasiliense x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	27,7 ± 0,28	26,0-30,0	1,39	4,4	0,64
54	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.brasiliense	10	26,4 ± 0,45	24,0-28,0	1,43	5,4	-0,02
ruderale (ярим ёввойи) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
55	f.pisco x Қарши-8	10	30,2 ± 0,45	27,0-32,0	1,43	4,7	0,43
56	Қарши-8 x f.pisco	10	32,6 ± 0,62	29,0-35,0	1,94	5,9	0,79
57	f.pisco x Аш-8	10	29,6 ± 0,42	27,0-31,0	1,33	4,4	0,08
58	Аш-8 x f.pisco	10	30,7 ± 0,53	28,0-33,0	1,68	5,4	0,22
59	f.parnat x Қарши-8	10	29,9 ± 0,55	27,0-32,0	1,73	5,7	-1,1
60	Қарши-8 x f.parnat	10	26,0 ± 0,42	24,0-28,0	1,33	5,1	-3,2
61	f.parnat x Аш-8	10	26,2 ± 0,54	23,0-28,0	1,72	6,5	-2,1
62	Аш-8 x f.parnat	10	33,4 ± 0,39	32,0-35,0	1,22	3,6	-0,08
63	Қарши-8 x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	28,2 ± 0,44	26,0-31,0	1,40	4,9	-2,2
64	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x Қарши-8	10	28,5 ± 0,37	27,0-31,0	1,18	4,1	-2,0

65	Аш-8 x f.ishan nigeria (оқ тотали)	10	36,5 ± 0,52	34,0-38,0	1,65	4,5	0,79
66	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x Аш-8	10	29,4 ± 0,37	28,0-32,0	1,17	3,9	-1,2
67	f.ishan nigeria (н. т-ли) x Аш-8	10	29,0 ± 0,63	27,0-33,0	2,00	6,9	-0,29
68	Аш-8 x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	37,1 ± 0,46	35,0-39,0	1,45	3,9	0,98
69	Қарши-8 x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	28,2 ± 0,29	27,0-30,0	0,92	3,2	-0,22
70	f.ishan nigeria (н. т-ли) x Қарши-8	10	30,1 ± 0,67	27,0-33,0	2,13	7,0	0,17
subsp.vitifolium (маданий тропик) x subsp.vitifolium (маданий тропик)							
71	f.brasiliense (к. п-ли) x f.brasiliense	10	28,2 ± 0,47	27,0-30,0	1,50	5,3	-1,3
72	f. brasiliense x f.brasiliense (к. п-ли)	10	30,4 ± 0,32	28,0-32,0	1,54	5,8	2,6
73	subsp.vitifolium x f.brasiliense (к. п-ли)	10	29,8 ± 0,24	28,0-31,0	1,47	4,2	1,5
74	f.brasiliense (к. п-ли) x subsp.vitifolium	10	29,3 ± 0,32	27,0-31,0	1,57	4,9	0,63
75	subsp.vitifolium x f.brasiliense	10	31,1 ± 0,42	29,0-33,0	1,63	5,4	0,0
76	f.brasiliense x subsp.vitifolium	10	30,6 ± 0,32	28,0-32,0	1,51	5,6	0,0
subsp.vitifolium (маданий тропик) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
77	subsp.vitifolium x Қарши-8	10	34,3 ± 0,47	30,0-36,0	1,62	6,7	1,1
78	Қарши-8 x subsp.vitifolium	10	34,8 ± 0,53	30,0-37,0	1,53	7,3	1,2
79	subsp.vitifolium x Аш-8	10	33,7 ± 0,42	29,0-36,0	1,92	7,6	0,20
80	Аш-8 x subsp.vitifolium	10	34,2 ± 0,46	30,0-37,0	1,84	8,3	0,31
81	f.brasiliense (к. п-ли) x Қарши-8	10	32,1 ± 0,69	30,0-36,0	2,25	6,8	0,15
82	Қарши-8 x f.brasiliense (к. п-ли)	10	27,2 ± 0,71	25,0-32,0	2,18	8,2	-2,0
83	f.brasiliense (к. п-ли) x Аш-8	10	23,5 ± 0,56	20,0-25,0	1,78	7,5	-2,5
84	Аш-8 x f.brasiliense (к. п-ли)	10	30,8 ± 0,39	29,0-32,0	1,23	3,9	-0,66
85	Қарши-8 x f.brasiliense	10	28,3 ± 0,58	25,0-30,0	1,83	6,4	-1,0
86	f.brasiliense x Қарши-8	10	32,2 ± 0,43	29,0-34,0	1,73	6,7	0,35
87	Аш-8 x f.brasiliense	10	30,6 ± 0,72	29,0-35,0	2,27	7,4	-0,50
88	f.brasiliense x Аш-8	10	30,2 ± 0,34	29,0-33,0	2,15	5,7	-0,59
subsp.eubarbadense (маданий навлар) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
89	Аш-8 x Қарши-8	10	34,8 ± 0,46	31,0-38,0	1,39	6,8	-0,5
90	Қарши-8 x Аш-8	10	34,7 ± 0,53	32,0-38,0	1,47	6,2	-0,5

сифатида иштирок этганда бу комбинацияларида F_1 , f , $ishan\ nigetia$ (новотрант толали) x $Ash-8$, F_1 , f , $ishan\ nigetia$ (ок толали) x $Ash-8$ дурагай комбинацияларида тола чикими кўрсаткичининг анча пайсалиши (29,0-29,4 %) ва салбий гетерозис ($hr=-1,2$, $hr=-0,2$) ҳолати аниқланди. Ирсийланишнинг бундай ҳолати $Ash-8$ нави иштирок этган барча комбинацияларида кузатилиб, бу навда тола чикимини назорат қилувчи полимер генлар аксарият доминант аллел генлардан ташкил топганлигини билдиради Н.Г. Симонгулян, С. Мухамедханов, А. Шафрин [1987].

Ўрганилган туричи дурагайлар гуруҳларида, яъни ярим ёввойи x маданий тропик, маданий тропик x маданий навлар дурагай комбинацияларида тола чикими белгисини ирсийланишида асосан ижобий оралик ирсийланиш, салбий оралик, гетерозис, ижобий доминант ва ўта доминант ҳолатда ирсийланиши кузатилиди.

Жадалда келтирилган натижалардан *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларига мансуб кенжа тур ва шаклларини турлараро ёввойи *G. darwinii* Watt турини чаতিштиришдан олинган F_1 ўсимликларида тола чикими белгисининг ирсийланиши бўйича доминантлик ва оралик ҳолати юз берганлигини кузатиш мумкин. Масалан, турлараро F_1 *G. darwinii* Watt x *f. ishan nigetia* (новотрант толали) реципрок дурагай комбинациясида тола чикими белгиси бўйича ижобий гетерозис ҳолати кузатилиб, ушбу белги бўйича доминантлик кўрсаткичлари мос равишда $hr=7,6$ ва $hr=10,3$ даража тенг бўлиди. Дурагайлаш натижасида олинган F_1 -ўсимликларида тола чикими белгиси бўйича 31,0-33,0 % гача бўлган ораликда жойлашди. Масалан, турлараро F_1 $Ash-8$ x *G. darwinii* Watt дурагай комбинациясида тола чикими бўйича энг юқори натижа олиниб, тегишли равишда белги кўрсаткичи ўртача 39,1 % ни ташкил этган бўлса, доминантлик даражаси $hr=1,3$ ҳолатда ирсийланиши кузатилиди.

Таъкикотларимизда ўрганилган барча туричи ва турлараро F_1 -ўсимликларида тола чикими белгисининг қай тарзда ирсийланиши таққослаб ўрганилди. Таъкикот натижалари шунини кўрсатдики, F_1 -ўсимликларининг


тола чикими белгиси бўйича ўртача кўрсаткичлар намоён бўлиди. Жадалдан, ўрганилган 90 та дурагайларнинг баъзи бирларида тола чикими белгиси бўйича кўрсаткичлари ирсийланиш коэффициенти гетерозис ҳолатда бўлганлигини кузатиш мумкин, яъни 32 та комбинацияларда белги бўйича Ушбу авлод дурагайларининг турлараро F_1 *G. darwinii* Watt x *f. ishan nigetia* (новотрант толали) реципрок дурагай комбинацияларида тола чикими белгисининг ирсийланиш коэффициенти ўта доминантлик даражасини ($hr=7,6$, $hr=10,3$) намоён қилди. Шунингдек, турлараро F_1 -ўсимликларидан, F_1 , f , *ishan nigetia* (ок толали) x *G. darwinii* Watt ва F_1 , $Ash-8$ x *G. darwinii* Watt дурагай комбинацияларида тола чикими белгиси бўйича энг юқори кўрсаткич (38,3 %-39,1 %) натижани кўрсатди, шу билан бирга F_1 -ўсимликларидан эса энг паст тола чикими белгисига эса F_1 , f , *riko* x *G. darwinii* Watt дурагай комбинацияси (20,8 %), салбий оралик ($hr=-0,8$) ҳолатда ирсийланиш кузатилиди.

Ўрганилган туричи ва турлараро F_2 ўсимликларида тола чикими белгиси бўйича кўрсаткичлари таҳлил қилинди. F_2 комбинацияларида тола чикими белгиси бўйича ўзгарувчанлик кўлами 6-7 синфни қамраб олди (3-10-жадалга қарант). Масалан: туричи F_2 Қарши-8 x *subsp. vifolium* реципрок дурагай комбинациясида трансгрессив ўзгарувчанлик мавжуд эканлигини кўришимиз мумкин. Ўсимликларнинг энг кўп фоизи 32-34 % кўрсаткичи модал синфларга (мос равишда 30,5 %) тўғри келди. Ушбу комбинацияда F_2 ўсимликларида кенг трансгрессив ўзгарувчанлик кузатилиб, ўрганилган таҳлил қилинган 213 та ўсимликлар орасидан тола чикими белгиси бўйича 15-37 % бўлган 58 та шакллар ҳамда тола чикими юқори 38-40 % ли кўрсаткичга эга бўлган 11 та трансгрессив шакллар олишга муваффақ бўлиди (3-10-жадал).

Ўзанинг кимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган тола чикими белгиси бўйича нисбатан камроқ синф, яъни нисбатан тор ўзгарувчанлик кўлами турлараро F_2 *subsp. vifolium* x *G. darwinii* реципрок дурагай комбинациясида (6 та синф) эканлиги аниқланди. Таҳлил қилинган

112

F ₂ дугарай комбинациялари	Ўсимлик сони ва фоизи, %	Синф n=3							Тола чиқими			
		20-22	23-25	26-28	29-31	32-34	35-37	38-40	$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	S	V %	h ²
F ₂ -ўсимликлари												
F ₂ subsp.vitifolium x Қарши-8	206	4	19	36	58	69	12	8	34,5 ± 0,2	3,4	11,9	72,8
	100	1,9	9,2	17,5	28,2	33,5	5,8	3,9				
F ₂ Қарши-8 x subsp.vitifolium	213	3	17	22	37	65	58	11	35,6 ± 0,2	3,2	11,5	71,0
	100	1,3	8,0	10,3	17,5	30,5	27,3	5,1				
F ₂ f.brasiliense x subsp.vitifolium	212	5	21	39	68	49	24	6	31,7 ± 0,1	2,9	10,3	64,5
	100	2,3	9,9	18,4	32,1	23,2	11,3	2,8				
F ₂ subsp.vitifolium x f.brasiliense	208	6	21	37	46	67	24	7	32,4 ± 0,3	2,8	10,1	61,0
	100	2,9	10,1	17,8	22,1	32,2	11,5	3,4				
F ₂ Ам-8 x f.brasiliense	207	-	22	39	47	64	27	8	32,8 ± 0,1	2,6	9,5	46,7
	100	-	10,6	18,8	22,8	30,9	13,0	3,9				
F ₂ f.brasiliense x Ам-8	184	4	16	35	47	62	17	3	31,7 ± 0,3	3,1	10,7	63,2
	100	2,2	8,7	19,0	25,5	33,7	9,3	1,6				
F ₂ subsp.vitifolium x G.darwinii	193	5	19	36	68	47	18	-	30,8 ± 0,2	3,3	11,4	79,9
	100	2,6	9,8	18,7	35,2	24,4	9,3	-				
F ₂ G.darwinii x subsp.vitifolium	187	3	20	41	63	46	14	-	30,1 ± 0,1	2,7	9,8	69,1
	100	1,6	10,7	21,9	33,7	24,6	7,5	-				
F ₂ subsp.vitifolium x f.parnat	203	4	24	38	49	61	19	8	32,3 ± 0,2	3,2	11,2	68,7
	100	2,0	11,8	18,7	24,2	30,1	9,3	3,9				
F ₂ f.parnat x subsp.vitifolium	214	3	19	39	51	68	29	5	31,9 ± 0,2	3,1	10,6	65,9
	100	1,4	8,9	18,2	23,8	31,8	13,6	2,3				



От-она шакллар ва уларнинг Γ_1 - Γ_2 ўсимликларида тола чикими белгисининг ирийланиши ва ўзгарувчанлиги

Турлараро F_2 subsp. *virifolium* x *G. damwinii* комбинациясининг тола
 шимми белгиси бўйича кўрсаткич 30,8 %, вариация коэффициенти эса 11,4 %
 ни ташкил этди. Ўрганилган ўсимликларнинг энг кўп фоизи эса 29,0-31,0 %
 ни кўрсаткичи модал синфларга (шунга мос равишда 35,2 %) тўғри келди.
 Турдан ташқари, турлараро F_2 ўсимликларида кенг трансгрессив
 мурувчанлик кузатилди.

Уштанлиглан F_2 ўсмиликларда толға чикими белгисининг насдан насста берилиши коэффициентини $h^2=46,7\%$ дан $h^2=79,9\%$ га тенг бўлди, бу эса тахлил натижасинан белгисининг $46,7-79,9\%$ и дурагай шакл генотипига, $20,1-53,3\%$ и

эса ташқи муҳит таъсирида ирсийланишини кўрсатди. Жумладан, турлараро F_2 subsp. *vibfolium* x *G.darwinii* комбинациясида ушбу белгиси бўйича наслдан наслга берилиш коэффиценти $h^2=79,9\%$ га тенг бўлди, бу эса ўрганилган тола чиқими белгисининг 79,9% и генлар, 20,1% и ташқи муҳит таъсири ҳисобига ирсийланганлигини кўрсатди.

Шундай қилиб, ғўзанинг хўжалик белгиларидан бири бўлган тола чиқими дуратайлашда иштирок этган бошлангич манбаларнинг генотипига боғлиқ равишда ирсийланиши аниқланди. Туричи ва турлараро F_2 ўсимликлари орасидан ажратиб олинган тола чиқими юқори бўлган (38,0-40,0%) трансгрессив шакллар юқори тола чиқимли тизмалар, навлар яратишда бошлангич манба сифатида хизмат қилади.

3.7.8. F_1 - F_2 ўсимликларида 1000 дона чигит вазни белгисининг ўзгарувчанлиги ва ирсийланиши

Ўсимликларнинг ёввойи ва рудерал шаклларда белгиларни бошқариш, айниқса, генетик структуралар боғлиқ, ўзгарувчанлик эса ташқи муҳит омилларига бўйсинади. Бу эса, сунъий танлаш эволюцион юксалишга олиб боришини кўрсатади, деб тахмин қилинади.

Маблумки, ғўзанинг ҳосилдорлигини белгиловчи асосий омиллардан бири-1000 дона чигит вазни бўлганлиги сабабли, бу белгининг ирсийланишини ўрганиш алоҳида аҳамият касб этади. Мавжуд адабиётлар таҳлили, ўртача вазнли чигитларга эга тизмалар, майда чигитли тизмалар билан чагитштирилганда, белгининг юқори кўрсаткич тўлиқсиз доминантлик ҳолда ирсийланишини кўрсатади. Чигити йирик тизмалар, нисбатан майда ва ўртача йирик чигитли тизмалар билан чагитштирилганда ҳам, йирик чигитлилик майда чигитлилик устидан тўлиқсиз доминантлиги кузатилган. С.А. Усманов, К.О. Хударганов [2014], F.R.Abdiev, S.A. Usmanov [2017], С.М. Ризаева ва бош. [2018].

А. Сиддиков [2008] ўз илмий изланишларида, ғўзанинг оддий дуратайларнинг F_1 ўсимликларида, битта кўсақдати пахта вазнининг ижобий

гетерозис ва оралик ҳолда ирсийланишини ҳамда кўш ва мураккаб дуратайларда оралик ҳолатда ирсийланишини, шунингдек, 1000 дона чигит вазни бўйича ҳам F_1 авлодида гетерозис ҳолати ва кейинги авлодларида кучли ўзгарувчанлик қайд этилганлигини ва бунинг натижасида трансгрессив рекомбинантлар ажратиб олинганлиги таъкидлаган.

С.Т. Жўраев ва бошқалар [2011] олиб борган илмий изланишларида, ўрта толали ғўзанинг Т-23/06, ТХ-103, Т-1305, Т-1304, Т-22/06, МГ-70, Б-104, Т-2268 тизмаларида 1000 дона чигит вазни белгиси ўрганилган. Шунингдек, ушбу белгининг юқори бўлиши билан бирга, чигитдати толалар сони ва унинг оқирлиги юқори бўлишини кузатганлар. Бу эса ушбу танлаб олинган тизмаларда бошқа белгилар билан бирга тола индекси юқори бўлишини айтиб ўтганлар.

Тажриба маълумотлари бўйича 1000 дона чигит вазни белгиси бўйича дуратайлашда иштирок этган бошлангич манба намуналари бир-биридан фарқ қилишини кўрсатди. Ярим ёввойи (рудерал) кенжа турига мансуб *f. ishan nigenta* (оқ толали) шаклининг чигити ўртача йирик 125,0 г бўлган бўйса, *f. riseo* ва *f. ramai* шакли 1000 дона чигит вазни майда эканлиги, яъни белги кўрсаткичи 86,1 г ва 92,2 г. Маданий тропик шаклига мансуб subsp. *vibfolium* кенжа тури танланган бошлангич манбалар ичида энг йирик чигит 141,1 г бўлиши аниқланди. Ўғзанинг ёввойи *G.darwinii* Watt турида ушбу белги бўйича кўрсаткич 112,3 г ни ташкил этди (3.11-жадвал).

G.barbadense L. нинг ярим ёввойи (рудерал) шаклларни ўзаро дуратайлаш натижасида олинган F_1 *f. ramai* x *f. ishan nigenta* (новотрант толали) реципрок комбинациясида майда чигит ўртача (90,4 грамм) дуратай олинган бўйса, салбий гетерозис ($h^2=-1,1$) ҳолатда ирсийланиш кузатилди. Ушбу турухда йирик чигитли дуратайлар кузатилмади. Ярим ёввойи кенжа турига мансуб *f. riseo* шакли она сифатида иштирок этганда белги ўа доминант ($h^2=7$), ота сифатида иштирок этганда эса оралик, чада доминантлик ($h^2=0,4$) ҳолати кузатилди. Қолган реципрок F_1 -ўсимликларида

**Бошланғич манбалар F₁-ўсимликларида 1000 дона чигит вази белгисининг
ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги**

№	Бошланғич манбалар ва F ₁ авлод комбинациялари	Таҳлил қилинган кўсаклар сони, дона	1000 дона чигит вази				
			$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	Limit	S	V %	hp
Бошланғич манбалар							
1	<i>G.darwinii</i> Watt	10	112,3 ± 0,45	110,0-114,0	1,4	1,2	-
2	subsp. <i>ruderae</i> f. <i>pisco</i>	10	86,1 ± 0,43	85,0-88,0	1,3	1,5	-
3	subsp. <i>ruderae</i> f. <i>parnat</i>	10	92,2 ± 0,42	90,0-94,0	1,3	1,4	-
4	subsp. <i>ruderae</i> f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	125,0± 0,33	123,0-126,0	1,0	0,8	-
5	subsp. <i>ruderae</i> f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	118,0 ± 0,30	117,0-119,0	0,9	0,8	-
6	subsp. <i>vitifolium</i>	10	141,4 ±0,38	138,0-145,0	1,1	1,1	-
7	subsp. <i>vitifolium</i> f. <i>brasiliense</i> (к. п-ли)	10	114,5 ± 0,34	113,0-116,0	1,0	0,9	-
8	subsp. <i>vitifolium</i> f. <i>brasiliense</i>	10	110,1± 0,38	109,0-112,0	1,2	1,0	-
9	subsp. <i>eubarbadense</i> (Аш-8 нави)	10	117,0± 0,33	116,0-118,0	0,8	0,9	-
10	subsp. <i>eubarbadense</i> (Қарши-8 нави)	10	114,0± 0,26	113,0-115,0	1,0	0,7	-
F ₁ -ўсимликлари							
Турлараро дурагайлаш (<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>ruderae</i> (ярим ёввойи))							
1	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>parnat</i>	10	100,4 ± 0,40	99,0-102,0	1,2	1,2	-0,18
2	f. <i>parnat</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	110,3 ± 0,37	109,0-112,0	1,1	1,0	0,80
3	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>pisco</i>	10	112,0 ± 0,49	110,0-114,0	1,5	1,4	0,97
4	f. <i>pisco</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	112,5±0,37	110,0-114,0	1,1	1,0	1,0
5	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	90,0 ± 0,26	89,0-92,0	0,8	0,9	-4,5
6	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	100,0 ± 0,30	99,0-102,0	0,9	0,9	-2,9
7	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	100,0 ± 0,41	99,0-102,0	0,9	0,9	-5,3
8	f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	110,2 ± 0,53	108,0-113,0	1,0	1,5	-1,7
G. <i>darwinii</i> Watt x subsp. <i>vitifolium</i> (маданий тропик)							
9	<i>G.darwinii</i> Watt x subsp. <i>vitifolium</i>	10	123,4 ±0,46	120,0-126,0	1,0	1,3	-0,23

							давоми
10	subsp. <i>vitifolium</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	129,2 ± 0,48	126,0-134,0	1,2	1,6	0,16
11	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>brasiliense</i> (к. п-ли)	10	90,5 ± 0,34	89,0-92,0	1,0	1,1	-20,8
12	f. <i>brasiliense</i> (к. п-ли) x <i>G.darwinii</i> Watt	10	111,1 ± 0,35	109,0-112,0	1,1	0,9	-2,0
13	<i>G.darwinii</i> Watt x f. <i>brasiliense</i>	10	110,0 ± 0,42	108,0-113,0	1,3	1,2	-1,0
14	f. <i>brasiliense</i> x <i>G.darwinii</i> Watt	10	113,4 ± 0,38	110,0-116,0	1,4	1,4	2,0
<i>G.darwinii</i> Watt x ssp.<i>eubarbadense</i> (маданий навлар)							
15	<i>G.darwinii</i> Watt x Қарши-8	10	103,3 ± 0,37	102,0-105,0	0,8	1,1	-11,5
16	Қарши-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	10	118,0 ± 0,26	117,0-119,0	1,1	0,6	5,7
17	<i>G.darwinii</i> Watt x Аш-8	10	110,0 ± 0,33	109,0-112,0	1,0	0,9	-1,9
18	Аш-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	10	112,0 ± 0,49	110,0-114,0	1,5	1,4	-1,1
Тур ичида дурагайлаш (subsp. <i>ruderae</i> (ярим ёввойи) x subsp. <i>ruderae</i> (ярим ёввойи))							
19	f. <i>parnat</i> x f. <i>pisco</i>	10	90,5 ± 0,37	89,0-92,0	1,1	1,3	0,44
20	f. <i>pisco</i> x f. <i>parnat</i>	10	110,5 ± 0,31	109,0-112,0	0,9	0,8	7,0
21	f. <i>parnat</i> x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	102,6 ± 0,27	101,0-104,0	0,8	0,8	-0,36
22	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x f. <i>parnat</i>	10	100,3 ± 0,45	98,0-102,0	1,4	1,4	-0,50
23	f. <i>parnat</i> x f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	90,4 ± 0,37	89,0-92,0	1,1	1,1	-1,1
24	f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли) x f. <i>parnat</i>	10	93,0 ± 0,39	91,0-95,0	1,2	1,3	-0,93
25	f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли) x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	112,5 ± 0,37	110,0-114,0	1,1	1,0	-2,5
26	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	110,8 ± 0,33	110,0-112,0	1,0	0,9	-3,0
27	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x f. <i>pisco</i>	10	100,0 ± 0,45	98,0-102,0	1,4	1,4	-0,28
28	f. <i>pisco</i> x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	95,0 ± 0,33	94,0-97,0	1,0	1,1	-0,79
29	f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли) x f. <i>pisco</i>	10	110,3 ± 0,75	110,0-114,0	2,3	2,1	0,51
30	f. <i>pisco</i> x f. <i>ishan nigeria</i> (н. т-ли)	10	91,8 ± 0,49	90,0-94,0	1,5	1,6	-0,64
subsp. <i>ruderae</i> (ярим ёввойи) x subsp.<i>vitifolium</i> (маданий тропик)							
31	f. <i>pisco</i> x subsp. <i>vitifolium</i>	10	109,2 ± 0,48	106,0-112,0	1,1	1,8	-0,16
32	subsp. <i>vitifolium</i> x f. <i>pisco</i>	10	118,6 ± 0,36	116,0-120,0	1,3	1,5	0,17
33	subsp. <i>vitifolium</i> x f. <i>parnat</i>	10	117,4 ± 0,39	115,0-120,0	1,5	1,6	0,02
34	f. <i>parnat</i> x subsp. <i>vitifolium</i>	10	115,2 ± 0,35	113,0-118,0	1,0	1,7	-0,06
35	subsp. <i>vitifolium</i> x f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли)	10	132,3 ± 0,29	130,0-135,0	1,2	1,4	-0,10
36	f. <i>ishan nigeria</i> (оқ т-ли) x subsp. <i>vitifolium</i>	10	129,4 ± 0,37	127,0-132,0	1,1	1,7	-0,46

37	subsp.vitifolium x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	134,6 ± 0,39	132,0-138,0	1,0	1,9	0,41
38	f.ishan nigeria (н. т-ли) x subsp.vitifolium	10	127,8 ± 0,32	126,0-132,0	1,3	1,8	-0,16
39	f.parnat x f.brasiliense (к. п-ли)	10	111,6 ± 0,34	110,0-113,0	1,0	0,9	0,73
40	f.brasiliense (к. п-ли) x f.parnat	10	113,5 ± 0,50	112,0-116,0	1,5	1,3	0,91
41	f.brasiliense (к. п-ли) x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	82,0 ± 0,54	80,0-84,0	1,7	2,0	-19,5
42	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.brasiliense (к. п-ли)	10	90,6 ± 0,52	88,0-92,0	1,6	1,8	-14,6
43	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.brasiliense (к. п-ли)	10	112,2 ± 0,42	110,0-114,0	1,3	1,1	-1,4
44	f.brasiliense (к. п-ли) x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	100,3 ± 0,42	98,0-102,0	1,3	1,3	-3,7
45	f.pisco x f. brasiliense (к. п-ли)	10	112,0 ± 0,39	109,0-113,0	1,2	1,1	0,82
46	f.brasiliense (к. п-ли) x f.pisco	10	110,2 ± 0,51	108,0-113,0	1,6	1,4	0,69
47	f.brasiliense x f.parnat	10	108,7 ± 0,36	106,0-112,0	1,2	1,7	0,84
48	f.parnat x f.brasiliense	10	113,2 ± 0,33	112,0-115,0	1,0	0,9	1,3
49	f. brasiliense x f. pisco	10	106,4 ± 0,31	104,0-109,0	1,3	1,8	0,69
50	f. pisco x f. Brasiliense	10	104,0 ± 0,37	103,0-106,0	1,1	1,1	0,49
51	f.brasiliense x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	113,6 ± 0,47	110,0-116,0	1,4	1,7	-0,53
52	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x f.brasiliense	10	118,7 ± 0,43	116,0-121,0	1,0	1,8	0,15
53	f.brasiliense x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	116,4 ± 0,36	114,0-119,0	0,9	1,6	0,59
54	f.ishan nigeria (н. т-ли) x f.brasiliense	10	112,4 ± 0,34	110,0-114,0	1,0	0,9	-0,41
ruderales (ярим ёввойи) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
55	f.pisco x Қарши-8	10	100,0 ± 0,37	98,0-102,0	1,1	1,1	-0,003
56	Қарши-8 x f.pisco	10	98,0 ± 0,30	97,0-99,0	0,9	0,9	-0,14
57	f.pisco x Ам-8	10	101,5 ± 0,37	100,0-103,0	1,1	1,1	-0,003
58	Ам-8 x f.pisco	10	108,0 ± 0,30	106,0-109,0	0,9	0,8	0,41
59	f.parnat x Қарши-8	10	112,0 ± 0,42	110,0-114,0	1,3	1,1	0,81
60	Қарши-8 x f.parnat	10	114,4 ± 0,34	113,0-116,0	1,0	0,9	1,0
61	f.parnat x Ам-8	10	111,0 ± 0,37	109,0-112,0	1,1	1,0	0,51
62	Ам-8 x f.parnat	10	105,5 ± 0,37	103,0-107,0	1,1	1,1	0,07
63	Қарши-8 x f.ishan nigeria (оқ т-ли)	10	100,0 ± 0,39	98,0-102,0	1,2	1,2	-3,5
64	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x Қарши-8	10	90,3 ± 0,30	89,0-92,0	0,9	1,0	-5,3
65	Ам-8 x f.ishan nigeria (оқ толали)	10	91,0 ± 0,52	88,0-93,0	1,6	1,7	-7,5

66	f.ishan nigeria (оқ т-ли) x Ам-8	10	90,0 ± 0,42	88,0-92,0	1,3	1,4	-7,7
67	f.ishan nigeria (н. т-ли) x Ам-8	10	110,0 ± 0,49	108,0-113,0	1,5	1,4	-15,0
68	Ам-8 x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	112,6 ± 0,37	110,0-114,0	1,1	1,0	-9,8
69	Қарши-8 x f.ishan nigeria (н. т-ли)	10	91,2 ± 0,42	89,0-93,0	1,3	1,4	-12,4
70	f.ishan nigeria (н. т-ли) x Қарши-8	10	90,5 ± 0,45	88,0-92,0	1,4	1,5	-12,7
subsp.vitifolium (маданий тропик) x subsp.vitifolium (маданий тропик)							
71	f.brasiliense (к. п-ли) x f.brasiliense	10	90,0 ± 0,39	88,0-92,0	1,2	1,3	-10,1
72	f. brasiliense x f.brasiliense (к. п-ли)	10	104,2 ± 0,32	103,0-106,0	1,0	1,2	-3,6
73	subsp.vitifolium x f.brasiliense (к. п-ли)	10	124,3 ± 0,46	122,0-127,0	1,4	1,7	-0,27
74	f.brasiliense (к. п-ли) x subsp.vitifolium	10	118,1 ± 0,32	116,0-120,0	1,0	1,6	-0,73
75	subsp.vitifolium x f.brasiliense	10	120,4 ± 0,43	117,0-123,0	1,0	1,9	-0,34
76	f.brasiliense x subsp.vitifolium	10	115,7 ± 0,41	113,0-119,0	1,2	2,0	-0,64
subsp.vitifolium (маданий тропик) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
77	subsp.vitifolium x Қарши-8	10	136,2 ± 0,46	133,0-140,0	1,2	2,1	0,62
78	Қарши-8 x subsp.vitifolium	10	131,5 ± 0,38	129,0-135,0	1,0	1,8	0,27
79	subsp.vitifolium x Ам-8	10	138,3 ± 0,43	135,0-142,0	1,4	2,1	0,74
80	Ам-8 x subsp.vitifolium	10	132,4 ± 0,34	130,0-135,0	1,1	1,7	0,26
81	f.brasiliense (к. п-ли) x Қарши-8	10	80,0 ± 0,60	78,0-82,0	1,8	2,3	-137,0
82	Қарши-8 x f.brasiliense (к. п-ли)	10	100,3 ± 0,30	99,0-102,0	0,9	0,9	-55,8
83	f.brasiliense (к. п-ли) x Ам-8	10	112,0 ± 0,39	110,0-114,0	1,2	1,1	-3,0
84	Ам-8 x f.brasiliense (к. п-ли)	10	102,0 ± 0,37	100,0-104,0	1,1	1,1	-11,0
85	Қарши-8 x f.brasiliense	10	113,5 ± 0,50	111,0-116,0	1,5	1,3	0,74
86	f.brasiliense x Қарши-8	10	111,6 ± 0,32	109,0-114,0	1,2	1,6	-0,23
87	Ам-8 x f.brasiliense	10	112,8 ± 0,39	110,0-114,0	1,2	1,0	-0,21
88	f.brasiliense x Ам-8	10	116,4 ± 0,37	114,0-119,0	1,4	1,8	0,82
subsp.eubarbadense (маданий навлар) x subsp.eubarbadense (маданий навлар)							
89	Ам-8 x Қарши-8	10	116,2 ± 0,38	114,0-119,0	1,4	1,7	0,46
90	Қарши-8 x Ам-8	10	115,4 ± 0,31	113,0-119,0	1,1	1,9	-0,06

1000 дона чигит вазни белгисининг оралик ҳамда салбий гетерозис ҳолатида ирсийланиши аниқланди.

Таъқидлаш лозимки, ғўзанинг *G. barbadeuse* L. ярим ёввойи шакллари маданий тропик кенжа тур ва шакллари билан ўзаро дурағайлаш натижасида олинган F₁-ўсимликларда кимматли хўжалик кўрсаткичларидан бири бўлган 1000 дона чигит вазни белгиси бўйича F₁ f. *ramai* x f. *brasileuse* дурағай комбинациясида ижобий гетерозис (hr=1,3), F₁ subsp. *vitifolium* x f. *ishan nigra* (новотранг тоғли) комбинациясида оралик (hr=0,4), f. *brasileuse* (қизил пояли) x f. *ishan nigra* (новотранг тоғли) реципрок дурағай комбинацияларида ушбу белги бўйича салбий гетерозис (hr=-14,6; hr=-19,5) ирсийланиш ҳолатлари кузатилиди.

Ярим ёввойи ва маданий нав намуналар билан дурағайлаш натижасида олинган деярли барча F₁-ўсимликларда 1000 дона чигит вазни белгиси бўйича майда чигитлар F₁ f. *ishan nigra* (оқ тоғли) x Қарши-8 дурағай комбинациясида 90,3 г. ни ташкил этган бўлса, салбий гетерозис (hr=-5,3) ирсийланиш ҳолда ирсийланиш аниқланди. Ушбу турухнинг бошқа комбинацияларида ижобий ўта доминант (hr=1), оралик (hr=0,5), салбий ўта доминант (hr=-15) ирсийланиш ҳолати кузатилиди.

Ғўзанинг *G. barbadeuse* L. маданий тропик кенжа тур ва шакллари ўзаро дурағайлаш асосида олинган F₁-ўсимликларда 1000 дона чигит вазни белгиси бўйича F₁ f. *brasileuse* (қизил пояли) x f. *brasileuse* комбинациясида турухдаги бошқа дурағайларга нисбатан майда чигитли (90,0 грамм) ўсимликлар аниқланган бўлса, F₁ subsp. *vitifolium* x f. *brasileuse* (қизил пояли) дурағай комбинациясида ушбу белги бўйича йирик чигит (124,3 грамм) дурағай ўсимликлар ажратиб олинди ва салбий оралик, салбий гетерозис ҳолатида ирсийланиш ҳолатлари аниқланди.

Маданий тропик шакллари маданий нав намуналар билан ўзаро дурағайлаш асосида олинган F₁-ўсимликларда асосан subsp. *vitifolium* ништрок этган дурағай комбинацияларида йирик чигитли дурағай ўсимликлар ажратиб чиқди. Масалан, F₁ subsp. *vitifolium* x Ап-8 дурағай

комбинациясида 1000 дона чигит вазни белги бўйича энг йирик чигит (138,3 г.) ажратиб чиқди, шунга мос равишда (hr=0,7) оралик ирсийланиш кузатилиди. Тахлил қилинган ушбу турухдаги бошқа комбинациялар асосан оралик (hr=0,6), салбий оралик (hr=-0,2) ва салбий гетерозис (hr=-137) ҳолатларида ирсийланиши аниқланди.

Туғлараро дурағайлаш натижасида олинган F₁ f. *ramai* x *G. davlinii* Watt, F₁ *G. davlinii* Watt x f. *risco* комбинацияларида ўрганилётган белги бўйича оралик ҳолат, F₁ *G. davlinii* Watt x f. *ishan nigra* (оқ тоғли) ва F₁ *G. davlinii* Watt x f. *ishan nigra* (новотранг тоғли) реципрок дурағай комбинацияларида 1000 дона чигит вазни белги бўйича салбий гетерозис, яъни салбий ўта доминантлик ҳолати кузатилиди, шунга мос равишда доминантлик коэффициентлари hr=-2,9; hr=-4,5; hr=1,7; hr=5,3 га тенг бўлиди.

Ўрганилган белги бўйича бир-биридан кескин фарқ қилган 2 та шакт ўзаро чагитштирилганда F₁ дурағайлари юқори ваздли ота-она шакллари кўрсаткичлари томонга оғиш кузатилиди. Масалан, ёввойи *G. davlinii* Watt турини *G. barbadeuse* L. нинг ярим ёввойи (рудерал) кенжа турига мансуб шакллари чагитштириш асосида олинган F₁ f. *risco* x *G. davlinii* Watt дурағай комбинациясида 1000 дона чигит вазни бўйича ижобий гетерозис назоён бўлиб, тўлиқ доминантлик ҳолати кузатилиди, hr=1,02 га тенг бўлиди. Шу дурағайнинг реципрок комбинациясида тўлиқсиз доминантлик (hr=0,98) ҳолати қайд этилди.

Ёввойи *G. davlinii* Watt тури билан *G. barbadeuse* L. маданий тропик кенжа тур ва шакллари чагитштириш натижасида олинган F₁-ўсимликларда ҳам 1000 дона чигит вазни белгиси бўйича оралик ва салбий гетерозис ҳолатида ирсийланиши аниқланди.


Ғўзанинг ёввойи тетраплоид *G. davlinii* Watt тури билан *G. barbadeuse* L. маданий навларини дурағайлаш натижасида олинган F₁-ўсимликларда асосан салбий гетерозис кузатилиди. Фақат F₁ Қарши-8 x *G. davlinii* Watt

F₂ ўсимликларида 1000 та чигит вазни белгисининг ўзгарувчанлик қўлаи

F ₂ дурагай Комбинациялари	Ўсимлик сони ва фоизи, %	Синф n=10							1000 та чигит вазни, г.			
		80-89	90-99	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149				
									$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	S	V %	h ²
F ₂ -ўсимликлари												
F ₂ subsp.vitifolium x Қарши-8	206	-	-	3	39	61	84	19	137,3 ± 0,4	9,8	11,2	98,7
	100	-	-	1,5	18,9	29,6	40,8	9,2				
F ₂ Қарши-8 x subsp.vitifolium	213	-	-	6	49	69	73	16	133,2 ± 0,4	9,7	10,8	98,8
	100	-	-	2,8	23,0	32,4	34,3	7,5				
F ₂ f.brasiliense x subsp.vitifolium	212	-	-	31	96	68	14	3	118,4 ± 0,4	9,6	10,7	98,5
	100	-	-	14,6	45,3	32,1	6,6	1,4				
F ₂ subsp.vitifolium x f.brasiliense	208	-	-	26	69	91	16	6	122,1 ± 0,4	9,2	10,4	98,6
	100	-	-	12,5	33,2	43,8	7,7	2,8				
F ₂ Ам-8 x f.brasiliense	207	-	-	11	106	76	14	-	117,1 ± 0,3	7,9	9,1	98,1
	100	-	-	5,3	51,2	36,7	6,8	-				
F ₂ f.brasiliense x Ам-8	184	-	-	12	64	98	10	-	120,5 ± 0,3	8,1	9,3	98,0
	100	-	-	6,5	34,9	53,2	5,4	-				
F ₂ subsp.vitifolium x G.darwinii	193	-	-	6	31	57	86	13	131,7 ± 0,4	9,7	10,8	98,4
	100	-	-	3,1	16,1	29,5	44,6	6,7				
F ₂ G.darwinii x subsp.vitifolium	187	-	-	10	35	85	49	8	124,6 ± 0,4	9,6	10,3	98,5
	100	-	-	5,3	18,7	45,4	26,3	4,3				
F ₂ subsp.vitifolium x f.parnat	203	3	16	28	63	76	13	4	121,2 ± 0,6	11,8	14,7	98,8
	100	1,5	7,9	13,8	31,0	37,4	6,4	2,0				
F ₂ f.parnat x subsp. vitifolium	214	9	24	38	79	51	13	-	117,4 ± 0,6	11,0	13,4	98,9
	100	4,2	11,2	17,8	36,9	23,8	6,1	-				

комбинациясида 1000 донга чигит вазни белгиси бўйича ўта доминантлик ($h^2=5,7$) ирсийланиш ҳолати кузатилади.

Туричи ва турлараро F₂ ўсимликларида 1000 донга чигит вазни белгиси бўйича кўрсаткичлари тахлил қилинди. Ўрганилган F₂ комбинацияларида белги бўйича ўзгарувчанлик қўлаи 7-4 синфни камраб олди. Масалан: туричи F₂ subsp. *vitifolium* x Қарши-8 реципрок комбинациясида трансгрессив ўзгарувчанлик мажмуи эканлигини кўришимиз мумкин. Ўзанинг 1000 донга чигит вазни белгиси бўйича ўртача 133,2-137,3 г, вариация коэффициенти эса 10,8-11,2% ни ташкил этди. Тахлил қилинган ўсимликларнинг энг кўп фоизи 1000 донга чигит вазни белгиси бўйича 130-139 г кўрсаткичи модал синфларга (шунга мос равишда 40,8-34,3 %) тўғри келди. Ушбу комбинацияларда ҳам бошланғич манбаларнинг чигит вазнидан кичик бўлган дурагай ўсимликлар ҳам ажралиши кузатилади (3.12-жадвал).



Олигона шакллар ва уларнинг F₁-F₂ ўсимликларида 1000 донга чигит вазни белгисининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги

Изланишларимиз асосида, ўзанинг *G. barbadense* L. турининг генетик кимия-хилликларини ўзаро ҳамда ёввойи *G. darwinii* Watt тури билан дургайлаш натижасида олинган туричи ва турлараро F₂ ўсимликларида кимиятти хўжалик кўрсаткичлардан бири 1000 донга чигит вазни белгиси

бўйича чап ва ўнг томонлама трансгрессия юз берганлиги аниқланди. Турлараро F_2 *G. darwinii* x *subsp. vitiifolium* дурагай комбинациясининг 1000 дона чигит вазни белгиси бўйича кўрсаткич ўртача 124,6 грамм, вариация коэффициенти эса 10,3 % ни ташкил этди. Тахлил қилинган ўсимликларнинг энг кўп фоизи 120-129 грамм кўрсаткичли модал синфларга (мос равишда 45,4 %) тўғри келди. Бундан ташқари, турлараро F_2 ўсимликларида кенг трансгрессив ўзарувчанлик кузатилиди. Нисбатан кам синф, яъни нисбатан тор ўзарувчанлик қўлами туричи F_2 Аш-8 x *f. brasiiliense* реципрок дурагай комбинациясида (4 та синф) эканлиги аниқланди ва ушбу белги бўйича ўртача кўрсаткич 117,1-120,5 грамм, вариация коэффициенти эса 9,1-9,3 % ни ташкил этди. Тахлил қилинган ўсимликларнинг 1000 дона чигит вазни белгиси бўйича энг кўп фоизи 100-119 % кўрсаткичли модал синфларга (мос равишда 51,2 %) тўғри келди. *G. barbadiense* L. турига мансуб маданий тропик ва маданий навларининг дурагай комбинациялари вариацион каторининг 100-109 граммлик синфларида жойлашганлиги кузатилиди.

Дурагайлаш натижасида олинган туричи ва турлараро F_2 ўсимликларда кимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган 1000 дона чигит вазни белгисининг насадан наслга берилиш коэффициенти $h^2=98,0$ % дан $h^2=98,9$ % га тенг бўлди, бу эса тахлил қилинган белгининг 98,0-98,9 % и дурагай шаклнинг генотипи, 20,1-53,3 % и эса ташки мухит таъсирида ирсийланишини кўрсатди. Жумладан, туричи чагиштириш натижасида олинган F_2 *f. raimi* x *subsp. vitiifolium* дурагай комбинациясида 1000 дона чигит вазни белгисининг насадан наслга берилиш коэффициенти $h^2=98,9$ % га тенг бўлди, бу эса ўрғанилган белгининг 98,9 % и дурагай шаклнинг генотипи, 2,0 % и ташки мухит таъсирида ирсийланганлигидан далолат беради.

IV БОБ. ИНТИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ ЙИРИК КЎСАКЛИ ДУРАГАЙЛАРИДА АЙРИМ МОРФО-ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ ОРАСИДАГИ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИКЛАР

4.1-§. *G. barbadiense* L. туричи хилма-хилликларини дурагайлаш асосида олинган йирик кўсакли F_2 оилаларнинг морфо-хўжалик белгиларининг ўзвий боғлиқлиги

Дурагайлаш асосида олинган ўсимликларининг кимматли хўжалик белгилари орасидаги корреляцион боғлиқликларни ўрганиш дурагайлашда иштирок этадиган намуналарнинг генотипи, уларнинг хўжалик белгиларига эътибор бериб танлаш имкониятини яратди. Шунинг учун, ғўза селекциясида белгиларнинг ўзаро ўзвий боғлиқлик даражасини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Ғўзанинг кимматли хўжалик белгилари орасидаги боғлиқликни ўрганиш борасида кўпшаб маҳаллий ва чет эл олимларининг илмий изланишларида ўз ифодасини топган С. Султонов [1997], J.C. Silvettooh, A. Saladima [2006], E.R. Norton, L.J. Clark, S.H. Nuzman [2002].

И.Т. Қасхаров [2005] ўз изланишларида, ғўзанинг ўрта толали *G. nitens* L. турига мансуб экологик узок шакллари ўзаро чагиштириш асосида олинган дурагайларда эртанишарлик билан кимматли хўжалик белгилари орасидаги корреляциясини ўрганиб, ота-она шакллари ва F_2 ўсимликларда бир хил, ўрта ва кучли ижобий равишда ўзвий боғлиқлик борлигини аниқлаган.

Н.Э. Чоршанбоев [2006] олиб борган изланишларида, ғўзанинг *G. barbadiense* L. турига мансуб янги ғўза навлари ва улар иштирокида олинган дурагайларнинг F_1 авлодида кимматли хўжалик белгиларининг ўзвий боғлиқлик даражасини ўргатган. Олинган натижалар таҳлилга кўра, кимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган тола узунлиги билан тола чикми ўртасида кучсиз манфий равишда ўзвий боғлиқлик мавжуд эмаслиги, тола узунлиги билан кўсақлар сони ўртасидаги боғлиқлик мавжуд эмаслиги, битта кўсақдаги пахта вазни билан битта ўсимликдаги кўсақлар сони ўртасида кучли манфий ўзвий боғлиқлик борлиги аниқланган ва белгилар ўртасидаги


фенотипик узвий боғлиқлик генотипга боғлиқ равишда ўзгаради, деган хулосага келган.

Х.Ю. Тўйчиев [2010] қайд этилишича, ёўзанинг ўрта толали навларида кимматли хўжалик белгиларининг генетик боғланишини ўрганган. Тола сифати ва микторий белгилар орасида кучли салбий генетик боғланиш қайд этилган ва бу маълумотлар юқори тола чикими ва узунлигига эга бўлган ёўз навларини яратишдаги қийинчиликларни бартаф қилиш мумкинлигини кўрсатган. Махсуддорлик кўсак йирислиги билан, 1000 донга чиғит вазни, толанинг чикими, тола узунлиги билан ижобий равишда боғланиш маъжудлигини, тола эчилиги ва индекси боғланиши сезиларли даражада эканлигини аниқлаган.

Тажрибада ёўзанинг ингичка толали *G. barbadense* L. турининг генетик хилма-хилликларини туричи дурайлаш асосида ажратиб олинган F_4 ўсимлик оилалари популяцияларида асосий морфо-хўжалик белгилари ўртасида ўзаро корреляцион боғланиш таҳлили қилинди. Ўрганилган F_4 ўсимлик оилаларининг морфо-хўжалик белгиларидан кўсак диаметри (мм) билан битта кўсақдаги пахта вазни (t) белгилари орасидаги корреляцион боғланишга алоҳида аҳамият қаратилди. Олинган маълумотлар шунини кўрсатдики, «Оила 2» ва «Оила 9» популяцияларида ушбу белги орасидаги корреляция коэффициентлари $r=+0,02$ дан $r=+0,15$ гача кучсиз ижобий, қолган барча оила гуруҳларида эса $r=+0,33$ гача ўртача ижобий равишда боғланишга эга эканлиги аниқланди (4.1-расм).

Олиб борилган изланишлар давомида ёўзанинг морфо-хўжалик белгиларидан «кўсак узунлиги» билан «тола узунлиги» орасидаги узвий боғлиқлик даражасини аниқлаш бўйича таҳлилларга кўра, узок муддатли танлаш натижасида ажратиб олинган «Оила 8», «Оила 2» популяцияларида («Оила 1», $r=0,0004$; $r=0,0008$) жуда кучсиз, «Оила 3», «Оила 6», «Оила 7», «Оила 9», «Оила 1» популяцияларида эса ($r=+0,02$, $r=+0,25$) кучсиз ижобий равишдаги узвий боғлиқлик кузатилди. F_4 ўсимлик оилалари популяцияларида «кўсак диаметри» билан «тола чикими» белгилари ўртасидаги узвий боғланиш

«Оила 7» гуруҳида жуда кучсиз ижобий боғлиқлик қайд этилиб, корреляция коэффициентини $r=0,0001$ га тенг бўлди. Шунингдек, «Оила 1», «Оила 2», «Оила 3», Оила 4», «Оила 5», «Оила 6», «Оила 8», «Оила 9» популяцияларида ҳам кучсиз ижобий ($r=+0,0003$ дан $r=+0,15$) равишда боғлиқлик маъжудлиги кузатилди (4.1-расм).



4.1-расм. *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини дурайлаш асосида олинган F_4 ўсимликларининг морфо-хўжалик белгиларининг узвий боғлиқлиги

Олинган натижаларининг таҳлили шунини кўрсатдики, ёўзанинг морфо-хўжалик белгилари яъни, «кўсак диаметри» билан «битта кўсақдаги пахта вазни», «кўсак узунлиги» билан «тола узунлиги», «кўсак диаметри» билан «тола чикими» белгиларининг ўртасидаги узвий боғлиқлик даражаси оила популяцияларида маълум даражада маъжудлигини кўрсатди, ўз нинбатида бу борада амалга оширилган генетик-селекцион изланишлар ўз натижасини намоён этишга замин яратди.

4.2-§. *G. barbata* L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида олинган йирик кўсақли оила популяцияларини айрим хўжалик белгиларининг ўзвий боғлиқлиги


Маълумки, ғўза оила, тизма ва навларда кимматли хўжалик белгиларнинг аксарияти рецессив генлар билан бошқарилади. Шунинг учун, амалий селекция учун ноёб намуналар уларнинг тўпланиши ҳамда томоситоталаниши оқибатида ажралиб чиқади. Ёўзада кўпчилик микродий белгилар ўзаро салбий боғланишни ҳосил қилган. Бундай салбий корреляциянинг муҳим сабабларидан бири кроссинг-овер жараёнида бўзилиши мумкин бўлган полиген блокларнинг бириктириши ҳисобланади.

Ёўзанинг кимматли хўжалик белгиларидан бири тола чиқими ва тола индекси кўрсаткичлари оила популяциялари орасидаги корреляция 2011-2013 йиллар давомида қиёсий ўрганилди, 2011 йил маълумотларига кўра, баъзи оилаларда бир биридан кескин фарқ қилиши кузатилди, яъни кучсиз ижобий ўртача ижобий, кучли ижобий корреляция борлиги ҳолатлари қайд этилди. Масалан, «Оила 1» популяциясида кучиз ижобий ($r=+0,25$) корреляция, «Оила 2», «Оила 4» популяцияларида эса кучли ижобий ($r=+0,95$) корреляция боғлиқлиги аниқланди (4.2-расм).

Ёўзанинг кимматли хўжалик белгилари 1000 дона чигит вазни билан тола индекси ўртасидаги корреляция боғлиқлиги таҳлил қилинганда, ўртача ва кучли ижобий корреляция борлиги аниқланди. Ўрганилган «Оила 8» популяциясида ушбу белги бўйича кучли ижобий ($r=+0,90$) кузатилган бўлса, «Оила 9» кучсиз ижобий ($r=+0,12$) корреляция боғлиқлиги борлиги аниқланди.

G. barbata L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида олинган оилаларда хўжалик белгиларидан тола ўзунлиги билан тола индекси белгилари ўртасидаги корреляция таҳлил қилинганда, ўрганилган оилаларда корреляция коэффициентлари $r=+0,08$ дан $r=+0,33$ гача кучсиз ижобий, қолган «Оила 3», «Оила 4» ўсимлик популяцияларида эса $r=+0,53$ дан $r=+0,56$ гача


ўртача ижобий, фақатгина «Оила 9» ўсимликлар популяциясида кучли ижобий ($r=+0,91$) корреляцион боғланиш борлиги кузатилди (4.2-расм).



4.2-расм. *G. barbata* L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида олинган оилаларининг кимматли хўжалик белгиларининг ўзвий боғлиқлиги (2011 йил).

G. barbata L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида олинган йирик кўсақли оилаларнинг иккинчи йилги натижаларига кўра, ўрганилган кимматли хўжалик белгиларидан тола чиқими ва тола индекси белгилари ўртасидаги корреляция коэффициентлари қиёсий ўрганилган оилаларда бир биридан кескин фарқ қилиши кузатилмади, яъни кучсиз, ўртача ва кучли ижобий корреляция боғланишлар қайд этилди. Жумладан, «Оила 3» ўсимлик популяцияларида энг юқори кўрсаткич ($r=+0,91$) кучли ижобий боғланиш қайд этилган бўлса, «Оила 8» ($r=+0,35$), «Оила 1»

($r=+0,41$), «Оила 2» ($r=+0,64$) популяцияларда ўртача ижобий корреляцион боғлиқ борлиги аниқланди ҳамда «Оила 9» ($r=+0,24$), «Оила 7» ($r=+0,25$) кучсиз ижобий корреляцион боғлиқни кузатишди (4.3-расм).



4.3-расм. *G.vardavense* L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида олинган оилаларнинг қимматли хўжалик белгиларининг узвий боғлиқлиги (2012 йил).

Ўзанинг айрим хўжалик белгилари яъни 1000 дона чипит вази билан тола чикими кўрсаткичлари ўртасидаги иккинчи йилги корреляция коэффициентини таҳлил қилинганда биринчи йилги натижаларга яқинлигини кўришимиз мумкин. Масалан, ўрганилган оилаларда асосан кучсиз $r=+0,01$ дан $r=+0,32$ гача, ўртача $r=+0,34$ дан $r=+0,63$ гача, кучли ижобий $r=+0,76$ дан $r=+0,79$ гача корреляцион боғлиқни кайд этилди. Танлаш натижасида олинган «Оила 1», «Оила 6» популяцияларида ($r=+0,76$; $r=+0,79$) кучли боғлиқни кузатишган бўлса, «Оила 7» ($r=+0,34$), «Оила 4» ($r=+0,66$)

популяцияларда ўртача корреляцион боғлиқ борлиги аниқланди ва қолган оилаларда эса кучсиз ижобий корреляция кузатишди.


G.vardavense L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида ажратиб олинган йирик кўсақли оилаларида тола узулиги билан тола индекси белгилари ўртасидаги корреляция коэффициентини таҳлил қилинганда 2011 йилги натижаларининг аниқлог ҳолати кайд этилди, яъни кучсиз, ўртача ва кучли ижобий корреляцион боғлиқни кайд этилди.

Ўзанинг *G.vardavense* L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида олинган йирик кўсақли оилаларнинг учинчи йилги натижалари қиссий таҳлил қилинди (4.4-расм).

Ажратиб олинган оилаларда ўзанинг хўжалик кўрсаткичларидан бири бўлган тола чикими билан тола узулиги белгилари ўртасидаги корреляция коэффициентини бўйича «Оила 3», «Оила 4» популяцияларида $r=+0,10$ дан $r=+0,22$ гача кучсиз ижобий, қолган «Оила 6», «Оила 4», «Оила 7» популяцияларида эса ($r=+0,42$; $r=+0,60$; $r=+0,66$) ўртача ижобий, «Оила 3», «Оила 8», «Оила 9» популяцияларида кучли ижобий ($r=+0,69$; $r=+0,86$; $r=+0,89$) боғлиқни кузатишди.

Ўзанинг *G.vardavense* L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида олинган оилаларни айрим қимматли хўжалик белгилари яъни, 1000 дона чипит вази билан тола индексининг корреляция боғлиқлиги биринчи ва иккинчи йилги билан анологик ҳолат кайд этилди.

G.vardavense L. туричи хилма-хилликларини ўзаро дуратайлаш асосида ажратиб олинган ингичка толали оила популяцияларида хўжалик кўрсаткичларидан тола узулиги билан тола индекси белгилари ўртасидаги корреляция таҳлил қилинганда, ушбу белгилар бўйича «Оила 1», «Оила 9» популяцияларида деярли корреляцион боғлиқни ҳолат ($r=+0,00005$; $r=+0,00004$) кузатилмаган бўлса, қолган оила популяцияларида тола узулиги билан тола индекси ўртасида кучсиз, ўртача ижобий корреляцион боғлиқни аниқланди.



4.4-расм. *G. barbadense* L. туринчи хилма-хилликларини дурагайлаш асосида олинган оилаларининг кимматли хўжалик белгиларининг узвий боғлиқлиги (2013 йил).

Шундай қилиб, ушбу ўрнатиш кимматли хўжалик белгилар орасидаги корреляцион боғлиқликларни ўрганиш борасида олинган 3 йиллик натижалар қиссий тахлили қилинганда, дурагайлашда иштирок этган *G. barbadense* L. турининг генетик хилма-хилликларининг генотипига тўғридан тўғри боғлиқ равишда намоён бўлиши, туринчи ва турлараро дурагайлаш асосида олинган йирик қўсақли оилаларида айрим хўжалик белгилар бўйича шу авлодлардаги ўсимлик популяцияларида уларнинг аҳамияти турлича кўринишни намоён этди ва айрим ҳолатларда ўрнатиш йирик қўсақли дурагай ўсимликлар орасидан ўзида бир қанча белгиларни мужассам этган рекомбинантларни ажратиб олиш эҳтимоли юқори эканлигини кўрсатди.

4.3-§. *G. barbadense* L. туринчи хилма-хилликларини дурагайлаш асосида олинган йирик қўсақли оила популяцияларининг айрим морфо-хўжалик белгиларининг узвий боғлиқлиги

Маълумки, ғўзанинг белгилари, жумладан морфо-хўжалик белгилари ўртасидаги корреляцион боғлиқликни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ўрганилаётган ҳар битта белги қай даражада бошқа бир белги билан боғлиқлигини кўрсатади. Масалан, ғўзанинг ҳосил шох пастда жойлашиши билан шоналаш даврининг эрта бошланиши, кимматли хўжалик белгилари тола узунлиги билан чиқими, тезпишарлик билан ҳосилдорлик ва бошқа белгилар ўртасида салбий боғланиш бўлиши аниқланган, ammo бу узвий боғланишларни барчаси ҳам мустақкам эмас, амалий селекция ишлари жараёнида уларни осонгина ўзиш мумкин. Чатштириш натижасида олинган дурагай авлодларида белгилар орасидаги салбий боғлиқликларни баргараф этиш учун, танлов ишларини тўғри олиб боришда ва амалий селекция жараёнининг самарадорлигини оширишда танлаб олинган ўсимлик популяциялари микјори жуда катта ўрин тутайди.

S. C. Naïland [1939] ўз тадқиқотларида, ғўзанинг морфобюлогик ва хўжалик белгилари ўртасида корреляция боғлиқлиги ўрганилган. Гултожбарглар ранги билан тола узунлиги ва чиқими ўртасида коррелятив шока боғлиқлиги аниқлади. Унинг далиллари бўйича гултожи барглар рангининг омишлари тола узунлигининг ортиши билан ва зичлигининг қимайиши билан боғлиқ. Ёўза ўсимлигида морфобюлогик белгилари билан энг муҳим кимматли хўжалик белгилари ўртасидаги корреляцион боғлиқликни ўрганиш селекция учун муҳим аҳамиятга эга ҳамда бу шокалардан селекцияда янги зот ва навларни чиқаришда фойдаланиш имконини беради. Янги дунё ғўзаларида паст тола индекси яланғоч уруғлилик билан боғлиқлигини ҳамда панжасимон кесик баргли ўсимликларнинг тола индекси панжасимон бўлинма (оддий) баргли ўсимликларнинг нисбатан паст бўлганлигини қайда этади.

Н.Т. Симонгулян [1969] ёўзанинг эртагишарлик масаласи билан шуғулланиб, эртагишарлик билан тола узунлиги, кўсакнинг йириклиги каби белгилар орасида манфий алоқадорликни аниқлади. Корреляция коэффициентлари у қадар юқори бўлмаганини айтган.


Ёўзанинг хўжалик белгилар ўртасидаги узвий боғлиқликларни F_2 ўсимликлари чегарасида ўрганиш бўйича кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Бироқ, юқори авлод дурагайлариди, айниса туричи генетик хилма-хилликлари иштирокида олинган дурагай ўсимликларнинг кейинги авлодларида белгиларнинг ўзаро коррелятив боғлиқликларини ўрганиш бирмунча қизиқиш уйғотади.

Ўсимлик бўйи билан биринчи ҳосил шохи кўрсаткичлари орасидаги корреляция коэффициенти ажратиб олинган оилалари 2011-2013 йил натижаларига кўра қиёсий таҳлил қилинганда, баъзи оилаларда бир берида кескин фарқ қилиши кузатилади. 2011 йил натижаларига кўра, ўсимлик бўйи билан биринчи ҳосил шохи ўртасида кучсиз, кучли ижобий ва деярли корреляцион боғлиқлик қайд этилмаган оилалар ҳам аниқланди. Жумладан, оила популяциялари таҳлил қилинганда фақат битта «Оила 1» корреляция коэффициентининг кучли ижобий ($r=+0,92$) боғланиш қайд этилган бўлса, «Оила 2», «Оила 4» популяцияларида деярли боғлиқлик ($r=0,001$) кузатилмади (4.5-расм).

Туричи дурагайлаш асосида ажратиб олинган оилаларда ёўзанинг морфо-хўжалик белгилари ўсимлик бўйи билан ҳосил шохлар сони ўртасида корреляция коэффициенти таҳлил қилинганда ажратиб олинган «Оила 2», «Оила 3», «Оила 6» популяцияларида ўртача ижобий боғланиш ($r=+0,45$; $r=+0,53$; $r=+0,63$) кузатилган бўлса, «Оила 4» популяциясида деярли боғланиш ($r=0,007$) кузатилмаган бўлса, қолган оилаларда кучсиз ижобий боғланиш қайд этилди.

G. barbadense L. хилма-хилликларини дурагайлаш асосида олинган оилаларда морфо-хўжалик белгилари яъни, биринчи ҳосил шохи билан ҳосил шохлар сони кўрсаткичлари орасидаги корреляция коэффициенти 3 йиллик


(2011-2013 йил) қиёсий таҳлил қилинганда ўрганилган оилаларида оилаларда деярли боғлиқлик кузатилмади, яъни «Оила 7» (F_3 $r=0,000036$), «Оила 4» популяцияларида (F_4 $r=0,000026$), «Оила 7» (F_5 $r=0,00008$) боғлиқлик кузатилмади ҳамда оилаларда корреляция коэффициентининг ўртача ва кучсиз ижобий боғлиқлик борлиги кузатилди (4.5-4.7-расм).



4.5-расм. *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини дурагайлаш асосида олинган оилаларининг морфо-хўжалик белгиларининг узвий боғлиқлиги (2011 йил).

G. barbadense L. туричи хилма-хилликларини дурагайлаш асосида олинган йирик кўсакли оилаларнинг иккинчи йилги (2012 йил) натижаларига кўра, ўрганилган морфо-хўжалик белгиларидан ўсимлик бўйи билан биринчи ҳосил шохи кўрсаткичи ўртасидаги корреляция коэффициенти қиёсий ўрганилган оилаларда бир берида кескин фарқ қилиши кузатилади, биринчи йилги натижаларга нисбатан кучли ижобий боғланиш кузатилмади ва кучсиз


ижобий ҳамда деярли боғлиқлик кайд этилмаган оилалар ҳам аниқланди. Жумладан, «Оила 1» популяцияларида ($r=+0,23$) кучсиз ижобий боғланиш кайд этилган бўлса, «Оила 3» ($r=+0,001$), «Оила 8» ($r=+0,003$), популяцияларида деярли корреляцион боғланиш ҳолати кузатилмади.



4.6-расм. *G. barybdenae* L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида олинган оилаларининг айрим морфо-ҳўжалик белгиларининг ўзвий боғлиқлиги (2012 йил).

Ўзанинг айрим морфо-ҳўжалик белгилари яъни, ўсимлик бўйи билан, ҳосил шоҳлар сони ўртасида корреляция коэффициенти тахлил қилинганда, ўрганилган «Оила-3» популяциясида ўртача ($r=+0,39$) боғланиш кайд этилди, қолган оилаларда кучсиз «Оила-2» ($r=+0,32$), «Оила-2» ($r=+0,02$), «Оила-9» ($r=+0,04$), «Оила-1» ($r=+0,05$) корреляцион боғланиш кайд этилган бўлса, ўсимлик бўйи билан ҳосил шоҳлар сони ўртасида ўрганилган «Оила-6» ($r=+0,00067$), «Оила-8» ($r=+0,008$) популяцияларида деярли корреляцион боғлиқлик аниқланмади.

2013 йилги тадқиқикот натижаларига кўра, ўзанинг *G. barybdenae* L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида ажратиб олинган йирик қўсақли оилаларда ўзанинг морфо-ҳўжалик кўрсаткичларидан ўсимлик бўйи билан биринчи ҳосил шоҳида корреляция коэффициенти бўйича деярли барча ўрганилган оилаларда кучсиз ижобий ($r=+0,005$; $r=+0,17$) корреляцион боғланиш кузатилди. Жумладан, «Оила 2» популяцияларида кучсиз ижобий ($r=+0,17$) корреляцион боғланиш кайд этилди.



4.7-расм. *G. barybdenae* L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида олинган оилаларининг морфо-ҳўжалик белгиларининг ўзвий боғлиқлиги (2013 йил).

Ўзанинг айрим морфо-ҳўжалик белгиларидан ўсимлик бўйи билан, ҳосил шоҳлар сони кўрсаткичларининг корреляцион боғлиқлиги тахлил қилинганда биринчи ва иккинчи йилги натижалар билан аналогик ҳолат кайд этилди.

У БОБ. ПЕРУ ГЎЗА ТУРЛАРИНИ ТУРИЧИ ВА ТУРЛАРАО ДУРАГАЙЛАШ АСОСИДА ОЛИНГАН F₁-F₂ ЎСИМЛИКЛАРИДА МОРФОБИОЛОГИК БЕЛГИЛАРНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ

5.1-§. Кун узунлигига талабчанлик

Мазлумки, фотопериодизм жараёни эволюцияси эртапишарлик каби
ғўзанинг тропик ўлкалардан, табиий узун кун бўлган шимолий минтақаларга
силжиши билан ҳамбарчас боғлиқдир. Ғўзанинг бошланғич фотопериодга
талабчанлигининг полиморфизми сабабли, турли мутациялар ҳамда табиий
ва сунъий танлашлар натижасида фотопериодга сезувчанлиги паст ёки
эртапишар, куннинг узунлигига деярли нейтрал бўлган навлар етиштиришга
муваффақ бўлинган Н.Г. Симонгулян, С. Мухамедханов, А. Шафрин [1987],
Ф.У. Рафиева [2017], Ф.У. Рафиева, С.М. Ризаева [2018], [260; 24-б., 268; 7-
10-б.].

Н.Г. Симонгулян, С. Мухамедханов, А. Шафрин [1987] таъкидлашича,
ғўзанинг фотопериодга сезувчанлиги узун кун шароитида биринчи хосил
шохининг баъандлигига қараб аниқланади. Бу белгилар турли хил генлар
tizими билан бошқарилсада, бир-бирига боғлиқ бўлган ҳамбарчас боғлиқдир.
Ўрганилган бошланғич манбалар ёввойи, рудерал ва маданий тропик
шакллар фотопериодга талабчанлиги, маданий навлар эса узун кунга
нейтраллиги билан тавсифланади.

Ёввойи турлар, тур кенжа ва шакллари амалий селекция
таджикотларига жалб этиш, фақат уларгана хос бўлган морфобиологик
белгиларни, яъни фотопериодга талабчанлик, шохланиш тип, баргларидаги
антоциан доғ, гулгожибаргларидаги антоциан доғининг ирсийланиши, тола
ранги, тукчалар ранги, туксизлик, толасизлик, хлорофил бўлмаслиги,
эркакча пуштаклиги каби белгиларнинг ирсийланиш тавсифини ўрганиш
кўпшаб олимларнинг эътиборини жалб этди. Бу борадаги ишлар саноклидир
Б.А. Сирожиiddинов [2017], J.C. McCarty, J.N. Jenkins [1993].

Н.Г. Симонгулян, С. Мухамедханов [1969] қайи этишича, ғўзанинг ўрта
толалли турда фотопериодик реакция полиген генлар тизими орқали

бошқарилишини, узун кунга «нейтраллик» реакцияси доминантлигини
исботлаб берганлар.

Ф.У. Рафиева [2017] олиб борган таджикотларда, тетраплоид ғўза
турларини турларо дуратайлаш асосида олинган *G. muselimit* х
«Бешкахрамон» нави дуратай комбинацияларида кун узунлигига талабчанлик
белгисининг ирсийланиши тахлилгига кўра, F₂ дуратайларида эса бу ҳолат
бўйича узун кун шароитида кенг доирадаги ўзарувчанликни намоён этган.
Ўрганилган белгининг 15:1 нисбатда ирсийланиши полимер генларнинг
нокумулятив таъсирида бошқарилишини аниқлаган.

G. barbadense L. турини ярим ёввойи кенжа турига мансуб *f. ratat*
шакли, маданий тропик *subsp. vitifolium*, *f. brasiense* шакли, маданий Карши-
8 нави ва *G. dalwini* турини дуратайлаш асосида олинган турини ва турларо
F₂ ўсимликларини фотопериодик реакциясини ирсийланиши тахлил қилинди.
Ёввойи *G. dalwini* Watt тури, *subsp. vitifolium* кенжа тури, *f. ratat*, *f.*
brasiense шакллари фотопериодга талабчан бўлиб, узун кунда уларнинг
биринчи хосил шохи 15-24 бўғинда бўлиб сунъий қиска кунда 7-9 бўғинда
жойлашади. *G. barbadense* L. хилма-хилликлари кун узунлигига талабчан
бўлиб, (13-15 соат) шароитида биринчи хосил шохи 23-30 бўғинда, сунъий
қиска кун (10 соат) шароитида эса 9-10 бўғинда хосил бўлади (5.1-жадвал).

Ўрганилган турини F₁, F₂ *subsp. vitifolium* х Карши-8 дуратай
комбинациясини кўриб чиқамиз. F₁-ўсимликлари узун кунда бемалол
шоналаб, гуллаб, хосил тутиши, F₂-ўсимликларида эса узун кун шароитида
кенг ўзарувчанлик кузатилади. Биринчи хосил шохининг ўзарувчанлиги 4-5
да 20 ва ундаги юкори бўғинларда кузатилади. Тахлил қилинган 206 та
дуратай ўсимликлардан 194 таси (hs=4-15) узун кунга нейтрал, 12 таси
(hs=15-20 ва ундан юкори) фотопериодга талабчан ўсимликларга ажралиб
чқиниши кузатилади.

Бошланғич манбалар ва уларнинг F₁, F₂ ўсимликларида кун узунлигига талабчанлик белгисининг ирсийланиши

№	Бошланғич манбалар ва F ₁ -F ₂ дурагай комбинациялари	Ўрганилган ўсимликлар сони, дона	Фотопериодга				Нисбат	X ²	P
			талабчан бўлган ўсимликлар сони		талабчан бўлмаган ўсимликлар сони				
			дона	Фонз	Дона	Фонз			
Бошланғич манбалар									
1	subsp.vitifolium	5	5	100,0	-	-			
2	subsp.vitifolium f.brasiliense	5	5	100,0					
3	subsp.eubarbadense Қарши-8	5	-	-	5	100,0			
4	subsp.eubarbadense Ам-8	5	-	-	5	100,0			
F ₁ -ўсимликлари									
5	F ₁ subsp.vitifolium x Қарши-8	10	-	-	10	100,0			
6	F ₁ Қарши-8 x subsp.vitifolium	10	-	-	10	100,0			
7	F ₁ Ам-8 x f.brasiliense	10	-	-	10	100,0			
8	F ₁ f.brasiliense x Ам-8	10	-	-	10	100,0			
F ₂ -ўсимликлари									
9	F ₂ subsp.vitifolium x Қарши-8	206	12	5,9	194	94,1	15:1	0,05	0,99-0,95
10	F ₂ Қарши-8 x subsp.vitifolium	213	16	7,5	197	92,5	15:1	0,57	0,50-0,20
11	F ₂ Ам-8 x f.brasiliense	207	11	5,4	196	94,6	15:1	0,30	0,80-0,50
12	F ₂ f.brasiliense x Ам-8	184	8	4,3	176	95,7	15:1	1,07	0,50-0,20

Генетик тахлил натижасига кўра, амалда олинган кўрсаткичлар кутилган назарий кўрсаткичларга жуда яқин бўлди. Ўрганилган белги 15:1 нисбатда ирсийланиши полимер генларнинг ноккумулятив таъсирида бошқарилишини, subsp. vitifolium кенжа тури фотопериодга талабчанлик, адабиётларда кайд этилгандек (Симонгулян, Мухамедханов, 1980) 3 та рецессив генлар rh₁, rh₂, rh₃ билан, узун кунга нейтраллик реакцияси эса иккита доминант генлар Rh₁, Rh₂ ва битта рецессив rh₃ ген томонидан бошқарилишини кўрсатади. Бунда $\chi^2=0,05$, P=0,99-0,95 оралиғида бўлди.

Бундан ташқари F₂ Ам-8 x f. brasiliense рециспрок дурагай комбинациялари тахлил қилинганда 207 та дурагай ўсимликлардан 196 таси (hs=4-15) узун кунга нейтрал, 11 таси (hs=15-20 ва ундан юқори) фотопериодга талабчан ўсимликларга ажралиб чиқди ҳамда фотопериодик реакция 15:1 нисбатда полимер генларнинг ноккумулятив таъсирида ирсийланиши кузатилди.

5.2-§. Антоциан рангли ўсимликларнинг ирсийланиши

Ўзанинг Gossypium L. туркумига мансуб кўпгина турларида, хатто маданий навлари орасида ҳам антоциан рангли ўсимликлар учрайди. Мавжуд адабиётлар шуни кўрсатдики бир канча олимлар тадқиқот ишларини олиб беришлар Д.А. Мусаев [1979], Р.Г. Коhel [1972].

Р.Г. Коhel [1972] ўз тажрибаварида, кўза ўсимлигида антоциан (кизил) рангини назорат қилувчи R₁ генини III бирикш турхига, гултожбەرглار антоцида бўлган антоциан доғни I бирикш турхига киритади.

Д.А. Мусаев [1979] кўза генетик коллекциясининг тизмаларида ранглик рангининг ирсийланишини ўрганиб, бу белгининг монотен вариантга эга эканлигини аниқлади ҳамда ўсимлик вегетатив органларида антоциан рангининг ривожланишини назорат қилувчи генини-R₂ символи билан белгиледи.

Н.С. Омельченко, С.С. Салыков [1980] олиб борган илмий тадқиқотида, кўзанинг тетраплоид G. hirsutum L. ва G. barbadense L. турларида бир пластинкасининг антоциан ранги битта асосий ген-R₂

томонидан бошқарилишини кўрсатадилар. Муаллифлар рантнинг қанчаллик тўқ ёки оч бўлишligи кўшимча полимерия типига таъсир этувчи R_1^+ , R_1^- , R_2^+ генларига боғлиқ деб ҳисоблайдилар.

М.Ф. Абзалов ва бошқалар [1990], М.Ф. Абзалов, Г.Н. Фатхуллаева, Ш.Х. Атабаева [1986] генетик коллекциянинг инбред линияларида F_2 ўсимлиги антоциан рантининг ирсийланишини ўргандилар. Тажриба учун олинган Д-12-1, Д-33, Д-35 линиялар ўсимлик барги қисмининг антоциан рангга эга бўлишligи билан, Д-477 линия эса бу рантнинг пояда ва барт пластинкаси томирларида кучли ривожланганлиги билан, Д-12, Д-476, Д-501 тизмалар эса ўзининг яшил ранглиги билан ажралиб турадилар. Муаллифларнинг далилига кўра, Д-2-1 x Д-501, Д-12 x Д-35, Д-476 x Д-477, Д-501 x Д-477 дурагай комбинацияларида F_1 ўсимликлари оралик рангга эга бўлганлар, F_2 ўсимликларда эса моно факторал ажралиш содир бўлиб иккита фенотипик синф (антоциан + оралик рангли ва яшил рангли) ажралиш кузатишган. Бу синфларнинг нисбати 3:1 га тенг бўлган. Д-12-1 x Д-477, Д-33 x Д-477 дурагай комбинацияларида эса F_1 дурагайлари антоциан ранги ота-она рангларидан кучсизроқ ифодаланган антоциан рангга эга бўлганлар. F_2 ўсимликларда антоциан ранг бўйича ажралишни кузатганлар ва ҳосил бўлган антоциан ва яшил рангли ўсимликлар фенотипик синфларнинг 15:1 бўлган нисбатини олганлар. Бу нисбат белгининг ирсийланиш иккита ирсий факторга боғлиқлигидан дарак беради.

М.Ф. Абзалов, Г.Н. Фатхуллаева [1991] генетик коллекциянинг янги линияларида ўсимлик ранги ва ўсимлик гули рантининг ирсийланишини ўрганишган. Бошланғич манба сифатида Д-662, Д-663, Д-665 (ўсимлик ҳамда гули тўқ қизил рангга) тизмалари олинган. Д-660 линия (антоциан пигментнинг тақсимланиши худди Д-477 тизманикига ўхшаш, аммо гулининг ранги - сарик), Д-12-1 (ўсимлик ҳамда гули антоциан рангга), Д-12 тизма (ўсимлик яшил рангга, гули эса сарик), Д-662 x Д-12, Д-12 x Д-663, Д-12 x Д-665 комбинацияларининг F_1 дурагайлари пояси, барги ва гулининг антоциан рангга бўлишligи билан характерланган. F_2 ўсимликларда ажралиш 15:1 нисбатда ирсийланиши аниқланган.

Д.А. Мусаев, ва бошқалар [2004] олиб борган илмий изланишларида, F_2 рантнинг генетик коллекциясининг Д-38, Д-450, Д-4110 тизмаларини ўзаро дурагайлашдан олинган F_2 ўсимликларда антоциан ранги фонига тола чиқими, 1000 дона чигит вазни, кўсақларининг йириклиги ва битта ўсимликдан олинган толали пакта ҳосилдорлигини ирсийланишни тадқиқ қилиш натижасида қуйидагиларни аниқлаган. Тола чиқими маркерли белги-ўсимлик ранги генининг аллеллари ҳолатига боғлиқ бўлмаган ҳолда ирсийланган. Иккинчи авлод ўсимликларда олинган яшил рангли (pp tr) ва оралик рангли (R_p tr) ўсимликларда 1000 та уруғнинг оғирлиги антоциан рангли (R_p , R_p) ўсимликларни кимга нисбатан юқори бўлиши кузатишган ҳамда аналогик ҳолат ўсимлик ранги билан ҳосилдорлик белгиларининг ирсийланишини ҳам кузатишган.

F_2 рантнинг *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларидан маданий тропик subsp. *vitifolium* кенжа тури, *f. brasiense* шакли, маданий Қарши-8 нав намуналари ўрганилди. Дурагайлаш натижасида олинган F_1 - F_2 ўсимликларининг антоциан ранги ирсийланиши таҳлил қилинди. Тадқиқот учун танланган *f. brasiense* шакли антоциан рангли ўсимликлар бўлиб, маданий тропик subsp. *vitifolium* кенжа тури ва маданий Қарши-8 нави номуналари эса яшил пояли ўсимликлар ҳисобланади (5.2-жадвал).

Туричи F_1 , F_2 *f. brasiense* x subsp. *vitifolium* дурагай комбинациялари таҳлил қилинди. Дурагайлаш натижасида олинган F_1 -ўсимликлари барчаси тўқ антоциан рангли ўсимликлар ҳосил бўлди. Ўрганилган F_2 -ўсимликларда эса антоциан рангли ўсимликлар бўйича кенг ўзгариувчанлик кузатилди. F_2 *f. brasiense* x subsp. *vitifolium* дурагай комбинацияси таҳлил қилинганда 212 та дурагай ўсимликлардан 196 таси антоциан рангли ўсимликлар, 16 таси яшил пояли ўсимликлар ажралиб чиқиши кузатилди ва бунда $\chi^2=0,60$, $P=0,50-0,20$ оқилишида бўлди. Адабийётларда қайд этилгандек, антоциан рангли ўсимликлар икки ген томонидан бошқарилишини кўрсатади ҳамда антоциан ранг бўйича генотипи- R_p , R_p , R_p' , R_p' эса эканлиги аниқланди.

Бошланғич манбалар ва уларнинг F₁, F₂ ўсимликларида антоциан рангли
ўсимликларнинг ирсийланиши

№	Бошлангич манбалар ва F ₁ -F ₂ дурагай Комбинациялари	Ўрганилган ўсимликлар сони, дона	Ўсимликлар ранги				Нисбат	X ²	P
			Антоциан рангли		Яшил пояли				
			дона	фонз	Дона	Фонз			
Бошлангич манбалар									
1	subsp.vitifolium	5	-	-	5	100,0			
2	subsp.vitifolium f.brasiliense	5	5	100,0	-	-			
3	subsp.eubarbadense Ам-8	5	-	-	5	100,0			
F ₁ -ўсимликлари									
4	F ₁ f.brasiliense x subsp.vitifolium	10	10	100,0					
5	F ₁ subsp.vitifolium x f.brasiliense	10	10	100,0					
6	F ₁ Ам-8 x f.brasiliense	10	10	100,0					
7	F ₁ f.brasiliense x Ам-8	10	10	100,0					
F ₂ -ўсимликлари									
9	F ₂ f.brasiliense x subsp.vitifolium	212	196	92,4	16	7,6	15:1	0,60	0,50-0,20
10	F ₂ subsp.vitifolium x f.brasiliense	208	194	93,2	14	6,8	15:1	0,08	0,99-0,95
11	F ₂ Ам-8 x f.brasiliense	207	195	94,2	12	5,8	15:1	0,07	0,99-0,95
12	F ₂ f.brasiliense x Ам-8	184	171	92,9	13	7,1	15:1	0,20	0,80-0,50

5.3-§. Шоҳланиш типи

G. barbadense L. туричи хилма-хилликларининг морфологик белгиларининг ирсийланишини генетик таҳлил қилиш амалий селекция учун фойдали белги ва хусусиятга эга бўлган гўза навларини яратиш учун зарур бўлибгина қолмай, балки туричи ва турлараро дурагайлашдаги тутган ўрнини минқлашда ҳам жуда катта аҳамиятга эгадир. Табиий шароитда ўсадиган гўзанинг ёввойи, ярим ёввойи (рудерал), маданий тропик кенжа турлари ва уларнинг ўзаро дурагай шакллари кўп йиллик хусусиятини намоян қилиши на шоҳланиш типининг ўзгартувчанлиги кўлаб олимлар Д.В. Тер-Аванесян [1973], А.Б. Амантурдиев, Р.Г. Ким [2009] ва бошқаларнинг илмий натижаларида келтирилган.

Таққикотларимиз натижасида, тетрапloid *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликлари ва ёввойи *G. dalwii* Watt. турининг морфологик белгиларидан шоҳланиш типи бўйича ирсийланиши ўрганилган бошланғич манбалари, туричи ва турлараро F₁-F₂ ўсимликлари ўсишига ва шоҳланиш типига бoғлиқ ҳолда нол шоҳланиш типли ҳамда симподиал типларга киритилди (5.3-жадвал).

Гўзанинг морфологик белгиларининг ирсийланиши бўйича кузатишлар сонб борилган бошланғич шакллари ёввойи *G. dalwii* Watt тури, ярим ёввойи (рудерал) f. *risco* белги ўрганилган бўйича кўрсаткич 100,0 % симподиал шоҳланиш типли кузатилди, ҳамда маданий Қарши-8 нави ўсимликлари эса 100,0 % нол типли шоҳланиш кузатилди. Дурагайлаш натижасида олинган F₁-ўсимликлари комбинацияларидан бўлган F₁ *(dalwii)* Watt x Қарши-8, F₁ Қарши-8 x f. *risco* рецетпрок дурагай комбинацияларида ушбу кўрсаткич бўйича 100 % симподиал шоҳланиш типли кайта этилди.

Туричи дурагайлаш асосида олинган F₂-ўсимликлари эса морфологик белгилардан бири бўлган шоҳланиш типли белгиси бўйича турича бўлиб,

Бошланғич манбалар ва уларнинг F_1 , F_2 ўсимликларининг
шоҳланиш типини белгисининг ирсийланиши

шохланиш типى بەلگىسىنىڭ پىرىنكلىنىش									
№	Бошлангич манбалар ва F ₁ -F ₂ дурагай комбинациялари	Ўрганилган ўсимликлар сони, дона	Нул типли		Симподиал		Нис- бат	X ²	P
			дона	Фоиш	дона	Фоиш			
Бошлангич манбалар									
1	<i>G.darwinii</i> Watt	5	-	-	5	100,0			
2	subsp. <i>ruderae</i> f. <i>pisco</i>	5	-	-	5	100,0			
3	subsp. <i>vitifolium</i>	5	-	-	5	100,0			
4	subsp. <i>eubarbadense</i> (Қарши-8)	5	5	100,0	-	-			
F ₁ -ўсимликлари									
5	F ₁ subsp. <i>vitifolium</i> x Қарши-8	10	-	-	10	100,0			
6	F ₁ Қарши-8 x subsp. <i>vitifolium</i>	10	-	-	10	100,0			
7	F ₁ <i>G.darwinii</i> Watt x Қарши-8	10	-	-	10	100,0			
8	F ₁ Қарши-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	10	-	-	10	100,0			
9	F ₁ Қарши-8 x f. <i>pisco</i>	10	-	-	10	100,0			
10	F ₁ f. <i>pisco</i> x Қарши-8	10	-	-	10	100,0			
F ₂ -ўсимликлари									
11	F ₂ subsp. <i>vitifolium</i> x Қарши-8	206	55	26,7	151	73,3	3:1	0,30	0,80-0,50
12	F ₂ Қарши-8 x subsp. <i>vitifolium</i>	213	59	27,6	154	72,4	3:1	0,82	0,50-0,20
13	F ₂ <i>G.darwinii</i> Watt x Қарши-8	233	68	29,2	165	70,8	3:1	2,17	0,20-0,05
14	F ₂ Қарши-8 x <i>G.darwinii</i> Watt	124	36	29,0	88	71,0	3:1	1,06	0,50-0,20
15	F ₂ Қарши-8 x f. <i>pisco</i>	214	60	28,0	154	72,0	3:1	1,04	0,50-0,20
16	F ₂ f. <i>pisco</i> x Қарши-8	215	57	26,5	158	73,5	3:1	0,25	0,80-0,50

туричи F_2 Қарши-8 x f. *pisco* дурагай комбинациясининг-214 та ўсимлигидан, 154 та (72,0 %) симподиал шоҳланиш тип, 60 таси (28,0 %), нул типли шоҳланишга эга бўлганлиги кузатилади. Бу комбинация ўсимликларида шоҳланиш типининг ирсийланиши 3:1 ($\chi^2=1,04$, $0,50>P>0,20$) нисбатга тенг бўлди.

Маданий тропик subsp. *vitifolium* кенжа тури симподиал шоҳланиш типли бўйича кўрсаткич 100,0 % симподиал шоҳланиш типини ҳамда маданий Қарши-8 нави ўсимликлари эса 100,0 % нул типли шоҳланиш кузатилади. Дурагайлаш натижасида олинган, F_1 Қарши-8 x subsp. *vitifolium* реципрок дурагай комбинацияларида бўйича кўрсаткич бўйича 100 % симподиал шоҳланиш типини аниқланди. Ўрганилган туричи F_2 subsp. *vitifolium* x Қарши-8 комбинациясининг 206 та ўсимлигидан, 151 (73,3 %) таси симподиал, 55 (26,7 %) нул типли шоҳланиш типига эга эканлиги қайд этилди. Тахлил қилинган ўсимликлари шоҳланиш типини белгиси бўйича ирсийланиши 3:1 ($\chi^2=0,30$, $0,80>P>0,50$) нисбатга тенглиги аниқланди.

F_2 нинг турдари F_2 *G.darwinii* Watt x Қарши-8 комбинациясининг-213 та ўсимлигидан, 165 таси симподиал шоҳланишга эга бўлди. Бу эса ўсимликлари шоҳланиш типини бўйича ирсийланиши 3:1 ($\chi^2=2,17$, $0,20>P>0,05$) нисбатга тенглигини кўрсатади. Олинган натижалар юқорида келтирилган комбинация ўсимликларида 3-қисми симподиал шоҳланиш типини, 1-қисми эса нул типли шоҳланишнинг ирсийланиши тўлиқ доминант моноген типда амалга ошишини кўрсатади.

И БОБ. *G. barbadense* L. ТУРИЧИ ДУРАГАЙ ПОПУЛЯЦИЯЛАРИДАН ОЛИНГАН ОИЛАЛАР, ТИЗМАЛАР ВА ЯНГИ ЯРАТИЛГАН ҒЎЗА НАВИДА КИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Олдимизга қўйилган вазифаларидан бири этиб, *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини ўзаро дуратайлаш асосида олинган ноёб оила, тизмаларни яратиш ва уларни белгилар бўйича генетик-селекцион тадқиқотларда фойдаланиш учун тавсия этиш билан белгиланган. Туричи дуратайларни авлодма-авлод ўрганиш ва танлов ишларини олиб бориш давомида уларнинг юқори авлодларидан ноёб хўжалик белгиларга эга бўлган кўпшаб янги оила ва тизмалар ҳамда кимматли хўжалик белгилари мажмуасига эга бўлган нав яратилди. Ўрганилган оила, тизмалар ва навининг хўжалик белгилари андоза Термиз-31 нави билан таққослаб ўрганилди. *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини ўзаро дуратайлаш асосида олинган оилалар асосида яратилган янги тизмаларнинг морфо-хўжалик белгилари бўйича ўрганишлар орқали уларнинг наводорлик белгилари бўйича барқарорлашувига катта эътибор қаратилди (1-2-3-илова).

6.1-§. *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини ўзаро дуратайлаш асосида олинган оилаларда кимматли хўжалик белгиларининг

шақлланиши

Ҳозирги вақтда ингичка тоғали ғўза тури учун тезпишар навлар яратиш устида изланишлар олиб бориш доимо долзарб муаммо бўлиб келган. Шунинг учун, тадқиқотларимизда тезпишарлик белгисига алоҳида эътибор қаратилди ва ажратиб олинган оилаларда тезпишарликнинг асосий компоненти бўлган 50% кўсаклар очилишигача бўлган даври бўйича қўйида тахлил этилди. Ушбу оилаларни ажратиб олишда келиб чиқишида иштирак этган тезпишар Қарши-8 навининг ижобий таъсири кучли бўлганлигини қайи этиш зарур. Ўсимликларда 50 % кўсаклар очилишигача бўлган даври оилаларга хос равишда 118,5 дан 122,3 кунгача бўлган ораликда жойлашиб, бу кўрсаткич андоза Термиз-31 нави кўрсаткичидан 2,3-6,0 кунгача тезпишар

эканилигини кўрсатди. Ўрганилган ўсимликларнинг 50 % кўсаклар очилишгача бўлган даври бўйича энг ижобий натижа «Оила-4» популяциясида кузатилиб, андоза Термиз-31 навидан 6,1 кун эртапишар бўлганлигини кўрсатди. Қолган оилалар ҳам андоза Термиз-31 навидан устун эканилиги аниқланди (6.1-жадвал).

6.1-жадвал

G. barbadense L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида
ажратиб олинган оилаларнинг 50 % кўсаклар очилишигача бўлган
даври бўйича ажратиб олинган оилалар, кун

Оилалар	Оилаларнинг келиб чикиши	$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	V %	Андозага нисбатан $\pm$ фарқи
Термиз-31	Андоза нав	124,6 $\pm$ 1,0	4,7	$\pm$
Оила-1	Қарши-8 x <i>spr. vifolium</i>	119,5 $\pm$ 1,3	5,3	-5,1
Оила-2	--/--	120,1 $\pm$ 1,9	7,2	-4,5
Оила-3	--/--	122,3 $\pm$ 1,4	5,4	-2,3
Оила-4	--/--	118,5 $\pm$ 1,6	5,6	-6,1
Оила-6	<i>spr. vifolium</i> x Қарши-8	119,4 $\pm$ 1,7	5,7	-5,2
Оила-7	--/--	121,4 $\pm$ 1,8	6,2	-3,2
Оила-8	--/--	119,3 $\pm$ 1,7	5,9	-5,3
Оила-9	--/--	120,3 $\pm$ 1,9	7,3	-4,3

Умуман олганда, *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини ўзаро дуратайлаш асосида олинган оилаларнинг тезпишарлик белгиси ижобий бўлиб, ушбу оилалардан тезпишар навлар яратиш юзасидан олиб бориладиган тадқиқотларни давом эттириб эртапишар хусусиятга эга бўлган нарма ва навлар олиш имконини беради.

Маълумки, ингичка тоғали ғўза турида йирик кўсақли навлар яратиш устида илмий изланишлар бориш доимо энг муҳим муаммолардан бири бўлиб келган. Шунни инобатга олган ҳолда, битта кўсақдаги пахта вази белгиси канчалик юқори бўлса шунчалик юқори ҳосилдорликка эришиш мумкин. Ажратиб олинган оилаларда битта кўсақдаги пахта вази кўрсаткичи ўртача 4,8-5,6 г ни ташкил этиб, бу андоза Термиз-31 навининг кўрсаткичидан 1,5-2,4 г та юқори эканилиги аниқланди. Ушбу белги бўйича

андоза навта нисбатан энг юкори кўрсаткич 5,6 г «Оила 7» популяцияларида кузатилди ва шунга мос равишда вариация коэффиценти эса 10,4 % ни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин. Қолган оилаларда ҳам битта кўсакдаги пахта вази белгиси бўйича юкори кўрсаткичларга эга эканлигини кўришимиз мумкин. Факатгина «Оила 2» популяцияларида бироз паст кўрсаткич 4,7 г бўлган бўлса, вариация коэффиценти эса 8,8 % ни ташкил этди (6.2-жадвал).

Ўрганлган оилаларнинг барчаси *subsp. vitifolium* кенжа тури иштирокидаги дурағайлардан ажратиб олинган бўлиб, бу *subsp. vitifolium* кенжа тури иштирокида чагиштиришлар олиб бориш асосида йирик кўсақли оилалар ажратиб олиш имконияти юкори эканлигини исботлайди.

Битта кўсакдаги пахта вази бўйича ажратиб олинган оилаларнинг кўрсаткичи, андоза навлан сезиларли равишда юкорилитини кўрсатиб, келажакда улардан йирик кўсақли навлар яратишда фойдаланиш яхши самара беради.

Ўзанинг ҳосилдорлик компонентларидан яна бири бу 1000 дона чигит вази белгиси ҳисобланиб, бу белги бўйича оилалар ажратиб олинди. Ўрганлган қимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган 1000 дона чигит вази кўрсаткичи бўйича энг яхши натижа «Оила 3» популяциясида кузатилиб, унинг натижаси 145,1 г, вариация коэффиценти эса 4,7 % ни ташкил этди ва бу андоза нав кўрсаткичидан +25,8 граммга юкори бўлишини таъминлади. Ажратиб олинган «Оила 7» популяциясида қолган оилаларга нисбатан паст кўрсаткич 129,0 г кузатилган бўлса, шунга мос равишда вариация коэффиценти эса 5,9 % кайд этилди ҳамда андоза навга нисбатан +9,7 кўрсаткиччи намоён этиди.

G. barbadense L. туричи хилма-хилликларини дурағайлаш асосида ажратиб олинган оилаларнинг барчаси ижобий кўрсаткичлар кайд этиб, улардан битта кўсакдаги вази ва 1000 дона чигит вази юкори бўлган тизма ва навлар яратиш борасидаги интичка толали ғўза селекцияси тадқиқотларида бошлангич ашё сифатида фойдаланиш тавсия этилади.

G. barbadense L. туричи хилма-хилликларини дурағайлаш асосида ажратиб олинган оилаларда битта кўсакдаги пахта вази ва 1000 дона чигит вази белгиси бўйича кўрсаткичлари

Оилалар	Оилаларнинг келиб чикиши	Битта кўсакдаги пахта вазин, грамм				Андозага нисбатан ± фарқи
		$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	limit	V %		
Битта кўсакдаги пахта вази						
Термиз-31	Андоза нав	3,2±0,10	2,2-3,2	10,1	±	
Оила-1	Қарши-8 х <i>ssp. vitifolium</i>	5,0±0,18	4,6-5,4	11,3	+1,8	
Оила-2	--/--	4,7±0,13	4,2-5,4	8,8	+1,5	
Оила-3	--/--	5,2±0,12	4,6-5,8	7,2	+2,0	
Оила-4	--/--	4,8±0,11	4,4-5,4	7,3	+1,6	
Оила-6	<i>ssp. vitifolium</i> х Қарши-8	4,8±0,05	4,6-5,0	3,6	+1,6	
Оила-7	--/--	5,6±0,11	5,6-6,5	10,4	+2,4	
Оила-8	--/--	5,2±0,14	4,7-6,0	8,7	+2,0	
Оила-9	--/--	5,5±0,24	4,0-6,5	13,7	+2,3	
1000 дона чигит вази						
Термиз-31	Андоза нав	119,3±0,02	117-123	1,43	±	
Оила-1	Қарши-8 х <i>ssp. vitifolium</i>	141,0±4,7	130-151	10,5	+21,7	
Оила-2	--/--	143,2±2,4	131-155	5,3	+23,9	
Оила-3	--/--	145,1±2,1	133-155	4,7	+25,8	
Оила-4	--/--	133,0±2,8	114-144	6,7	+13,7	
Оила-6	<i>ssp. vitifolium</i> х Қарши-8	143,3±3,1	133-151	6,9	+24,0	
Оила-7	--/--	129,0±2,4	120-143	5,9	+9,7	
Оила-8	--/--	131,3±1,3	125-138	3,2	+12,0	
Оила-9	--/--	135,8±1,9	129-146	4,5	+16,5	

Интичка толали ғўза навлари тола сифати бўйича дунё бозорида юкори ўринда туради. Шу сабабли яратилаётган янги интичка толали ғўза навларида навоий талаб толаси узун ва чикими юкори бўлиши керак. Иллатишларимизда юкоридатиларни инобатга олиб, ушбу белгилар бўйича юкори кўрсаткичга эга оилалар ажратиб олинди (6.3-жадвал).

Ажратиб олинган оилаларнинг кўрсаткичи андоза Термиз-31 навлдан 0,1-2,2 мм гача юкори эканлиги аниқланди. Ўзанинг тола узунлиги белгиси

бўйча андоза навага нисбатан энг юкори кўрсаткич 40,5 мм «Ойла-8» популяцияларида кузатилди ва шунга мос равишда вариация коэффициенти эса 3,1 % ни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин. Қолган оила популяцияларида ҳам ушбу белгиси бўйча юкори кўрсаткичларга эга эканлигини кўришимиз мумкин ва «Ойла-3» популяцияларида нисбатан бироз паст кўрсаткич 38,4 мм бўлган бўлса, вариация коэффициенти эса 2,3 % ни ташкил этди.

Мавлўмки, тола бу ғўзанинг асосий махсулооти бўлиб, унинг микдорини ошириш қатта амалий аҳамиятга эгадир. Шунини инобатга олган ҳолда изланишларимизда тола чикими белгисига ҳам алоҳида аҳамият қаратдик. Тола чикими белгиси бўйча юкори кўрсаткичга эга оилалар ажратиб олинди.

Тола чикими белгиси бўйча энг яхши натижа «Ойла-8» популяция ўсимликларида кузатилиб, унинг натижаси ўртача 36,1%, вариация коэффициенти эса 5,3 % ни ташкил этди ва бу андоза нав кўрсаткичидан +2,1 % га юкори бўлишини таъминлади. Ажратиб олинган «Ойла-6» популяция ўсимликларида қолган оилаларга нисбатан паст кўрсаткич 34,4 % кузатилган бўлса, шунга мос равишда вариация коэффициенти эса 3,5 % қайд этилди ҳамда андоза навага нисбатан +0,4 кўрсаткични намоён этди. Ажратиб олинган бошқа оилаларда ҳам тола чикими белгиси бўйча кўрсаткичлари андоза навадан устун эканлигини кўришимиз мумкин.

Умуман олганда тола чикими белгиси бўйча ижобий натижаларга эришилиб, *G. barbadense* L. турини хилма-хилликларини дуратайлаш асосида ажратиб олинган оилаларни бярчасида ижобий кўрсаткичлар қайд этилди ҳамда тола чикими юкори бўлган оилаларни ажратиб олиш самараси юкори эканлиги исботланди.

6.3-жадвал
G. barbadense L. турини хилма-хилликларини дуратайлаш асосида
ажратиб олинган оилаларида тола узунлиги, тола чикими ва тола
индекси кўрсаткичлари

Ойлалар	Ойлаларнинг келиб чикими	Тола узунлиги, мм			Андозага нисбатан ±фарқи
		$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	Limit	V	
Тола узунлиги					
Термин-31	Андоза нав	38,3±0,02	37,0-39,0	2,1	±
Ойла-1	Қарши-8 x <i>spr. vitifolium</i>	38,5±0,7	37,0-40,0	5,8	+0,2
Ойла-2	--/--	39,5±0,4	38,0-41,0	2,8	+1,2
Ойла-3	--/--	38,4±0,3	38,0-40,0	2,3	+0,1
Ойла-4	--/--	38,8±0,3	38,0-40,0	2,9	+0,5
Ойла-6	<i>spr. vitifolium</i> x Қарши-8	39,0±0,5	38,0-41,0	3,6	+0,7
Ойла-7	--/--	40,1±0,3	38,0-41,0	2,9	+1,8
Ойла-8	--/--	40,5±0,4	39,0-42,0	3,1	+2,2
Ойла-9	--/--	38,5±0,3	38,0-40,0	2,6	+0,2
Тола чикими					
Термин-31	Андоза нав	34,0±0,03	32,0-36,0	3,6	±
Ойла-1	Қарши-8 x <i>spr. vitifolium</i>	35,0±0,9	33,0-37,0	8,0	+1,0
Ойла-2	--/--	35,8±0,5	34,4-38,0	4,5	+1,5
Ойла-3	--/--	34,7±0,3	33,7-35,4	2,4	+0,7
Ойла-4	--/--	36,0±0,3	35,0-37,6	2,9	+2,0
Ойла-6	<i>spr. vitifolium</i> x Қарши-8	34,4±0,4	33,2-35,2	3,5	+0,4
Ойла-7	--/--	35,5±0,4	34,0-37,0	3,6	+1,5
Ойла-8	--/--	36,1±0,6	33,5-38,0	5,3	+2,1
Ойла-9	--/--	35,3±0,9	32,0-39,2	8,3	+1,3
Тола индекси					
Термин-31	Андоза нав	6,5±0,14	5,6-7,8	6,2	±
Ойла-1	Қарши-8 x <i>spr. vitifolium</i>	7,3±0,15	6,6-7,8	6,5	+0,8
Ойла-2	--/--	7,8±0,21	6,7-8,9	8,9	+1,3
Ойла-3	--/--	7,6±0,19	6,6-8,7	7,8	+1,1
Ойла-4	--/--	7,6±0,22	6,8-9,1	9,4	+1,1
Ойла-6	<i>spr. vitifolium</i> x Қарши-8	6,9±0,39	5,9-8,7	10,5	+0,4
Ойла-7	--/--	8,2±0,44	6,7-8,4	8,6	+1,4
Ойла-8	--/--	7,5±0,48	5,9-8,6	11,2	+1,0
Ойла-9	--/--	7,0±0,34	5,3-8,0	14,4	+0,5

Ўздаги энг муҳим кўрсаткичлардан яна бири тола индекси белгиси ҳисобланади. Териб олинган пахта тола ҳосили шу навингт умумий ҳосилдорлиги ва тола бериши (сертолалиги) билан, яъни тола вазнинингт пахта вазнинга нисбати билан баҳоланади. Пахта ҳосили тенг бўлганда ҳам ўзинингт сертола нави тола ҳосилини кўп беради. Сертолалик чигитларинингт асослот вазнинга ва индексига боғлиқ бўлади.

Тола индекси белгиси бўйича энг яхши натижа «Ойла-7» популяриясида кузатилиб, унинг натижаси ўртача 8,2 вариация коэффициенти эса 8,6 % ни ташкил этди ва бу андоза нави кўрсаткичидан +1,7 юкори бўлишини таъминлади. Ажратиб олинган «Ойла-6» популяриясида колган оилаларга нисбатан паст кўрсаткич 6,9 кузатилган бўлса, шунга мос равишда вариация коэффициенти эса 10,5 % кайд этилди ҳамда андоза нави нисбатан тола индекси +0,4 кўрсаткичини намоён этди. Ажратиб олинган бошқа оилаларда ҳам тола индекси белгиси бўйича андоза навида усту эканлигини кўришимиз мумкин (6.3-жадвал).

Бу оилалар орасидан тола сифати I-II тип толаларга кўйилган талабларга тўлиқ жавоб бериши аниқланди ҳамда ажратиб олинган узу толали ушбу оилаларни тизма ва нави даражасига етказиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш орқали юкори самарадорликка эришиш мумкинлиги тасдиқланди. Юкорида кўрсатиб ўтилган узу толали оилалардан генетик селекция талқикотларда бошланғич ашё сифатида фойдаланиш тавсия этилади.

6.2-8. *C. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини ўзаро дуратайлаш асосида олинган тизмаларда кимматли хўжалик белгиларининг шаклланиши

Дунё бозорига халқ хўжалиги эҳтиёжларини қондиришда энг асосий хом-ашё манбаларидан бири пахта толаси ҳисобланади. Бунингт учун ўзинингт кимматли хўжалик белгилари жаҳон бозори талабларига жавоб берадиган юкори тола сифатига эга ўза навларини ишлаб чиқаришга жорий этишни тақозо этиди.

Талқикотларимиз асосида олинган йирик кўсакли дуратайлар ва бу авлодлардаги йирик кўсакли ўсимликларининг барқарорлигини ошириш натижасида яратилган янги тизмаларда ўзинингт кимматли хўжалик белгилари ҳисобланган битта кўсакдаги пахта вазни, тола узунлиги, тола чикими, 1000 донга чигит вазни ва тола индекси каби кўрсаткичларинингт шаклланиши ўрганилди. Шунга таъкидлаб ўтиш керакки, ўрганилган янги тизмаларинингт барчасида наводорлик белгилари бўйича кескин ажралиш жараёни кечмади. Бу эса яратилган янги тизмаларда хўжалик белгиларинингт барқарорлашганини кўришимиз мумкин.

Ўзинингт энг муҳим компонентларидан бири *тезпишарлик кўрсаткичлари* бўйича ўрганилган тизмаларинингт натижалари анча ижобий бўлиб, андоза сифатида киёсий ўрганилган Термиз-31 навида нисбатан тезпишар эканлиги аниқланди. Тегишли равишда ўрганилган тизмаларинингт 50 % кўсаклар очилишигача бўлган даври 117,2 (Т-1981) кундан 120,4 (Т-1982) кунгача бўлган ораликда жойлашди. Тезпишарлик белгиси бўйича энг яхши кўрсаткич Т-1981 тизмасида кузатилиди ва уларинингт тезпишарлик белгиси бўйича кўрсаткичи андоза Термиз-31 навида тегишли равишда 6,5 кунга эрталашар эканлигини кўрсатди. Колган барча тизмаларинингт кўрсаткичлари Термиз-31 навида юкори эканлиги кайд этилди (6.4-жадвал).

Умуман олганда тизмаларинингт келиб чиқишида иштирок этган бошланғич манбаларга боғлиқ ҳолда, тезпишар ёки кечпишар бўлиши мумкин. Кўлаб оимларинингт фикрита кўра, тезпишарлик ва ҳосилдорлик белгилари ўртасида салбий корреляция боғлиқлик мавжуд эканлигини айтиб ўтишган. Шунингт учун, ўзинингт энг муҳим компонентларидан тезпишар ва ҳосилдор навларни яратиш муаммо туғдириб келган. Ушбу ажратиб олинган тизмаларинингт тезпишарлик белгиси андоза Термиз-31 навида нисбатан анча ижобий эканлиги кўришимиз мумкин, ўрганилган бу тизмаларда ўзинингт ҳосилдорлик компонентлари кай даражада эканлигини аниқлаш юзасидан талқикотлар олиб борилади.

G. barbadense L. туринчи хилма-хилликларини дурагайлаш асосида олинган ажратиб олинган тизмаларда 50 % кўсаклар очилишинга эга бўлган даври бўйича ажратиб олинган тизмалар, кун.

Тизмалар	Тизмаларнинг келиб чиқиши	Ўсув даври, кун	Андозага нисбатан ± фарқи
		$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	
Термиз-31	Андоза нав	123,7±1,2	4,8
T-1987	F ₀ Карши-8 x <i>ssp. vitifolium</i>	118,2±1,2	4,9
T-1985	--/--	119,6±1,7	5,8
T-1982	--/--	120,4±1,3	5,1
T-1981	--/--	117,2±1,5	5,4
T-2006	F ₈₈ <i>ssp. vitifolium</i> x Карши-8	118,7±1,6	5,7
T-2008	--/--	119,3±1,5	5,3
T-2017	--/--	118,9±1,9	6,7
T-2017-2	--/--	121,7±1,7	6,2

Битта кўсақдаги пахта вази белгиси бўйича, ўрғанилган янги интичка тоғали тизмаларнинг кўрсаткичи ўртача 5,9 граммдан (limit 5,2-7,3 грамм) юқори бўлиб, андоза навадан жуда катта фарқ билан устун бўлди. Тизмалар орасида йирик кўсақли вази T-1985 (ўртача 5,7 г), T-1981 (ўртача 5,1 г), T-2017 (ўртача 5,6 г), T-2017-2 (ўртача 5,3 г) тизмаларида кузатилиб, уларнинг ушбу белги бўйича 4,6-7,3 граммни ташкил этди. Бу кўрсаткич эса андоза Термиз-31 навиға (ўртача 3,2 г) нисбатан фарқ кўрсаткичлари 1,9-2,7 г та юқори эканлигини тасдиқлайди. Тизмалар орасида нисбатан бироз паст кўрсаткич, T-1987 (ўртача 4,4 г), T-2008 (ўртача 4,4 г), T-1982 (ўртача 4,6 г) тизмаларида кузатилиб, уларнинг ушбу белги бўйича (limit 3,9-5,1 г) ташкил этиши ва бу ҳам андоза Термиз-31 нав кўрсаткичидан (limit 1,2-1,4 г) юқори бўлганлигини кўрсатди. Узоқ йиллик танлов натижасида яратилган янги интичка тоғали тизмаларнинг битта кўсақдан олинадиган пахта вази

белгисини ўрғаниш асосида андоза навадан устун эканлиги кузатилиб, барча тизмалар йирик кўсақли эканлиги аниқланди (6.5-жадвал).

Мавдумки, ғўзанинг кимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган 1000 дона чигит вази белгиси бўйича барча интичка тоғали тизмаларнинг кўрсаткичи ижобий бўлиб, андоза Термиз-31 навадан кескин устун эканлиги кайд этди. Тизмалар орасида ушбу белги бўйича энг паст натижа T-1982 тизмасида кузатилиб, унинг кўрсаткичи 127,7 г ташкил этгани холда, вариация коэффиценти эса 6,4 %, бу ҳам андоза Термиз-31 навадан 8,4 г та юқори эканлигини кўрсатди. Ушбу белги бўйича энг яхши кўрсаткичлар эса T-2017-2 (ўртача 134,1 г), T-2017 (ўртача 139,8 г), T-1981 (ўртача 140,3 г), T-1987 (143,7 г), T-1985 (ўртача 144,0 г), T-2006 (146,0 г) тизмаларида эканлиги ва уларнинг кўрсаткичи андоза Термиз-31 нави кўрсаткичидан 14,8-26,7 г та юқори бўлиши аниқланди. Ўрғанилган 8 та тизманинг 7 тасини кўрсаткичи 130 г юқори бўлган бўлса, фақат 1 та тизмада бу кўрсаткич 112,0-136,0 грамм оралиғида жойлашди. 1000 дона чигит вази 120 граммдан паст кўрсаткича эга бўлган тизмалар аниқланмади.

Тизмаларнинг белги бўйича ўзгарувчанлик даражаси бир-биридан кескин фарқ қилмаган ҳолда андоза нав даражасида эканлиги аниқланди. Бу эса тизмаларнинг 1000 дона чигит вази белгиси бўйича бирқарорлашганлигини кўрсатади. Ўрғанилган ушбу белгилар яъни, битта кўсақли пахта вази ва 1000 дона чигит вази белгилари бўйича тизмаларнинг кўрсаткичи андоза Термиз-31 нави кўрсаткичидан кескин устунлиқни намоён этиб, бу хосилдорлик элементлари бўйича тизмаларнинг нисбатан юқори эканлигидан далolat беради. Ушбу тизмаларни келажакда нав даражасига етказиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш асосида юқори хосилдорликка эришиш мумкин.

Ўрғанилган кимматли хўжалик кўрсаткичлари каторида, ғўза ўсимлигининг асосий хом-ашёлардан бири ҳисобланган *тола чигити* белгиси бўйича яратилган янги интичка тоғали тизмалардаги кўрсаткичлари аниқланди. Тола чигити белгиси тизмаларга мос равишда 34,0-35,0 %

(Т-1982; 2006; 2017) оралинида, 36,0-37,0 % дан юкори кўрсаткичлар (1985; Т-1987; Т-1981; Т-2008; 2017-2) гача бўлган ораликда жойлашди. Ўрганилган 6,5-жадвал

G. barbadense L. туричи хилма-хилликларини дуратгайлаш асосида олинган ажратиб олинган тизмаларнинг битта кўсакдаги пахта вази ва 1000 донга чигит вази белгиси бўйича кўрсаткичлари

Тизмалар	Тизмаларнинг келиб чиқиши	Битта кўсакдаги пахта вази,				Андозага нисбатан ±
		грамм			V %	
		± 45 ±	Limit			
Битта кўсакдаги пахта вази						
Термиз-31	Андоза нав	3,2±0,10	2,2-3,2	10,1	±	
Т-1987	Ғақарши-8 x <i>ssp.vitifolium</i>	4,4±0,14	3,9-5,0	10,2	+1,2	
Т-1985	--/--	5,7±0,06	5,5-5,9	0,98	+2,5	
Т-1982	--/--	4,6± 0,13	4,1-5,1	8,6	+1,4	
Т-1981	--/--	5,1±0,12	4,6-5,8	7,6	+1,9	
Т-2006	<i>Ғ.ssp.vitifolium</i> x Карши-8	5,9±0,38	5,2-7,3	20,5	+2,7	
Т-2008	--/--	4,4±0,16	4,0-5,0	11,5	+1,2	
Т-2017	--/--	5,6±0,20	4,8-6,7	11,5	+2,4	
Т-2017-2	--/--	5,3±0,20	4,6-6,3	13,2	+2,1	
1000 донга чигит вази						
Термиз-31	Андоза нав	119,3±0,02	117-123	1,43	±	
Т-1987	Ғақарши-8 x <i>ssp.vitifolium</i>	143,7±2,3	135-152	5,1	+24,4	
Т-1985	--/--	144,0±0,45	142-145	0,98	+24,7	
Т-1982	--/--	127,7±2,5	112-136	6,4	+8,4	
Т-1981	--/--	140,3±2,8	136-151	4,9	+21,0	
Т-2006	<i>Ғ.ssp.vitifolium</i> x Карши-8	146,0±1,7	140-157	3,8	+26,7	
Т-2008	--/--	140,3±3,3	135-147	4,7	+21,0	
Т-2017	--/--	139,8±1,8	134-149	4,2	+20,5	
Т-2017-2	--/--	134,1±1,9	129-143	4,5	+14,8	

тизмалардан 5 тасининг тола чикими 35,0 % дан юкори бўлганиги анча диққатга сазовор бўлиб, ушбу натижа андоза Термиз-31 нав кўрсаткичидан 1,3-3,5 % га юкори бўлишини кўрсатди. Қолган тизмаларнинг ҳам тола чикими бўйича кўрсаткичи андоза Термиз-31 навиға нисбатан ижобий бўлиб, ўрганилган 8 тизмадан 5 тасини тола чикими ўртача 36,0-37,0 % ораликда жойлашган бўлса, 3 таси 34,6 % дан 35,0 % гача бўлган кўрсаткичини

намоиш этди (6,6-жадвал). Нисбатан бироз паст натижа эса Т-2017 (34,6%), Т-1982 (34,7%), ва Т-2006 (34,8%) тизмаларида кузатилиб, уларнинг натижаси андоза Термиз-31 нав даражасидан қисман юкори эканлиги аниқланди. Тизмалар орасида тола чикими белгиси бўйича андоза Термиз-31 навидан паст кўрсаткичга эга тизмалар мавжудлиги аниқланмади. Тола чикими белгиси бўйича энг яхши кўрсаткич Т-1987 (37,5%), Т-2008 (36,5%), Т-2017-2 (35,9%) тизмаларида кайд этилиб, уларнинг тола чикими бўйича кўрсаткич андоза Термиз-31 навадан 2,5-3,5 % га юкори бўлди. Ўрганилган бошқа қимматли хўжалик белгилардан фарқи равишда тола чикими белгиси бўйича Т-1987, Т-1985, Т-2006, Т-2008 тизмаларининг ўзарувчанлик даражаси $V=4\%$ дан юкори бўлиб, бу тола чикимини барқарорлашуви устида тадқиқотлар давом этириш зарурлигини кўрсатди. Тола чикими белгисини ўрганишлар асосида тизмаларнинг келиб чиқишида танланган бошлангич манбалардан ушбу белги бўйича юкори бўлган тизмаларнинг ажралиб чиқиши аниқланди.

Ўзанинг қимматли хўжалик компонентларидан бири бўлган **тола узунлиги** белгиси бўйича тизмалар бир-биридан кескин фарқ қилмади. Тола узунлиги бўйича ўрганилган тизмалар орасида энг яхши кўрсаткичлар энг яхши натижа Т-1987, Т-2017 тизмаларида кузатилиб, унинг тола узунлиги белгиси 40,7 мм ташқил этгани ҳолда бу андоза Термиз-31 нави кўрсаткичидан 2,4 мм га узуи эканлигини кўрсатди. Таҳлил қилинган тола узунлиги белгиси бўйича ижобий натижалар Т-1985, Т-1982, Т-1981, Т-2006, Т-2008 тизмаларида ҳам кайд этилиб, уларнинг тола узунлиги белгиси бўйича натижаси 40,0 мм дан юкори бўлган ҳолда, андоза Термиз-31 навидан 1,9-2,3 мм юкори эканлигини кўрсатиши мумкин. Фақатгина Т-2017-2 тизма сининг тола узунлиги белгиси нисбатан паст 39,3 мм ни ташқил этиб, бу танланган андоза Термиз-31 навидан 1,0 мм устуи эканлигини тасдиқлайди. Ўрганилган 8 та тизманинг тола узунлиги белгиси бўйича 40,7-39,3 мм ораликда эканлиги аниқланиб, бу андоза Термиз-31 навидан устуи эканлиги ни кўрсатди. Бу эса тола узунлиги

белгиси бўйича яратилган ингичка толали тизмаларнинг кўрсаткичи I-II тип толага кўйилган талабларга тўла мос келишини кўрсати.

6.6-жадвал

G. barbadense L. туричи хилма-хилликларини дуралайлаш асосида ажратиб олинган тизмаларнинг тола узунлиги ва тола чикими ҳамда тола индекси белгилари бўйича кўрсаткичлари

Тизмалар	Тизмаларнинг келиб чикими	Тола узунлиги, мм			Андозага нисбатан ± фарқи
		$\bar{x} \pm S_x$	Limit	V %	
Тола узунлиги					
Термиз-31	Андоза нав	38,3±0,02	37,0-39,0	2,15	±
T-1987	F ₉ Карши-8 x <i>spr.vitifolium</i>	40,7±0,30	40,0-42,0	2,3	+2,4
T-1985	--/--	40,2±0,16	40,0-41,0	1,2	+1,9
T-1982	--/--	40,5±0,17	40,0-41,0	1,3	+2,2
T-1981	--/--	40,6±0,17	40,0-41,0	1,2	+2,3
T-2006	F ₉ <i>spr.vitifolium</i> x Карши-8	40,3±0,18	40,0-41,0	1,4	+2,0
T-2008	--/--	40,3±0,18	40,0-41,0	1,4	+2,0
T-2017	--/--	40,7±0,24	40,0-42,0	1,8	+2,4
T-2017-2	--/--	39,3±0,26	38,0-40,0	2,0	+1,0
Тола чикими					
Термиз-31	Андоза нав	34,0±0,03	32,0-36,0	3,6	±
T-1987	F ₉ Карши-8 x <i>spr.vitifolium</i>	37,5±0,95	34,0-40,0	8,0	+3,5
T-1985	--/--	35,3±1,03	32,0-40,0	9,5	+1,3
T-1982	--/--	34,7±0,36	32,0-35,0	3,3	+0,7
T-1981	--/--	35,8±0,35	34,5-36,4	3,0	+1,8
T-2006	F ₉ <i>spr.vitifolium</i> x Карши-8	34,8±0,52	33,0-36,1	5,0	+0,8
T-2008	--/--	36,5±0,62	34,6-38,5	5,3	+2,5
T-2017	--/--	34,6±0,29	32,4-35,3	2,7	+0,6
T-2017-2	--/--	35,9±0,40	33,9-37,2	3,5	+1,9
Тола индекси					
Термиз-31	Андоза нав	6,7±0,13	5,8-7,9	6,4	±
T-1987	F ₉ Карши-8 x <i>spr.vitifolium</i>	8,7±0,23	7,9-9,4	8,3	+2,0
T-1985	--/--	8,6±0,32	7,2-9,7	13,8	+1,9
T-1982	--/--	7,5±0,09	7,0-7,9	4,2	+0,8
T-1981	--/--	7,8±0,16	7,1-8,6	6,4	+1,1
T-2006	F ₉ <i>spr.vitifolium</i> x Карши-8	7,1±0,21	6,8-8,2	10,4	+0,4
T-2008	--/--	7,9±0,18	7,3-9,5	9,4	+1,2
T-2017	--/--	7,2±0,11	6,7-7,7	4,6	+0,5
T-2017-2	--/--	7,6±0,19	6,9-8,7	10,3	+0,9

Тола индекси белгиси бўйича тизмалар кескин бир-биридан фарқ қилмади. Ушбу белги бўйича ижобий кўрсаткичларга эса T-1987 тизмасидан

аниқланиб, тола индекси белгиси бўйича 8,6 ни таъкил этган ҳолда, андоза Термиз-31 навидан +2,0 устун эканлигини кўрсатди. Қолган тизмаларда тола индекси белгиси бўйича 7,1-8,6 оралиғида эканлиги аниқланди. Туричи хилма-хилликларини дуралайлаш асосида олинган йирик кўсақли тизмаларда кузатиладиган ушбу ҳолатни 1000 донга чиғит вазни белгисининг юқори бўлганлиги билан ҳам изоҳлаш мумкин.

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, ғўзанинг тола узунлиги, чикими ва индекси белгилари ўрганилган тизмаларда ижобий бўлиб, андоза Термиз-31 нав даражасида ёки ундан тўлиқ устуңлик қилишини намоеън этди. Ингичка толали тизмаларни ўрганиш асосида тола чикими ва узунлиги юқори бўлган тизмалар яратилганлиги, бу тизмаларнинг қимматли хўжалик белги бўйича кўрсаткичлари Давлат дастури талабларига тўлиқ жавоб бериши аниқланди.

Тола сифат кўрсаткичлари. Пахта толаси тўқимачилик саноати ва халқ хўжалигининг кўплаб тармоқлари учун хом ашё ҳисобланади. Шу сабабли, хозирги пайтда яратилаётган кўплаб ғўзанинг янги навлари толаси технологик сифат кўрсаткичлари бўйича дунё андозалари талабларига жавоб бериши керак бўлади. Мальгумки, дунё микёсида пахта толасининг сифат кўрсаткичлари замонавий NVI ускунаси ёрдамида аниқланмоқда. Юқоридагиларни назарда тутган ҳолда, биз ҳам изланишларимиз асосида яратилган янги тизмаларнинг сифат кўрсаткичлари Республика «Сифат» марказида NVI ускунаси ёрдамида аниқланди ва энг асосий сифат кўрсаткичлари бўйича олинган мальгумотлар III типга мансуб Термиз-31 нави толаси билан қиёсий таҳлил қилинди.

Толанинг асосий сифат кўрсаткичларидан бири бўлган микронейр (mic)-пахта толаси намунасининг хаво ўтказувчанлигига қараб толанинг ингичкалиги ва пишиб етилганлигини билдиради. Микронейр кўрсаткичинини микро таснифларда кўйидаги мезонларга ажратилган, 3,7-4,2 интервали «мукофотли оралик», 3,5-3,6 мис ва 4,3-4,9 мис интерваллари «асосий оралик», агар 3,4 мис дан кам ва 5,0 мис дан юқори кўрсаткичга эга бўлса,

«нархидан четириладиган» - деб аталиши кўшиб адабиётларда келтириб ўтилган.

Ўрганилган тизмаларда толанинг микронейр кўрсаткичи 4,1-4,7 мис оралиғида жойлашди. Энг ижобий натижа Т-1981 (4,1 мис) ва Т-2017 (4,2 мис) тизмаларида кузатилгани ҳолда, бу «мукофотли оралик» мезонларига тўғри келиши аниқланди. Толанинг микронейр кўрсаткичи 8 та тизманинг 7 тасида микронейр кўрсаткичи 4,2-4,6 мис оралиғида жойлашиб, бу ўрганилган умумий тизмаларнинг 87,5 % ни ташкил этади. Факатгина тахлил қилинган 1 та Т-1982 тизмасининг кўрсаткичи 4,7 мис бўлган бўйса, бу эса андоза Термиз-31 нави билан тенг эканлиги аниқланди. Ушбу тизмалар орасида толанинг сифат белгиларидан бири бўлган микронейр кўрсаткичи 3,4 мис дан кам ва 5,0 мис дан юқори кўрсаткичга эга, яъни «нархидан четириладиган» мезонларга мос келувчи тизма мавжудлиги аниқланмади. Олинган маълумотларга кўра, тахлил қилинган тизмаларнинг микронейр кўрсаткичи белгиси бўйича андоза Термиз-31 нави кўрсаткичидан сезиларли равишда ижобий бўлиб, бу уларнинг микронейр кўрсаткичи бўйича интичка толани кўза навларига мансуб I-II тип пахта толасига кўйилган талабларга тўла мос келиши аниқланди (6,7-жадвал).

Толанинг сифат кўрсаткичларидан яна бири **солингитрма узлиши кучи (St)**-пахта толасининг пишиклиги бўлиб, калиблланувчи пахтанинг NVI градуировкасида (NVI Calibration Cotton), гс/текс да (сН/текс) ифодаланади. Ўрганилган барча тизмаларнинг белги бўйича кўрсаткичи 41,0 гс/текс (Т-1985) дан 43,5 гс/текс (Т-2006) гача бўлди. Солингитрма узлиши кучи (St) белгиси бўйича барча тизмаларнинг кўрсаткичи ижобий эканлиги аниқланди.

6,7-жадвал
G. by vide nce L. туричи хилма-хилликларини дуратайлаш асосида ажратиб олинган янги тизмалар толасининг сифат кўрсаткичлари («Сифат» маркази маълумоти-2017 й.).

№	Тизмалар	Тизмаларнинг келиб чиқishi	Мис.	St.	Len. (UHM)
1	Термиз-31	Андоза нав	4,7	40,9	1,37
2	Т-1987	Ёқарш-8 x <i>ssp. vitifolium</i>	4,6	41,2	1,41
3	Т-1985	--/--	4,5	41,0	1,43
4	Т-1982	--/--	4,7	41,6	1,41
5	Т-1981	--/--	4,1	42,0	1,42
6	Т-2006	<i>F. ssp. vitifolium</i> x Карш-8	4,5	43,5	1,40
7	Т-2008	--/--	4,3	41,4	1,43
8	Т-2017	--/--	4,2	42,5	1,44
9	Т-2017-2	--/--	4,5	41,3	1,45

Толанинг сифат кўрсаткичларидан бири бўлган **юқори ўртача узунлик (UHM)**-текшириладиган намуна массасининг ярмини ташкил қилувчи энг узун толаларнинг ўртача узунлиги бўлиб, дюймда ёки мм да ифодаланади. Ушбу тизмаларнинг тола узунлиги лаборатория шароитида аниқланиб, мм даги кўрсаткичлари юқорида тақдим этилди. Ушбу белгини NVI ускунасида аниқланиб, тизмаларнинг тола узунлигини лаборатория шароитида кўрсаткичларини қай даражада тасдиқлаши аниқланиб, олинган маълумотлар тақдим этилди. Олинган натижаларга кўра тизмаларнинг кўрсаткичи сезиларли равишда андоза навга нисбатан ижобий бўлганлигини кўриш мумкин. Юқори ўртача узунлик (UHM) белгиси бўйича ўрганилган тизмалар барчасида энг яхши кўрсаткичлар Т-2017-2 (1,45 дюйм), Т-2017-2 (1,44 дюйм), Т-1985 (1,43 дюйм), Т-1981 (1,42 дюйм), Т-2008 (1,42 дюйм), Т-1987 (1,41 дюйм), Т-1982 (1,41 дюйм) ва Т-2006 (1,40 дюйм) натижаси ҳам ижобий бўлди. Бунга ўрганилган тизмалар кўрсаткичи ҳам яхши тасдиқлайди. Умуман олганда ушбу белги бўйича ҳам тизмаларнинг натижаси III-типта мансуб Термиз-31 нави кўрсаткичидан сезиларли равишда устун

бўлганлигини кўриш мумкин. Тола узунлиги бўйича NVI ускунасида аниқланган маълумотлар, лаборатория шароитидаги кўрсаткичларни тўла тасдиқлади.

Тола сифатини ўрганиш бўйича олинган натижалар тахлили шуни кўрсатдики, *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини дурайтлаш натижасида яратилган янги тизмаларнинг барчасини кўрсаткичлари тола сифати бўйича ижобий бўлиб, ҳозирги вақтда пахта толаси сифатига кўйилган талабларга тўла жавоб бериши аниқланди. Бунга сабаб, тизмаларнинг келиб чиқишида иштирок этган маданий тропик *subsp. villosum* кенжа тури ва Қарши-8 навининг тола сифати ижобий бўлганлиги, дурайтлаш натижасида олинган ўсимликларнинг дастлабки авлодларидаёқ тола сифати юқори бўлган трансгрессив шаклларнинг ажралиб чиқиши ҳамда ўрганилган дурайт авлодларда танлов ишларини тўғри олиб бориш орқали, юқори тола сифатига эга янги тизмалар яратилганлиги деб ҳулоса қилиш мумкин. Ажратиб олинган ушбу ингичка толагли тизмаларни нав даражасига етказиш ва ишлаб чиқаришни юқори тола сифатига эга навлар билан таъминлаш борасида изланишлар давом эттирилмақда.

Олиб борилган кўп йиллик тадқиқотлар давомида, *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини дурайтлаш асосида олинган оила ва тизмаларни андоза Термиз-3-1 навиға киёсий ўрганиш асосида қимматли хўжалик белгиларнинг генетик жиҳатдан бойитилган кенг даражадаги ўзгартуванликка эришиш ҳамда ижобий белгилар мажмуасига эга бўлган рекомбинантларни ажратиб олиш мавжудлиги аниқланди. Шунинг билан бирга мазкур туричи хилма-хилликларини дурайтлашда битта кўсакдан пахта вазни белгисининг ирсийланиши ва юқори авлодларда шаклланиши, дурайтлашда иштирок этган *subsp. villosum* кенжа турининг генотиپига ҳам боғлиқ равишда кечиши аниқланди ҳамда йирик кўсакли 4,5-5,7 грамм, аралаш 3-4-5 чанокли оилалар ва тизмалар ажратиб чиқди. Бундан ташқари, тезпишар Қарши-8 нави иштирокидаги дурайт комбинациялардан белги бўйича ижобий рекомбинантлар ажратиб олинди. Ёўзанинг *G. barbadense* L.

туричи хилма-хилликларини чапиштириш натижасида олинган дурайтларидида ижобий трансгрессия намоён бўлиши натижасида тезпишар, тола чикими 38,0-40,0 %, тола узунлиги 40,0 мм ва ундан юқори ҳамда микронейр кўрсаткичлари 4,1-4,2 міс бўлган ижобий рекомбинантлар ажратиб олинди.

Олинган натижалар тахлили шуни кўрсатдики, узлуксиз, кўп йиллик (13 йил) якка танлов тажриба асосида ёўзанинг Перу ёўза турлари иштирок этиб, бу ёввойи, ярим ёввойи, маданий тропик, маданий кенжа турларнинг ҳар бири ўзига хос муҳим белги-хусусиятга эга эканлиги, туричи ва турлараро дурайтлаш, генетик тахлил, киёсий ва дала тахлили услубларини қўллаш орқали уларнинг идивидуал белги хусусиятларини битта генотиپга йитиш мумкинлиги исботланди.

6.3-§. Сурхон бирдамчи хўжалигининг қатта нав синови кўчазориди синилган «Ангор» навининг қимматли хўжалик белги кўрсаткичлари

Узоқ муддатли олиб борилган тадқиқотларнинг амалий аҳамияти *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини дурайтлаш, селекцион-генетик жараёнлар, кўплаб ноёб белги, хусусиятларга эга бўлган биотиплар, рекомбинантлар, оилалар ва тизмалар олиш билан бирга, генетик жиҳатдан бойитилган, ишлаб чиқариш талабларини қондирувчи янги навларни яратиш билан изоҳланади. Олиб борилган тадқиқотлар давомида *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини дурайтлаш асосида олинган авлодларини бўғинма-бўғин ўрганиш асосида 8 та янги комплекс қимматли хўжалик белгиларга эга бўлган тизмалар ажратиб олинди. Ёўзанинг қимматли хўжалик белги ва хусусиятларини ўрганиш ва тахлил қилиш борасида амкатта сазовор бўлган тизмаларни нав даражасига етказиш ҳамда уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича ҳам изланишлар давом эттирилди. *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларини чапиштириш асосида юқори андоза дурайтларидан «Т-1981» тизмасини танлаб олинishi натижасида ўшунинг янги ингичка толагли «Ангор» навининг қимматли хўжалик

белгилари кўрсаткичларини Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтига қарашли «Ўза систематикаси ва интродукцияси» лабораториясининг тажриба майдонлари ва «Дўрмон» тажриба базаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожлантириш вазирлигининг «Ўруғчиликни ривожлантириш маркази» ДУК га қарашли Сурхондарё вилояти «Сурхон» бирламчи хўжалигида ташкил этилган катта нав синови кўчатларида андоза Термиз-31 нави билан қиёсий ўрганилди.

Ўзанинг морфобиологик белгиларидан бири, ўсимлик бўйи тахлил қилинганда янги интичка тоғали «Ангор» навининг ўртача баландлиги 100,0-110,0 см. ни ташкил этгани ҳолда андоза Термиз-31 нави белги кўрсаткичлари 2016 йил 10 см паст бўлган бўлса, 2017 йил эса ўсимлик бўйи бир хил бўлганлигини кўришимиз мумкин. Шунингдек, «Ангор» навининг ўсимликларида шаклланган кўсақларни очилиш суръати ҳам андоза Термиз-31 нав билан қиёсий тахлил қилинганда 2016 йилда 3 кунга (116 кун) эртапишар бўлди ҳамда 2017 йилда эса 4 кунга (120 кун) эртапишар эканлиги қайд этилди (6,8-жадвал).

Ўзанинг муҳим компонентларидан бири битта кўсақдаги пахта вази белгиси бўйича янги интичка тоғали «Ангор» навининг кўрсаткичи андоза сифатида танлаб олинган Термиз-31 навига нисбатан қиёсий тахлил қилинганда 2016 йилда ушбу белги ўртача 4,9 граммга тенг бўлиб, андоза Термиз-31 навидан 1,7 г. га юқори бўлди, 2017 йил мавлумотларига кўра, ушбу белги бўйича қиёсий ўрганилганда «Ангор» навида ўртача 4,8 грамм бўлиб, андоза Термиз-31 навидан 1,8 граммга юқори эканлиги аниқланди. Сурхондарё вилояти Жарқўрғон туманида жойлашган «Сурхон» тажриба хўжалигининг 2 йиллик маълумотларга кўра, «Ангор» навининг умумий пахта ҳосилдорлиги ўртача 39,7-39,9 ц/га. ни ташкил этиб, андоза Термиз-31 навига нисбатан 103,3-106,9 % га серҳосиллиги эканлиги кузатилади.

6,8-жадвал

«Сурхон» тажриба хўжалигининг катта нав синови кўчатларида синалган «Ангор» навининг қимматли хўжалик белги кўрсаткичлари

хўжалик белги курсаткичлари												
№	Нав	Бош поя баланд- лиги, см	Тезпи- шарлиги, кун	Битта кўсакдаги пахта вазни, г	Умумий пахта ҳосилдорлиги		Тола ҳосили		Тола чиқими, %	Тола сифати		
					ц/га	Андозага нисбатан, %	ц/га	Андозага нисбатан, %		Микро- нейр	Тола узунлиги (Len), дюйм	Солиштирма узилиш кучи (Str), г.к/текс
2016 йил												
1.	Термиз-31	115	119	3,2	37,3		11,2		33,5	4,7	1,19	31,0
2.	Ангор	105	116	4,9	39,9	106,9	14,3	127,6	37,4	4,0	1,40	42,0
2017 йил												
1.	Термиз-31	110	124	3,0	38,4		11,4		34,5	4,6	1,20	32,3
2.	Ангор	110	120	4,8	39,7	103,3	15,2	133,3	36,5	4,2	1,42	45,2

Ўзанинг асосий хўжалик белгиларидан бири бўлган тола чикими белгиси бўйича «Антор» навининг 36,5-37,4 % ни ташкил этиб, андоза Термиз-31 навига нисбатан юқори эканлиги аниқланди.

Мавлудми, ўзанинг тола сифат кўрсаткичлари муҳим ўрин тутди. Шунинг илоҳи олдидан ҳолда, микронейр (mic)-пахта толаси намунасининг ҳаво ўтказувчанлигига қараб толаннинг интиқалиги ва пишиб этилганлигини билдиради, толаннинг дуюмга нисбатан узунлиги (Len) ва солиштирма узлиши кучи (St) каби белгилари ҳам қиссий таҳлил қилинди. Тола сифат компонентларидан бири микронейр кўрсаткичи қиссий ўрганилганда янги интиқча толали «Антор» навига 4,0-4,2 дуюмга тен бўлган бўлса, Термиз-31 навига 4,6-4,7 дуюм паст натижани қайд этганлигини кўришимиз мумкин.

2016-2017 мавлудотларига кўра, толаннинг дуюмга нисбатан узунлиги (Len) белгиси андоза Термиз-31 навига 1,19-1,20 дуюмни ташкил этган бўлса, ўзанинг янги интиқча толали «Антор» навига эса ушбу белги бўйича кўрсаткич ўртача 1,40-1,42 дуюм, шунга мос равишда «Антор» навига андоза Термиз-31 навига нисбатан толаннинг дуюмга узун эканлигини кўришимиз мумкин. Бундан ташқари, толаннинг сифат компонентларидан солиштирма узлиши кучи (St) белгиси андоза Термиз-31 навига (31,0-32,3 гс/текс) нисбатан қиссий ўрганилганда «Антор» навига бу кўрсаткич нисбатан юқори 42,0-45,2 гс/текс, шунга мос равишда бу шундан далолат берадики, толаси жуда мураккаб эканлигини кўришимиз мумкин.

Олиб борилган тадқиқотлардан маълум бўлдики, ўзанинг янги интиқча толали «Антор» навини хўжалик ва сифат кўрсаткичлари бўйича комплекс бўлиб, ҳозирги кунда республикамизда раёнлашган интиқча толали ўза навларига рақобатбардош ҳисобланади. Ушбу нав раёнлашган навлардан битта кўсакдаги пахта вази, тона чикими, толаининг технология ҳусусиятлари, потенциал ҳосилдорлиги, касаллик, куракчиликка чидамли каби белгиларига эга бўлиб, ишлаб чиқаришга жорий этилиши натижасида юқори самараларга эришиш имкониятини беради. «Антор» нави тола сифати бўйича I тип талабларига тўлиқ жавоб беради.

Комплекс услублар натижасида, ушбу диссертацияда ўзанинг *Gossypium L.* туркумига мансуб Перу ўза турларини ёввойи, ярим ёввойи (рудерал), маданий тропик ва маданий кенжа турларининг ноёб белги-хусусиятларини ўрганиш ва таҳлил қилиш, янги тизма, нав яратишда туричи дурағайлаш услубининг самардорлиги, маданий навларнинг генотипини бойитишда ёввойи, ярим ёввойи, маданий тропик кенжа тур ва шаклларнинг аҳамияти, турлараро дурағайлашда кузатиладиган бошқа генетик конуниятларни ўрганиш борасидаги масалалар кенг маънода таҳлил қилинди. Олинган маълумотлар асосида эволюцион жараёнда вужудга келган хилма-хилликнинг аҳамияти ва уларнинг селекция учун янги манбалар эканлиги аниқланди. Шу билан бир қаторда, ўза эволюцияси назариясига кўшимча фикрлар билан бойитилди. Изланишлар натижасида илк мартаба, Перу ўза турларини туричи ва турлараро дурағайлаш натижасида морфо-хўжалик белгиларининг кенг миқёсдаги трансгрессив ўзгартувчанлиги, ирсийланиш характери, корреляцион боғлиқлиги, қимматли хўжалик белгиларидан ижобий танлов имкониятларини ошириш ҳамда белги-хусусиятларни турғунлигини таъминлаш, ишлаб чиқариш учун комплекс қимматли хўжалик белгиларга эга бўлган янги интиқча толали тизмалар ва нав яратиш борасида юқори натижаларга эришилди. Узоқ муддатли олиб борилган изланишлар асосида туричи ва турлараро дурағайлаш услубларини қўллаш орқали ўзанинг индивидуал белги-хусусиятларини битта генотипга йиғиш мумкинлиги исботланди.

Изланишлар давомида ўзанинг генетик жиҳатдан бойитилган, фойдалани комплекс белги-хусусиятларга эга бўлган янги оила, тизма ва навларини яратишда туричи хилма-хилликларини дурағайлаш услубининг самараси юқори эканлиги аниқланди. Ажратиб олинган ушбу оилалар ва янги тизмалар генетик-селекция тадқиқот ишларида ҳамда амалий селекция жараёнларида донор сифатида фойдаланиш учун ҳамда комплекс қимматли хўжалик белгиларга эга бўлган янги истикболли «Антор» нав сифатида ишлаб чиқаришга жорий этилади.

1. Перу нўза турларининг *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликлари ўзаро ва *G. damini* Watt тури билан яхши чагишди, *G. damini* Watt тури оналик шакл сифатида фойдаланилганда кўсак туғилиши кўрсаткичлари паст (33,3-40,0 %), кўсакаги уруғлар туғилиши фоиизи эса юкори (65,5-94,0 %) бўлди.

2. Дурагайлارнинг F₁-ўсимликларида битта кўсака туғилган тўлиқ уруғлар фоиизининг энг юкори кўрсаткичлари туричи Карши-8 x *subsp. viifolium* (95,3 %) ва турларо Карши-8 x *G. damini* (90,2%) комбинацияларида кайд этилди.

3. *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларининг ўзаро ҳамда ёввойи *G. damini* тури билан дурагайлаш асосида олинган F₁ реципрок дурагайларида ўсув даври белгиси оналик шаклининг хусусиятига боғлиқ холда ижобий ва салбий ўта доминантлик ҳамда тўлиқсиз доминантлик холатларида ирсийланди. F₂ комбинацияларида чап томонли трансрессив ўзарувчанлик натижасида ўсув даври 105,0-124,0 кун бўлган рекомбинант шакллар ажратиб чиқди.

4. Туричи F₁ ўсимликларида кун узунлигига талабчанлик белгиси асосан доминантлик холатида, F₂ ўсимликларида эса полимер генларнинг нокўмулятив таъсирида ирсийланиши аниқланди. Бу белгининг 15:1 нисбатда ирсийланганлиги *subsp. viifolium* кенжа турида кун узунлигига талабчанликни рецессив генлар ва маданий «Карши-8» навида эса доминант генлар назорат қилишини кўрсатади.

5. *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларининг F₁-ўсимликларда битта кўсакаги пахта вази белгиси ижобий ва салбий доминантлик ҳамда ўта доминантлик, *subsp. viifolium* ва Карши-8 нинг реципрок F₁ комбинацияларида эса оралик ($h_r=0,04$ ва $h_r=-0,04$) холатларида ирсийланди. Бу белгининг туричи ва турларо F₂ ўсимликларидаги ижобий трансрессияи асосида битта кўсакаги пахта вази 5,0-7,9 г. бўлган ноёб

рекомбинант шакллар ажратиб олинди. F₂ ўсимликларда белгининг наслдан наслга берилиш коэффиценти (h^2) нинг 46,0-69,8 га тенглиги унинг намоён бўлишида 46,0-69,8 % генотипининг ва 30,2-54,0 % ташки мухитининг таъсири маъжудлигини кўрсатади.

6. *G. barbadense* L. турининг туричи ва F₁-ўсимликларида тола узунлиги белгиси оралик ҳамда ижобий доминантлик ва ўта доминантлик холатларида ирсийланиб, F₂ авлодидаги кенг кўламли ўзарувчанлик натижасида тола узунлиги 39,0-42,0 мм бўлган кимматли рекомбинант шакллар олинди. Белгининг наслдан-наслга берилишида генотипининг таъсири ($h^2=60,1-86,8$ %) ташки мухитикидан қучлпроқ бўлди. Ажратиб олинган тола узунлиги юкори бўлган рекомбинантлар генетик-селекцион тадқиқотлар учун кимматли бошланғич манба сифатида хизмат қилади.

7. *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларининг F₁ реципрок ўсимликларида тола чиқими белгиси асосан салбий ўта доминантлик ва оралик холатларида, турларо *G. damini* ва *f. ishan nigra* (новотрант толали) нинг реципрок F₁ комбинацияларида эса ижобий ўта доминантлик ($h_r=7,6$; $h_r=10,3$) холатларида ирсийланди. F₂ авлодидаги трансрессив ўзарувчанлик асосида Карши-8 ва *subsp. viifolium* кенжа турининг ўзаро реципрок комбинацияларидан тола чиқими 35,0-40,0 % бўлган кимматли шакллар ажратиб олинди. Белгининг наслдан-наслга берилиши кўрсаткичи h^2 нинг 46,7-79,9 % тенглиги унинг ирсий назоратида дурагай комбинациясига боғлиқ равишда генотип ёки ташки мухитининг таъсири турлича эканлигидан далолат беради.

8. *G. barbadense* L. туричи хилма-хилликларининг ўзаро ва ёввойи *G. damini* тури билан олинган F₁ комбинацияларида 1000 дона чигит вази оралик ва салбий ўта доминантлик холатида ирсийланиши, F₂ ўсимликларда наслдан-наслга берилиши коэффицентининг 98,0-98,9 % га тенглиги белгининг намоён бўлиши асосан дурагай генотипига боғлиқлигини кўрсатади.

9. Антоциан ва яшил рангли ота-она шаклларининг F_2 авлодида бў белгининг 15:1 фенотипик нисбатда (15 қисм антоциан рангли, 1 қисм яшил рангли) ажралиши антоциан рангининг икки ген томонидан назорат қилинишини кўрсатди ва бу рангли ўсимликлар генотипи $R_p R_p R_c R_c$ ҳолатида тавсифланди.

10. *G. barbadense* L. турчи хилма-хилликларини ўзаро ва *G. darwinii* тури билан турлараро дуралайлаш асосида тезпишар Т-1981 (ўсув даври 117,2 кун), йирик кўсақли Т-2006 (5,9 г), толаси узун Т-1987 (40,7 мм), тола чиқими ва индекс юкори Т-1987 (мос равишда 37,5 % ва 8,6 г.), 1000 донга чигит вази юкори Т-2006 (146,0 г), толаси I-II типга мансуб Т-1981 (4,1 пмс), Т-2006 (43,5 г/текс) ва Т-2017-2 (1,45 дюйм) бўлган селекция истикболли тизмалар олинди.

11. *G. barbadense* L. турининг subsp. *vibidum* кенжа тури ва Қарин-8 навининг ўзаро дуралай авлодларида олиб борилган селекция ишлари натижасида битта кўсақдаги пахта вази 4,8 грамм, тола узунлиги 40,2 мм, тола чиқими 36,5 %, 1000 донга чигит вази 141,0 грамм, тола микронейри 4,1 ҳамда солиштирма узилиш кучи 43,6 г/текс, юкори ўртача узунлиги 1,41 дюйм бўлган янги интичка толали «Анор» фўза нави яратилди ва ишлаб чиқаришга жорий этилди. Яратилган тизмалар ва «Анор» фўза навидан интичка толали фўзанинг келтурилади генетик-селекция талқиқотларида қимматли бошланғич ашё сифатида фойдаланиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони.
2. Мирзиёев Ш.М. «Сурхондарё вилоятида кишлоқ хўжалиги экин майдонлари тарқибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2016 йил 1 ноябрдаги №378 сонли қарори.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. // Москва. 1979. - С. 3-242.
4. Лемешев Н., Агланов А., Подольная Л., Корнейчук В. Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода *Gossypium* L. // Ленинград. 1989. - С. 5-20.
5. Абдуллаев А.А. Эволюция и систематика полиплоидных видов хлопчатника. // - Ташкент. 1974. - С. 22-26.
6. Абзалов М.Ф. *Gossypium hirsutum* L. фўзада генларнинг ўзаро таъсири. // Изд «ФАН» АН РУз. Ташкент, 2008. - Б. 106-112.
7. Автономов В.А. Селекция тонковолокнистых сортов хлопчатника. // - Ташкент. 1973. - С. 84-86.
8. Исанов М.И. Каталог сортов хлопчатника. // Ташкент. 1993. - С. 42-49.
9. Кимсанбоев О.Х. Современная селекция тонковолокнистых сортов хлопчатника. // Ташкент. 2004. - С. 38-41.
10. Мауер Ф.М. Хлопчатник. Происхождение и систематика хлопчатника. // Ташкент. 1954. - С. 316-337.
11. Максименко И.К. Селекция тонковолокнистых и с природно крашенным волокном сортов хлопчатника в Туркменистане. // Ашхабад. 1958. - С. 74-76.
12. Мусаев Д.А. К вопросу преодоления трудностей отдаленной гибридизации в селекции советских тонковолокнистых сортов хлопчатника. // Ташкент. 1956. - С. 46-49.

31. Аманов Б.Х., Эрназарова З.А., Абдуллаев А.А., Ризаева С.М. Ёзаннинг *G. barbadense* L. тур туричи хилма-хилликларидан фойдаланиш асосида кимматли белгиларга эга бўлган донорлар олиш.// Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг маърузалари. - Тошкент. 2012. - №4. - Б. 81-83.
32. Ахмедов Ж.Х. Ингилика тоғали ёўза навларини етиштириш агротехнологияси.// Кишлоқ хўжалиги журнали. Тошкент. 2017. - №8. - 32 б.
33. Ахмедов Ж.Х., Чориева Х. Ингилика тоғали ёўзанинг афзалликлари.// Кишлоқ хўжалиги журнали. - Тошкент. 2018. - №9. - 31 б.
34. Ахмедов Д.Д., Автономов В.А. Изменчивость, наследуемость и наследование признака скороспелости у межсортных гибридов F_1 - F_2 .// Журнали Вестник аграрной науки Узбекистана. - Ташкент. 2016. - №3. - С. 10-14.
35. Акмурадов Ш., Бердымурадов Р., Чапау А. Эффективность бекроссов.// Журнал Хлопководство. - Москва. 1990. - №5. - С. 40-42.
36. Бабамурадов Х. Приемы повышения выносливости, качества волокна хлопчатника.// Журнал Хлопководство. - Москва. 1977. - №12. - С. 35-38.
37. Гесос К.Ф., Пулатов М.П. Создание высоковолокнистых сортов тонковолокнистого хлопчатника.// Журнал Хлопководство. - Москва. 1985. №10. - С. 24-25.
38. Джаникулов Ф. Связь между радиочувствительностью и мутабельностью диких и культурно-пропических видов хлопчатника.// Доклады РАН. - Москва. 2002. - №2. - С. 19-22.
39. Жалилов О.Ж., Одилов С., Абухоевская А.П. Модификация-совершенствованией механизм структуры популяции сортов хлопчатника.// Ўзбекистон Аграр Хабарномаи. - Ташкент. 2006. - №4. - С. 35-38.
40. Ибрагимов П.Ш., Амантурдиев Ш.Б. Корреляция между некоторыми признаками у сложных гибридов F_1 тонковолокнистого хлопчатника.// Узбекский Биологический журнал. - Ташкент. 1996. - №4. - С. 47-48.
41. Ибрагимов П.Ш., Ким Р.Г., Намазов Ш.Э., Бабаев Я.А., Автономов В.А. Взаимосвязь некоторых морфохозяйственных признаков хлопчатника.// Журнал Вестник семеноводства в СНГ. - Москва. 2002. - №3. - С. 23-25.
42. Инге-Вечтомов С.Г. Механизмы модификационной изменчивости.// Журнал Экологическая Генетика. Санкт Петербург. 2007. - С. 21-24.
43. Иссанов М., Эгамбедиев А., Халманов Б. Волокна главных продукции хлопководства.// Сельскохозяйственный журнал Узбекистана. - Ташкент. 2006. - №6. - С. 11-12.
44. Кимсанбаев О.Х. Наследуемость признаков, определяющих выход волокна гибридов F_2 хлопчатника *G. barbadense* L. // Вестник Аграрной Науки Узбекистана. - Ташкент. 2004. - №4. - С. 50-55.
45. Кимсанбаев О.Х. Выход волокна у гибридов хлопчатника.// Вестник Аграрной Науки Узбекистана. - Ташкент. 2005. - №1. - С. 14-17.
46. Каюмов У., В.Автономов, Ш.Намазов. Формирование признака «длина вегетационного периода» у географически отдаленных межсортных гибридов F_1 - F_2 хлопчатника вида *G. hirsutum* L.// Агро Илм журналы. - Ташкент. 2017. №3. - С. 7-8.
47. Мауер Ф.М. О происхождении культурных видов хлопчатника. Трехвидовой высокоплодовый гибрид (*G. barbadense* L. x *G. herbertyi* Tod.) x *G. arboreum* L.// Изв. АН ССР. Серия биологическая. 1938. - №4. - С. 695-708.
48. Махмудов Т.К., Садыкова Л.Д., Мамедов Ф.Х. Отдаленная гибридизация в сочетании с экспериментальной полиплоидией и ее использование в селекции хлопчатника.// Вестник, сельскохозяйственный наук. - Баку. 1982. - №1. - С. 22-26.

49. Мусаев Д.А., Абзалов М.Ф. Некоторые вопросы генетики подпушка семян хлопчатника *G. hirsutum* L. // Журнал Генетика. - Москва. 1972. - №3. - С. 38-40.
50. Мусаев Д.А., Закиров С.А., Фатхуллаева Г.Н., Мусаева С., Ахмедов Х., Ахмедова Д.Х. Генетические основы маркировки линий хлопчатника генами сигнальных признаков. // Узбекский биологический журнал. - Ташкент. 2004. №3. - С. 75-80.
51. Мўминов Х.А. Ҳинди-Ҳитой ғўзасининг туричи F₁ авлод дуралай ўсимликларида «битта кўсақдаги пахта вази» белгисининг ирсийланиши. // Ўзбекистон биология журнали. - Тошкент. 2013. - №4. - Б. 42-45.
52. Мўминов Х.А. *G. herbaseti* L. ва *G. arboreum* L. ғўза турларининг туричи ҳамда турлараро филогенетик муносабатлари. // Ўзбекистон биология журнали. - Тошкент. 2017. - №4. - Б. 41-44.
53. Мўминов Х.А., Эрназарова З.А. Внутривидовое разнообразие полиморфных видов рода *Gossypium* L.-источник создания новых перспективных сортов хлопчатника. // Наука и мир. Международный научный журнал. - Волгоград. 2016. - №4. - С. 94-96.
54. Назаров Р., Автономов В., Ахмедов Дж., Курбонов А. Селекция сортов тонковолокнистого хлопчатника в Узбекистане. // Ўзбекистон кишлок ҳўжалиги журналининг Агро илим илимий иловаси. - Ташкент. 2017. - №1. - С. 5-7.
55. Намазов Ш.Э., Жўраев С.Т., Холмуродова Г.Р. Ғўзанинг *G. hirsutum* L. тури дуралайларида тола узунлиги ва чикими белгиларининг ирсийланиши. // Ўзбекистон кишлок ҳўжалиги журналининг Агро илим илимий иловаси. - Тошкент. 2008. - №3. - Б. 2-6.
56. Намазов Ш.Э., Холмуродова Г.Р., Жумаева Г. Ғўзанинг юкори авлод дуралайларида тола чикими ва тола узунлиги шаклланиши. // Ўзбекистон кишлок ҳўжалиги журналининг Агро илим илимий иловаси. - Тошкент. 2011. - №4. - Б. 20-22.
57. Омельченко С., Садыков С.С. Генетика антоциана в роде *Gossypium* L. Наследование гена R¹ у вида *G. barbadense* L. II. // Узбекский биологический журнал. - Ташкент. 1980. - №5. - С. 65-67.
58. Омельченко В.С., Садыков С.С. Генетика антоциана в роде *Gossypium* L. Наследование гена R¹ в пределах вида *G. hirsutum* L. I. // Узбекский биологический журнал. - Ташкент. 1980. - №4. - С. 54-59.
59. Рафиева Ф.У., Ризаева С.М. *Magdibasticeolata* Tod. секциясига мансуб ғўза турларининг турлараро F₁ ўсимликларида кўсақда тўлиқ уруғлар туғилишининг ирсийланиши. // Ўзбекистон биология журнали. - Тошкент. 2014. - Б. 42-46.
60. Султонов С. Ғўза тулларининг калта ва узун оналик тумшукчали шаклларида белгиларининг ўзаро фенотипик корреляцияли боғланишини ўрганиш. // Пахтачилик ва дончилик журнали. - Тошкент. 1997. - №4. - Б. 15-18.
61. Сирожиддинов Б.А. Ҳинди-Ҳитой ва Австралия ғўза турларининг турлараро F₀ авлод дуралайларида кўсақ ва уруғ туғилиш даражаси. // Ўзбекистон биология журнали. - Тошкент. 2014. - №4. - Б. 45-48.
62. Сирожиддинов Б.А. Ҳинди-Ҳитой ва Австралия ғўза турларининг турлараро F₀ ўсимликларида тола узунлигининг ирсийланиши. // Ўзбекистон биология журнали. - Тошкент. 2014. - №6. - Б. 50-52.
63. Сирожиддинов Б.А. *G. arboreum* L. ва Австралия ғўза турларининг F₀ дуралайларида кўсақ ва уруғ туғилиши. // ЎЗМУ хабарлари журнали. - Тошкент. 2015. - №3. - Б. 111-117.
64. Симонтулян Н.Г. Наследование скороспелости и фотопериодической реакции у гибридов однолетних форм с многолетней формой. // Журнал Генетика. - Москва. 1969. - №5. - С. 62-65.

65. Симонгулин Н.Г., Ибрагимов П. Наследование качества и выхода волокна. // Журнал Хлопководство.-Москва. 1985. - №10. - С. 22-24.
66. Тяминов А.Р. Комбинационная способность сортов тонковолокнистого хлопчатника по скорости и выходу волокна. // Узбекский биологический журнал.-Ташкент. 1994. - №1. - С. 57-60.
67. Усманов С.А., Хударганов К.О., Абдиев Ф.Р. Изменчивость хозяйственно-ценных признаков и типа цветка у гибридов хлопчатника *F₂-F₃ G. barbadense L.* // Журнал Мичуринский агрономический Вестник. Мичуринск-Наукоград. - Россия. 2014. - №2. - С. 28-144.
68. Усманов С.А., Хударганов К.О., Абдиев Ф.Р., Аманов Б.Х. Изменчивость хозяйственно-ценных признаков у межлинейных гибридов *F₄₋₆* тонковолокнистого хлопчатника *G. barbadense L.* // Путь науки Международный научный журнал. - Волгоград. 2017.-№7. - С. 44-47.
69. Чоршанбиев Н.Э., Набиев С.М., Матиязова Х.Х. *G. barbadense L.* турига мансуб гўза навлари *F₁-F₂* ўсимликларида «тола чикими» ирсийланиши ва ўзгартуричанлиги. // Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг маърузалари. - Тошкент. 2017. - №4. - Б. 77-80.
70. Allard R. W. The analysis of genetic - environmental interactions by means of diallel crosses. // Journal Genetics. 1956. -V.41. -№3. - P. 786-792.
71. Abo El-Zahab A., El-Kilany. Correlated responses to several selection procedures for increased lint yield in segregating generation of Egyptian cotton (*G. barbadense L.*) // Beitr. Trop. Landwirtschaft. Veter.-med. 1979. - P. 165-171.
72. Ashokkumar K., Ravikesavan R. Genetic Studies of Correlation and Path Coefficient Analysis for Seed Oil, Yield and Fibre Quality Traits in Cotton (*G. hirsutum L.*) // Australian Journal of Basic and Applied Sciences. - Pakistan. 2010. №4. - P. 5496-5499.
73. Abdiev F.R., Usmanov S.A. Using genetic statistical methods in creation of cotton plant varieties in Uzbekistan // International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online). - India. - 2017. - №11. - P. 56-58.
74. Adashe A.D., Salve A.N., Patil N.P. Heterosis studies for quantitative traits in interspecific hybrids of cotton (*Gossypium hirsutum L.* x *Gossypium barbadense L.*) // Journal of Phytology. 2017. - P. 11-14.
75. Abdalla A.M., Reddy O.U., El-Zik K.M., Perper A.E. Genetic diversity and relationships of diploid and tetraploid cottons revealed using. // AFLP. Theor Appl Genet. 2001 - P. 222-229.
76. Alkudsi Y., Patil S.S., Manjula S.M., Patil B.C. Correlation Studies on Yield and its Components in Inter Specific Cotton Hybrids (*G. hirsutum L.* x *G. barbadense L.*) for Developing Heterotic Box // Molecular Plant Breeding. 2013. - №28. - P. 228-237.
77. Abd-El-Haleem S.H.M., Elhab M.R. Metwali, Al-Felady Ali M.M. Genetic Analysis of Yield and its Components of Some Egyptian Cotton (*Gossypium barbadense L.*) Varieties // World Journal of Agricultural Sciences. 2010. - №6. - P. 615-621.
78. Abo S., Kandiro M.M., Laghari S., Arain M.A., Deho Z.A. Combining Ability and Heterosis for Yield Contributing Traits in Upland Cotton (*G. hirsutum L.*) // Journal Botany. Pakistan. 2009. - №41. - P. 1769-1774.
79. Abdullah M., Numan M., Shafique M.S., Shakoar A., Rehman Sh., Ahmad M.I. Genetic Variability and Interrelationship of Various Agronomic Traits Using Correlation and Path Analysis in Cotton (*Gossypium hirsutum L.*) // Academia Journal of Agricultural Research. 2016. - №4. - P. 315-318.
80. Abdullaev A.A., Abdullaev A.A., Salakhudinov I.B., Rizaeva S.M., Kuryazov Z.B., Ernazarova D.Q., Abdurakhmonov I.Y. Cotton Germplasm

- Collection of Uzbekistan// The Asian and Australasian Journal of Plant Science and Biotechnology. 2013. - №2. - P. 15.
81. Beil G.E., Atkins R.E. Inheritance of quantitative characters sorghum.// Jow State Journal of Science. 1965. - № 3. - P.35-37.
82. Baloch M.J., Baloch Q.B. Plant characters in relation to earliness in cotton (*G.hirsutum* L.)// Proc.Pak.Acad.Sci. - Pakistan. 2004. - №41. - P.103-108.
83. Brubaker C.L. Paterson A.H., Wendel J.F. Comparative genetic mapping of allotetraploid cotton and its diploid progenitors.// Genome. - Ottawa. 1999. - №42. - P. 184-203.
84. Balakrishna B., Reddy Ch., Reddy K.V.S., Ahamed M.L. Genetic Studies for Yield and Yield Components in Inter-Specific Hybrids (*G. hirsutum* x *G. barbadense*) of Cotton Over Environments.// International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ISSN: 2319-7706. 2017. - №8. - P. 1722-1735.
85. Bayyapu Reddy K., Chenga V., Ahmed M. L., Naidu T. M., Srinivasarao V. Correlation and Path Coefficient Analysis in Upland Cotton (*Gossypium hirsutum* L.)// International Journal of pure & Applied Bioscience. 2015. - №3. - P. 70-80.
86. Chaudhry M.R. World statistics Bull. Of the international Cotton advisory Committee. - Washington. 2003. - P. 72-106.
87. Culp T.M., Harel D.C. Breeding methods for improving yield and fiber quality of upland cotton (*G.hirsutum* L.)// Crop Science. 1973. - №6. - P. 686-689.
88. Clark L. J., Carpenter E. W., Norton E.R. Acala Upland cotton variety trial.// Safford Agricultural Center. 2003. - P. 186-192.
89. Cheatham C.L., Jenkins J.N., McCarty Jr J.C., Watson C.E., Wu J. Genetic variances and combining ability of crosses of American cultivars, Australian cultivars and wild cottons.// The Journal of Cotton science. 2003. - №7. - P. 16-22.
90. Delodie D.R., Wendel J.F. Genetic diversity and origin of the Hawaiian islands cotton *G.lomentosum*.// Journal Botany. - New York. 1992. - №79. - P. 1311-1319.
91. Dhamayanthi K.P.M., K.Subashree. Assessment of yield and yield related traits to determine earliness in Egyptian cotton (*G.barbadense* L.)// Electronic Journal of Plant Breeding. 2016. - №7. -P. 771-777.
92. Deshpande L.A., Baig K.S., Nagare V.P. "Combining ability studies for yield, fibre quality and morphological traits in Desi cotton (*G.arboreum* L.)// Journal Maharashtra Agricultural University. 2003. - №1. - P. 36-39.
93. Dhamayanathi K.P.M., Manickam S., Rathinavel K. Genetic variability studies in *Gossypium barbadense* L. genotypes for seed cotton yield and its yield components.// Electronic Journal of Plant Breeding. 2010. - №1. - P. 961-965.
94. Deyi Shao, Tao Wang, Haiping Zhang, Jian El Zhu, Feiyu Tang Genetic variability and Heritability Study in F₂ Segregants of Desi Cotton for Yield and its Component Traits.// Journal Botany. - Pakistan. 2016. - №48. - P. 1945-1949.
95. Ellstrand N.C, Prentice H.C, Hancock J.F. Gene flow and introgression from domesticated plants into their wild relatives.//Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. - 1999. - №30. - P. 539-563.
96. Endrizzi J.E., Turcotte E.L., Kohel R.J. Genetics, cytology, and evolution of *Gossypium* L.// Journal Advances in Genetics. - Melbourne. 1985. - №23. - P. 272-375.
97. Endrizzi J.E., Turcotte E.L., Kohel R.J. Qualitative genetics, cytology and cytogenetic.// Crop Science Society of America and Soil Science Society of America. 1994. - P. 82-129.
98. El-Zanaty A.M., K.F.M.Salem, R.M.Esmail. Detection of Genetic Diversity in Egyptian cotton (*G.barbadense* L.) varieties using RAPD

- markers and morphological traits // Nature and Science. 2012. - №10.- P.123.
99. Eswari K.B., Dr. Sudheer Kumar S., Dr. Gopinath and Dr. Rao V.B. Genetic variability heritability and genetic advance studies in cotton.// International Journal of Development Research. 2016. - №1. - P. 104-109.
100. Ehtisham Shakeel Khokhar, Amir Shakeel, Muhammad Amir Maqbool, Muhammad Waheed Anwar, Zoraiz Tanveer and Muhammad Fahad Ifran Genetic Study of Cotton (*Gossypium hirsutum* L.) Genotypes for Different Agronomic, Yield and Quality Traits.// Pakistan Journal of Agricultural Research. 2017. - №4. - P. 363-372.
101. Farias FI., Carvalho LP., Silva Filho JL, Teodoro PE. Correlations and path analysis among agronomic and technological traits of upland cotton.// Genet Mol Res. 2016. - №15. - P. 182-186.
102. Fryxell P.A. A revised taxonomic interpretation of *Gossypium* L. (Malvaceae) // Rheeda - Washington. 1992. - №2. - P. 108-165.
103. Fryxell P.A., Lyn Graven, Stewart J.M. A revision of *Gossypium* L. sect Grandicalyx from northwestern Australia, including the description of six new species.// Systematic botany. 1992. - №17. - P.91-114.
104. Gamal M., Abd-El-Halen S.H., Ibrahim E.M. A genetic analysis of yield and its components of Egyptian cotton (*G. barbadense* L.) under divergent environments.// American-Eurasian Journal Agric. & Environ. Sci. 2009. - №5. - P. 5-13.
105. Gohil S.B., Parmar M.B., Chaudhari D.J. Study of Heterosis in Interspecific Hybrids of Cotton (*Gossypium hirsutum* L. x *Gossypium barbadense* L.) // Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2017. - №6. - P. 804-810.
106. Harland S.C. The genetics of cotton // Jonathan cape-London. 1939. - P. 32-35.
107. Harland S.C. Genetical studies in the genus *Gossypium* and their relationship to evolutionary and taxonomic problems.// Proc. Int. Genet. Congr.- Edinburgh. 1939. - P. 138-143.
108. Hutchinson J.B. The application of genetic to cotton improvement // London: Cambridge Univ. Press. 1959. - P. 86-89.
109. Hutchinson, J. B., Sirow, R. A., and Stephens, S. G. The Evolution of *Gossypium* and the Differentiation of the Cultivated Cottons.// Oxford University Press. - London. 1947. - P. 207-216.
110. Hoffmann L.V., Cardoso K.C., Rocha S.N., Oliveira A.I., Abreu A.G., Pereira C.C., Malafaia G., Menezes I.P. Genetic diversity of *Gossypium barbadense* from the central Brazilian Amazon.// Acta Amaz. Manaus 2018. - №48. - P. 1-9.
111. Iqbal M.J., Reddy O.U.K., El-Zik K.M., Pepper A.E. A genetic bottleneck in the evolution under domestication of upland cotton *G. hirsutum* examined using DNA fingerprinting.// Theor. Appl. Genet. 2001. - №103. - P. 547-554.
112. Jawahar T.G., Patil B.R. Genetic variability and Heritability Study in F₂ Segregants of Desi Cotton for Yield and its Component Traits.// International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2017. - №6. - P. 2679-2684.
113. Jia Zhao-dong, Sun Jing, Zhang Tian-zhen. Diallel analysis quantitative traits *G. barbadense* L. x *G. hirsutum* L. hybrid with use 7 introgressive lines.// Journal Nanjing Agr. Univ. 2006. - №2. - P. 6-10.
114. Jatoi W.A., M.J.Baloch, A.Q.Panhwar, N.F.Veesar, Panhwar S.A. Characterization and identification of early maturing upland cotton varieties. //Sarthad Journal Agric. 2012. - №26. -P. 993-996.
115. Jenkins J., Wu J., McCarty J., Saha S., Gutierrez O., Hayes R., Stelly D. Genetic effects of thirteen *Gossypium barbadense* L. chromosome

- substitution lines in topcrosses with Upland cotton cultivars: II Fiber quality traits. // Crop Science. 2007. - №2. - P. 561-570.
116. Kohel R.J. Linkage tests in Upland cotton, *G. hirsutum* L. // Crop. Sci.-1972. - №12. - P. 66-69.
117. Khan M.A., Larik A.S., Soomro Z.A. Study of Gene Action for yield and yield components in *G. barbadense* L. // Journal Asian Plant Sci. 2004. - №1. - P. 130-131.
118. Kumar K., Nidegundi J.M., Hosanan A.C., Correlation Analysis for Agro-morphological Features in Upland Cotton under Rainfed Conditions. // International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2017. - №5. P. 2593-2596.
119. Khan N.U., Hassan G., Kumbhar M.B., Marwat K.B., Khan M.A., Parveen A., Aiman U., Saeed M. Combining ability analysis to identify suitable parents for heterosis in seed cotton yield, its components and lint in upland cotton. // Industrial Crops and Products. 2009. - №29. - P. 108-115.
120. Kausar Nawaz Shah M., Saeed A. Malik, Naveed Murtaza, Ihsan Ullah, Rahman H., Uzma Younis. Early and rapid flowering coupled with shorter boll maturation period offers selection criteria for early crop maturity in upland cotton. // Journal Botany. - Pakistan. 2010. - №42. - P. 3569-3576.
121. Lin L., Cantrell R.G., McCarty, J.C. Jr., Stewart J.McD. Simple Sequence Repeat-Based Assessment of Genetic Diversity in Cotton race Stock Accessions. // Crop Sci. - Wisconsin. 2000. - №40. - P. 1459-1469.
122. Lakho A.R., Baloch M.J., Bhutto H.U., Chang M.S., Tunio G.H., Solangi M.Y. Impact of early maturity on seed cotton yield and some economic characters in upland cotton. // Sindh Balochist Journal Plant Scienc. 2007. - №3. - P. 48-52.
123. Liu F., Z.L. Zhou, C.Y. Wang, Y.H. Wang, X.Y. Cai, X.X. Wang, K.B. Wang Z.S. Zhang Correlation analysis of allotetraploid *Gossypium tomentosum* and *Gossypium darwini*. // Journal Genetics and Molecular. 2016. - №6. - P. 215-219.
124. Lori L. Hinze, Elodie Gazave, Michael A. Gore, David D. Fang, Brian E. Scheffler, John Z. Yu, Don C. Jones, James Frelichowski, Percy R.G. Genetic Diversity of the Two Commercial Tetraploid Cotton Species in the *Gossypium* Diversity Reference Set. // Journal of Heredity Advance Access. 2016. - №10. - P. 1-13.
125. Mehrete S.S. Distant hybridization in cotton breeding-intergeneric hybridization (An overview). // Journal Cotton Res & Dev. - 1993. - №2. - P. 179-192.
126. Meredith W.R. Cotton yield progress- Why has it reached a plateau. // Better Crops. 2000. - №84. - P. 6-9.
127. McCarty J.C., Jenkins J.N. Registration of 79 day-neutral primitive cotton germplasm lines. // Crop Science. - Wisconsin. 1993. - №33. - P. 351-358.
128. Mehmet Çoban, Aydın Ünay Gene Action and Useful Heterosis in Interspecific Cotton Crosses (*Gossypium hirsutum* L. x *Gossypium barbadense* L.). // Journal of Agricultural Sciences. 2017. - №23. - P. 438-443.
129. Muthuswamy, A. Vivekanandan, P. Correlation studies on seed cotton yield and its components in hirsutum cotton. // Journal Indian Soc. Cotton Improv., 2004. - P. 7-9.
130. Mohan Kumar N.V., Katageri I.S. Genetic variability and heritability study in F₂ population of *Gossypium barbadense* L. Cotton for Yield and its Components. // International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2017. - №6. - P. 975-983.
131. Muthu, R., Kandasamy, G., Jayaramachandran, M. Correlation and path coefficient analysis for yield and fibre quality traits in cotton (*G. hirsutum* L.). // Journal Indian Soc. Cotton Improv. 2004. - №29. - P. 17-20.

132. Muhammad Yaqoob, Sajid Fiaz, Babar Ijaz Correlation analysis for yield and fiber quality traits in upland cotton. // Journal Communications in Plant Sciences. 2016. - №4. - P. 55-60.
133. Mei Yong-Jun, Zhang Gai-Sheng, Ye Zi-Hong, Cao Xin-Chuan, Zhang Wen-Ying. Genetic analyses of fibre traits and heterosis for F₁-F₂ *G. barbadense* L. hybrids. // Zuowu xuebao, Acta agron. Sin. 2006. - №8. - P. 796-800.
134. Menezes I.P.P., Gaiotto F.A., Suassuna N.D., Hoffmann L.V. Susceptibility of *G. mustelinum* populations to the main cotton diseases in Brazil. // Journal Agricultural Science. 2014. - №6. - P. 39-47.
135. Muhammad Abdullah, Muhammad Numan, Muhammad Sohaib Shafique, Awaiz Shakoor, Shamsur Rehman, Muhammad Ifan Ahmad Genetic variability and interrelationship of various agronomic traits using correlation and path analysis in cotton (*Gossypium hirsutum* L.) // Academia Journal of Agricultural Research 2016. - №4. - P. 315-318.
136. Nabiev S.M., Chorshanbiev N.E. Inheritance productivity of F₁ plants and combining ability of long fibrous cotton varieties. // International Journal of Science and Research (IJSR), Nagpur, Maharashtra, India. 2017. - №10. - P. 1023-1024.
137. Norton E.R., Clark L.J., Husman S.H. Evaluation of a Twin-Line Cotton Production System in Graham County. // Arizona Cotton Report. - The University of Arizona, College of Agriculture and Life Sciences. 2002. - P. 204-208.
138. Percy R.G. The World wide Gene Pool of *Gossypium barbadense* L. and Its Improvement. // Journal Genetics and Genomics of Cotton. University of Georgia Plant Genome Mapping Laboratory Riverbend Road Athens, USA. 2009. - P. 53-68.
139. Parmar M.B., Patel S.K., Patel S.M., Patel M.P., Patel A.D. Genetic studied of variability parameters, correlation and path coefficient analysis for yield components in *G. hirsutum* Bt-Cotton Hybrids. // Trends in Biosciences. 2015. - №8. - P. 1186-1190.
140. Ranjan R., Sangwan R.S., Siwach S.S., Sangwan O., Sah M.K. Correlation and path analysis studies in *Gossypium arboreum* L. // Journal of Cotton Research and Development. 2014. - №28. - P. 37-39.
141. Stoiilova A. Combining ability in netlike test crossing of introgressive cotton lines (*G. hirsutum* L. x *G. barbadense* L.) and *G. hirsutum* L. cultivars II. Fibre length and lint percentage // Journal Genet. 2004. - №4. - P. 27-42.
142. Stoiilova A., Saldzhiev, I. Interspecific hybridization in cotton and its use in breeding. // Journal Genetics and Breeding. 2015. - №1. - P. 49-60.
143. Silvertooth J.C., Galadima A. Evaluation Irrigation Termination Effect on Fiber Micronaire and Yield of Upland Cotton. // Arizona Cotton Report. - The University of Arizona, College of Agriculture and Life Sciences. 2006. - P. 49-60.
144. Salahuddin Sh., Abro S., Rehman A., Iqbal Kh. Correlation analysis of seed cotton yield with some quantitative traits in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) // Journal Botany. - Pakistan. 2010. - №42. - P. 3799-3805.
145. Shakil Ahmad, Sajid Fiaz, Aamir Riaz, Ikram Bashir, Aqib Zeb Correlation analysis of morphological and fiber quality traits in upland Cotton (*Gossypium hirsutum* L.) // Journal Biosciences. 2016. - №4. - P. 200-208.
146. Taofik S., Stoiilova A. Hybridological analysis in interspecific cotton (*G. hirsutum* L. and *G. barbadense* L.) hybrids I. Productivity and its elements. // Journal Genetics and Breeding. 2000. - №4. - P. 49-57.
147. Tanksley S.D., Nelson J.C. Advanced backcross QTL analysis: a method for the simultaneous discovery and transfer of valuable QTLs from unadapted germplasm into elite breeding lines. // Journal Theoretical and Applied Genetics. 2006. - №92. - P. 191-203.

148. Tayade A.S., Raju A., Dhole M.V. Studies on correlation and path coefficient analysis in Bt and Non Bt Cotton hybrids (*Gossypium hirsutum* L.) // Cotton Research and Development Association. 2011. - №25. - P. 147-151.
149. Tulasi J., Ahamed, M.L., Murthy J.S., Rani, Y. A. Correlation analysis in American cotton // Electronic Journal of Plant Breeding. 2012. - №4 - P. 1005-1008.
150. Warner S.N. A method for estimating heritability // Journal Agronomy - 1982. - №44. - P. 427-430.
151. Wendel J.F., Percy R.G. Allozyme diversity and introgression in the Galapagos-Islands endemic *Gossypium darwini* and its relationship to continental *Gossypium barbadense*. // Journal Biochemical Systematics and Ecology. - Frankfurt. 1990. - №18. - P. 517-528.
152. Wendel J.F., Cron R.C. Polyploidy and the Evolutionary history of Cotton // Department of Botany, Iowa State University. - USA. 2003. - P. 49.
153. Yik Choi - Pheng, Birchfield Wray. Resistant germplasm in *Gossypium* L. species and related plants to *Rotylenchulus reniformis*. // Journal of Nematology. 1984. - №2. - P. 146-153.
154. Zhou Youyao, Bie Shu. Genetic relationship between earliness and fiber properties in Upland cotton (*G. hirsutum* L.) // Journal of Nematology. 1991. - P. 343-345.
155. Zhang J.F., Abdelgahem, Wu J.X. Heterosis, combining ability and genetic effect and relationship with genetic distance based on a diallel of hybrids from five diverse *Gossypium barbadense* cotton genotypes. // Journal Science Business Media. 2017. - P. 1-16.
156. Yuan You-Lu, Zhang Tian-Zhen, Guo Wang-Zhen, Pan Jia-Ju, Kohel R.J. - Diallel analysis of superior fiber quality properties in selected upland cottons // Yichuan xuebao. Acta genet. sin. 2005. - №1. - P. 79-85.

157. Исторические аспекты эволюции скороспелости хлопчатника. // Материалы международной научно-практической конференции «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур», посвященной 95-летию со дня рождения акад. С.С.Содикова. - Ташкент. 2005. - С. 5-8.
158. Автономов В.А. Селекция Египетского хлопчатника. // Сб. науч. трудов УзНИИССХ. - Ташкент. 1948. - С. 109-136.
159. Автономов Вик.А. Изменчивость, наследуемость штапельной длины волокна у экологически отдаленных гибридов F₁-F₂ хлопчатника *G. barbadense* L. // Материалы международной научно-практической конференции посвященной 95-летию Саратовского госагроуниверситета. Часть 1. - Саратов. 2008. - С. 3-4.
160. Автономов В.А. Изменчивость, наследование признаков у географически отдаленных гибридов F₁-F₂ хлопчатника *G. hirsutum* L. // Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития. Посвященной 110-летию академика А.И. Автономова, 80-летию академика С.М. Мирахмедова и профессора А.А. Автономова, а также 65-летию доктора сельскохозяйственных наук В.А. Автономова. Материалы международной научно-практической конференции. - Ташкент. 2006. - С. 36-41.
161. Алламбергенов Т.Д. Корреляция между свойствами волокна у сортов хлопчатника и их F₂ межсортовых гибридов // «Достижения генетики и селекции в области скороспелости и устойчивости сельскохозяйственных растений к биотипическим и абиотическим факторам среды» Республиканская научно-практическая конференция. - Ташкент. 2011. - С. 33-36.
162. Амантурдиев А.Б. Взаимосвязь некоторых хозяйственно-ценных признаков у отдаленных внутривидовых и межвидовых гибридов F₂ и

- Ғ₃ с различным типом плодоносения // Ғўза, беда селекциси ва уруғчилиги илимий ишлар тўплами. - Тошкент. 2009. - Б. 66-69.
163. Абзалов М.Ф., Баратова Н.Р. Соъ ўсимлигининг тезпишарлигида фаол ҳарорат йиғиндисининг аҳамияти.// Республиканская научно-практическая конференция «Достижения генетики и селекции в области скоростелости и устойчивости сельскохозяйственных растений к биотическим и абиотическим факторам среды». - Ташкент. 2011. - С. 17-20.
 164. Амантурдиев А.Б., Ким Р.Г. Структура куста и ее взаимосвязь с морфохозяйственными признаками и влагоустойчивостью хлопчатника вида *G. hirsutum* L.// Ўзбекистон пахтачилик илимий-тадқиқот институтининг 80 йиллигига бағишланган «Пахтачиликдаги долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илимий-амалий конференция маврузалари асосидаги мақолалар тўплами. - Тошкент. 2009. -С. 43-44.
 165. Амантурдиев А.Б., Ким Р.Г. Морфохозяйственные показатели лучших гибридных семян и линий хлопчатника с различным типом ветвления, полученных при отдаленных внутривидовых и межвидовых скрещиваниях.// Ўзбекистон пахтачилик илимий-тадқиқот институтининг 80 йиллигига бағишланган «Пахтачиликдаги долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илимий-амалий конференция маврузалари асосидаги мақолалар тўплами. - Тошкент. 2009. - С. 362-365.
 166. Ахмедов Д.Д., Автономов В.А. Изменчивость, наследование и наследуемость признака «штательная длина волокна», у линейно-экологически отдаленных сортов и гибридов F_1 - F_2 хлопчатника вида *G. barbadense* L. на искусственно инфицированном фоне *Xanthomonas malvacearum* Smith.// «Пахтачиликдаги долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илимий-амалий конференция маврузалари асосидаги мақолалар тўплами. - Тошкент. 2009. - С. 39-42.
 167. Абзалов М.Ф., Фатхуллаева Г.Н., Атабаева Ш.Х. К генетике антоциановой окраски растений хлопчатника // V съезд Узб. респ. общества генет. и селекционеров: Тез. докл. - Ташкент. 1986. - С. 56-58.
 168. Ахмедов Ж.Х., Рахматуллаев Ғ. Тақрорий экинлардан кейин яратилган фонларнинг ўргасида ўрта тоғали Андижон-36 ҳамда Нарўз ғўза навларини битта кўсақдаги пахта ваэининг ўзгаришига таъсири.// «Фундаментал фан ва амалиёт интеграциси: муаммолар ва истиқболлар» Республика илимий-амалий конференцияси материаллари. - Тошкент. 2018. - Б. 217-218.
 169. Аманов Б.Х., Ризаева С.М., Абдуллаев Ф.Х. Оценка внутривидового разнообразия вида *G. barbadense* L.// «Ўзбекистон пахтачиликни ривожлантириш истиқболлари» номили Республика илимий-амалий анжуман материаллари тўплами. - Тошкент. 2014. - Б. 42-45.
 170. Абдиев Ф.Р., Умиров Д., Эгамбердиева А., Мўминова Б. Юкори авлод (F_8B - $F_{10}B$) ўсимликларида кимматли хўжалик белгиларининг ўзаро боғлиқлик нисбатлари. // «Селекция ва уруғчилик соҳасининг хозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари» мавзусидаги Республика илимий-амалий конференцияси. - Тошкент. 2014. - Б. 11-12.
 171. Автономов В.А., Ибрагимов П.Ш., Григорьевский А.А., Усманов А.А. Некоторые вопросы селекции тонковолокнистых сортов хлопчатника в Узбекистане.// Генетика, селекция и семеноводство хлопчатника и люцерны. - Ташкент. 1992. - С. 94-101.
 172. Алпашов Б. Ибрагимов Ш., Ибрагимов П., Шадримов Э. Кўш дурагайлаш услубида олинган Т-550 тизмасида кўсақ ваэни ва бошқа белгилар ўргасидаги коррелятив боғлиқликларни ўрганиш. «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника,

- проблемы и пути их решения» номли халқаро илмий-амалий конференция тўплами. - Тошкент. 2007. - Б. 91-93.
173. Автономов Вик.А., Кимсанбоев О.Х., Ахмедов Д.Д., Аширкулов А.А. Исследование и наследуемость признака выхода волокна у линейно-сортовых гибридов F₁-F₂ хлопчатника *G. barbadense* L. // «Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг хозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари» Республика илмий-амалий анжумани илмий материаллари. - Тошкент. 2015. - Б. 87-91.
174. Ахмедов Д.Д., Эгамбердиев Р.Р., Автономов В.А., Кимсанбаев О.Х., Курбонов А.Ё. Изменчивость, наследование и наследуемость признака «выход волокна», у экологически отдаленных линейно-сортовых гибридов F₁-F₂ хлопчатника вида *G. barbadense* L. на искусственно инфилцированном фоне *Xanthopoulos talvascapi Smith*. // Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. - Тошкент. 2014. - Б. 58-61.
175. Автономов В.А., Кушалиев А., Халманов Б., Кимсанбаев М., Нормуратов Д., Ахмедов Д. Гетерозис количественных признаков у гибридов F₁-F₂ хлопчатника вида *G. barbadense* L. // Мат. межд. науч. конф.-Краснодар: Биологическая защита растений-основа стабилизации агроэкосистем. Технологии создания биологических средств. 2006. - С. 484-485.
176. Бочарова В.М. Сопраженность длины с тонинной и прочностью волокна у хлопчатника F₂. // В сб. генетика, селекция и семеноводство хлопчатника и люцерны, вып. 17. - Ташкент. 1979. - С. 101-103.
177. Бабамуратов Х., Ахмедов Д. Особенности расщепления признаков у межвидовых гибридов хлопчатника. // В сб.: Генетика, селекция и семеноводство хлопчатника. - Ташкент-1987. - С. 43-56.
178. Бахши М.А., Халманов Б.А., Тошпулатов Ш.К. Эффективность различных доз гамма облучений в улучшении скороспелости хлопчатника вида *G. barbadense* L. // В книге сборник «селекции и семеноводства хлопчатника, люцерны», посвященной 120-летию со дня рождения Г.С.Зайцева, к 100-летию со дня рождения А.Д.Дадабаева, Л.Г.Арутюновой и Г.Д.Губанова. - Ташкент. 2009. - С. 245-250.
179. Бобоев Я.М., Ким Р.Г., Амантурдиев А.Г. Ёзуанинг F₂ авлодида тезпишарлик белгиларининг бошқа хўжалик учун қимматли белгилар билан ўзаро боғланиши. // Ёўза, беда селекцияси ва уруғчилиги. ЎЗҶСҮИТИ илмий ишлар тўплами. - Тошкент. 2009. - Б. 48-51.
180. Бобоев С.Ғ., Намозов Ш.Э., Холмуродова Г.Р., Исроилов М.И. Мураккаб турлараро дургайлаш асосида яратилган тизмаларинг айрим хўжалик белгилари бўйича кўрсаткичлари. // «Турли экстремал шароитларга бардошли ёўза ва беданинг янги навларини яратишда генетик-селекцион услублардан фойдаланиш» Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. - Тошкент. 2011. - Б. 93-94.
181. Бабаев Я., Амантурдиев А., Ким Р.Г., Баба Назаров А., Ким М. Генетические основы селекции высокоустойчивых, листовидных сортов хлопчатника, с высоким выходом и качеством волокна, способных обеспечить экологическую обстановку условий Республики Узбекистан. // Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития. Мат. межд. науч. кон. - Ташкент. 2006. - С. 90-92.
182. Джаникулов Ф., Нарбаев О. О создании новых форм хлопчатника на основе мутагенеза. // Теоретические и практические основы и перспективы развития селекции и семеноводства хлопчатника. Тезисы докладов Межд. научн. - практ. конф. - Ташкент. 2002. - С. 70-72.

183. Жўраев С.Т. Янги ошларни қимматли хўжалик белгилари.// «Ўза, беда селекцияси ва уруғчиликни ривожлантиришнинг назарий ҳамда амалий асослари» номли Республика илмий-амалий анжумани тўплами. - Тошкент. 2005. - Б. 81-83.
184. Жумаев Ф.Х., Абзалов М.Ф., Оразбоева Г., Холов Ё, *G. Mirzigit* L. га мансуб навлар дуратай бўғинларида тезпишарликни генотипта боғлиқлиги.// «Ўза ва бошқа кишлоқ хўжалик ўсимликларида тезпишарликни ҳамда мосланувчанликни эволюцион ва селекция кўрсаткичлари» номли халқаро илмий конференция материаллари. - Тошкент. 2005. - Б. 42-45.
185. Жўраев С.Т., Исроилов М., Хожамбергенов Н., Тореев Ф. Ўзанинг янги тизмаларида тола сифати белгилари.// «Турли экстремал шароитларга бардошли ўза ва беданинг янги навларини яратишда генетик-селекция услублардан фойдаланиш» Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. - Тошкент. 2011. - Б.114-116.
186. Иксанов М.И. Качество волокна новейших сортов и линий тонковолокнистого хлопчатника.// Материалы международной научно-практической конференции «Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития». - Ташкент. 2006. - С. 192-194.
187. Иксанов М.И. Потенциал республики Узбекистан в производстве тонковолокнистого хлопка.// Ўза, беда селекцияси ва уруғчилик илмий ишлар тўплами. - Тошкент. 2009. - Б. 257-260.
188. Иксанов М.И. Генофонд и селекция тонковолокнистого хлопчатника в Центральной Азии.// Ўзанинг дунёвий хилма-хиллиги генофонди- фундаментал ва амалий тадқиқотлар асоси халқаро илмий анжуман. - Тошкент. 2010. - Б. 32-35.
189. Иксанов М.И. Повышение скороспелости-важнейшее направление в селекции сортов тонковолокнистого хлопчатника.// Республиканская научно-практическая конференция «Достижения генетики и селекции в области скороспелости и устойчивости сельскохозяйственных растений к биотическим и абиотическим факторам среды». - Ташкент. 2011. - С. 46-48.
190. Ибрагимов П.Ш., Автономов В.А. *G. barbadense* L. турига мансуб навлардаги асосий хўжалик белгиларини ирсийланиши.// Ўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик масалалари тўплами. - Ташкент. 1993. - С. 47-50.
191. Ибрагимов П.Ш., Урозов Б., Тореев Ф., Бегимкулов Б., Холматова Н., Тўраева Д. Яратилган янги навлар ва тизмаларнинг тола махсуддорлигини таъминловчи белгилар орасидаги боғлиқлик.// «Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. - Тошкент. 2016. - Б. 71-74.
192. Каххаров И.Т. Корреляция скороспелости с хозяйственно ценными признаками у внутривидовых географически отдаленных гибридов F₂ хлопчатника *G. Mirzigit* L.// Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур: Мат. межд. науч. конф. - Ташкент. 2005. - С. 109-110.
193. Кулиев Т., Шодмонов Ж. Ўза навлари асосий белгилари ўртасидаги коррелятив боғланишлар тузилиши ва уларнинг ирсийланиши.// «Пахтачилик ва дончиликни ривожлантириш мўаммолари» номли илмий конф. тўплами. - Тошкент. 2004. - Б. 304-309.
194. Кимсанбаев М.Х., Автономов В.А. Сопреженность продуктивности хлопка-сырца одного растения с выходом волокна у географически отдаленных гибридов F₂ тонковолокнистого хлопчатника.// «Ўза

- генетикиси, селекцияси ва уруғчилигини ривожлантиришнинг назарий ҳамда амалий асослари» номи Республика илимий-амалий анжумани тўплами. - Тошкент. 2009. - Б. 101-103.
195. Ким Р.Г., Амантурдиев А.Б. Наследование количества коробочек на растении у отделенных внутри и межвидовых гибридов хлопчатника F_2 и F_3 с различным типом плодовых ветвей. // «Пахтачиликдаги долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илимий-амалий конференция матбузатлари асосидати мақолалар тўплами. - Тошкент. 2009. - Б. 368-371.
196. Ким Р.Г., Амантурдиев А.Б. Наследование продолжительности вегетационного периода у отделенных внутривидовых и межвидовых гибридов хлопчатника F_1 , F_2 и F_3 при скрещивании с различным типом ветвления. // «Пахтачиликдаги долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илимий-амалий конференция матбузатлари асосидати мақолалар тўплами. - Тошкент. 2009. - Б. 357-359.
197. Кимсанбоев М.Х., Автономов В.А., Кимсанбоев О.Х. Изменчивость и наследуемость продуктивности хлопка-сырца одного растения у междуростовых географически отделенных гибридов F_1 - F_3 хлопчатника *G. barbadense* L. // Ёўза беда селекцияси ва уруғчилиги илимий ишлар тўплами. - Тошкент, 2009. - Б. 132-137.
198. Кимсанбоев О.Х., Эгамбердиев Р.Р., Автономов В.А. Изменчивость признака «выход волокна» у гибридов F_1 - F_3 хлопчатника *G. barbadense* L. // «Достижения генетики и селекции в области скороспелости и устойчивости сельскохозяйственных растений к биотипическим и абиотическим факторам среды» Республиканская научно-практическая конференция. - Тошкент. 2011. С. 55-58.
199. Кимсанбоев О.Х., Амантурдиев Ш.Б., Автономов В.А., Хусанов Ф. Наследование признаков у гибридов F_1 с дикорастущей и рудеральной формами хлопчатника. // «Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития» номи халқаро илимий-амалий конференция тўплами. - Тошкент. 2013. - Б. 90-94.
200. Мухиддинов Т.И. Практические аспекты вопроса генетики и селекции признака хазмо и клейстогамного типа цветка при внутри и межвидовой гибридизации // «Ёўза ва бошқа кишлоқ хўжалик ўсимликларида тезпишарликни ҳамда мосланувчанликни эволюцион ва селекцион қирралари» номи илимий конференция материаллари. - Тошкент. 2005. - Б. 58-59.
201. Мамаракимов Б., Холикова М., Холмуродов А., Сайдалиев Ҳ. *G. tomentosum* иштирокида олинган турларо дурагайларда тола чиқимининг ирсийланиши. // Ёўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик тўплами. - Тошкент. 2000. - Б. 67-70.
202. Мунасов Х., Муратов Ў., Кўчоров О., Алихўжаева С. Шўрланган тупроқда ўстирилган айрим тизмаларнинг эртапишарлиги ва хосишдорлиги. // Ёўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик тўплами. - Тошкент. 2002. - С. 97-103.
203. Мухиддинов Т.И., Чориев А.Х., Жумаев С.К., Кодирова Ш.Н. *G. hirsutum* L. тури дорасида ота-она нусхалари ва дурагайларининг тола чиқими ва узунлигини тадқиқ этиш асослари. // «Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: муаммолар ва истиқболлари» Республика илимий-амалий конференцияси материаллари. - Тошкент. 2018. - Б. 233-235.
204. Набиева Н.Н., Ризаева С.М., Тўйчиева Х.Ю. Турларо F_1 ўсимликларида ва ота-она шаклларида 1000 дона чигит вази кўрсаткичларининг ўзгаришчанлиги ва ирсийланиши. // «Турли экстремал шароитларга бардошли ёўза ва бедачилик янги навларини яратишда генетик-селекцион услублардан фойдаланиш» Республика

- илий-амалий конференцияси материаллари тўплами. - Тошкент. 2012. - Б. 166-168.
205. Набиев С.М., Хамдуллаев Ш.А., Шавкиев Ж.Ш., Абдушукриова С.К. Изучение коэффициента корреляций между морфобиологическими признаками у сортов и гибридов F_1 хлопчатника.// «Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари» мавзусидаги халқаро илий-амалий конференцияси материаллари тўплами. - Тошкент. 2016. -Б. 111-116.
206. Одилов С., Жалилов О.Ж., Қаҳҳаров И.Т. Набиев С.М. Ғўза ўсимлиги ҳосил шохларининг интеграция ва мослашувчанлик заминин.// «Ғўза ва бошқа кишлоқ ҳўжалик ўсимликларида тезпишарликни ҳамда мослашувчанликни эволюцион ва селекцион кирралари» халқаро илий конференцияси тўплами. - Тошкент. 2005. -Б. 118-119.
207. Пуртова И.В. Использование коэффициента наследуемости при отборе по количественным признакам.// Основные итоги и приоритеты научного обеспечения АПК Евро-северо-востока. Мат. межд. науч. практ. конф. посв. 110-летию Вятской с.х. опытной станции. - Киров. 2005. - С. 137-141.
208. Рахимбоев Р.Р., Зеленина Р.Ф. Наследование некоторых хозяйственных признаков у хлопчатника.// Генетика и селекция хлопчатника. - Ташкент. 1976. - С. 91-96.
209. Рахмонов З.З., Бўстонов З.Т. Одий чатиштиришдан олинган дуратайларда эрталпишарлик белгисининг ирсийланиши ва ўзарувчанлиги.// «Ғўзанинг дунёвий хилма-хиллиги генотипи ва фундаментал ва амалий тадқиқотлар асоси» халқаро илий анжумани. - Тошкент. 2010. -Б. 119-121.
210. Рафиева Ф.У., Ризаева С.М. Турлараро F_2 дуратайларидан кун узунлигига таъабчанлик морфобиологик белгисининг ирсийланиши.// «Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: муаммолар ва истиқболлар» республика илий-амалий конференцияси материаллари. - Тошкент. 2018. - Б. 40-41.
211. Рафиева Ф.У., Куризов З.Б., Ризаева С.М., Имомалиева Н.Х. *Karlas* Раф. кенжа туркумига мансуб айрим маданий ва ёввойи таърипоид ғўза турларининг ўзаро чатишиши ва F_0 дуратай кўсак тугилиши.// «Турли экстремал шароитларга бардошли ғўза ва беданинг янги навларини яратишда генетик-селекцион услублардан фойдаланиш» Республика илий-амалий конференцияси материаллари тўплами. - Тошкент. 2012. - Б. 25-26.
212. Ризаева С.М., Абдуллаев А.А., Эрназарова Д.К., Аманов Б.Х., Мўминов Х.А., Арсланов Д.М. Турлараро дуратайлаш асосида яратилган тизмаларининг айрим ҳўжалик белгилари бўйича кўрсаткичлари.// «Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: муаммолар ва истиқболлар» республика илий-амалий конференцияси материаллари. - Тошкент. 2018. - Б. 22-24.
213. Симонгулян Н.Г. Наследование скороспелости хлопчатника.// Тез. докл. на конф. по генетике хлопчатника. - Ташкент. 1968. - С. 219-221.
214. Сейитмусаев А.И., Тишин А.И. Отбор на скороспелость и продуктивность в старых поколениях гибридов.// Вопросы генетики, селекции и семеноводства хлопчатника. - Ташкент. 1996. - С. 59-64.
215. Турабеков Ш., Мусаева С. Изучение наследования «наличия-отсутствия» листовых нектарников и госсипольных железок у линий генетической коллекции хлопчатника.// V съезд Узб.респ. общества генет. и селекционеров. Тез. докл. -Ташкент. 1986. - С. 141-143.
216. Топвольдиев Т., Рахмонов З. Ғўзанинг F_2 ўсимликларида эрталпишарлик белгиларини корреляцион боғланишлари.// «Ғўза ва бошқа кишлоқ ҳўжалик ўсимликларида тезпишарликни ҳамда мослашувчанликни эволюцион ва селекцион кирралари» номи халқаро илий конференция тўплами. -Тошкент. 2005. - Б. 78-79.

217. Тўйчиев Х.Ю., Куразов З.Б. Биринчи хосил шох жойлашган бўғин ҳамда тезпишарлик орасидаги корреляция.// Республиканская научно-практическая конференция «Достижения генетики и селекции признаков скорости и устойчивости растений к биотическим и абиотическим факторам». - Ташкент. 2011. - Б. 82-85.
218. Тўйчиев Х.Ю., Тўйчиева Х.Ю. Хосилдорлик билан айрим хўжалик белгилари орасидаги корреляция.// Республика илимий-амалий анжуман материаллари тўплами. - Ташкент. 2014. - Б. 222-225.
219. Усманов С.А., Абдиев Ф.Р. Юкори авлод дурагай ўсимликларида битта кўсакдаги пахта вазни ва унинг таркибий қисми бўлган белгиларнинг шаклланиши.// «Турли экстремал шароитларга бардошли ғўза ва беданинг янги навларини яратишда генетик-селекцион услублардан фойдаланиш» номили республика илимий-амалий конференцияси материаллари тўплами. - Ташкент. 2012. - Б. 220-221.
220. Усманов С.А., Алихўжаева С.С., Абдиев Ф., Хударганов К. *G. barbadense* тури географик узок ғўза дурагайлари климатли-хўжалик белгиларининг ўзгаришчанлиги.// «Турпок унуводорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари» номили халқаро илимий-амалий конференция тўплами. - Ташкент. 2007. - Б. 274-277.
221. Усманов С.А., Алихўжаева С.С., Хударганов К.О., Абдиев Ф.Р. Создание донаров *G. barbadense* L. с высоким выходом волокна и массой хлопка-сырца одной коробо́чки.// «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решение» Материалы международной научно-практической конференции. - Ташкент. 2007. - С. 157-159.
222. Усманов С.А., Абдиев Ф.Р., Хударганов К.О., Аманов Б.Х. Ғўзанинг *G. barbadense* L. турига мансуб юкори авлод донор ўсимликларида битта кўсакдаги пахта вазнини толанинг айрим сифат кўрсаткичлари

- билан ўзаро боқлиқлиги // «Достижения генетики и селекции в области скорости и устойчивости сельскохозяйственных растений к биотическим и абиотическим факторам среды» Республиканская научно-практическая конференция. - Ташкент. 2011. - Б. 86-89.
223. Усманов С.А., Абдиев Ф.Р., Хударганов К.О., Аманов Б.Х. Ғ.А.Ғ.Ғ.В.Бекросс дурагай популяцияси ўсимликларида хосилдорлик элементлари, тола чиқими, тола узунлиги ва тола индекси кўрсаткичлари.// «Турли экстремал шароитларга бардошли ғўза ва беданинг янги навларини яратишда генетик-селекцион услублардан фойдаланиш» Республика илимий-амалий конференцияси материаллари тўплами. - Ташкент. 2012. - Б. 217-219.
224. Усманов С.А., Расулов И.М., Хударганов К.О., Абдиев Ф.Р. Ғз ўсимликларида тола чиқимини 1000 дона чипит вазни ва ўсимликлари шохланиш типини билан ўзаро боғлиқлиги.// «Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилик соҳасининг хозирги ҳолати ва ривожланиш истикболлари» Республика илимий-амалий анжумани материаллари тўплами. - Ташкент. 2015. - Б. 121-123.
225. Усманов С.А., Абдиев Ф.Р., Аманов Б.Х., Худойкулов Б., Расулов С. Ғ.В. ўсимликларида битта кўсакдаги пахта ва унинг таркибий қисми бўлган белгилар орасида корреляция.//«Селекция ва уруғчилик соҳасининг хозирги ҳолати ва ривожланиш истикболлари» мавзусидаги Республика илимий-амалий конференцияси. - Ташкент. 2014. - Б. 126-127.
226. Холмуродова Г.Р., Джумаева Г.П. Юкори авлод конвергент, турлараро оила ва тизмаларнинг айрим климатли хўжалик белгилари бўйича кўрсаткичлари.// Андижон Пахтачилик институтини илимий-амалий анжумани тўплами. - Ташкент. 2013. - Б. 13-14.
227. Хударганов К.О., Усманов С.А. Ғўзанинг *G. barbadense* L. турига мансуб Ғ₁-Ғ₂ ўсимликларида морфобологик ва климатли хўжалик

- белгиларининг ўзгарувчанлиги. // «Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчиликни сохасининг хозирги ҳолати ва ривожланиши истиқболлари». Республика илмий-амалий анжумани илмий материаллари. - Тошкент. 2015. - Б. 84-87.
228. Холмуродова Г.Р., Намазов Ш.Э., Бобоев С.Ғ. Ғўзада тезпишарлик мураккаб полиген. // «Селекция ва уруғчилик сохасининг хозирги ҳолати ва ривожланиши истиқболлари» мавзусидаги республика илмий-амалий конференция тўплами. - Тошкент. 2014. - Б. 126-128.
229. Хударганов К.О., Усманов С.А., Абдиев Ф.Р. Характеристика хозяйственно-ценных признаков у отдаленных гибридов хлопчатника *G. barbadense* L. // Материалы международного научно-практического конференции «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования» Прикаспийский НИИ аридного земледелия. - Россия. 2017. - С. 1275-1279.
230. Холмуродова Г.Р., Бобоев С.Ғ., Джумаева Г.П., Баратова Х., Мамедова Ф.Ф. Ғўзанинг мураккаб, конвергент ва турлараро дурағай, оила ва тизмаларда тезпишарликнинг шаклланиши. // «Селекция ва уруғчилик сохасининг хозирги ҳолати ва ривожланиши истиқболлари» Республика илмий-амалий анжумани илмий материаллари. - Тошкент. 2014. - Б. 133-138.
231. Чоршанбиев Н.Э. Янги интичка тоғали ғўза навларининг кимматли хўжалик белгиларини ўрганиш. // Материалы международной научно-практической конференции «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур» посвященной 95-летию со дня рождения акад. С.С.Содикова. - Ташкент. 2005. - С. 86-89.
232. Чоршанбиев Н.Э. Интичка тоғали ғўзанинг янги навларида ва дурағайларининг F_1 авлодида кимматли хўжалик белгиларининг корреляцияси. // Республика илмий конференция материаллари. - Самарканд. 2006. - Б. 34-35.
233. Чоршанбиев Н.Э. Наследование числа коробочек и массы хлопчатсырца одной коробочки у гибридов F_1 - F_2 вида *G. barbadense* L. // Биология, экология ва тупроқшуносликнинг долзарб муаммолари: Республика Илмий-амалий конференцияси. - Тошкент. 2008. - Б. 190-191.
234. Чоршанбиев Н.Э., Набиев С.М. Янги интичка тоғали ғўза навларининг кимматли хўжалик белгиларини ўрганиш. // «Ғўза ва бошқа қишлоқ хўжалик ўсимликларида тезпишарликни ҳамда мосланувчанликни эволюцион ва селекцион кирралари» номли халқаро илмий конф. - Тошкент. 2005. - Б. 86-88.
235. Чоршанбиев Н.Э., Набиев С.М. Характер наследования и изменчивость по выходу и длине волокна у гибридов F_1 - F_2 вида *G. barbadense* L. // Халқаро илмий-амалий конференция мавзулари асосидаги мақолалар тўплами. - Тошкент. 2009. - Б. 385-387.
236. Қўчқоров О., Алихўжаева С., Қушалиев А., Мунасов Х. Шўр тупроқда ўстирилган тизмаларнинг кимматли хўжалик кўрсаткичлари. // Ғўза генетикаси, селекцияси, уруғчилик ва бедачилик тўплами. - Тошкент. 2000. - Б. 64-66.
237. Эрназарова Д.К., Ризаева С.М., Абдуллаев А.А. Наследование плодовитости (масса хлопчатсырца одной коробочки и 1000 семян) у внутри- и межвидовых гибридов F_1 , F_2 и F_1B_1 . // Республика илмий-амалий анжумани тўплами. - Тошкент. 2005. - Б. 57-59.
238. Эрназарова Д.К., Эрназарова З.А., Аманов Б.Х., Муминов Х.А., Ризаева С.М. Наследование длины волокна внутри и межвидовых гибридов хлопчатника. // Материалы 14-й Международной Пушкинской школы-конференции молодых ученых «Биология-наука XXI-века». - Москва. 2010. - С. 306-307.

239. Эгамбердиев Р.Р., Автономов В.А., Кимсанбоев М.Х., Изменчивость и наследуемость выхода волокна у географически отдаленных гибридов *F₁-F₃* хлопчатника *G. barbadense* L. // *Ўза беда селекциси ва уруғчилиги илимий ишлар тўғрисида*. - Тошкент. 2009. - Б. 213-218.
240. Юлдашева Р., Намазов Ш., Холмуродова Г., Юсупова А., Курбонов Ҳ. Тур ичида дурағайлаш орқали яратилган селекцион опшларда тезлишарликнинг шаклланиши // «Қишлоқ хўжалиги экинлари селекциси ва уруғчилиги соҳасининг хозирги ҳолати ва ривожланиши истикболлари». Республика илимий-амалий анжумани илимий материаллари. - Тошкент. 2015. - Б. 73-77.
241. Avlonopov V.A., Kimsanbaev O.X., Namazov Sh.E., Qurbonov A.Y., Utmanov Sh.X., Mullaхshov V. Problems and ways of the rescovery of cultivation of fine-fiber cotton varieties in the republic of Uzbekistan. // Digest of scientific and technical achievements in the realm of cotton industry of the republic of Uzbekistan. Tashkent. 2017. - P. 31-34.
242. Акмурадов Ш. Селекционно-генетические аспекты низкорослых сортов тонковолокнистого хлопчатника. Автореф. док. с/х. наук. Ашгабад. 1996. - С. 38-40.
243. Ахмедов Дж.Х. Основы комбинационной способности и гетерозиса сортов и гибридов хлопчатника. Автореф. дис. док. биол. наук. Ташкент. 2008. - С. 14-18.
244. Абдурахманов И.Ю. Структурная и функциональная хлопчатника: создание маркеров, генетическое картирование, клонирование и следование функций полезных генов рода *Gossypium* L. Автореф. дис. док. биол. наук. Ташкент. 2008. - С. 13-16.
245. Автономов В.А. Внутривидовая географически отдаленная гибридизация хлопчатника на устойчивость к вирусу и черной корневой гниле. Автореф. дис. докт. с/х. наук. Ташкент. 2010. - С. 24-25.
246. Аманов Б.Х. Перу ўза турларининг генетик хилма-хилликлари ва морфо-хўжалик белгиларининг ирсийланиши. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Тошкент. 2010. - Б. 10-12.
247. Абдиев Ф.Р. *G. barbadense* L. турига мансуб юкори авлод дурағайлардан амалий селекцита бошлангч материал яратиш. Автореф. к/х. ф.н. Тошкент. 2011. - Б. 18-19.
248. Абдуллаев Ал.А. Молекулярная характеристика и ассоциативное картирование предпосавителей вида *G. barbadense* L. из коллекции гермиплазмы Узбекистана. Автореф. дис. ... док. биол. наук. Ташкент. 2016. - С. 12-26.
249. Бабаев Д.Б. Пути использования методов межвидовой и географически отдаленной гибридизации в селекции Советского тонковолокнистого хлопчатника. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Ашхабад: АН Туркм. ССР. 1963. - С. 10-14.
250. Бобоев С.Г. Мураккаб турлараро дурағайлаш орқали ўзанинг кўп геномни янги дурағайларини яратиш ва хусусиятларини очиб бериш. Дис. био. фан. док. (DSc). Тошкент. 2017. - Б. 14-16.
251. Закиров С.А. Изучение наследования некоторых качественных и количественных признаков при межлинейных скрещиваниях у хлопчатника *G. hirsutum* L. Автореф. ... канд. биол. наук. Ташкент. 1973. - С. 10-11.
252. Ибрагимов П.Ш. Роль системных скрещиваний в оптимизации селекционного процесса хлопчатника видов *G. barbadense* L. и *G. hirsutum* L. Автореф. дис. ... док. с/х. наук. Ташкент. 2003. - С. 12-15.
253. Кушанов Ф.Н. Микросателлитное генотипирование и характеристика индуцированных мутантов хлопчатника *G. barbadense* L. с измененным фотопериодизмом. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Ташкент. 2008. - С. 14-16.

254. Кушанов Ф.Н. Ёўзада фотопериодик турлашни бошқарувчи докус ва генларни QTL картадаштириш. Автореф. дис... док. биол. наук. (DSc). Тошкент. 2017. - С. 17-21.
255. Мамаракимов Б. *G. tomentosum* Nutt ex Desm. иштирокида олинган турлараро дуратайлардаги белгиларнинг шаклланишида тақдорий тағйирлашнинг ролли. К.х.ф.н... дисс. автореф. Тошкент. 2005. - Б. 15-20.
256. Намазов Ш.Э. Амалий ёўза селекциясида тур ичида ва турлараро мураккаб дуратайлашнинг генетик асослари. К/х.ф.д... дисс. автореф. (DSc). Ташкент. 2014. - Б. 17-19.
257. Рахманкулов М.С. Селекциянинг янги усуллари асосида ёўзанинг *G. hirsutum* L. турига мансуб тезпишар, юкори ҳосилили нав ва тизмаларини яратиш. Автореф. дис... док. с/х. наук. (DSc). Тошкент. 2017. - С. 16-19.
258. Ризаева С.М. Отдаленная гибридизация хлопчатника и получение новых доноров (на примере новосветских видов). Автореф. дис... док. биол. наук. - Ташкент. 1996. - С. 20-26.
259. Рафиева Ф.У. *G. mistelium* Meigs ex Watt. турининг бошқа полиплоид турлар билан филогенетик келиб чиқишини ўрганиш асосида янги донорлар олиш. Б.ф.д... дисс. автореф. (PhD). Тошкент. 2017. - Б. 12-15.
260. Сиддиков А.Р. Мураккаб дуратайлаш таъсирида ёўзада кимматли хўжалик белгиларининг ўзгартувчанлиги. К.х.ф.н... дисс. автореф. Тошкент. 2006. - Б. 11-14.
261. Сирожидинов Б.А. Австралия ва Ҳинди-Хитой ёўза турларининг филогенетик муносабатлари. Б.ф.д... дисс. автореф. Тошкент. 2017. - Б. 10-13.
262. Тўйчиев Х.Ю. Айрим ёўза ва нав тизмаларининг популяциялари ичиндаги биотипларнинг морфобиологик ва хўжалик белгиларининг мувозанатлиги. Б.ф.д... дисс. автореф. Ташкент. 2010. - С. 16-18.
263. Хударганов К.О. *G. barbadense* L. ёўза дуратайларида клейстогам тул ва кимматли хўжалик белгиларини ирсийланиши ва ўзгартувчанлиги. К/х.ф.н. автореф. Тошкент. 2012. - Б. 10-13.
264. Халикова М.Б. *G. tomentosum* турининг генетик потенциалли ва унинг маданийлашган турларни (*G. hirsutum* L., *G. barbadense* L.) кимматли-хўжалик белгилари билан бойитишдаги аҳамияти. К/х.ф.д... дисс. автореф. (DSc). Тошкент. 2016. - Б. 14-15.
265. Чоршанбёев Н.Э. *G. barbadense* L. тури маҳаллий ёўза навларининг F₁-F₂ ўсимликларида морфо-хўжалик белгиларининг ирсийланиши ва ўзгартувчанлиги. Б.ф.д... дисс. автореф. Тошкент. 2018. - Б. 13-15.
266. Эрназарова З.А. Межвидовое родство C-геномных хлопчатников и их филогенетические взаимоотношения с D-геномными видами. Дисс... канд. биол. наук. Ташкент. 1998. - С. 10-12.
267. Эрназарова Д.К. Внутри- и межвидовое филогенетическое родство разновидностей *G. hirsutum* L. и *G. triloboides* Lam. Автореф. дис... канд. биол. наук. - Ташкент. 2008. - С. 7-10.
268. Эгамбердиев Р.Р. Исследование и сопряженность качества волокна и основных хозяйственных признаков у экологически отдаленных гибридов хлопчатника вида *G. barbadense* L. Автореф. дисс. канд. с/х. наук. Ташкент. 2008. - С. 13-14.
269. Эгамбердиева С.А. Ёўзанинг маданий *G. hirsutum* L. турини кимматли хўжалик белгиларини яхшилашда интрогрессив шакллардан фойдаланиш. К/х.ф.д... дисс. автореф. (DSc). Тошкент. 2017. - Б. 16-17.

ИЛОВА

G. barbadense L. турининг айрим туричи шакллари дурагайлаш асосида олинган оилаларнинг морфоҳужалик белгиларининг таҳлили

1-илова

Бошланғич манбалар ва дурагай ўсимликлар	Ўсимликлар бўйи			Биринчи ҳосил шох (hs)			Ҳосил шохлар сони, дона		
	$\bar{x} \pm S\bar{x}$	limit	V %	$\bar{x} \pm S\bar{x}$	limit	V %	$\bar{x} \pm S\bar{x}$	Limit	V %
Бошланғич манбалар									
Қарши-8 нави	77,0 ± 1,53	70,0-80,0	6,27	3,0 ± 0,15	2,0-4,0	13,09	20,2 ± 0,49	18,0-22,0	7,67
<i>ssp. vitifolium</i>	96,5 ± 1,83	90,0-105,0	6,01	15,8 ± 0,39	14,0-16,0	8,20	22,6 ± 0,62	20,0-26,0	8,65
Оилалар									
Оила -1	82,1 ± 4,91	65,0-110,0	19,16	5,1 ± 0,42	3,0-7,0	25,93	19,9 ± 1,10	14,0-26,0	17,53
Оила -2	106,5 ± 4,65	85,0-130,0	13,79	6,9 ± 0,33	5,0-10,0	14,91	23,2 ± 1,39	17,0-32,0	18,90
Оила -3	99,0 ± 5,85	60,0-135,0	18,26	7,0 ± 0,45	4,0-9,0	20,38	20,4 ± 1,05	16,0-28,0	16,22
Оила -4	95,6 ± 4,79	65,0-120,0	15,80	6,4 ± 0,48	4,0-9,0	23,82	19,5 ± 0,68	16,0-25,0	11,09
Оила -6	98,1 ± 5,96	70,0-130,0	19,19	6,1 ± 0,43	3,0-9,0	22,51	18,9 ± 0,93	15,0-25,0	15,62
Оила -7	103,8 ± 4,77	75,0-130,0	14,52	6,7 ± 0,49	4,0-10,0	22,91	20,1 ± 1,07	15,0-26,0	16,85
Оила -8	99,1 ± 4,34	70,0-125,0	13,84	7,2 ± 0,42	4,0-9,0	18,38	21,0 ± 0,95	16,0-27,0	14,23
Оила -9	91,8 ± 4,37	70,0-130,0	15,03	7,8 ± 0,39	6,0-10,0	15,93	20,2 ± 0,79	14,0-23,0	12,29

G. barbadense L. турининг айрим туричи шакллари дурагайлаш асосида олинган тизмаларида морфобиологик белгиларининг таҳлили

212

Бошланғич манбалар ва дурагай ўсимликлар	Ўсимликлар бўйи, м			hs – белгиси			Симподиаллар сони, дон		
	$\bar{x} \pm S\bar{x}$	limit	V %	$\bar{x} \pm S\bar{x}$	limit	V %	$\bar{x} \pm S\bar{x}$	Limit	V %
Тизмалар									
T-1987	100,3 ± 1,71	95,0-110,0	5,39	4,9 ± 0,35	3,0-6,0	22,32	22,3 ± 0,51	20,0-25,0	7,18
T-1985	107,3 ± 2,55	100,0-120,0	7,52	5,5 ± 0,40	3,0-7,0	23,21	23,6 ± 0,69	19,0-26,0	9,20
T-1982	106,6 ± 2,57	100,0-120,0	7,63	5,8 ± 0,36	4,0-7,0	19,42	23,4 ± 0,91	20,0-29,0	12,23
T-1981	113,7 ± 1,61	110,0-125,0	4,46	6,1 ± 0,54	3,0-8,0	28,02	21,9 ± 0,65	19,0-24,0	9,36
T-2006	106,3 ± 1,66	100,0-115,0	4,93	7,5 ± 0,59	4,0-10,0	24,70	22,3 ± 0,78	18,0-25,0	11,08
T-2008	107,3 ± 1,85	100,0-115,0	5,44	5,9 ± 0,62	3,0-9,0	33,41	19,6 ± 0,43	17,0-21,0	6,88
T-2017	106,1 ± 1,89	100,0-120,0	5,63	5,3 ± 0,44	3,0-7,0	26,48	22,1 ± 0,60	20,0-25,0	8,58
T-2017-2	109,3 ± 1,30	105,0-115,0	3,75	5,7 ± 0,39	4,0-7,0	21,49	19,7 ± 0,67	16,0-22,0	10,83

Ўсимликнинг кабачиқлиги	$38,2 \pm 1,83$	35,0-40,0	5,01	12,8 ± 0,34	10,0-15,0	8,30	32,9 ± 0,65	30,0-35,0	8,62
Ўсимликнинг кабачиқлиги	$31,9 \pm 1,23$	30,0-35,0	5,33	10,0 ± 0,12	10,0-10	12,00	30,3 ± 0,48	18,0-33,0	10,1
Ўсимликнинг жами ҳосили									
Ўсимликнинг жамий ҳосили	12 ± 2	limit	V %	12 ± 2	limit	V %	12 ± 2	limit	V %
Ўсимликнинг бўйи			Ўсимликнинг ҳосили (га)			Ўсимликнинг сони (га)			

Ўсимликнинг морфобиологик белгиларининг таҳлили
Ўсимликнинг турининг айрим туричи шакллари дурагайлаш асосида олинган

2-илова



Янги ингичка толали «Ангор» гўза нави
(«Сурхон» тажриба хўжалиги)





Янги ингичка толали «Ангор» гўза нави
(Дўрмон тажриба базаси)

3-илова

213

Янги интичка тоғали «Ангор» ғўза навининг морфобологияк белгилари



Аманов Бахтиёр Хушбакович- 1981 йил 18 октябрда Сурхондарё вилояти, Ангор туманида туғилган, биология фанлари доктори.

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтини Табиий фанлар факультетини Генетика ва эволюцион биология кафедраси мудири ҳамда Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтини хузуридаги Илмий кенгаш илмий котиби.

Генофонд-2, Ангор, ТошДАУ-130, Нисо навларининг муаллифи ва ҳаммуаллифи, 2 та патент эгаси.

Б.Х. Аманов томонидан 3 та монография ҳамда 200 ортиқ илмий мақолалар маҳаллий ва хорижий нашрларда чоп этилган.



Абдиев Фозил Рашидович- 1982 йил 30 январда Қашқадарё вилояти, Ғўзор туманида туғилган, кишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Тошкент давлат аграр университети «Кишлоқ хўжалиги экинлари генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги» кафедрасида профессор лавозимини фаолият юритиши билан бир вақтда университетнинг «Илмий инновацион ишланмаларни тижоратлаштириш» бўлими бошлиғи ва Тошкент давлат аграр университети хузуридаги илмий даражадор бериучи илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда раис ўринбосари лавозимларида фаолият юритиб келмоқда.

ТошДАУ – 100, СП – 7701 ва СП – 7721 навларининг муаллифи ва ҳаммуаллифи, 1 та патент эгаси.

Ф.Р. Абдиев томонидан 2007-2021 йилларда илмий-тадқиқот ишлари бўйича жами 61 та илмий иш чоп этиб, шулардан, 28 таси, жумладан 28 таси республика ва 10 таси хорижий журналларда нашр қилинган, 2 та монография, 1 та ўқув кўиланма чоп этилган.

МУНДАРИЖА

КИРИШ.....	3
I БОБ. GOSSYRUM L. ТУРКУМИГА МАНСУБ ҒЎЗА ТУРЛАРИНИНГ ДУРАГАЙЛАРИДА MORFOBIOLOGIK БЕЛГИЛАРИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ, ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ ВА КОРРЕЛЯЦИЯСИ.....	6
1.1-§. Ғўза турларининг дурагайларида морфоҳўжалик белгиларининг генетик-селекцион таджикотлар таҳлили.....	6
1.2-§. Ғўзада морфоҳўжалик белгиларининг узвий боғлиқлиги.....	32
II БОБ. ПЕРУ ҒЎЗА ТУРЛАРИ ВАКИЛЛАРИНИНГ МАНБАЛАРИ, ЎРГАНИШ УСЛУБЛАРИ ВА ШАРОИТИ.....	45
2.1-§. Таджикот ўтказилган жой ва унинг шароити.....	45
2.2-§. Таджикот манбаи.....	45
2.3-§. Таджикот услублари.....	48
III БОБ. ПЕРУ ҒЎЗА ТУРЛАРИНИНГ ТУРИЧИ ВА ТУРЛАРАО F ₁ -F ₂ ЎСИМЛИКЛАРИДА MORFOBIOLOGIK ВА КИММАТЛИ-ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ ВА ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ.....	53
3.1-§. Перу ғўза турларини туричи ва турларо чагиштириш, дурагай кўсак тутилиши ва кўсакларда тўлиқ уруғлар фоизи.....	53
3.2-§. Бошлангич шакллар ва F ₁ ўсимликларида кўсаклар сони ва кўсакда тўлиқ уруғлар тутилиш.....	61
3.3-§. F ₁ -F ₂ ўсимликларида ўсув даврининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги.....	71
3.4-§. F ₁ -F ₂ ўсимликларида битта кўсакдаги пахта вази белгисининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги.....	83
3.5-§. F ₁ -F ₂ ўсимликларида тола узунлиги белгисининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги.....	94
3.6-§. F ₁ -F ₂ ўсимликларида тола чикими белгисининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги.....	104
3.7-§. F ₁ -F ₂ ўсимликларида 1000 донга чигит вази белгисининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги.....	115
IV БОБ. ИНГИЧКА ТОЛАШИ ҒЎЗАНИНГ ЙИРИК КЎСАКЛИ ДУРАГАЙЛАРИДА АЙРИМ MORFO-XOЖAЛИK БЕЛГИЛАРИ ОРАСИДАГИ ЎЗАРО БОГЛИКЛИКЛАР.....	126
4.1-§. <i>G. barbadense</i> L. туричи хилма-хилликларини дурагайлаш асосида олинган F ₄ оилаларнинг морфо-хўжалик белгиларининг узвий боғлиқлиги.....	126
4.2-§. <i>G. barbadense</i> L. туричи хилма-хилликларини дурагайлаш асосида.....	216

олинган йирик кўсакли оила популяцияларини айрим хўжалик белгиларининг узвий боғлиқлиги.....	129
4.3-§. <i>G. barbadense</i> L. туричи хилма-хилликларини дурагайлаш асосида олинган йирик кўсакли оила популяцияларини айрим морфо-хўжалик белгиларининг узвий боғлиқлиги.....	134
V БОБ. ПЕРУ ҒЎЗА ТУРЛАРИНИ ТУРИЧИ ВА ТУРЛАРАО ДУРАГАЙЛАШ АСОСИДА ОЛИНГАН F ₁ -F ₂ ЎСИМЛИКЛАРИДА MORFOBIOLOGIK БЕЛГИЛАРИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ.....	139
5.1-§. Кун узунлигига талабчанлик.....	139
5.2-§. Антоциан рангли ўсимликларнинг ирсийланиши.....	142
5.3-§. Шохланиш типли.....	146
VI БОБ. <i>G. BARBADENSE</i> L. ТУРИЧИ ДУРАГАЙ ПОПУЛЯЦИЯЛАРИДАН ОЛИНГАН ОИЛАЛАР, ТИЗМАЛАР ВА ЯНГИ ЯРАТИЛГАН ҒЎЗА НАВИДА КИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	149
6.1-§. <i>G. barbadense</i> L. туричи хилма-хилликларини ўзаро дурагайлаш асосида олинган оилаларда кимматли хўжалик белгиларининг шаклланиши.....	149
6.2-§. <i>G. barbadense</i> L. туричи хилма-хилликларини ўзаро дурагайлаш асосида олинган тизмаларда кимматли хўжалик белгиларининг шаклланиши.....	155
6.3-§. Сурхон тажриба хўжалигининг катта нав синови кўчатзориди синалган «Ангор» навининг кимматли хўжалик белги кўрсаткичлари.....	166
ХУЛОСА.....	171
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	174
ИЛОВА.....	210

Б.Х. АМАНОВ, Ф.Р. АБДИЕВ

ПЕРУ ҒЎЗА ТУРЛАРИНИ ТУРИЧИ ВА ТУРЛАРАРО ДУРАГАЙЛАШ АСОСИДА ГЕНЕТИК ЖИХАТДАН БОЙИТИЛГАН ТИЗМАЛАР ЯРАТИШ

Босишта рухсат этилди: 10.06.2021
Бичими: 60x84 1/16 «Times New Roman»
гарнитурда ракамли босма усулда босилди.
Шартли босма табағи 13.6. Адади: 50. Буюртма: № 10-06
Тел: (99) 832 99 79; (97) 815 44 54

“IMPRESS MEDIA” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Манзил: Тошкент ш., Яққасарой тумани, Кушбети кўчаси, 6 уй