

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS  
TA'LIM VAZIRLIGI  
ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT  
UNIVERSITETI**



**DIFFERENTIAL TENGLAMALAR KAFEDRASI**  
**«MATEMATIK FIZIKA TENGLAMALARI»**  
**fanidan o'quv-uslubiy**

**M A J M U A**

**«5480100 - Amaliy matematika va informatika»**  
**ta'lim yo'nalishi bakalavr talabalari uchun**

**SAMARQAND-2010**

Akram Hasanovich Begmatov, Zarifjon Husanovich Ochilov «Matematik fizika tenglamalari» fanidan o'quv – uslubiy majmua («5480100 - Amaliy matematika va informatika» ta'lim yo'nalishi bakalavr talabalari uchun). O'quv-uslubiy majmua. – Samarqand: SamDU nashri, 2010. – 463 bet.

«Matematik fizika tenglamalari» fanidan ushbu o'quv – uslubiy majmua Samarqand davlat universitetining «Differentsial tenglamalar» kafedrasida tayyorlangan. Majmua «Matematik fizika tenglamalari» fanini o'rganish jarayonida talabanning mustaqil ishlashini ta'minlovchi o'quv-uslubiy materiallarni o'z ichiga oladi hamda talaba olgan bilimining sifatini doimo nazorat qilishni ta'minlaydi.



## MUNDARIJA

1. Namunaviy o'quv dasturi.....	4
2. Ishchi o'quv dasturi.....	15
3. Reyting nazoratlarni grafigi.....	21
4. Baholash mezonlar.....	22
5. Kalendar ish reja.....	24
6. Ma'ruza matni ishlanmasi.....	29
7. Amaliy mashg'ulotlar ishlanmasi.....	164
8. Seminar mashg'ulotlar ishlanmasi.....	273
9. Mustaqil ta'lim ishlanmasi.....	284
10. Oraliq nazorat savollari.....	337
11. Yakuniy nazorat savollari.....	366
12. Testlar.....	379
13. Taqdimot slaydlari.....	396
14. Elektron darslik, elektron qo'llanmalar.....	447
15. Fanning axborot manbai va o'ning ta'minoti (fanga, mavzuda oid o'quv adabiyotlar ro'xati) .....	447
16. Glossariy.....	448

**TAJRIBA-SINOV**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

Руйхатга олинди  
№ БД5480100-3.1.02  
2008 йил "23" август

Ўзбекистон Республикаси Олий  
ва ўрта махсус таълим  
вазирлигининг  
2008 йил "23" август даги  
"263"-сонли буйруғи билан  
тасдиқланган

**МАТЕМАТИК ФИЗИКА ТЕНГЛАМАЛАРИ  
фанининг**

**ЎҚУВ ДАСТУРИ**

Билим соҳаси: 400 000 – Фан  
Таълим соҳаси: 480000 – Амалий математика ва информатика  
Таълим йўналиши: 5480100 – Амалий математика ва информатика

Тошкент – 2008

Фаннинг ўқув дастури Олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълими ўқув-методик бирлашмалари фаолиятини Мувофиқлаштирувчи Кенгашнинг 2008 йил “20” август даги “4”-сон мажлис баёни билан маъқулланган.

Фаннинг ўқув дастури Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида ишлаб чиқилди.

#### Тузувчилар:

- Қосимов Ш.Ф. - ЎзМУ “Математик физика” кафедраси доценти,  
ф. – м. ф. д.  
Сайдаматов Э.М. - ЎзМУ “Математик физика” кафедраси доценти,  
ф. – м. ф. н.

#### Такризчилар:

- Зикиров О.С. - ЎзМУ “Дифференциал тенгламалар” кафедраси  
доценти, ф. – м. ф. н.  
Қаюмов Э. - Тошкент Давлат техника университети доценти,  
ф.-м. ф.н.

Фаннинг ўқув дастури Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Илмий-методик кенгашида тавсия қилинган (2008 йил “27” июндаги “9” -сонли баённома).

## **Kirish**

Matematik fizika masalalari har xil fizik jarayonlarni o'rganish bilan chambarchas bog'liqdir. Bunday jarayonlar qatoriga gidrodinamika masalalari, elektrodinamika masalalari va boshqa masalalarni keltirish mumkin. Bunday jarayonni ifodalovchi matematik masalalar ko'pgina umumiylikka ega bo'lib matematik fizika tenglamalari predmetini tashkil etadi. Matematik fizika tenglamalari oliy matematikaning asosiy fundamental va tadbqiqiy bo'limlaridan bo'lib, u bakalavriyatning matematika, mexanika, amaliy matematika va informatika kabi yo'nalishlari o'quv rejasidagi umumkasbiy fanlardan biri hisoblanadi.

### **O'quv fanining maqsadi va vazifalari**

Matematik fizika tenglamalarining xususiy hosilali differensial tenglamalari uchun chegaraviy masalalarini yechishga bag'ishlanadi. Matematik fizika tenglamalari fanining maqsadi talabalarga fizik jarayonlarning xususiy hosilali differensial tenglamalar yordamida matematik modelini tuzishini o'rgatadi. Matematik modellar uchun masalaning berilishiga qarab, ularning yechimining mavjudligini, yagona ekanligini, boshlang'ich va chegaraviy shartlarga hamda tenglamada qatnashgan parametrlarga uzluksiz bog'liq ekanligini isbotlashdan iborat.

Matematik fizika tenglamalari bilan shug'ullangan talabalar xususiy hosilali differensial tenglamalar va ularning yechimlari to'g'risida tushunchalar. Xarakteristik forma. Ikkinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalarning klassifikasiyasi va kanonik ko'rinishi. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni kanonik ko'rinishga keltirish. Matematik fizikaning asosiy tenglamalarini keltirib chiqarish (tor tebranish tenglamasi; issiqlik tarqalish tenglamasi; stasionar tenglamalar). Matematik fizika tenglamalari uchun asosiy masalalarning qo'yilishi: Koshi masalasi va uning qo'yilishida xarakteristikalarining roli. Korrekt qo'yilgan masala tushunchasi. Chegaraviy masala; Aralash masala va boshqa masalalar yechimlarining yagona va mavjud ekanligini isbotlashdan hamda o'rganilgan nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llashni o'rganishdan iborat.

### **Fan bo'yicha bilimiga, ko'nikma va malakasiga qo'yiladigan talablar**

«Matematik fizika tenglamalari» o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:

- fan bo'yicha talabalar xarakteristikalar, Furiye, Riman, Grin funksiyasi usullarini ***bilishi kerak***;

- fanni o'rganishda talabalar tegishli jarayonlar haqida tasavvurga ega bo'lishlari, ayni paytida ularni mantiqiy fikrlash va to'g'ri xulosalar chiqarish ***ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak***;

-Korrekt qo'yilgan masala tushunchasi; Chegaraviy masala; Aralash masala va boshqa masalalar yechimlarining yagona va mavjud ekanligini isbotlashdan hamda o'rganilgan nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llash ***malakalariga ega bo'lishi kerak***.

### **Fanning o'quv rejadagi boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi va uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi**

Matematik fizika tenglamalari fani asosiy ixtisoslik fani hisoblanib, 6-semestrda o'qitiladi. Bu fan matematik analiz, funksional analiz, oddiy differensial tenglamalar va shu kabi predmetlar bilan o'zaro bog'liq va uslubiy jihatdan ularning davomidir.

### **Fanning ishlab chiqarishdagi o'rni**

Matematik fizika tenglamalari "Amaliy matematika va informatika" yo'nalishida mutaxassislar tayyorlashning o'quv jarayonida bakalavrlarning yuqori darajadagi matematik tayyorgarligi va ko'pgina maxsus fanlar bo'yicha chuqur bilimlar egasi bo'lishida asosiy o'rin tutadi.

### **Fanni o'qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar**

Talabalarining matematik fizika tenglamalari fanini o'zlashtirishlari uchun o'qitishning zamonaviy pedagogik usullaridan va informasion texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga egadir. Bunda elektron darslik, uslubiy qo'llanmalar, tarqatma materiallar, virtual stendlar va yangi nashr etilgan zamonaviy adabiyotlardan foydalaniladi.

### **Asosiy qism**

### **Fanning nazariy mashg'ulotlari mazmuni**

Xususiy hosilali differensial tenglamalar sinflari. Giperbolik tipdagi tenglamalar. Parabolik tipdagi tenglamalar. Integral tenglamalar. Elliptik tipdagi tenglamalar. Aralash masalalar. Maxsus funksiyalar. Aralash tipdagi tenglamalar.

### **Xususiy hosilali differensial tenglamalar sinflari**

Xususiy hosilali differensial tenglamalar va ularning yechimi haqida tushuncha. Matematik fizikaning asosiy tenglamalari va ularni keltirib chiqarish. Ikkinchi tartibli xususiy hosilali kvazichiziqli differensial tenglamalarning sinflari va ularni kanonik ko'rinishga keltirish. Xarakteristik forma tushunchasi. Yuqori tartibli differensial tenglamalarning va sistemalarning sinflari. Ikki o'zgaruvchili ikkinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalarni kanonik ko'rinishga keltirish. Ikkinchi tartibli chiziqli differensial tenglamalar uchun asosiy chegaraviy masalalarning qo'yilishi. Korrekt (to'g'ri) va nokorrekt qo'yilgan masala tushunchasi. Koshi-Kovalevskaya teoremasi. Adamar misoli.

### **Giperbolik tipdagi tenglamalar**

Giperbolik tipdagi tenglamaga olib kelinadigan oddiy masalalar. To'lqin tarqalish usuli. Dalamber formulasi. Bir jinsli bo'lmagan tenglama uchun Dalamber formulasi. Yechimning turg'unligi. Yarim chegaralangan o'q va davom ettirish usuli. Chegaralangan kesma uchun masala. Tebranishning integral tenglamasi. O'zgaruvchilarni ajratish usuli. Torning erkin tebranish tenglamasi. Yechimning fizik ma'nosi. Bir jinsli bo'lmagan tenglama uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli. Umumiy birinchi chegaraviy masala. Boshlang'ich shartsiz masala. O'zgaruvchilarni ajratish usulining umumiy sxemasi. Xarakteristikalarda berilgan masala. Giperbolik turdagi umumiy chiziqli tenglamalarni yechish. Qo'shma differensial operatorlar. Yechimning integral ko'rinishi. Riman funksiyasining fizik talqini. O'zgarmas koeffisientli tenglamalar. Fazoda to'lqin tarqalishi. Kirxgof formulasi. Tushish usuli. Puasson va Dalamber formulalari. Bir jinsli bo'lmagan to'lqin tenglamasi. Dyumel prinsipi.

### **Parabolik tipdagi tenglamalar**

Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Birinchi chegaraviy masala. Ekstremum prinsipi. Birinchi chegaraviy masala yechimining yagonaligi va turg'unligi. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun Koshi masalasi. Puasson

formulasini keltirib chiqarish. Puasson formulasini asoslash. Bir jinsli bo'lmagan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi.

### **Integral tenglamalar**

Umumiy tushunchalar. Ketma-ket yaqinlashish usuli. Fredgolm va Volterraning ikkinchi tur integral tenglamasi. Fredgolm teoremlari. Kuchsiz maxsuslikka ega bo'lgan tenglamalar. Volterraning birinchi tur tenglamasi.

### **Elliptik tipdagi tenglamalar**

Garmonik funksiyalarning asosiy xossalari. Garmonik funksiyalarning integral ifodasi. O'rta arifmetik haqidagi formulalar. Ekstremum prinsipi va Dirixle masalasi yechimining yagonaligi. Laplas tenglamasi uchun Dirixle masalasining Grin funksiyasi. Shar uchun Dirixle masalasini yechish. Puasson formulasi. Yarim fazo uchun Dirixle masalasini yechish. Puasson formulasidan kelib chiqadigan ayrim muhim natijalar. Liuvill va Garnak teoremlari. Hajm potensialining uzluksizligi va uning birinchi tartibli hosilasi. Hajm potensialining ikkinchi tartibli hosilasining mavjudligi. Puasson tenglamasi. Gauss formulasi. Ikkilangan va oddiy qatlam potentsiali. Dirixle va Neyman masalalarini potentsiallar yordamida yechish. Ikkinchi tartibli elliptik tipdagi chiziqli tenglamalar umumiy nazariyasidan ayrim ma'lumotlar. Ikkinchi tartibli chiziqli elliptik tenglama yechimining mavjudligi. Chegaraviy masalalarning qo'yilishi. Ekstremum prinsipi. Dirixle masalasi yechimining yagonaligi.

### **Aralash masalalar**

Furye usuli. Bir jinsli va bir jinsli bo'lmagan giperbolik tenglamalar. Parabolik tenglama. Shredinger tenglamasi. Elliptik tenglama. Misollar. Giperbolik tipdagi tenglamalar uchun aralash masala. Klassik yechim. Energiya integrali. Klassik yechimning yagonaligi va uzluksiz bog'liqligi. Umumlashgan yechim. Umumlashgan yechimning yagonaligi va uzluksiz bog'liqligi. Umumlashgan yechimning mavjudligi. Klassik yechimning mavjudligi. Parabolik tipdagi tenglamalar uchun aralash masala. Klassik yechim. Maksimum prinsipi. Klassik yechimning yagonaligi va uzluksiz bog'liqligi. Umumlashgan yechim. Umumlashgan yechimning mavjudligi. Klassik yechimning mavjudligi.

### **Maxsus funksiyalar**

Eyler integrallari. Gipergeometrik funksiya. Bessel funksiyasining ta'rifi va uning sodda xossalari. Ortogonallik xossasi. Bessel funksiyasi uchun rekurrent munosabatlar. Bessel funksiyasining ildizlari. Bessel tenglamasi uchun xos qiymat chegaraviy masalasi. Bessel tenglamasi uchun bir jinsli bo'lmagan chegaraviy masalasi. Bessel funksiyalarining to'laligi. Boshqa silindrik funksiyalar.

### **Aralash tipdagi tenglamalar**

Trikomi masalasining qo'yilishi. Ekstremum prinsipi va Trikomi masalasi yechimining yagonaligi. Ayrim boshqa aralash masalalar.

Chegaraviy masalalarni yechishda qo'llaniladigan ayrim usullar.

Integral almashtirishlar. Laplas, Furye, Mellin almashtirishlari. Integral almashtirishlar yordamida masalalarni yechish. Chekli ayirmalar usuli. Variasion usullar haqida tushuncha. Dirixle prinsipi. Rits usuli.

### **Amaliy mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar**

Amaliy mashg'ulotlardan maqsad ma'ruza materiallari bo'yicha talabalarning bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish va kengaytirishdan iborat. Bunda talabalar amaliy mashg'ulotlarda misol va masalalarni yechishda, yechimlarni tahlil qilishda olgan nazariy bilimlarini qo'llay olishlari nazarda tutiladi.

Amaliy mashg'ulotlarning taxminiy tavsiya etiladigan mavzulari:

1. Matematik fizikaning asosiy tenglamalari va ularni keltirib chiqarish. Ikkinchi tartibli xususiy hosilali kvazichiziqli differensial tenglamalarning sinflari va ularni kanonik ko'rinishga keltirish.
2. Xarakteristik forma tushunchasi. Yuqori tartibli differensial tenglamalarning va sistemalarning sinflari. Ikki o'zgaruvchili ikkinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalarni kanonik ko'rinishga keltirish.
3. Giperbolik tipdagi tenglamaga olib kelinadigan oddiy masalalar. To'lqin tarqalish usuli. Dalamber formulasi.
4. Bir jinsli bo'lmagan tenglama uchun Dalamber formulasi. Yechimning turg'unligi. Yarim chegaralangan o'q va davom ettirish usuli.
5. O'zgaruvchilarni ajratish usuli. Torning erkin tebranish tenglamasi. Bir jinsli bo'lmagan tenglama uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli.



6. Umumiy birinchi chegaraviy masala. O'zgaruvchilarni ajratish usulining umumiy sxemasi.
7. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Birinchi chegaraviy masala. Ekstremum prinsipi. Birinchi chegaraviy masala yechimining yagonaligi va turg'unligi. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun Koshi masalasi. Puasson formulasi.
8. Ketma-ket yaqinlashish usuli. Fredgolm va Volterraning ikkinchi tur integral tenglamasi.
9. Garmonik funksiyalarning asosiy xossalari. Garmonik funksiyalarning integral ifodasi. O'rta arifmetik haqidagi formulalar.
10. Ekstremum prinsipi va Dirixle masalasi yechimining yagonaligi. Laplas tenglamasi uchun Dirixle masalasining Grin funksiyasi.
11. Shar uchun Dirixle masalasini yechish. Puasson formulasi. Yarim fazo uchun Dirixle masalasini yechish.
12. Giperbolik tipdagi tenglamalar uchun aralash masala. Klassik yechim. Energiya integrali. Klassik yechimning yagonaligi va uzluksiz bog'liqligi. Umumlashgan yechim.
13. Parabolik tipdagi tenglamalar uchun aralash masala. Klassik yechim. Maksimum prinsipi.

Amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish bo'yicha kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Unda talabalar asosiy ma'ruza mavzulari bo'yicha olgan bilim va ko'nikmalarini amaliy masalalar yechish orqali yanada boyitadilar. Shuningdek, darslik va o'quv qo'llanmalar asosida talabalar bilimlarini mustahkamlashga erishish, tarqatma materiallardan foydalanish, ilmiy maqolalar va tezislarni chop etish orqali talabalar bilimini oshirish, mavzular bo'yicha ko'rgazmali qurollar tayyorlash va boshqalar tavsiya etiladi.

### **Laboratoriya ishlarini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar**

Laboratoriya mashg'ulotlardan maqsad hozirgi zamonaviy kompyuterlar yordamida ba'zi bir fizik jarayonlarni talabaning ko'z o'ngida sodir bo'lishini, ushbu masalalarning differensial tenglamalarini tuzish, ularni integrallash, analitik, sonli yechimlarini olish, harakat trayektoriyalari grafiklarini ilmiy tahlil qilish ko'zda tutilgan.

Laboratoriya ishlarining tavsiya etiladigan mavzulari:

1. Korrekt (to'g'ri) va nokorrekt qo'yilgan masala tushunchasi.
2. Giperbolik tipdagi tenglamaga olib kelinadigan oddiy masalalar. To'lqin tarqalish usuli.
3. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi.
4. Aralash masalalar.
5. Maxsus funksiyalar.

### **Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni**

Talaba mustaqil ishni tayyorlashda muayyan fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- Darslik va o'quv qo'llanmalar bo'yicha fan boblari va mavzularini o'rganish;
- Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik;
- Uy vazifalarni bajarish;
- O'tilgan materiallar mavzularini qaytarish;
- Mustaqil ish uchun mo'ljallangan nazariy bilim mavzularini o'zlashtirish.

Bunda talabalar ma'ruzalarda olgan bilimlarini amaliy mashg'ulotlarni bajarishlari bilan mustahkamlashi hamda matematik fizika tenglamalarining ba'zi mavzularini tushinishi hamda ularga oid masalalarni yechishlari kerak.

Mustaqil ish mavzularini o'zlashtirish ta'lim jarayonida uzluksiz nazorat qilib boriladi.

Tavsiya etilayotgan mustaqil ishlarning mavzulari:

1. Xususiy hosilali differensial tenglamalar sinflari.
2. Yuqori tartibli differensial tenglamalarning va sistemalarning sinflari.
3. Korrekt(to'g'ri) va nokorrekt qo'yilgan masala tushunchasi. Koshi-Kovalevskaya teoremasi. Adamar misoli.
4. Qo'shma differensial operatorlar. Yechimning integral ko'rinishi. Riman funksiyasining fizik talqini. Kirxgof formulasi. Tushish usuli.
5. Bir jinsli bo'lmagan to'lqin tenglamasi. Dyamel prinsipi. Kechikuvchan potensial.
6. Xarakteristikalarda berilgan masala.Giperbolik turdagi umumiy chiziqli tenglamalarni yechish.
7. Puasson formulasini asoslash. Bir jinsli bo'lmagan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Dyamel prinsipi.
8. Ekstremum prinsipi. Birinchi chegaraviy masala yechimining yagonaligi

- va turg'unligi.
9. Kuchsiz maxsuslikka ega bo'lgan tenglamalar. Volterraning birinchi tur tenglamasi. Abelning integral tenglamasi.
  10. Singulyar integral tenglamalar. Ermit yadroli integral tenglamalar. Gilbert-Shmidt teoremasi va uning natijalari.
  11. Puasson tenglamasi. Gauss formulasi. Ikkilangan va oddiy qatlam potentsiali. Dirixle va Neyman masalalarini potentsiallar yordamida yechish.
  12. Ikkinchi tartibli elliptik tipdagi chiziqli tenglamalar umumiy nazariyasidan ayrim ma'lumotlar. Ikkinchi tartibli chiziqli elliptik tenglama yechimining mavjudligi.
  13. Chegaraviy masalalarning qo'yilishi. Ekstremum prinsipi. Dirixle masalasi yechimining yagonaligi. Umumlashgan oddiy va qatlam potentsiallari.
  14. Umumlashgan yechim. Umumlashgan yechimning mavjudligi. Klassik yechimning mavjudligi.
  15. Bessel tenglamasi uchun bir jinsli bo'lmagan chegaraviy masalasi. Bessel funksiyalarining to'laligi. Boshqa silindrik funksiyalar.
  16. Bessel tenglamasi uchun xos qiymat chegaraviy masalasi.
  17. Trikomi masalasining qo'yilishi. Ekstremum prinsipi va Trikomi masalasi yechimining yagonaligi. Ayrim boshqa aralash masalalar.
  18. Chegaraviy masalalarni yechishda qo'llaniladigan ayrim usullar. Integral almashtirishlar. Laplas, Furiye, Mellin almashtirishlari.
  19. Integral almashtirishlar yordamida masalalarni yechish. Chekli ayirmalar usuli. Variasion usullar haqida tushuncha. Dirixle prinsipi. Rits usuli.

### **Dasturning informasion-uslubiy ta'minoti**

EHM yordamida matematik fizika tenglamalarining ba'zi masalalarini yechish, chegaraviy masalalarni sonli integrallashda, chekli ayirmalar usuli, variasion usullar, Dirixle prinsipi. Rits usullarini o'rganishda dasturlar to'plami (Maple, MathCad, Matlab va h.k.) laridan foydalanish. Mavzularni o'zlashtirishda va mustaqil ishlarni bajarishda adabiyotlar ro'yxatida keltirilgan mavjud darsliklar, o'quv qo'llanmalari, elektron adabiyotlar bilan metodik ta'minlanadilar.

Dasturdagi mavzularni o'tishda ta'limning zamonaviy usullardan keng foydalanish, o'quv jarayonini yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish samarali natija beradi. Bu borada zamonaviy pedagogik texnologiyalarning

“Aqliy hujum”, «Munozarali dars» usullari hamda mavzularga oid slaydlardan foydalanish nazarda tutiladi.

## **Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar ro’yxati**

### **Asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar**

1. Tixonov A.N., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. “Nauka”.1972.
2. Vladimirov V.S. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. “Nauka”.1988.
3. Petrovskiy I.G. Lekcii ob uravneniyax s chastnimi proizvodnimi. M. “Nauka”.1961.
4. Bisadze A.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. “Nauka”.1982.
5. Salohiddinov M. Matematik fizika tenglamalari. T. “O’zbekiston”.2002.

### **Qo’shimcha adabiyotlar**

6. Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. “Nauka”.1977.
7. Vladimirov V.S., Mixaylov V.P., Vasharin A.A., Karimova X.X., Sidorov Yu.V., Shabunin M.I. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. “Nauka”.1982.
8. Bisadze A.V. Nekotoriye klassi uravneniy v chastnix proizvodnix. M. “Nauka”.1981.
9. Vladimirov V.S. Obobshchenniye funktsii v matematicheskoy fizike. M. “Nauka”.1979.
10. Smirnov M.M. Uravneniya smeshannogo tipa. M.1985.
11. Smirnov M.M. Zadachi po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. “Nauka”.1975.
12. Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. “Nauka”.1980.
13. Petrovskiy I.G. Lekcii po teorii integralnix uravneniy. M. Iz-vo MGU.1984.
14. Teshaboyeva N.X. Matematik fizika usullari. T.1966.
15. Godunov S.K. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. “Nauka”.1971.
16. Rid M., Saymon B. Metodi sovremennoy matematicheskoy fiziki, T. 1-4. 1977- 1982, <http://www.mcmee.ru>, <http://lib.mexmat.ru>

17. Mixlin S.G. Variasionniye metodi v matematicheskoy fizike. M. 1970.  
<http://www.mcmee.ru>, <http://lib.mexmat.ru>

## Alisher Navoiy nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

“Tasdiqlayman”  
O’quv ishlari prorektori  
A.S. Soleev \_\_\_\_\_  
“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2010yil

### Mexanika-matematika fakulteti Differentsial tenglamalar kafedrası

«Amaliy matematika va informatika» bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha  
«Matematik fizika tenglamalari» fanidan  
**ISHCHI DASTUR**  
3-kurs kunduzgi bo’lim  
(I-semestr)

Jami o’quv yuklama	-128 soat
Ma’ruza	-28 soat
Amaliy mashg’ulot:	-26 soat
Seminar	-10 soat
Mustaqil ish	- 64 soat

Tuzuvchi: prof. A.H. Begmatov  
ass. Z.H. Ochilov

Differentsial tenglamalar kafedrasining 2010 yil 29 avgustdagi yig’ilishining № 1 bayonnoma bilan tavsiya etilgan.

Kafedra mudiri: prof. A.H. Begmatov

Mexanika-matematika fakulteti O’quv-uslubiy Kengashining 2010 yil 29 avgustdagi № 1 bayonnomasi bilan ma’qullangan.

O’quv-uslubiy Kengash raisi: dots. Sattorov E.N.

Mexanika -matematika fakulteti Ilmiy Kengashining 2010 yil 29 avgustdagi № 1 qarori bilan tasdiqlangan.

Fakultet dekani:

dots. X. Qurbonov

Samarqand-2010

**1. Ma'ruza mashg'ulotlari**

**2.**

№	Darsda o'tilishi lozim bo'lgan asosiy mavzular.	Soat Miqd	Adabiyot (raqami va sahifalar)
1	O'zgarmas koeffitsiyentli 2-chi tartibli chiziqli tenglamalar	2	[1]-gl.1, s.11 [2]-gl.1, s.55
2	Ikkinchi tartibli xususiy hosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi	2	[1]-gl.2, [2], gl.1, [3], s.52
3	Birinchi chegaraviy masala yechimini mavjudligini isbotlash uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli.	2	[1]-gl.2, [2], gl.1, [3], s.52
4	Energiya integralining tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masala yechimini yagonaligi	2	[1]-gl.2, s.49; [3], s.52
5	Qo'shma differensial operator. Riman usuli. Limitga o'tish shaklidagi umumlashgan yechimlar	2	[1]-gl.2, s.82 [2], gl.6, [3], s.338
6	Parabolik tipdagi tenglamalar Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi	2	[1]-gl.2, s.120 [2], gl.3
7	Maksimum prinsipi	2	[1], [2] [3], [4]
8	Umumiy chegaraviy masala yechimini yagonaligi va mavjudligi. Koshi masalasi yechimini mavjudligi va yagonaligi	2	[1]-gl.3, s.177 [2], gl.1, s.47 [3]-c.19
9	Yarim to'g'ri chiziqda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi va ikkinchi chegaraviy masalaning yechimini mavjudligi. Birinchi chegaraviy masala uchun Grin funksiyasi	2	[1]-gl.3, [3]-c.149
10	Elliptik tipdagi tenglamalar Laplas va Puasson tenglamalari. Grin formulasi	2	[1]-gl.3, s.193 [2], gl.6
11	Garmonik funksiyalarning xossalari Maksimum prinsipi. Dirixle masalasi	2	[1]-[4]
12	Tekislikda Dirixlening tashqi masalasi	2	[1]-gl.3, s.197 [2], gl.5
13	Grin funksiyaning xossalari. Ikkilangan qatlam potentsiali	2	[1],[2],[3]

14	Potensial xossalari. Fredgolm alternativasi	2	[1],[2],[3]
	Jami	28	

### 3. Amaliy mashg`ulotlar

<b>№</b>	<b>Darsda o`tilishi lozim bo`lgan asosiy mavzular.</b>	<b>Soat miqd</b>	<b>Adabiyot (raqamiva sahifalar)</b>
1	Ikkinchi tartibli chiziqli tenglamalar	2	[1]-gl.1, s.11 [2]-gl.1, s.55
2	Ikkinchi tartibli xususiy xosilali differensial tenglamalar klassifikatsiyasi (giperbolik tip)	2	[1]-gl.2, [2], gl.1, [3], s.52
3	Ikkinchi tartibli xususiy xosilali differensial tenglamalar klassifikatsiyasi (parabolik tip)	2	[1]-gl.2, [2], gl.1, [3], s.52
4	Ikkinchi tartibli xususiy xosilali differensial tenglamalar klassifikatsiyasi (elliptik tip)	2	[1]-gl.2, s.49; [3], s.52
5	Dalamber formulasi	2	[1]-gl.2, s.82 [2], gl.6, [3], s.338
6	Shturm – Liuvil masalasi	2	[1]-gl.2, s.120 [2], gl.3
7	Bir jinsli bo`lmagan tebranish teglamasi uchun chegaraviy masala To`g`ri to`rtburchakli membranani tebranishi	2	[1], [2] [3], [4] 1]- gl.3, s.177 [2], gl.1, s.47 [3]-c.19
8	Bir jinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan giperbolik tipli tenglama uchun chegaraviy masala. Fur`e usuli	2	[1]-gl.3, [3]-c.149
9	Bir jinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan bir jinsli parabolik tipli tenglama uchun Fur`e metodi	2	[1]-gl.3, s.193 [2], gl.6
10	Birjinsli bo`lmagan chegaraviy shartni bir jinsliga keltrish	2	[1]-gl.3, s.197 [2], gl.5
11	Garmonik funktsiyalar va ularning xossalari.	2	[1],[2],[3]
12	Laplas tenglamasining fundamental yechimi	2	[1], [2] 1], [2], [3]
13	Elliptik tenglamalar uchun fur'e usuli	2	[1], [2], [3]
	Jami	26	

#### 4. Seminar mashg'ulotlar

<b>№</b>	<b>Darsda o'tilishi lozim bo'lgan asosiy mavzular.</b>	<b>Soat miqd</b>	<b>Adabiyot (raqamiva sahifalar)</b>
1.	Korrekt (to'g'ri) va nokorrekt qo'yilgan masala tushunchasi.	2	[1-5; 8;14; 16;18]
2.	Giperbolik tipdagi tenglamaga olib kelinadigan oddiy masalalar. To'lqin tarqalish usuli.	2	[1-5; 8;14; 16;18]
3.	Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi.	2	[1-5;8;14; 16;18]
4.	Aralash masalalar.	2	[1-5; 8;14; 16;18]
5.	Maxsus funksiyalar.	2	[1-5; 8;14; 16;18]
	<b>Jami</b>	<b>10</b>	



#### 4. Mustaqil ish mavzulari

№	Darsda o'tilishi lozim bo'lgan asosiy mavzular.	Soat Miqd	Adabiyot (raqamiva sahifalar)
1	Ikkinchi tartibli xususiy hosilali defferensial tenglamalarni kanonik shaklga keltirish.	4	[1]-gl.1, s.11 [2]-gl.1, s.55
2	Ikkinchi tartibli xususiy hosilali defferensial tenglamalarni kanonik shaklga keltirish va tipini aniqlash.	4	[1]-gl.1, s.11 [2]-gl.1, s.55
3	Torning erkin tebranish tenglamasiga qo'yilgan aralash masalani Fur'e usulida yechish	4	[1]-gl.2, [2], gl.1, [3], s.52
4	Energiya integralining tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masala yechimining yagonaligi	6	[1]-gl.2, s.49; [3], s.52
5	Qo'shma differentsial operator. Riman usuli. Limitga o'tish shaklidagi umumlashgan yechimlar	4	[1]-gl.2, s.82 [2], gl.6, [3], s.338
6	Parabolik tipli (issiqlik tarqalish) tenglamalarga qo'yilgan aralash masalani Fur'e usulida yechish.	4	[1]-gl.2, [2], gl.1, [3], s.52
7	Elliptik tipli tenglamalar orqali o'rganiladigan fizik jarayonlar.	6	[1]-gl.2, s.49; [3], s.52
8	Maksimum va minimum haqidagi teorema.	4	[1]-gl.2, s.82 [2], gl.6, [3], s.338
9	Laplas tenglamasining egri chiziqli koordinatalardagi tasviri	4	[1]-gl.2, s.120 [2], gl.3
10	Laplas va Puasson tenglamalariga qo'yilgan chegaraviy masalalarni yechish	6	[1], [2] [3], [4]
11	Garmonik funktsiyalar va ularning xossalari.	4	[1]-gl.3, s.177 [2], gl.1, s.47 [3]-c.19
12	Laplas tenglamasining fundamental yechimlari	4	[1]-gl.3, s.177 [2], gl.1, s.47 [3]-c.19
13	Doiradan tashqarida Dirixle va Neyman masalalarini Fur'e usuli bilan yechish	4	[1]-gl.3, [3]-c.149
14	Grin funksiyaning xossalari. Ikkilangan qatlam potentsiali. Potensial xossalari. Fredgolm alternativasi	6	[1]-gl.3, [3]-c.149
	JAMI	64	

## **4. ADABIYOTLAR**

### **4.1. Asosiy adabiyotlar**

1. Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamalari, T. «Uzbekiston», 2002.
2. Mixlin S. G. Kurs matematicheskoy fiziki M.1968
3. S.L. Sobolev, Uravneniya matematicheskoy fiziki, Nauka, 1966g
4. A.V.Bitsadze Uravneniya matematicheskoy fiziki. M.1976
4. A.V.Bitsadze, D.F. Kalinichenko, Sbornik zadach po uravneniya matematicheskoy fiziki, M. 1977..

### **4.2. Qo'shimcha adabiyotlar**

1. Koshlyakov N.S., Glinner E.B., Smirnov M.M , Uravneniya v chastnix proizvodnix matematicheskoy fiziki: 1970g
2. G.N.Poloyiy. Uravneniya matematicheskoy fiziki 1976g
3. Juraev T.J., Kraevie zadachi dlya uravneniy smeshannogo i smeshanno-sostavnogo tipov. Tashkent 1979g
4. Saloxiddinov M.S. Uravneniya smeshanno-sostavnogo tipa. Tashkent 1979g
5. N.Teshaboeva. Matematik fizika metodlari Toshkent 1966y.
6. Aramanovich.I.G.Levin V.I., Uravneniya matematicheskoy fiziki.1964g.
7. A.N. Tixonov, A.A. Samarskiy. Uravneniya matematicheskoy fiziki, Nauka, 1966g
8. V.S.Vladimirov, Uravneniya matematicheskoy fiziki, Nauka, 1961g
9. B.M. Budak, A.A. Samarskiy, A.N. Tixonov. Sbornik zadach po matematicheskoy fiziki, Nauka.

**« MATEMATIK FIZIKA TENGLAMALARI »  
FANI BO'YICHA REYTING NAZORATLARI GRAFIGI**

Ta'lim yo'nalishi: Tadbiiy matematika va informatika

O'quv shakli: kunduzgi; Semestr: 6

Jami o'quv yuklama - 112 soat, Ma'ruza-26 soat, Amaliy mashg'ulot -30 soat, mustaqil ish-56 soat

№	Ishchi o'quv dasturidagi mavzular tartib raqami.(qo'shimcha topshiriq mazmuni)	O'quv yuklamasi					Baxo lash turi	Nazorat Shakli	Ball		Muddati (hafta)
		Ma'ruza	Amaliy	seminar	Mustaqil ish	Jami			Maksimal	Saralash	
1	1-7 qo'shimcha mavzu bo'yicha referat	14	12	6	32	64	1-JB	Kund.nazorat, davom,nazorat ishi, kurs ishi, uy ishi, Himoya	17		<i>dekabr 1-hafta</i>
							1-MB				<i>dekabr 1-hafta</i>
2	8-13 qo'shimcha mavzu bo'yicha referat	14	14	4	32	64	2-JB	Kund.nazorat, davom.nazorat ishi, kurs ishi, uy ishi, Himoya	18		fevral 3-hafta
	2-MB										
	1-14 jami						28	26	10	64	128
							YaB	Yozma	30		fevral 4-hafta

Kafedra mudiri:

prof. A.H.Begmatov

**Matematik fizika tenglamalari fani bo'yicha joriy nazoratlarda talabalar bilimi va amaliy ko'nikma darajasini aniqlash mezonlari**  
(max ball-35)

Maksimal ball		Nazorat qilinadigan va baholanadigan ish turlari	Baholashda e'tibor qaratiladigan jihatlar
1- JN	2- JN		
3	4	Mavzular bo'yicha nazariy tayyorgarlik darajasi va darsdagi faollik	Asosiy tushunchalar, ta'riflar, teoremlar va formulalarni bilish, mohiyatini tushunish, ijodiy fikrlay olish, bilimlarni amalda qo'llay olish
3	4	Uyga berilgan topshiriqlarni bajarish sifati	Topshiriqlarni to'g'ri va to'liq bajarish, masalalarni hal qilishga ijodiy yondashish, tushuntirib bera olish
7	7	Nazorat ishlarini bajarish sifati	Topshiriqlarni to'g'ri va to'liq bajarish, ijodiy yondashish, mustaqil fikrlash, yechimni asoslay olish
4	3	Mustaqil topshiriqlarni bajarilish sifati	Berilgan topshiriqni to'g'ri va to'liq bajarish, mustaqil mulohaza yurita olish, bilimlarni amalda qo'llay olish, masalaga ijodiy yondashish, mohiyatini tushunish va aytib bera olish
17	18		

**Matematik fizika tenglamalari fani bo'yicha oraliq va yakuniy nazoratlarda talabalar bilimi va amaliy ko'nikma darajasini aniqlash mezonlari**

(ON bo'yicha max ball-35, YaB bo'yicha max ball – 30)

Savollar		ON (max ball)	YaN (max ball)	Baholashda e'tibor qaratiladigan jihatlar
		1-ON		
Nazariy	1	7	6	Asosiy tushunchalar, ta'riflar, formulalar, teoremlarni va ularni isbotini bilish, mohiyatini tushunish, tasavvur qilish va aytib bera olish, ijodiy fikrlay olish va mustaqil mulohaza yurita olish
	2	7	6	
Amaliy	3	7	6	Topshiriqlarni to'g'ri va to'liq bajarish, ijodiy yondashish, mustaqil fikrlash, yechimni asoslay olish, mohiyatini tushunish
	4	7	6	
Mushtash	5	7	6	Savolga to'liq va to'g'ri javob berish, misollar bilan asoslash, ijodiy yondashish, mohiyatini tushunish va tushuntirib bera olish
Jami		35	30	

**Matematik fizika tenglamalari fani bo'yicha  
reyting nazoratlarida o'zlashtirish ko'rsatkichini aniqlash mezonlari**

JN	ON	YaN	Baholashlarda e'tibor qaratiladigan asosiy jihatlar
31-35 ball	31-35 ball	27-30 ball	Asosiy tushuncha, ta'rif, formula, teoremlar isbotlarni bilish amalda qo'llay olish, mohiyatini tushunish, ijodiy fikrlay olish, tasavvurga ega bo'lish, aytib bera olish, mustaqil mushohada yurita olish, topshiriqlarni aniq va to'g'ri bajarish.
25-30 ball	25-30 ball	22-26 ball	Asosiy tushuncha, ta'rif, formula, teoremlarni bilish, yengil isbotlarni bajara olish, bilimlarni amalda qo'llay olish, ijodiy yondashishga harakat qilish, tasavvurga ega bo'lish, topshiriqlarni to'g'ri bajarish va tushuntirish.
19-24 ball	19-24 ball	17-21 ball	Asosiy tushuncha, ta'rif, formula va teoremlarni bilish va amalda qo'llay olish, mohiyatini biroz tushunish va to'liq bo'lmagan tasavvurga ega bo'lish. Amaliy topshiriqlarni deyarli to'g'ri bajarish va tushuntirib berishga harakat qilish.
0-18 ball	0-18 ball	0-16 ball	Asosiy tushuncha, ta'rif, formula va teoremlarni to'liq bilmaslik va amalda qo'llay olmaslik mustaqil mulohaza yurita olmaslik, yetarlicha tasavvurga ega bo'lmaslik va tushuntira olmaslik, topshiriqlarni to'liq bajarmaslik va qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish.

A.Navoiy nomidagi Samarqand davlat universitet  
mexanika–matematika fakulteti differensial tenglamalar kafedrası  
professori Begmatov Akram Xasanovichning matematik fizika tenglamalari  
fanidan 2010–2011 o’quv yili uchun amaliy matematika va informatika  
yo’nalishi 3- kurs talabalari uchun ma’ruza darsidan

**KALENDAR ISH REJASI**

№	O’tiladigan mavzu	soat	O’tkazish sanasi	Ijro belgisi	Izoh
1	O’zgarmas koeffitsiyentli 2-chi tartibli chiziqli tenglamalar	2			
2	Ikkinchi tartibli xususiy hosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi	2			
3	Birinchi chegaraviy masala yechimining mavjudligini isbotlash uchun o’zgaruvchilarni ajratish usuli.	2			
4	Energiya integralining tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masala yechimining yagonaligi	2			
5	D’Alembert differensial operator. D’Alembert usuli. Limitga o’tish qoidasidagi umumlashgan yechimlar	2			
6	Parabolik tipdagi tenglamalar Issiqlik o’tkazuvchanlik tenglamasi	2			
7	Maksimum prinsipi	2			
8	Umumiy chegaraviy masala yechimining yagonaligi va mavjudligi. Koshi masalasi yechimining mavjudligi va yagonaligi	2			
9	<i>Yarim to’g’ri chiziqda issiqlik o’tkazuvchanlik tenglamasi uchun 1-va 2- chegaraviy masalaning yechimini mavjudligi. Birinchi chegaraviy masala uchun Grin funksiyasi</i>	2			
10	Elliptik tipdagi tenglamalar Laplas va Puasson tenglamalari.	2			

	Grin formulasi				
11	Garmonik funksiyalarning xossalari Maksimum prinsipi. Dirixle masalasi	2			
12	Tekislikda Dirixlening tashqi masalasi	2			
13	Grin funksiyaning xossalari. Ikkilangan qatlam potentsiali.	2			
14	Potensial xossalari. Fredgolm alternativasi	2			
	jami	28			

Kafedra mudiri

prof. A.X. Begmatov

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010  
y.

A.Navoiy nomidagi Samarqand davlat universitet  
mexanika–matematika fakulteti differensial tenglamalar kafedrası  
assistenti Ochilov Zarifjon Xusanovichning matematik fizika tenglamalari  
fanidan 2010–2011 o’quv yili uchun amaliy matematika va informatika  
yo’nalishi 3-kurs talabalari uchun amaliyot darsidan

**KALENDAR ISH REJASI**

№	O’tiladigan mavzu	soat	O’tkazish sanasi	Ijro belgisi	Izoh
1	Ikkinchi tartibli chiziqli tenglamalar	2			
2	Ikkinchi tartibli xususiy xosilali differensial tenglamalar klassifikatsiyasi (giperbolik tip)	2			
3	Ikkinchi tartibli xususiy xosilali differensial tenglamalar klassifikatsiyasi (parabolik tip)	2			
4	Ikkinchi tartibli xususiy xosilali differensial tenglamalar klassifikatsiyasi (elliptik tip)	2			
5	Dalamber formulasi	2			
6	Shturm-Liuvil masalasi	2			
7	Bir jinsli bo’lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masala To’g’ri to’rtburchakli membranani tebranishi	2			
8	Bir jinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan giperbolik tipli tenglama uchun chegaraviy masala. Fur’e usuli	2			
9	Bir jinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan bir jinsli parabolik tipli tenglama uchun Fur’e metodi	2			
10	Birjinsli bo’lmagan chegaraviy shartni bir jinsliga keltrish	2			
11	Garmonik funktsiyalar va ularning xossalari.	2			



12	Laplas tenglamasining fundamental yechimi	2			
13	Elliptik tenglamalar uchun fur'e usuli	2			
	Jami	26			

Kafedra mudiri

prof. A.X. Begmatov

Tasdiqlayman  
Fakultet dekani

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 y.

A.Navoiy nomidagi Samarqand davlat universitet  
mexanika–matematika fakulteti differensial tenglamalar kafedrasida  
assistenti Ochilov Zarifjon Xusanovichning matematik fizika tenglamalari  
fanidan 2010–2011 o'quv yili uchun amaliy matematika va informatika  
yo'nalishi 3-kurs talabalari uchun seminar darsidan

### KALENDAR ISH REJASI

№	O'tiladigan mavzu	soat	O'tkazish sanasi	Ijro belgisi	Izoh
1	Korrekt (to'g'ri) va nokorrekt qo'yilgan masala tushunchasi.	2			
2	Giperbolik tipdagi tenglamaga olib kelinadigan oddiy masalalar. To'lqin tarqalish usuli.	2			
3	Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi.	2			
4	Aralash masalalar.	2			
5	Maxsus funksiyalar.	2			
	Jami	10			

Kafedra mudiri

prof. A.X. Begmatov

## Mavzu 1. O'zgarmas koeffitsiyentli ikkinchi tartibli chiziqli tenglamalar

### Ma`ruzaga reja-topshiriqlar

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O'quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

**Ma`ruza rejasi:**

1. Asosiy ta'riflar.
2. 1-tartibli kvazichiziqli tenglamalar.
3. Misollar.
4. Ta'rif.
5. Kanonik ko'rinishga keltirish.

**O'quv mashg'uloti maqsadi:**

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

**O'quv mashg'uloti masalalari:**

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarning matematik firlashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan birlashtirish, intizomlashtirish.

**O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari:* instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O'qitish shakillari:* frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari:* Ma`ruza matni; javdallar, multimediya;
- *O'qitish sharoitlari:* texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring:* o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

**Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rni va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsifi etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.

- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta`riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo`nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

### **• 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi**

#### **• 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;
- *Shakillar, usular, uslublar:* instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

#### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati:* mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati:* yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o'qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o'zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar:* frontav so'rov blits-so'rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

#### **3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)**

- *O'qituvchining faoliyati:* mavzu bo'yicha hulosa qilish, talabalarning e'tiborlarini asosiyalarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o'tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o'zaro baholashning natijalarini chiqarish; o'quv mashg'ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko'rsatgichlari va me`zonlari;
- *Talabalar faoliyati:* ishning tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo'llash; o'zaro baholashni o'tkazish, yo'l qo'yilgan hatolar bo'yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar:* guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

### **1.3. O'quv-metodik materiallar**

### Ma`ruza rejası:

1. Asosiy ta`riflar.
2. 1-tartibli kvazichiziqli tenglamalar.
3. Misollar.
4. Ta`rif.
5. Kanonik ko`rinishga keltirish.

**Kalit so`zlar:** Xususiy xosilali differensial tenglama, tenglamaning tarbibi, kvazichiziqli tenglamalar, yechim, Koshi masalasi, ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglama

### 1.3.1. Ma`ruza matni

#### 1. Asosiy ta`riflar

Xususiy xosilali differensial tenglama deb bir nechta o`zgaruvchili noma`lum funksiyaga , uning argumentlari va turli tartibli xususiy xosilalariga nisbatan tenglamalarga aytiladi. Agar noma`lum funksiya  $n$  o`zgaruvchiga bog`lik bo`lsa, ya`ni  $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$  bo`lsa u xolda, xususiy xosilali differensial tenglama

$$F\left(x_1, x_2, \dots, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \dots, \frac{\partial^m u}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}}\right) = 0$$

ko`rinishga ega, bu yerda  $k_1 + \dots + k_n = m$ ,  $F$  – berilgan funksiyalar. Xususiy xosilali differensial tenglamaning **tartibi** deb bu tenglamaga kiruvchi xosilalarning eng yuqori tartibiga aytiladi.  $n$ -tartibli tenglama tartibi  $n$  dan katta bo`lmagan xususiy xosilalarga ega bo`ladi. Xususiy xosilali chiziqli tenglama

$$a_1(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + a_n(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_n} + b_1(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dots + b_n(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = f(x_1, \dots, x_n, u).$$

ko`rinishga ega. Masalan

$$\begin{aligned} x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} + xyz &= 1, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 0, \\ \left(x + \frac{\partial z}{\partial y}\right) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} + z &= 0 \end{aligned}$$

tenglamalar chiziqli bo`ladi.

## 2. Birinchi tartibli kvazichiziqli tenglamalar

Kvazichiziqli tenglamalar

$$a_1(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + a_n(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_n} = f(x_1, \dots, x_n, u). \quad (1.1)$$

ko'rinishga ega. Agar  $f(x_1, \dots, x_n, u) \neq 0$  bo'lsa u xolda tenglama bir jinsli tenglama bo'lmaydi, aks xolda  $f(x_1, \dots, x_n, u) = 0$  bo'lsa, tenglama bir jinsli tenglama bo'ladi. (1.1) tenglama yechish uchun

$$\frac{dx_1}{a_1} = \frac{dx_2}{a_2} = \dots = \frac{dx_n}{a_n} = \frac{du}{f} \quad (1.2)$$

sistemani tuzamiz. (1.2) sistemani yechish jarayonida  $n$  ta birinchi integrallar xosil qilamiz:

$$\varphi_i(x_1, \dots, x_n, u) = C_i, i = 1, \dots, n.$$

Tenglamani yechimini quyidagi  $F(\varphi_1, \dots, \varphi_n) = 0$  funksiya beradi, bu yerda  $F(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$  ixtiyoriy o'z argumentlari bo'yicha differensiallanuvchi funksiya.

**Teorema 1.** (1) tenglama yechimi (2) oddiy differensial tenglamalar sistemasining yechimga teng kuchli, uning  $n$  ta birinchi integrallari har bittasi aloxida berilgan tenglamani yechimini beradi. Shunda  $F(\varphi_1, \dots, \varphi_n) = 0$  umumiy yechim bo'ladi.

$$\text{Teorema 2. } a_1(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + a_n(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_n} = 0 \quad \text{bir jinsli tenglama}$$

yechish uchun oddiy differensial tenglamalar sistemasi tuziladi.

Bu sistemaning yechimlari  $(n-1)$ -ta birinchi integrallardan iborat bo'ladi. Quyidagi tasdiq o'rinli: agar

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = t \quad \text{bo'lsa, shunda ixtiyoriy } k \text{ uchun}$$

$$\frac{k_1 a_1 + \dots + k_n a_n}{k_1 b_1 + \dots + k_n b_n} = t \quad (3)$$

o'rinli.

## 3. Misollar

**1-Misol.**  $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$  tenglamani yeching.

$$\frac{dx}{y} = -\frac{dy}{x} \quad \text{sistemani tuzamiz. So'ngra}$$

$$xdx + ydy = 0, \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 = C, x^2 + y^2 = C$$

Umumiy yechimi  $z = F(x^2 + y^2)$  bo'ladi.

**2-Misol.**  $xz \frac{\partial x}{\partial x} + yz \frac{\partial z}{\partial y} = -xy$  tenglamani yeching.

$$\frac{dx}{xz} = \frac{dy}{yz} = -\frac{dz}{xy} \text{ sistemani tuzamiz.}$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}, \ln|x| = \ln|y| + \ln C_1 \text{ tenglamani yechamiz,}$$

undan  $C_1 = \frac{x}{y}$  ni topamiz.

$$(3) \text{ ayniyatdan foydalanib } \frac{k_1 dx + k_2 dy + k_3 dz}{k_1 xz + k_2 yz - k_3 xy} = \frac{dz}{-xy} \text{ ni olamiz.}$$

Faraz qilaylik, masalan,  $k_1 = y, k_2 = x, k_3 = 0$  bo'lsin, bu xolda

$$\frac{ydx + xdy}{yxz + xyz} = \frac{dz}{-xy}, \frac{d(xy)}{2xyz} = -\frac{dz}{xy}$$

So'ngra  $d(xy) = -2zdz, xy = -z^2 + C, C = xy + z^2$ .

$F(x^2 + y^2, xy + z^2) = 0$  umumiy yechimni xosil qilamiz.

Chiziqli tenglamalar uchun Koshi masalasini yechimini qaraymiz

$$\begin{cases} x = x_0(t), \\ y = y_0(t), \\ z = z_0(t). \end{cases}$$

Farz qilaylik,  $\varphi_1(x, y, z) = C_1, \varphi_2(x, y, z) = C_2$

ikkita birinchi integral topilgan bo'lsin. U xolda

$$\begin{cases} \Phi_1(t) = C_1, \\ \Phi_2(t) = C_2; \end{cases} \Leftrightarrow \Phi(C_1, C_2) = 0$$

va izlanayotgan yechim  $\Phi(\varphi_1, \varphi_2) = 0$  bo'ladi.

**3-Misol.**  $x = 2$  da  $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy, z = y^2 + 1$  Koshi masalani yeching.

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z - xy} \text{ sistemani tuzamiz.}$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \text{ tenglamani yechimini izlasak, quyidagilarni xosil qilamiz:}$$

$$\ln |x| = \ln |y| + \ln C_1, \quad C_1 = \frac{x}{y}.$$

Endi  $\frac{dx}{x} = \frac{dz}{z-xy}$  tenglamani qaraymiz.

$$\frac{k_1 dx + k_2 dy + k_3 dz}{k_1 xz + k_2 yz - k_3(z-xy)} = \frac{dz}{z-xy} \text{ ayniyatni tuzamiz.}$$

$k_1 = y, k_2 = x, k_3 = 0$  bo'lsin, u xolda

$$\frac{ydx + xdy}{2xy} = \frac{dz}{z-xy}, \quad \frac{d(xy)}{2xy} = \frac{dz}{z-xy}, \quad \frac{1}{2} \ln |xy| = \frac{dz}{z-xy}.$$

$xy = t, dt = xdy + ydx$  almashtirish kiritamiz.

$$\frac{1}{2} \ln |t| = \frac{dz}{z-t}, \quad \frac{1}{2} \ln |t| = \ln |z-t| + \ln C_2 \text{ ni xosil qilamiz,}$$

bundan  $C_2 = \frac{t^2}{z-t} = \frac{x^2 y^2}{z-xy}$  ni topamiz.  $F\left(\frac{x}{y}, \frac{x^2 y^2}{z-xy}\right) = 0$  umumiy yechimni xosil bo'ladi.

$x = 2$  da

$z = y^2 + 1$  Koshi masalani qaraymiz

$$\begin{cases} 2y = C_1, \\ \frac{4y^2}{y^2 - 2y + 1} = C_2; \end{cases} \quad \begin{cases} 2y = C_1, \\ \frac{4y^2}{(y-1)^2} = C_2. \end{cases}$$

#### 4. Ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli chiziqli tenglamalar

Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglama yuqori tartibli xosilalarga nisbatan chiziqli deyiladi, agar bu tenglama faqat birinchi tartibli xosilalarni o'z ichida saqlasa.

$u = u(x,y)$  funksiyaga nisbatan ikkinchi tartibli xususiy xosilali differensial tenglama quyidagi umumiy ko'rinishga ega:

$$a(x,y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b(x,y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c(x,y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + F(x,y,u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}) = 0. \quad (1)$$

Agar  $b^2 - ac > 0$  bo'lsa, (1) tenglama giperbolik tipdagi tenglama (to'liq tenglama),

$b^2 - ac = 0$  bo'lsa, parabolik tipdagi tenglama (issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi),

$b^2 - ac < 0$  bo'lsa, elliptik tipdagi tenglama (starsionar tenglama). (1) tenglamani yangi  $\xi$  va  $\eta$  o'zgaruvchilarga formulalar bo'yicha o'tish yo'li bilan kanonik ko'rinishga keltirish mumkin.



$x$  va  $y$  o'zgaruvchilari bo'yicha berilgan xosilalarni,  $\xi$  va  $\eta$  o'zgaruvchilar bo'yicha xosilalarga almashtiramiz. Matematik fizik tenglamalar kursi uchun xarakterli belgilashlarni kiritamiz:

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, u_y = \frac{\partial u}{\partial y}, u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, u_{xy} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, u_{yy} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

U xolda

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, \\ u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx}, \\ u_{xy} &= u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy} \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy} \end{aligned}$$

larni olamiz.

$\xi(x, y)$  va  $\eta(x, y)$  funksiyalarni topish uchun

$$a(dy)^2 - 2bdxdy + c(dx)^2 + 0, \quad (2)$$

xarakteristik tenglama qaraladi, u ikkita tenglamalar sistemaga teng kuchli:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{b + \sqrt{b^2 - ac}}{a} \\ \frac{dy}{dx} = \frac{b - \sqrt{b^2 - ac}}{a} \end{cases}. \quad (3)$$

(2) egri chiziqli integral tenglamalar (1) tenglamaning xarakteristik tenglamalari deb ataladi. Giperbolik, parabolik va eliptik tipdagi tenglamalarni kanonik ko'rinishga keltirishni qaraymiz.

1. Agar (1) tenglama giperbolik tipda bo'lsa, (3) tenglamalarning birinchi integrallari

$$\varphi_1(x, y) = C_1, \varphi_2(x, y) = C_2$$

xaqiqiy va har xil. Ular (1) tenglamaning xaqiqiy xarakteristikalari ikkita turli oilasini aniqlaydi.

$$\xi = \varphi_1(x, y), \eta = \varphi_2(x, y)$$

o'garuvchilarni almashtirish yordamida, (1) tenglama giperbolik tipdagi tenglamani quyidagi kanonik ko'rinishiga keltiriladi.

$$u_{\xi\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$$

$$\xi = \mu + \nu, \eta = \mu - \nu$$

o'zgaruvchilarni almashtirish yordamida boshqa

$$u_{\mu\mu} - u_{\nu\nu} = \Phi(\mu, \nu, u, u_\mu, u_\nu)$$

kanonik ko'rishga keltiriladi.

**1-misol.**  $a^2u_{xx} - y^2u_{yy} = 0$  tenglamani kanonik ko'rishga keltiring.

$b^2 - ac = 0 + x^2y^2 = x^2y^2 > 0$  bo'lgani uchun, bu giperbolik tipdagi tenglama ekanligini aniqlaymiz.

Xarakteristik tenglama tuzamiz:

$$x^2(dy)^2 y (dx)^2 = 0 \Leftrightarrow (xdy + ydx)(xdy - ydx) = 0$$

Ikkita  $(xdy + ydx) = 0, (xdy - ydx) = 0$  differensial tenglama xosil qilamiz.

O'zgaruvchilarni ajratib va interallab quyidagi ko'rishga kelamiz:

$$\frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0, \ln|y| + \ln|x| = \ln C_1$$

$$\frac{dy}{y} - \frac{dx}{x} = 0, \ln|y| - \ln|x| = \ln C_2$$

Potensiallashtirgandan keyin, ikki oila xarakteristikalar uchun tenglamalarni topamiz:

$$xy = C_1, \frac{y}{x} = C_2.$$

Endi yangi o'zgaruvchidarni kiritamiz.

$$\xi = xy, \eta = \frac{y}{x}$$

Yuqorida keltirgan fomulalardan foydalanib, eski o'zgaruvchilar bo'yicha xususiy xosilalarni yangi o'zgaruvchilar bo'yicha xususiy xosilalar orqali ifodalaymiz:

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = yu_\xi + \frac{y^2}{x^2}u_\eta$$

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = xu_\xi + \frac{1}{x}u_\eta$$

$$u_{xx} = (u_{\xi\xi} \xi_x + u_{\xi\eta} \eta_x)y - (u_{\eta\xi} \xi_x + u_{\eta\eta} \eta_x) \frac{y}{x^2} + \frac{2y}{x^3}u_\eta = (yu_{\xi\xi} - \frac{y}{x^2}u_{\xi\eta})y -$$

$$-(yu_{\xi\eta} - \frac{y}{x^2}u_{\eta\eta}) \frac{y}{x^2} + \frac{2y}{x^3}u_\eta = y^2u_{\xi\xi} - 2\frac{y^2}{x^2}u_{\xi\eta} + \frac{y^2}{x^4}u_{\eta\eta} + 2\frac{y}{x^3}u_\eta.$$

$$u_{yy} = x(u_{\xi\xi} \xi_y + u_{\xi\eta} \eta_y) + \frac{1}{x}(u_{\eta\xi} \xi_y + u_{\eta\eta} \eta_y) = x(xu_{\xi\xi} + \frac{1}{x}u_{\xi\eta}) +$$

$$+ \frac{1}{x}(xu_{\xi\eta} + \frac{1}{x}u_{\eta\eta}) = x^2u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + \frac{1}{x^2}u_{\eta\eta}$$

Berilgan tenglamaga ikkinchi xosila uchun topilgan ifodalarni qo'yib

$$x^2(y^2u_{\xi\xi} - 2\frac{y^2}{x^2}u_{\xi\eta} + \frac{y^2}{x^4}u_{\eta\eta} + 2\frac{y}{x^3}u_\eta) - y^2(x^2u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + \frac{1}{x^2}u_{\eta\eta}) = 0$$

ni olamiz. Oxirgi ifodani soddalashtirib,

$$u_{\xi\eta} - \frac{1}{2\xi}u_{\eta} = 0$$

kanonik ko'rinishga kelamiz.

2. Agar (1) parabolik tipdagi tenglama bo'lsa, u xolda (3) tenglamalar ustma-ust tushadi. Bu xolda (3) sistema uchun bitta  $\varphi(x, y) = C$  birinchi integralini xosil qilamiz. U xolda o'zgaruvchilarni

$$\xi = \varphi(x, y), \eta = \psi(x, y)$$

formula bo'yicha amalshtirib olamiz, bu yerda  $\psi(x, y)$ -ni

$$\begin{vmatrix} \varphi_x & \varphi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{vmatrix} \neq 0$$

shartni qanoatlantiruvchi ixtiyoriy funksiya, ya'ni funksional determinant –yakobian–nolga teng bo'lmasligi lozim.

**2-misol.** Tenglamani kanonik ko'rinishga keltiring.

$$z_{xx} \sin^2 x - z_{xy} 2y \sin x + z_{yy} y^2 = 0$$

$b^2 - ac = y^2 \sin^2 x - y^2 \sin^2 x = 0$  bo'lgani uchun tenglama giperbolik tipga qarashli.

Xarakteristik tenglamasi quyidagicha

$$\sin^2 x (dy)^2 + 2y \sin x dx dy + y^2 (dx)^2 = 0$$

yoki

$$(\sin x dy + y dx)^2 = 0$$

ko'rinishga ega. Yani  $\sin x dy + y dx = 0$  tenglamani o'zgaruvchilarni almashtirib va integrallab

$$\frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0, \ln|x| + \ln tg \frac{x}{2} = \ln C, tg \frac{x}{2} = C.$$

tenglamani olamiz.

$$\xi = ytg \frac{x}{2}, \eta = y$$

O'zgaruvchilarni almashtirib, bu yerda  $y$  - ixtiyoriy  $\begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0$  shartni

qanoatlantiruvchi funksiya. Bu funksiya uchun xususiy xosilalarni yangi o'zgaruvchilar orqali ifodalaymiz.

$$z_x = z_{\xi} \xi_x + z_{\eta} \eta_x = \frac{1}{2} z_{\xi} y \sec^2 \frac{x}{2},$$

$$z_y = z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y = z_\xi \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_\eta,$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= \frac{1}{2} (z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\xi\eta} \eta_x) y \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = \\ &= \frac{1}{4} z_{\xi\xi} y^2 \sec^4 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} y z_\xi \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \end{aligned}$$

$$z_{yy} = (z_{\xi\xi} \xi_y + z_{\xi\eta} \eta_y) \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\eta\xi} \xi_y + z_{\eta\eta} \eta_y = z_{\xi\xi} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 2z_{\xi\eta} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\eta\eta}$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= \frac{1}{2} (z_{\xi\xi} \xi_y + z_{\xi\eta} \eta_y) y \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} z_\xi \sec^2 \frac{x}{2} = \\ &= \frac{1}{2} (z_{\xi\xi} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\xi\eta}) y \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} z_\xi \sec^2 \frac{x}{2} \end{aligned}$$

ni olamiz. Olingan xususiy xosilalarni berilgan differensial tenglamaga qo'yamiz.

$$\begin{aligned} &\frac{1}{4} z_{\xi\xi} y^2 \sec^4 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} y z_\xi \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} - (z_{\xi\xi} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\xi\eta}) y^2 \sec^2 \frac{x}{2} \sin x - \\ &-\frac{1}{2} z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2} \sin x + y^2 (z_{\xi\xi} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 2z_{\xi\eta} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\eta\eta}) = 0 \end{aligned}$$

Soddalashtirib

$$\frac{1}{2} z_{\xi\xi} y \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} \sin^2 x + y^2 z_{\eta\eta} - z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2} \sin x = 0$$

yoki

$$y z_{\eta\eta} = z_\xi \sin x \quad \text{ni olamiz.}$$

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} \quad \text{bo'lgani uchun u xolda}$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{\xi}{\eta}, \sin x = \frac{2\xi}{\xi^2 + \eta^2} \quad \text{natijada}$$

$$z_{\eta\eta} = \frac{2\xi}{\xi^2 + \eta^2} z_\xi \quad \text{ni olamiz.}$$

3. Agar (1) tenglama elliptik tipda bo'lsa, sistemaning birinchi integrallari qo'shma kompleks ko'rinishda bo'ladi:

$$\varphi(x, y) + i\psi(x, y) = C_1, \varphi(x, y) - i\psi(x, y) = C_2$$

$\xi = \varphi(x, y), \eta = \psi(x, y)$  formula bo'yicha almashtirish yordamida (1) tenglama

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$$

ko'rinishga keltiriladi.

**3-misol.**  $z_{xx} - 2z_{xy} + 2z_{yy} = 0$  tenglamani kanonik ko'rinishga keltiring.

$b^2 - ac = 1 - 2 = -1 < 0$  bo'lgani uchun elliptik tipdagi tenglama ekan.

Demak, xarakteristik tenglama

$$(dy)^2 + 2dxdy + 2(dx)^2 = 0, y'^2 + 2y' + 2 = 0$$

ko'rinishga ega. Uni yechib

$$y + x - ix = C_1, y + x + ix = C_2 \quad \text{ni topamiz. Ikkita mavhum}$$

xarakteristikalar oilalarini xosil qilamiz:

$$\xi = y + x, \eta = x$$

O'zgaruvchilarni almashtirib

$$z_x = z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x = z_\xi + z_\eta,$$

$$z_y = z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y = z_\xi,$$

$$z_{xx} = (z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\xi\eta} \eta_x) + (z_{\eta\xi} \xi_x + z_{\eta\eta} \eta_x) = z_{\xi\xi} + 2z_{\xi\eta} + z_{\eta\eta},$$

$$z_{xy} = z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\xi\eta} \eta_x = z_{\xi\xi} + z_{\xi\eta}$$

$$z_{yy} = z_{\xi\xi} \xi_y + z_{\xi\eta} \eta_y = z_{\xi\xi}.$$

larga ega bo'lamiz. Topilgan ifodalarni berilgan differensial tenglamaga qo'yib

$$z_{\xi\xi} + 2z_{\xi\eta} + z_{\eta\eta} - 2z_{\xi\xi} - 2z_{\xi\eta} + 2z_{\xi\xi} = 0 \quad \text{ni yoki } z_{\xi\xi} + z_{\eta\eta} = 0 \quad \text{ifodani olamiz.}$$

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Xususiy xosilali differensial tenglama qachon giperbolik tipdagi tenglama deyiladi?
2. Xususiy xosilali differensial tenglama qachon parabolik tipdagi tenglama deyiladi?
3. Xususiy xosilali differensial tenglama qachon elliptik tipdagi tenglama deyiladi?

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

1. Xususiy xosilali differensial tenglama ta'rif bering.
2. Kvazichizikli differensial tenglama qanday ko'rinishga ega?
3. Xususiy xosilali differensial tenglama tartibi deb nima aytiladi.

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

4. Kvazichizikli differensial tenglama umumiy yechimi to'g'risidagi teoremani keltiring.
5. Bir jinsli iyenglamaning yechimi to'g'risidagi teoremani keltiring.
6. Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglama qachon chizikli deyiladi?

7. Matematik fizik tenglamalar kursi uchun xarakterli belgilashlarni keltiring.
8. 2–chi tartibli o'zgarmas ko'effitsiyentli giperbolik tipdagi tenglamani kanonik shakliga keltirish yo'lini ayting.
9. 2–chi tartibli o'zgarmas ko'effitsiyentli parabolik tipdagi tenglamani kanonik shakliga keltirish yo'lini ayting.
10. 2–chi tartibli o'zgarmas ko'effitsiyentli elliptik tipdagi tenglamani kanonik shakliga keltirish yo'lini ayting.

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xarakterdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. Saloxiddinov M.S. *Matematik fizika tenglamolari*. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.
2. Mixlin S.G. *Kurs matematicheskoy fiziki*. M, 1968,
3. Sobolev S.L. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1966.
4. Bisadze L.V. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1976.
5. Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. *Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki*. M. 1977.

#### Qo'shimcha

6. Tixonov A.P., Samarskiy A.A. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1968.
7. Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. *Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1962.
8. Vladimirov B.C. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1981.
9. Polojii G.II. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1964.
10. Petrovskiy I.G. *Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi*. M., 1961.
11. Mixlin S.G. *Leksii po lineynym integralnym uravneniyam*. M. 1959.

12. Smirnov M.M. *Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*

13. Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. *Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*

14. Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. *Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

## **1.4. O'qitish usullari qoidalari**

### **1.4.1. Aqliy hujum qoidalari**

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastic va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

### **1.4.2. "Insert" texnikasi qoidalari**

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- "Insert" jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
Agar «←» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

### **1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari**

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemadamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

## **Mavzu 2. GIPERBOLIK TIPDAGI TENGLAMALAR.**

## Ma`ruzaga reja-topshiriqlar

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O`quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O`quv mashg`uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o`rganish.

**Ma`ruza rejasi:**

1. Ikkinchi tartibli xususiy hosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi.
2. Tebranish tenglamasi uchun masalaning quyilishi.
3. Dalamber formulasi. Koshi masalasi yechimining mavjudligi turg`unligi va yagonaligi.
4. Ikkinchi tartibli xususiy hosilali tenglamalarning xarakteristikasi.
5. Yarim to`g`ri chiziqdagi masala. Davom ettirish metodi.

**O`quv mashg`uloti maqsadi:**

O`quv fani to`g`risida umumiy ta`surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

**O`quv mashg`uloti masalalari:**

- *O`rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang`ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarning matematik firflashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag`zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o`tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo`llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o`rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg`ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan birlashtirish, intizomlashtirish.

**O`qitish texnologiyasi:**

- *O`qitish usullari:* instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O`qitish shakillari:* frontal; jamoaviy;
- *O`qitish vositalari:* Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O`qitish sharoitlari:* texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring:* o`g`zaki savol-javob, blits-so`rov.

**Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o`quv fanlar sistemasidagi o`rni va roli bilan tanishtirish;
- O`quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o`quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o`qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O`qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;



### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o`qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta`riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo`nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to`liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag`ulotlarni bajarishda o`rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

### **• 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi**

#### **• 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o`ziga ishonch, aniqligi,); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o`quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so`zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro`yhati; o`quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati:* o`quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko`rinish; o`quv materiallar va qo`llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o`quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko`rish;
- *Shakillar, usular, uslublar:* instruktaj; frontal so`rov; mustahkamlovchi so`rov.

#### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati:* mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o`tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo`yishni taklif etadi; birinchi savol bo`yicha matn o`qiladi; qo`shimcha o`quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo`yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati:* yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi,; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o`qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o`zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar:* frontav so`rov blits-so`rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

#### **3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)**

- *O'qituvchining faoliyati:* mavzu bo`yicha hulosa qilish, talabalarning e`tiborlarini asosiylarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o`tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o`zaro baholashning natijalarini chiqarish; o`quv mashg'ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko`rsatgichlari va me`zonlari;
- *Talabalar faoliyati:* ishning tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo`llash; o`zaro baholashni o`tkazish, yo`l qo`yilgan hatolar bo`yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar:* guruhlarda ishlash, kartochnalarda topshiriqlar.

### **1.3. O'quv-metodik materiallar**

## Ma`ruza rejasi:

6. Ikkinchi tartibli xususiy hosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi.
7. Tebranish tenglamasi uchun masalaning quyilishi.
8. Dalamber formulasi. Koshi masalasi yechimining mavjudligi turg'unligi va yagonaligi.
9. Ikkinchi tartibli xususiy hosilali tenglamalarning xarakteristikasi.
10. Yarim to'g'ri chiziqdagi masala. Davom ettirish metodi.

Tayanch iboralar: xususiy xosilali tglama, klassifikasiya, tebranish tenglamasi, Dalamber formulasi, Koshi masalasi, xarakteristika, davom ettirish.

### 1.3.1. Ma`ruza matni

#### 1. Ikkinchi tartibli xususiy hosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi

O'tgan ma'ruzada berilgan ta'riflarni eslaymiz.

Ta'rif:  $E^2$  fazoda ikkinchi tartibli xususiy hosilalarga ega bo'lgan biror bir funksiya  $U(x,y)$  berilgan (bunda  $U_{xy} = U_{yx}$ ) bo'lsin. Shunda xususiy hosilali umumiy tenglama deb  $F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy}) = 0$  tenglamaga aytiladi. Bunda  $F$  qandaydir funksiya. Kvazichizikli tenglama uning xususiy holidan iborat

$$a_{11}(x, y, u, u_x, u_y)u_{xx} + 2a_{12}(x, y, u, u_x, u_y)u_{xy} + a_{22}(x, y, u, u_x, u_y)u_{yy} + F_1(x, y, u, u_x, u_y) = 0$$

Bizni yuqori tartibli xosilalarga nisbatan chizikli tenglamalar, ya'ni  $a_{11}, a_{12}, a_{22}$  funksiyalari faqat  $(x, y)$  o'zguruvchilarga bog'liq bo'lgan hollar qiziqtiradi.

$$a_{11}(x, y)u_{xx} + 2a_{12}(x, y)u_{xy} + a_{22}(x, y)u_{yy} + F_1(x, y) = 0$$

Tenglama chizikli deyiladi, agar  $u$  nafaqat yuqori tartibli hosilalari  $u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$  ga nisbatan balki  $u$  funksiya va uning birinchi tartibli hosilalariga nisbatan chizikli bo'lsa.

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu + f = 0 \quad (2.0)$$

Bu yerda  $a_{11}, a_{12}, a_{22}, b_1, b_2, c, f$  - koeffitsiyentlar faqat  $x$  va  $y$  bo'yicha o'zgaradi.

Ta'rif: Agar  $f \equiv 0$  bo'lsa shunda (2.0) tenglama bir jinsli tenglama, aks holda bir jinsli bo'lmagan tenglama deb aytiladi.

Ta'rif:  $(x_0, y_0)$  nuqtada (2.1) tenglama quyidagicha aniqlanadi.

1. Agar  $a_{12}^2(x_0, y_0) - a_{11}(x_0, y_0)a_{22}(x_0, y_0) > 0$  bo'lsa, giperbolik tipdagi bo'ladi.
2. Agar  $a_{12}^2(x_0, y_0) - a_{11}(x_0, y_0)a_{22}(x_0, y_0) < 0$  bo'lsa, elliptik tipdagi bo'ladi.
3. Agar  $a_{12}^2(x_0, y_0) - a_{11}(x_0, y_0)a_{22}(x_0, y_0) = 0$  bo'lsa, parabolik tipdagi bo'ladi.

Tenglamaning tipi ma'lum bir soha uchun ham xuddi shunday aniqlanadi: (2.1) tenglama sohada (elliptik), (giperbolik), (parabolik) tipdagi deb ataladi, agar shu soha barcha

nuqtalarda  $a_{12}^2 - a_{11} \cdot a_{12}$   $a_{12}^2 - a_{11} \cdot a_{12} > 0$   $a_{12}^2 - a_{11} \cdot a_{12} < 0$   $a_{12}^2 - a_{11} \cdot a_{12} = 0$  bo'lsa. Agar tenglama sohaning har xil nuqtalarida xar xil tipga ega bo'lsa, bunda u shu sohada aralash tipdagi tenglama teyiladi.

## GIPERBOLIK TIPDAGI TENGLAMALAR.

### 2. Tebranish tenglamasi uchun masalaning qo'yilishi.

Bizlar giperbolik tipdagi tenglamani ko'rib chiqammiz.

Faraz qilaylik  $u(x,t) \in C^2 ((x,t): 0 < x < l, t > 0)$  bo'lsin, shunda

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad ((x,t): 0 < x < l, t > 0) \quad (2.1)$$

Tenglama ideal torning tebranish tenglamasi deyiladi.

Ikki fazoviy o'zgaruvchilarning funksiyasi  $u(x,y,t)$  holida:

$$u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad (x,y) \in D, t > 0$$

bu elastik membraning tebranish tenglamasi.

(2.1) tenglamani qaraymiz. Biz quyidagi boshlang'ich shartlarni berishimiz mumkin:

$$\begin{cases} u(x,0) = \phi(x), & 0 < x < l; \\ u_t(x,0) = \varphi(x), & 0 < x < l, \end{cases} \quad \text{-- torning muvozanat holatidan chetlanishini izohlaydi;}$$

va chegaraviy shartlarni:

$$\begin{cases} u(l,t) = \mu(t), & t > 0; \text{ (max kamlanlangan holda } \mu \equiv 0) \\ u_x(l,t) = \nu(t), & t > 0; \\ u(l,t) + \alpha u_x(l,t) = \theta(t). & t > 0 \end{cases}$$

odatda bizlar ulardan ba'zilarini olamiz.

Giperbolik yoki tebranish tenglamalar uchun chegaraviy masalalar tuzamiz.

Birinchi chegaraviy masala.

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad 0 < t \leq T; \\ u(x,0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l; \\ u_t(x,0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l; \\ u(0,t) = \mu_1(t), & 0 \leq t \leq T; \\ u(l,t) = \mu_2(t), & 0 \leq t \leq T; \end{cases}$$

Xuddi shuni o'zi yarim to'g'ri chiziq uchun :

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, \quad 0 < t \leq T; \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0; \\ u_t(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0; \\ u(0, t) = \mu(t), & 0 \leq t \leq T; \end{cases}$$

Shuningdek oddiy Koshi masalasini qarash mumkin:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad 0 < t \leq T; \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty; \\ u_t(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

3. Dalamber formulasi. Koshi masalasi yechimining mavjudligi turg'unligi va yagonaligi.

Bizlar tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasini qaraymiz.

$$[1.1] \begin{cases} (1) & u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad 0 < t \leq T; \\ (2) & u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty; \\ (3) & u_t(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Faraz qilaylik,  $u \in C^2(R \times R^+)$  funksiya bo'lib, u [1.1] Koshi masalasining yechimi bo'lsin. Yangi  $\xi$ ,  $\eta$  o'zgaruvchilarni quyidagicha aniqlaymiz:

$$\begin{cases} \xi = x + at; \\ \eta = x - at; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\xi + \eta}{2}; \\ t = \frac{\xi - \eta}{2a}. \end{cases}$$

Yangi funksiyaning aniqlaymiz:

$$v(\xi, \eta) = u\left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right).$$

Bu funksiyaning xususiy hosilalarini topamiz.

$$v_\xi = u_x \left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right) \frac{1}{2} + u_t \left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right) \frac{1}{2a};$$

$$\begin{aligned}
v_{\xi\eta} &= u_{xx} \left( \frac{\xi+\eta}{2}, \frac{\xi-\eta}{2a} \right) \frac{1}{4} + u_{xt} \left( \frac{\xi+\eta}{2}, \frac{\xi-\eta}{2a} \right) \left( -\frac{1}{4a} \right) \\
&+ u_{tx} \left( \frac{\xi+\eta}{2}, \frac{\xi-\eta}{2a} \right) \frac{1}{4a} + u_{tt} \left( \frac{\xi+\eta}{2}, \frac{\xi-\eta}{2a} \right) \left( -\frac{1}{4a} \right) = \\
&= u_{xx} \left( \frac{\xi+\eta}{2}, \frac{\xi-\eta}{2a} \right) \frac{1}{4} - \frac{1}{4a} u_{tx} \left( \frac{\xi+\eta}{2}, \frac{\xi-\eta}{2a} \right) = \\
&\{tebranish\ tenglamasi\} = 0;
\end{aligned}$$

Endi teskari integrallashni amalga oshiramiz:

$$\begin{aligned}
v_{\xi\eta}(\xi, \eta) = 0, \quad & \xrightarrow{\xi \text{ bo'yicha integral}} v_{\eta}(\xi, \eta) = \tilde{f}_1(\eta) \Rightarrow \\
& \xrightarrow{\eta \text{ bo'yicha integral}} v(\xi, \eta) = \int \tilde{f}_1(\eta) d\eta + f_2(\xi) \\
& \Rightarrow v(\xi, \eta) = f_1(\eta) + f_2(\xi) \Rightarrow \{u(x, t) = v(x+at, x-at)\} \Rightarrow
\end{aligned}$$

$$u(x, t) = f_1(x-at) + f_1(x+at), \quad (2.2)$$

bu yerda  $\tilde{f}_1, f_1, f_2$  - lar integrallash davomida hosil bo'ladigan funksiyalar. Shunday qilib biz tebranish tenglamasi yechimi bo'lgan  $u$  funksiyaning umumiy ko'rinishini hosil qildik. Boshlang'ich shartlardan foydalanib  $f_1, f_2$ -larni aniqlaymiz:

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} u(x, 0) = f_1(x) + f_2(x) = \phi(x); \\ u_t(x, 0) = -af_1'(x) + af_1'(x) = \varphi(x); \end{cases} \Rightarrow \\
& \Rightarrow \begin{cases} -f_1(x) + f_2(x) = \frac{1}{a} \int_{x_0}^x \varphi(\xi) d\xi + C \\ f_1(x) + f_2(x) = \phi(x). \end{cases}
\end{aligned}$$

Sistemadagi tenglamalarni qo'shib va biridan birini ayirib quyidagini hosil qilamiz.

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} f_2(x) = \frac{\phi(x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \varphi(\xi) d\xi + \frac{c}{2}; \\ f_1(x) = \frac{\phi(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \varphi(\xi) d\xi - \frac{c}{2}. \end{cases} \Rightarrow \\
& \Rightarrow \{u(x, t) = f_1(x-at) + f_2(x+at)\} \Rightarrow
\end{aligned}$$

$$u(x, t) = \frac{\phi(x-at) + \phi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi \quad (2.3)$$

(2.3) formula Dalamber formulasi deyiladi.

Teorema 2. 1 (Koshi masalasi yechimining mavjudligi va yagonaligi).

Faraz qilaylik  $\phi(x) \in C^2(R)$ ,  $\varphi(x) \in C^1(R)$ . [1. 1] Koshi masalasining yechimidan iborat shunday  $u(x,y)$  funksiya mavjud va yagonadirki, bunda  $u \in C^2(R \times \overline{R}^+)$ . Bu yerda  $\phi(x)$ ,  $\varphi(x)$  funksiyalar boshlang'ich shartlarni aniqlaydi.

Isbot:

Yechimning mavjudligi (1)-(3) shartlardan foydalanib va teorema shartlaridan foydalangan holda bevosita o'rniga qo'yish bilan tekshirilib ko'riladi.

Yagonaligi quyidagi mulaxozalardan kelib chiqadi: (1)-(3) shartlarni qanoatlantiruvchi ixtiyoriy funksiya uchun Dalamber formulasi bo'yicha ifodasi xaqqoniydir, bu ifoda esa faqat bir funksiyani ko'zda tutadi.

Teorema 2.2 (Turg'unlik teoremasi).

Faraz qilaylik  $\phi_1, \phi_2(x) \in C^2(R)$ ,  $\varphi_1, \varphi_2(x) \in C^1(R)$  va ular  $R$  fazoda cheagralangan bo'lsin. Agar  $u_1, u_2(x,t)$  funksiyalar [2.1] tipdagi masalaning yechimlari vam mos ravishda  $\phi_1, \phi_2, \varphi_1, \varphi_2$  boshlang'ich shartlar bilan berilgan yechimlari bo'lsa, shunda

$$\sup_{x \in R, 0 \leq t \leq T} |u_1(x,t) - u_2(x,t)| \leq \sup_{x \in R} |\phi_1(x) - \phi_2(x)| + T \sup_{x \in R} |\varphi_1(x) - \varphi_2(x)|$$

bo'ladi.

Isbot.

$u_1, u_2$  uchun (2.3) Dalamber formularidan kelib chiqadiki:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, \quad ((x,t): 0 < x < l, t > 0) \\ |u_1 - u_2| &\leq \left| \frac{\phi_1(x+at) - \phi_2(x+at)}{2} \right| + \left| \frac{\phi_1(x-at) - \phi_2(x-at)}{2} \right| + \\ &+ \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} |\varphi_1(\xi) - \varphi_2(\xi)| d\xi \leq \sup_{x \in R} |\phi_1(x) - \phi_2(x)| + \\ &+ \sup_{x \in R} |\varphi_1(x) - \varphi_2(x)| \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} d\xi \leq \sup_{x \in R} |\phi_1(x) - \phi_2(x)| + \sup_{x \in R} |\varphi_1(x) - \varphi_2(x)| T \end{aligned}$$

Teorema isbotlandi.

#### 4. Ikkinchi tartibli xususiy hosilali tenglamalarning xarakteristikalarini.

Ikkinchi tartibli xususiy hosilali klassik tenglama quyidagi ko'rinishga ega:

$$a_{11}(x,y)U_{xx} + 2a_{12}(x,y)U_{xy} + a_{22}(x,y)U_{yy} = F(x,y,u,u_x,u_y) \quad (2.4)$$

Unga bir qiymatli moslik bilan quyidagi oddiy differensial tenglamani qo'yamiz:

$$a_{11}(dy)^2 - 2a_{12}dxdy + a_{22}(dx)^2 = 0 \quad (2.5)$$

Shunda (2.5)ning yechimlari bo'lgan funksiyalar (egri chiziqlar) (2.4) tenglamaning xarakteristikalarini deyiladi. Masalan

$a^2 U_{xx} - U_{tt} = 0$  tebranish tenglamasi uchun xarakteristikalar hosil qilinadigan tenglama

$$a^2(dt)^2 - (dx)^2 = 0 \quad \text{ko'rinishga ega.}$$

Undan quyidagini hosil qilamiz:

$$\begin{cases} a dt + dx = 0; \\ a dt - dx = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + at = const; \\ x - at = const. \end{cases}$$

Bular giperbolik tipdagi tenglamalarning xarakteristikalaridan iborat ikki to'g'ri chiziqdir.

Faraz qilaylik  $u(x, t)$  funksiya ma'lum bir Koshi masalasining yechimi bo'lsin.  $Oxy$  tekisligining birinchi choragida ixtiyoriy  $(x_0, y_0)$  nuqta olamiz. Bu nuqtadan faqat ikkita xarakteristika o'tadi:

$$x - at = x_0 - at_0, \quad x + at = x_0 + at_0$$

Ular  $Ox$  o'qini  $(x_0 + at_0, 0)$ ,  $(x_0 - at_0, 0)$  nuqtalar orqali kesib o'tib, bunda xarakteristik uchburchakni hosil qiladi.

$u(x, t)$  funksiya uchun  $u(x_0, t_0)$  nuqtada (2.3) Dalamber formulasini yozib

$$u(x_0, t_0) = \frac{\phi(x_0 - t_0) + \phi(x_0 + t_0)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \varphi(\xi) d\xi$$

hosil qilamizki,  $u(x, t)$  funksiyaning qymati faqat xarakteristik uchburchakning asosidagi  $\phi(x)$ ,  $\varphi(x)$  qiymatlari bilan aniqlanadi.

Bu giperbolik tipdagi tenglamalarning muxim o'ziga xos xususiyat. Uni quyidagi misolda tushinib olish mumkin.

Faraz qilaylik  $\phi(x)$ ,  $\varphi(x)$  funksiyalar biror  $[a, b]$  kesmaning tashqarisida 0 ga teng bo'lsin. Shunda II, III sohalarida  $u(x, t)$  funksiya ham 0 ga aynan teng bo'ladi. Bu Dalamber formulasidan osongina ko'rish mumkin. Ushbu fakt (dalil) giperbolik tenglamadagi  $u(x, t)$  signal (xabar)ni tarqalishining ( $x$  o'qi bo'yicha) ( $t$  vaqt mobaynidagi) oxiridagi tezligini ko'rsatadi.

Aksincha issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun berilgan Koshi masalasida

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) & -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

yechim, keyinchlik ko'rsatadiganidek, quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left(-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right) \phi(s) ds$$

Ko'rinib tipibdiki, agar  $\phi(s)$  funksiya uzluksiz, manfiy bo'lmagan va biror nuqtada 0 dan farqli bo'lsa, unda

$$u(x, t) > 0, \quad \forall t > 0$$

bo'ladi.

Ya'ni biz shuni hosil qildikki issiqlik o'kazuvchanlik tenglamasi holida signal (xabar) amalda darhol (mgnovenno) tarqaladi.

## 5. Yarim to'g'ri chiziqdagi masalalar. Davom ettirish usuli.

### Birinchi chegaraviy masala

Yarim to'g'ri chiziqdagi bir jinsli shartga ega bo'lgan tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala quyidagi ko'rinishga ega:

$$\begin{cases} (1) & u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t < 0; \\ (2) & u(x, t) = 0, & t < 0; \\ (3) & u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0; \\ (4) & u_t(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0; \end{cases}$$

$u(x, t)$  va  $u_t(x, t)$  funksiyalarning 0 da uzluksizligini ta'minlash uchun

$$\begin{cases} \phi(0) = 0; \\ \varphi(0) = 0. \end{cases}$$

bog'lanish shartlarini qo'shamiz (usloviya sopryajeniya).

Ushbu chegaraviy masalaning yechimini topish uchun, uni to'liq to'g'ri chiziq holigacha kegaytirish asosida aniqlaymiz. Yangi  $\Phi, \Psi$  funksiyalarni kiritgan holda  $\phi(x), \varphi(x)$  funksiyalarni butun to'g'ri chiziqda toq tarzda qo'shimcha aniqlaymiz (Doopredelim nechetyim obrazom).

$$\Phi(x) = \begin{cases} \phi(x), & x \geq 0; \\ -\phi(-x), & x < 0. \end{cases}$$

$$\Psi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0; \\ -\varphi(-x), & x < 0. \end{cases}$$

Modifikatsiyalangan Koshi masalasini qaraymiz.

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0; \\ u(x, 0) = \Phi(x), \\ u_t(x, 0) = \Psi(x). \end{cases}$$

Bu holda  $U(x, t)$  ni topish uchun biz Dalamber formulasidan foydalanamiz.

$$U(x, t) = \frac{\Phi(x - at) + \Phi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi.$$

$x, t \geq 0$  da bizga kerakli  $u(x, t)$  funksiya sifatida  $U(x, t)$  funksiyani olamiz. Ko'rinib tipibdiki (1), (3) va (4) shartlar  $x, t \geq 0$  bo'lganda birdaniga bajariladi, bu  $\Psi(x), \Phi(x)$  larni tarifidan kelib chiqadi. (2) shartning bajrilishi quyidagi almashtirishlardan kelib chiqadi.

$$u(0, t) \stackrel{def}{=} U(0, t) = \frac{\Phi(-at) + \Phi(at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \Psi(\xi) d\xi.$$

1-chi va 2-chi qo'shiluvchilar tegishli funksiyalarning toqligi sabali nolga aylanadi. Bu esa 2chi shartning bajarilishini ko'rsatadi. Shunday qilib bizlar tuzgan  $u(x, t)$  funksiya birinchi chegaraviy masalalarning yechimi ekanligini isbotladik.  $\Psi(x), \Phi(x)$  funksiyalarni mos ravishda isxodnyye funksiyalar  $\phi(x), \varphi(x)$  orqali ifodalaymiz:



$$\begin{aligned} \text{Agar } x \geq at \text{ bo'lsa } & \begin{cases} \Phi(x+at) = \phi(x+at); \\ \Phi(x-at) = \phi(x-at); \\ \Psi(\xi) = \varphi(\xi), \text{ agar } \xi \in [x-at; x+at] \end{cases} \text{ bo'lsa} \\ \text{Agar } x < at \text{ bo'lsa } & \begin{cases} \Phi(x+at) = \phi(x+at); \\ \Phi(x-at) = -\phi(x-at); \end{cases} \end{aligned}$$

Birinchi chegaraviy masalani yechish uchun quyidagi yordamchi formulani yozamiz.

$$\begin{aligned} \text{Agar } x < at \text{ bo'lsa, unda } & \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi = \int_{x-at}^0 \Psi(\xi) d\xi + \int_0^{x+at} \Psi(\xi) d\xi = \\ & = \int_{x-at}^0 -\varphi(-\xi) d\xi + \int_0^{x+at} \varphi(\xi) d\xi = \\ & = \{-\xi = \xi \text{ deb olamiz}\} = \int_{at-x}^0 \varphi(\xi) d\xi + \int_0^{x+at} \varphi(\xi) d\xi = \int_{at-x}^{at+x} \varphi(\xi) d\xi \end{aligned}$$

Shunda umumiy formula quyidagicha bo'ladi:

$$u(x,t) = \begin{cases} \frac{\phi(x+at) + \phi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi, & x \geq at; \\ \frac{\phi(at+x) - \phi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{at+x} \varphi(\xi) d\xi, & x < at; \end{cases}$$

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Turg'unlik teoremasi
2. D'alamber formulasini yozing.
3. Xususiy hosilali tenglamaga uchun klassifikasiyani keltiring.
4. Tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasi.

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

1. Xususiy hosilali umumiy tenglama deb nimaga aytiladi?
2. Xususiy hosilali chiziqli tenglamaga ta'rif bering.
3. Bir jinsli xususiy hosilali tenglama ta'rifini bering.

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Tebranish tenglamasi uchun masalaning quyilishi.
2. Ideal torning tebranish tenglamasini keltiring.
3. Birinchi chegaraviy masala.
4. Koshi masalasi yechimining mavjudligi turg'unligi va yagonaligi to'g'risidagi teorema.
5. Ikkinchi tartibli xususiy hosilali tenglamalarning xarakteristikalari
6. Yarim to'g'ri chiziqdagi bir jinsli birinchi chegaraviy shartga ega bo'lgan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalaning ko'rinishi.
7. Birinchi chegaraviy masalani yechimini keltiring

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xaraktyerdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobole» SL. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadzs L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlenn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

## 1.4. O'qitish usullari qoidalari

### 1.4.1. Aqliy hujum qoidalari

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;

- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastic va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

#### 1.4.2. “Insert” texnikasi qoidalari

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- “Insert” jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
Agar «←» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

#### 1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemadamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

### Mavzu 3. Birinchi chegaraviy masala yechiminig mavjudgini isbotlash uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli.

#### Ma`ruzaga reja-topshiriqlar

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O'quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

**Ma`ruza rejasi:**

1. Ikkinchi chegaraviy masala
2. O'zgaruvchilarni ajratish usuli

3. Shturm-Liuvill masalasining trivial bo'lmagan yechimlari
4. Birinchi chegaraviy masala yechimining mavjudligi haqida teorema
5. 1–chi chegaraviy masala yagonaligi

### **O'quv mashg'uloti maqsadi:**

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

### **O'quv mashg'uloti masalalari:**

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarning matematik firflashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan biriktirish, intizomlashtirish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari:* instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, “Insert” texnikasi;
- *O'qitish shakillari:* frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari:* Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O'qitish sharoitlari:* texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring:* o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rni va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta'riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo'nalishlari beriladi;

- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

## • 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi

### • 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):

- *O'qituvchining faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

### 2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati*: yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o'qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o'zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar*: frontav so'rov blits-so'rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

### 3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzu bo'yicha hulosa qilish, talabalarning e'tiborlarini asosiylarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o'tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o'zaro baholashning natijalarini chiqarish; o'quv mashg'ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko'rsatgichlari va me'zonlari;
- *Talabalar faoliyati*: *ishning* tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo'llash; o'zaro baholashni o'tkazish, yo'l qo'yilgan hatolar bo'yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

## 1.3. O'quv-metodik materiallar

### Ma`ruza rejasi:

1. Ikkinchi chegaraviy masala
2. O'zgaruvchilarni ajratish usuli
3. Shturm-Liuvill masalasining trivial bo'lmagan yechimlari
4. Birinchi chegaraviy masala yechimining mavjudligi haqida teorema
5. 1–chi chegaraviy masala yagonaligi

Tayanch iboralar: chegaraviy masala, o'zgaruvchilarni ajratish, usul, Shturm-Liuvill masalasi, mavjudlik teoremasi, yagonalik teoremasi.

**1.3.1. Ma'ruza matni**  
**Ikkinchi chegaraviy masala**

Yarim to'g'ri chiziqdagi bir jinsli chegaraviy shart bilan berilgan ikkinchi chegaraviy masala quyidagi ko'rinishga ega:

$$\begin{cases} (1) & u_{tt} = a^2 U_{xx}, x > 0, t > 0 \\ (2) & u_x(0, t) = 0, t \geq 0; \\ (3) & u(x, 0) = \phi(x), x \geq 0; \\ (4) & u_t(x, 0) = \psi(x), x \geq 0. \end{cases}$$

Oldingi holdagiday harakat qilamiz. Lekin bizlarni faqat juft davom ettirish qanoatlantiradi:

$$\Phi(x) = \begin{cases} \phi(x), x \geq 0; \\ \phi(-x), x < 0. \end{cases} \quad \Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), x \geq 0; \\ \psi(x), x < 0. \end{cases}$$

Yangi Koshi masalasi va uning uchun Dalamber formulasi bo'yicha yechimi 2-chi ma'ruzada ko'rsatganimzdek bo'ladi:

$$U(x, t) = \frac{\Phi(x - at) + \Phi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi.$$

Oldingi xoldagidek,  $u(x, t) = U(x, t), x, y > 0$  bo'lsin.

U holda (1), (3), (4) shartlarning bajarilishi ayon.

(2) shartni tekshiramiz. Dalamber formulasini differensiallasak va  $\Psi(t)$  juft funksiyaning hosilasi toq funksiya bo'lishini inobatga olib, quyidagi tenglikni hosil qilamiz:

$$u_x(0, t) = U_x(0, t) = \frac{\Phi'(at) + \Phi'(-at)}{2} + \frac{1}{2a} [\Psi(at) - \Psi(-at)]$$

$\Phi'(t)$  toqligidan va  $\Psi(t)$  juftligidan ko'rinadiki ikkala had ham nolga teng.

$u(x, t)$  uchun umumiy formula shunga o'xshash olinadi.

**2. O'zgaruvchilarni almashtirish usuli**

$[0, l]$  kesmada ortonormallashtirilgan funksiyalar sistemalarini qaraymiz.

$$\left\{ \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \right\}, n = 1, 2, 3, \dots \quad \left\{ \frac{1}{\sqrt{l}} \sqrt{\frac{2}{l}} \cos\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \right\}, n = 1, 2, 3, \dots$$

Fur'ye koeffitsiyentlarini

$$\phi_n = \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds; \quad \tilde{\phi}_n = \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds.$$

kabi aniqlaymiz.

U holda matematik analiz kursidan ma'lumki, agar  $\phi(x) \in C[a; b]$  bo'lsa, u holda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \phi_n^2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{\phi}_n^2$$

qatorlar yaqinlashadi. Buni eslab qolamiz va bir jinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan bir jinsli tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalaga o'tamiz:

$$[1.2] \begin{cases} (1).u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0; \\ (2).u(0, t) = u(l, t) = 0, t \geq 0; \\ (3).u(x, 0) = \phi(x), 0 \leq x \leq l; \\ (4).u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Uning yechimini quyidagi usul bilan topamiz: biror  $u(x, t)$  funksiyaga keltiruvchi almashtirishlarni bajaramiz, so'ngra, ma'lum bir shartlarni qanoatlantiruvchi  $\phi(x)$  va  $\psi(x)$  funksiyalar uchun bu funksiya mavjud bo'lishini va berilgan masala yechimi ekanligini isbotlaymiz.

Yechimni  $v(x, t) = X(x)T(t)$  ko'rinishda izlaymiz. Bu nolga aynan teng bo'lmagan funksiya bo'lsin.  $v(x, t)$  ni tebranish tenglamasiga qo'yib, quyidagini hosil qilamiz:

$$T''(t)X(x) = a^2 X''(x)T(t) \Rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda$$

bu yerda  $\lambda$  qandaydir o'zgarmas son.

Bu ayniyatlardan ikkita tenglama kelib chiqadi:

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l; \\ T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, t > 0. \end{cases}$$

$X(0) = X(l) = 0$  da  $v(x, t)$  funsiya (2) shartni qanoatlantiradi.

### 3. Shturm – Liuvill masalasi

Quyidagi masalani qaraymiz.

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 \leq x \leq l; \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

Shturm – Liuvill masalasining trivial bo'lmagan yechimlarni topamiz.

Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun yechimni chiqarishda, quyidagi xos qiymatlar va ularga mos xos funksiyalar to'g'ri keladi (buni bizlar keyinchalik ko'rsatamiz):

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2; \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi n}{l}x\right), n = 1, 2, \dots$$

Topilgan  $\lambda_n$  larni  $T(t)$  uchun tenglamaga qo'yamiz:

$$T_n''(t) + \left(\frac{\pi n}{l}a\right)^2 T_n(t) = 0 \Rightarrow T_n(t) = a_n \cos\left(\frac{\pi n}{l}at\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n}{l}at\right),$$

bu yerda  $a_n$  va  $b_n$  lar qandaydir o'zgarmaslar.

Shunday qilib (1), (2) shartlar qanoatlantiradigan  $X_n(x), T_n(t)$  funksiyalarni topdik.

$v_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$  deb olamiz. Ravshanki, bu funksiya uchun ham (1), (2) shartlar bajariladi.

(3), (4) shartlardan  $a_n, b_n$  konstantalarni

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) \text{ deb olamiz;}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{l}x\right)[a_n \cos\left(\frac{\pi n}{l}at\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n}{l}at\right)];$$

$$\phi(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \Rightarrow a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds;$$

$$\psi(x) = u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(b_n \frac{\pi n a}{l}\right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \Rightarrow \frac{\pi n a}{l} b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \Rightarrow$$

$$b_n = \frac{2}{\pi n a} \int_0^l \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds.$$

Natijada, konstantalarni topdik, endi to'la formulani yozamiz;

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{2}{l} \int_0^l \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds + \right. \\ \left. + \frac{2}{\pi n a} \int_0^l \sin\left(\frac{\pi n}{l} at\right) \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right] \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right). \quad (1.6)$$

Endi bu formula korrekt bo'ladigan shartlarni ifodalaymiz.

#### 4. Mavjudlik teoremasi

**Teorema 1.3. (mavjudlik)**

$$\phi(x) \in C^3[0; l], \phi(0) = \phi(l) = \phi''(0) = \phi''(l) = 0;$$

$$\psi(x) \in C^2[0; l], \psi(0) = \psi(l) = 0.$$

bo'lsin. U holda (1.6) formula bilan aniqlanadigan  $u(x, t)$  funksiya quyidagi xossalarga ega:

$$u(x, t) \in C^2\{[0; l] \times [0; t]\} (T - \forall > 0)$$

va (1)-(4) shartlarni qanoatlantiradi ([1.2] chegaraviy masala yechimi bo'ladi).

**Isbot:**  $u(x, t) \in C^2\{[0; l] \times [0; T]\}$  ekanligini isbotlaymiz;

$$\begin{aligned} \phi_n &= \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = \{bo'laklab int egrallaymiz\} = \\ &= -\phi(s) \frac{l}{\pi n} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l + \frac{l}{\pi n} \int_0^l \phi'(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = \\ &= \{bo'laklab int egrallaymiz\} = \\ &= \left(\frac{l}{\pi n}\right)^2 \phi'(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l - \left(\frac{l}{\pi n}\right)^2 \int_0^l \phi''(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = \\ &= \left(\frac{l}{\pi n}\right)^3 \phi''(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l - \left(\frac{l}{\pi n}\right)^3 \int_0^l \phi'''(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds. \\ \widehat{\phi}_n &= \int_0^l \phi'''(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds. \quad n^3 |\phi_n| = \left(\frac{l}{\pi}\right)^3 |\widehat{\phi}_n|. \end{aligned}$$



deb olamiz. Yuqorida aytib o'tilgan xossaga ko'ra  $\sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\phi}_n^2$  qator yaqinlashadi. Bundan

$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\phi_n|$  qatorning yaqinlashuvchiligi kelib chiqishini ko'rsatamiz:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\phi_n| = \left(\frac{l}{\pi}\right)^3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} |\widehat{\phi}_n| \leq \left\{ ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \right\} \leq \left(\frac{1}{n}\right)^3 \left[ \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\phi}_n^2 \right]$$

Shunday qilib, bizda ikkala qator ham yaqinlashuvchi qatorlar, shuning uchun

$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\phi_n|$  qator majorant alomatiga ko'ra yaqinlashadi. Shunga o'xshash

$$\begin{aligned} \psi_n &= \int_0^l \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = \{bo'laklab int egrallaymiz\} = \\ &= -\psi(s) \frac{l}{\pi n} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \Big|_0^l + \frac{l}{\pi n} \int_0^l \psi'(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = \\ &= \{bo'laklab int egrallaymiz\} = \\ &= \left(\frac{l}{\pi n}\right)^2 \psi'(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l - \left(\frac{l}{\pi n}\right)^2 \int_0^l \psi''(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \end{aligned}$$

Shunga o'xshash,  $\sum_{n=1}^{\infty} n |\psi_n|$  qatorning yaqinlashishini ko'rsatish mumkin.  $\left| \cos\left(\frac{\pi n}{l} st\right) \right|$  ni bir bilan chegaralab,  $u(x, t)$  uchun (1.6) qator Veyershtrass alomatiga ko'ra tekis yaqinlashadi (majorant bo'lib  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{2}{l} |\phi_n| + \frac{2}{\pi n a} |\psi_n| \right]$  yaqinlashuvchi qator hisoblanadi). Bundan tashqari  $u(x, t)$  bu holda  $[0; l] \times [0; T]$  da uzluksiz.

Shunga o'xshash  $x$  bo'yicha birinchi va ikkinchi hosilalar mavjudligi va uzluksizligi uchun (1.6) formuladagi mos hosilalardan iborat qatorning tekis yaqinlashishini ko'rsatish yetarli.  $x$  bo'yicha differensiallab, quyidagilarni olamiz.

$$\begin{aligned} u_x(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi n}{l} \left[ \frac{2}{l} \int_0^l \cos\left(\frac{\pi n}{l} at\right) \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds + \right. \\ &\quad \left. \frac{2}{\pi n a} \int_0^l \cos\left(\frac{\pi n}{l} at\right) \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right] \cos\left(\frac{\pi n}{l} x\right). \\ u_{xx}(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 \left[ \frac{2}{l} \int_0^l \cos\left(\frac{\pi n}{l} at\right) \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds + \right. \\ &\quad \left. + \frac{2}{\pi n a} \int_0^l \cos\left(\frac{\pi n}{l} at\right) \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right] \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right). \end{aligned}$$

U holda (Veyershtrass alomatiga ko'ra)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi n}{l} \left( \frac{2}{l} |\phi_n| - \frac{2}{\pi n a} |\psi_n| \right), \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 \left( \frac{2}{l} |\phi_n| - \frac{2}{\pi n a} |\psi_n| \right)$$

qatorlar yaqinlashishini ko'rsatish yetarli.

$$U \sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\phi_n| \quad \text{va} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n |\psi_n|$$

qatorlar uchun hozir isbot qilingan xossalardan kelib chiqadi. Shuning uchun o'sha mulohazalarni  $t$  bo'yicha hosilalar uchun o'tkazib, natijada  $u(x,t) \in C^2\{[0;l] \times [0;T]\}$  ni hosil qilamiz. Bu holda oson tekshirish mumkinki (1.6) formula bilan belgilanadigan  $u(x,t)$  funksiya tebranish tenglamasini qanoatlantiradi (ya'ni (1) shartni). Bunday  $u(x,t)$  funksiya (2)-(4) shartlarni qanoatlantirishi uni ko'rishdan quriladi – chegaraviy va boshlang'ich shartlar hisobga olingan.

Teorema isbotlandi.

Shunday qilib, yechim qurildi. Ba'zi shartlarda bu yechim yagona ekanligini isbotlaymiz.

### 5. 1–chi chegaraviy masalaning yagonaligi

Qo'yidagi umumiy 1 – chegaraviy masalani qaraymiz:

$$[1.3] \quad \begin{cases} U_{tt} = a^2 U_{xx} + f(x,t), & 0 < x < l, \quad 0 < t < T \\ U(0,t) = \mu_1(t), & 0 \leq t \leq T; \\ U(l,t) = \mu_2(t), & 0 \leq t \leq T; \\ U(x,0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l; \\ U_t(x,0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

**Bu chegaraviy masalaning yechimi yagonaligini isbotlaymiz.**

**Teorema 1.4 (yagonalik).** Faraz qilaylik  $u_1, u_2(x,t) \in C^2\{[0;l] \times [0;T]\}$  va  $u_1, u_2$  funksiyalar bir hil [1.3] chegaraviy masalaning echimi bo'lsin, u holda  $\{[0;l] \times [0;T]\}$  soxada  $u_1(x,t) \equiv u_2(x,t)$

**Isbot:**  $v(x,t) = u_1 - u_2$  ko'rinib turibdiki funksiya bizning chegaraviy masalaning  $f, \varphi, \phi, \mu_1, \mu_2$  funksiyalar aynan 0 ga teng bulgadagi yechim bo'ladi. Shunday qilib

$$v(x,t) \in C^2\{[0;l] \times [0;T]\}$$

va

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx}, & 0 < x < l, 0 < t < T; \\ v(0,t) \equiv v(l,t) \equiv v(x,0) \equiv v_t(x,0) \equiv 0 \end{cases}$$

$v(x,t) \equiv 0$  isbotlash talab etiladi.  $E(t) = \int_0^l [(v_t(x,t))^2 + a^2 (v_x(x,t))^2] dx$  funksiyani

aniqlaymiz va uni **energiya integrali** deb ataymiz. Misol uchun bizning tebranuvchi torimizning o'zgarishiga aniqlik bilan olingan to'la energiya deb fizikaviy interpretatsiya o'lish mumkin. Ko'rinib turibdiki, bizning  $v$  funksiya shartlarida  $E(t)$  differensiallanuvchi funksiyadir. Demak uning xosilasi quyidagicha hisoblanadi:

$$E'(t) = \int_0^l [2v_t(x,t)v_{tt}(x,t) + 2a^2 v_x(x,t)v_{xt}(x,t)] dx$$

Bu integralda ikkinchi qo'shiluvchini  $x$  bo'yicha bo'laklab integrallab quyidagi ifodaga kelamiz:

$$E'(t) = \int_0^l \left[ 2v_t(x,t)v_{tt}(x,t) - 2a^2 v_{xx}(x,t)v_{xx}(x,t) \right] dx + 2a^2 v_x(x,t)v_t(x,t) \Big|_0^l$$

$v(x, t)$  tebranish tenglamasini yechimi ekanligini esda tutgan holda, integral ostidagi ifoda aynan  $0$  ga teng ekanligini aniqlaymiz. Chegaraviy sharlarni  $t$  bo'yicha differensiallab  $v_t(0,t) \equiv 0 \equiv v_t(l,t)$  ni xosil qilamiz. Bundan xulosa: integral tashqarisidagi qo'shiluvchisi  $0$ ga teng. Demak  $E'(t) \equiv 0$  yoki

$$E(t) = \int_0^l \left[ (v_t(x,t))^2 + a^2 (v_x(x,t))^2 \right] dx \equiv const$$

Umuman olaganda biz yopiq [1.3] tenglamar bilan ifodalanuvchi sistemada energiya saqlanish qonunining yana bir ko'rinishiga ega bo'ldik — energiya soni doimiydir. Ko'rinib turibdiki

$$E(t) = E(t) = \int_0^l \left[ (v_t(x,t))^2 + a^2 (v_x(x,t))^2 \right] dx$$

Boshlang'ich shartlardan quyidagiga ega bo'lamiz.  $v_t(x,0) = v_x(x,0) = 0, \quad 0 \leq x \leq l$ ,

Demak,  $E(0) = 0 \Rightarrow E(t) \equiv 0$ . Integral ostidagi funksiyalarning manfiy bo'lmaganligi  $v_t(x,t) \equiv v_x(x,t) \equiv 0$  ga teng ekanligi aniqlanadi. Bundan  $v \equiv const$ , boshlang'ich shartlardan esa  $v \equiv 0$  ekanligi kelib chiqadi. Teorema isbotlandi.

**Eslatma:**  $\begin{cases} v_x(0,t) = 0 \\ v_x(l,t) = 0 \end{cases}$  ikkinchi tur chegaraviy shartlarga ega bo'lgan masala uchun ham

barcha tasdiqlarimiz o'rinli. Teoremaning isboti o'zgarmaydi, faqat integral tashqarisidagi qo'shiluvchi nolga teng ekanligi boshqa usulda. Bundat tashqari, teoremaning barcha tasdiqlari aralash ko'rinishdagi chegaraviy shartlar uchun ham o'rinlidir.

Savollar.

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Yarim to'g'ri chiziqdagi bir jinsli chegaraviy shart bilan berilgan ikkinchi chegaraviy masala quyilishini keltiring
2. Ikkinchi chegaraviy masalaning Dalamber formulasi bo'yicha yechimini keltiring.

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

1. O'zgaruvchilarni almashtirish usuli.
2. Umumiy 1 – chegaraviy masalani qo'yilishini keltiring.
3. Umumiy 1 – chegaraviy masala yagonaligi.

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Bir jinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan bir jinsli tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalani keltiring.

2. Shturm – Liuvill masalasi.
3. Mavjudlik teoremasi.

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xaraktyerdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### *Asosiy*

6. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
7. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
8. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
9. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
10. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

10. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
11. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
12. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
13. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
14. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
15. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
16. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
17. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
18. *Vladimirov I.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### 1.4. O'qitish usullari qoidalari

### 1.4.1. Aqliy hujum qoidalari

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastic va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

### 1.4.2. “Insert” texnikasi qoidalari

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- “Insert” jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
Agar «–» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

### 1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemadamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

## Mavzu 4. Energiya integralining tebranish tenglamasi

### uchun chegaraliy masala yechimining yagonaligi

#### Ma`ruzaga reja-topshiriqlar

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O'quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

**Ma`ruza rejasi:**

1. Ma'lumotlar xarakteristikalarda berilgan masala. Integral tenglamalarning ekvivalent sistemasi.
2. Xarakteristikalarda berilgan yechimning mavjudligi.
3. Malumotlar xarakteristikalarda berilgan masalaning yagonaligi.

### **O'quv mashg'uloti maqsadi:**

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

### **O'quv mashg'uloti masalalari:**

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarning matematik firlashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan biriktirish, intizomlashtirish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari:* instruktaj; Ma'ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O'qitish shakillari:* frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari:* Ma'ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O'qitish sharoitlari:* texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring:* o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rni va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma'ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma'ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma'ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta'riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma'ruzalarining asosiy yo'nalishlari beriladi;

- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

## • 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi

### • 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):

- *O'qituvchining faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

### 2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati*: yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o'qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o'zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar*: frontav so'rov blits-so'rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

### 3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzu bo'yicha hulosa qilish, talabalarning e'tiborlarini asosiyalarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o'tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o'zaro baholashning natijalarini chiqarish; o'quv mashg'ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko'rsatgichlari va me'zonlari;
- *Talabalar faoliyati*: *ishning* tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo'llash; o'zaro baholashni o'tkazish, yo'l qo'yilgan hatolar bo'yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

## 1.3. O'quv-metodik materiallar

### Ma`ruza rejasi:

1. Ma'lumotlar xarakteristikalarda berilgan masala. Integral tenglamalarning ekvivalent sistemasi.
2. Xarakteristikalarda berilgan yechimning mavjudligi.
3. Malumotlar xarakteristikalarda berilgan masalaning yagonaligi.

Tayanch iboralar: chegaraviy masala, xarakteristika, integral tenglama, tebranish tenglamasi, energiya integrali,

### 1.3.1. Ma'ruza matni

1. Ma'lumotlar xarakteristikalarda berilgan masala. Integral tenglamalarning ekvivalent sistemasi.

Quyidagi masalani qaraymiz

$$[1.4] \begin{cases} (1) & u_{xy}(x, y) = a(x, y)u_x(x, y) + b(x, y)u_y(x, y) + \\ & + f(x, y, u(x, y)), \quad 0 < x < l_1, \quad 0 < y < l_2 \\ (2) & u(x, 0) = \phi(x), \quad 0 \leq x \leq l_1; \\ (3) & u(0, y) = \varphi(y), \quad 0 \leq y \leq l_2; \end{cases}$$

Bu giperbolik tipdagi chiziqli bo'lmagan tenglama uchun berilgan masala **Gursa masalasi** deb ataladi. Ilgari berilgan ta'rifga ko'ra (1) tenglamaning xarakteristikalari bu  $dx dy = 0$  tenglamani qanoatlantiruvchi funksiyalar bo'ladi. Bu esa  $x = \text{const}$ ,  $y = \text{const}$  ko'rinishdagi to'g'ri chiziqlar oilasini bildiradi. Shunday qilib, bizning  $u(x, t)$  funksiyamizning  $x=0$ ,  $y=0$  xarakteristikalardagi ma'lumotlar bilan beriladi.

**Ta'rif:**  $u(x, y)$  funksiya [1.4] masalaning yechimi deb ataladi, agarda  $u(x, y) \in C^2\{[0; l_1] \times [0; l_2]\}$  va (1) – (3) shartlarni qanoatlantirilsa.

Berilgan masalaning yechimi mavjudligi va yagonligini bir necha etaplarda isbotlaymiz. Dastlab biz [1.4] masalani qandaydir chiziqli bo'lmagan integral tenglamalar sistemasiga ekvivalent ekanligini ko'rsatamiz.

Faraz qilaylik,  $u(x, y)$  funksiya [1.4] masalaning yechimi bo'lsin. U holda (1) tenglamani dastlab  $y$  bo'yicha keyin  $x$  bo'yicha integrallab, quyidagini xosil qilamiz:

$$u_x(x, y) = u_x(x, 0) + \int_0^y a(x, \eta)u_x(x, \eta)d\eta + \int_0^y b(x, \eta)u_y(x, \eta)d\eta + \int_0^y f(x, \eta, u(x, \eta))d\eta;$$

$$u(x, y) = u(0, y) + u(x, 0) - u(0, 0) + \int_0^x \int_0^y a(\xi, \eta)u_x(\xi, \eta)d\eta d\xi + \int_0^x \int_0^y b(\xi, \eta)u_y(\xi, \eta)d\eta d\xi +$$

$$+ \int_0^x \int_0^y f(\xi, \eta, u(\xi, \eta))d\eta d\xi \quad (1.7)$$

$$\text{Ikkita yangi funkciyalarni kiritamiz} \begin{cases} v(x, y) = u_x(x, y) \\ w(x, y) = u_y(x, y) \end{cases}$$

U holda, (2)-(3) boshlang'ich shartlarni qo'llab, (1.7) tenglamani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$u(x, y) = \varphi(y) + \phi(x, 0) - \phi(0) + \int_0^x \int_0^y [a(\xi, \eta)v(\xi, \eta) + b(\xi, \eta)w(\xi, \eta)]d\xi d\eta + \int_0^x \int_0^y f(\xi, \eta, u(\xi, \eta))d\xi d\eta \quad (1.8)$$

Buni  $x$  bo'yicha differensiallab, quyidagini xosil qilamiz:

$$v(x, y) = \phi'(x) + \int_0^y [a(x, \eta)v(x, \eta) + b(x, \eta)w(x, \eta)]d\eta + \int_0^y f(x, \eta, u(x, \eta))d\eta \quad (1.9)$$

Xuddi shunday  $y$  bo'yicha differensiallaymiz:

$$w(x, y) = \varphi'(y) + \int_0^x [a(\xi, y)v(\xi, y) + b(\xi, y)w(\xi, y)]d\xi + \int_0^x f(\xi, y, u(\xi, y))d\xi \quad (1.10)$$

Demak, agar  $u(x, t)$  [1.4] masalani yechimi bo'lsa u holda (1.8) – (1.10) tenglamalarini qanoatlantiruvchi  $v(x, t)$ ,  $w(x, t)$  funksiyalar mavjud bo'ladi. Teskarisi: (1.8) – (1.10) tenglamalarning yechimlari bo'lgan  $u$ ,  $v, w$ - uzluksiz funksiyalarning mavjudligidan



$v = u_x$ ;  $w = u_y$  ekanligi kelib chiqadi. Shuningdek bevosita differensiallashdan  $u(x,t)$  funksiyalar [1.4] masalani yechimi ekanligini tekshirib ko'rish mumkin.

## 2. Xarakteristikalarda berilgan yechimning mavjudligi.

**Teorema [1.5]: (Mavjudlik teoremasi)** Quyidagi to'rtta shart bajarilgan bo'lsin:

1.  $a(x, y), b(x, y) \in C\{[0; l_1] \times [0; l_2]\}$

2.  $f(x, y, p) \in C\{[0; l_1] \times [0; l_2] \times E\}$  ya'ni, bizlar  $u(x, y)$  funksiyani  $p$  ixtiyoriy qiymat qabul qiluvchi o'zgaruvchi bilan almashtirdik.

3.  $|f(x, y, p_2) - f(x, y, p_1)| \leq L|p_2 - p_1|$ ,  $\forall x \in [0; l_1], \forall p_1, p_2 \in E$  r o'zgaruvchi bo'yicha Lipshis shartidir.

4.  $\phi(x) \in C^1[0; l_1], \phi(y) \in C^1[0; l_2], \phi(0) = \phi(0)$

U holda [1. 4] masalaning yechimi mavjud.

**Isbot.** [1.4] masala (1.8)-(1.10) ga ekvivalentligini xisobga olib, (1.8)-(1.10) ni qanoatlantiruvchi  $u(x,y), v(x,y), w(x,y)$  uzluksiz funksiyalar mavjudligini isbotlaymiz. Bu funksiyalarni iterasiyalar ketma-ketligi yordamida topamiz. Ketma-ket iterasiyalar prosesini quyidagicha ko'ramiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_0(x, y) = v_0(x, y) = w_0(x, y) = 0 \\ u_{n+1}(x, y) = \phi(y) + \phi(x) - \phi(0) + \int_0^x \int_0^y [a(\xi, \eta)v_n(\xi, \eta) + b(\xi, \eta)w_n(\xi, \eta)] d\eta d\xi + \\ + \int_0^x \int_0^y f(\xi, \eta, u_n(\xi, \eta)) d\eta d\xi \\ u_{n+1}(x, y) + \phi'(y) + \int_0^y [a(x, \eta)v_n(x, \eta) + b(x, \eta)w_n(x, \eta)] d\eta + \int_0^y f(x, \eta, u_n(x, \eta)) d\eta \\ w_{n+1}(x, y) + \phi'(y) + \int_0^x [a(\xi, y)u_n(\xi, y) + b(\xi, \eta)w_n(\xi, y)] d\xi + \int_0^x f(\xi, y, u_n(\xi, y)) d\xi \end{array} \right.$$

Bu prosesni yaqinlashuvchi ekanligini isbotlaymiz. Buning uchun  $u_n, v_n, w_n$  ketma-ketliklarning hadlari orasidagi farqlarni baholaymiz.  $u_n$  uchun iterasiya ta'rifidan va teoremaning (3) shartlaridan quyidagi tengsizlik kelib chiqadi:

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - u_n| &\leq \int_0^x \int_0^y [|a(\xi, \eta)| |v_n(\xi, \eta) - v_{n-1}(\xi, \eta)| + |b(\xi, \eta)| |w_n(\xi, \eta) - w_{n-1}(\xi, \eta)|] d\xi d\eta + \\ &+ \int_0^x \int_0^y L |u_n(\xi, \eta) - u_{n-1}(\xi, \eta)| d\xi d\eta \end{aligned}$$

Faraz qilaylik:  $(x, y) \in \{[0; l_1] \times [0; l_2] \times E\}$  da  $M = \max\{\max|a(x, y)|, \max|b(x, y)|, L\}$ .

Shunda:

$$|u_{n+1} - u_n| \leq M \int_0^x \int_0^y [|v_n(\xi, \eta) - v_{n-1}(\xi, \eta)| + |w_n(\xi, \eta) - w_{n-1}(\xi, \eta)| + |u_n(\xi, \eta) - u_{n-1}(\xi, \eta)|] d\xi d\eta \quad (1.11)$$

$v_n, w_n$  funksiyalar uchun ham xuddi shunday:

$$|u_{n+1} - u_n| \leq M \int_0^y [|u_n(x, \eta) - u_{n-1}(x, \eta)| + |w_n(x, \eta) - w_{n-1}(x, \eta)| + |u_n(x, \eta) - u_{n-1}(x, \eta)|] d\eta \quad (1.12)$$

$$|u_{n+1} - u_n| \leq M \int_0^x [|u_n(\xi, y) - u_{n-1}(\xi, y)| + |w_n(\xi, y) - w_{n-1}(\xi, y)| + |u_n(\xi, y) - u_{n-1}(\xi, y)|] d\xi \quad (1.13)$$

Iterasiya prosesining barcha elementlari uzluksiz funksiyalar bo'lganligi sababli, bundan  $|u_n|, |v_n|, |w_n|$  funksiya qandaydir  $H$  o'zgarimas bilan chegaralanganligi kelib chiqadi. Ketma-ketlikning nolga teng bo'lgan xadlarning ta'rifidan  $|u_1 - u_1| \leq M, |v_1 - v_1| \leq M, |w_1 - w_1| \leq M$  kelib chiqadi. Buni qo'llab quyidagi ayirmani baholaymiz:

$$|u_2 - u_1| \leq M \int_0^x \int_0^y 3Hd\xi d\eta = 3HMxy \leq 3HM \frac{(x+y)^2}{2}$$

$$|v_2 - v_1| \leq M \int_0^y 3Hd\eta = 3HM y \leq 3HM(x+y)^2$$

$$|w_2 - w_1| \leq M \int_0^x 3Hd\xi = 3HM x \leq 3HM(x+y)$$

Ketma - ketlikni tekis yaqinlashuvchi ekanligini isbotlash uchun majorant qator qurishga to'g'ri keladi, lekin dastlab quyidagi bahoni isbotlaymiz.

$$|u_n(x, y) - u_{n-1}(x, y)| \leq 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(x+y)^2}{2};$$

$$|v_n(x, y) - v_{n-1}(x, y)| \leq 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(x+y)^{n-1}}{(n-1)!};$$

$$|w_n(x, y) - w_{n-1}(x, y)| \leq 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(x+y)^{n-1}}{(n-1)!};$$

Bu yerda  $K = 2 + l_1 + l_2$ ;

Isbotni induksiya bilan ko'ramiz .

Induksiya bazasi. Yuqorida isbotlanganidek  $n=2$  uchun o'rinli

**Induksiya farazi. Faraz qilaylik**  $n$  uchun o'rinli.  $n+1$  uchun isbotlaymiz .

**Induktiv o'tish** .  $|u_{n+1} - u_n|$  induksiya

farazidan foydalanib ayirmani baholaymiz:

$$|u_{n+1} - u_n| \leq M \int_0^x \int_0^y \left[ 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(\xi + \eta)^n}{n!} + 2 \cdot 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(\xi + \eta)^{n-1}}{(n-1)!} \right] d\xi d\eta \leq$$

$$\leq 3HM^n K^{n-2} \left[ \int_0^x \frac{(\xi + \eta)^{n+1}}{(n+1)!} \Big|_0^y d\xi + 2 \int_0^x \frac{(\xi + \eta)^n}{n!} \Big|_0^y d\xi \right]$$

Integralni hisoblaylik. Bunda boshlang'ich integral chegaralarini qo'yishda quyi chegarani tashlab yuboramiz. Ularni qo'shiluvchilari manfiy bo'lib, yuqoridagi ayirma uchun shunday bahoni yuqori chegara asosida hosil qilamiz:

$$|u_{n+1} - u_n| \leq 3HM^n K^{n-2} \left[ \frac{(x+y)^{n+2}}{(n+2)!} + 2 \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)!} \right] =$$

$$= 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)!} \left[ \frac{x+y}{n+2} + 2 \right] \leq$$

$$\leq \left\{ \frac{x+y}{n+2} + 2 \leq l_1 + l_2 + 2 = K \right\} \leq 3HM^n K^{n-1} \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Shunday qilib  $u_n$  ketma-ketlik uchun induksiya farazi isbotlangan. Qolgan ikkita ketma-ketlik uchun bahoning isboti shunga o'xshash bo'ladi.

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - u_n| &\leq M \int_0^y \left[ 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(\xi + \eta)^n}{n!} + 23HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(\xi + \eta)^{n-1}}{(n-1)!} \right] d\eta \leq \\ &\leq 3HM^n K^{n-2} \left[ \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)!} + 2 \frac{(x+y)^n}{n!} \right] = 3HM^n K^{n-2} \frac{(x+y)^n}{n!} \left[ \frac{x+y}{n+1} + 2 \right] \leq \\ &\leq 3HM^n K^{n-1} \frac{(x+y)^n}{n!} \end{aligned}$$

Demak ikkinchi baho ham to'g'ri.

Uchinchi bahoning isboti ham shu ko'rinishda bo'lad, shuning uchun uni tashlab ketamiz. Endi  $u_n, v_n, w_n$ , ketma-ketliklarni tekis yaqinlashuvchi ekanligini isbotlaymiz. Ko'rinib turibdiki bunday ketma-ketlikning har bir hadini tegishli qatorning qismaniy yig'indisi shaklida ifodalash mumkin.

$$\begin{aligned} u_n(x, y) &= \sum_{m=1}^n (u_m(x, y) - u_{m-1}(x, y)); \\ v_n(x, y) &= \sum_{m=1}^n (v_m(x, y) - v_{m-1}(x, y)); \\ w_n(x, y) &= \sum_{m=1}^n (w_m(x, y) - w_{m-1}(x, y)); \end{aligned}$$

Birinchi qatorning qo'shiluvchilari uchun biz bahoni isbotlagan edik.

$$|u_n(x, y) - u_{n-1}(x, y)| \leq 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(x+y)^n}{n!} \leq 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(l_1 + l_2)^n}{n!} = C \frac{a^n}{n!},$$

$C, a = \text{const.}$

Malumki,  $\sum_{n=1}^{\infty} C \frac{a^n}{n!}$  qator yaqinlashuvchi. Bundan Veyershtress alomatiga ko'ra  $u_n$  ketma-ketlikni tekis yaqinlashishini hosil qilamiz. Qo'shiluvchilarning uzluksizligidan limitik funksiyaning uzluksizligi kelib chiqadi.

Shunga o'xshash qolgan ikki ketma-ketlik uchun ham ko'rsatish mumkin:

$$\begin{aligned} v_n(x, y) &\Rightarrow v(x, y) \in C\{[0; l_1] \times [0; l_2]\}; \\ w_n(x, y) &\Rightarrow w(x, y) \in C\{[0; l_1] \times [0; l_2]\}; \end{aligned}$$

Endi biz  $n \rightarrow \infty$  da limitni hisoblash iterasion jarayonini yozishga haqlimiz. Bu esa ushbu tenglamalar sistemasining yechimi bo'lgan  $u, v, w$  funksiyalarning mavjudligini bildiradi. Bu tenglamalar sistemasini boshlang'ich [1.4] ga ekvivalent deb olsak teorema butunlay isbotlanadi. Teorema isbotlandi.

### 3. Malumotlar xarakteristikalarda berilgan masalaning yagonaligi.

Shunday qilib [1.4] masalaning mavjudligini isbotladik. Endi uning yagonaligini isbotlaymiz-ravshanki bu (1.8)-(1.10) integral tenglamalar sistemasi yechimining yagonaligiga ekvivalentdir.

**Teorema 1.6 (Yagonalik)** Faraz qilaylik

$$\{u_1(x, y), v_1(x, y), w_1(x, y)\}, \\ \{u_2(x, y), v_2(x, y), w_2(x, y)\};$$

ikki funksiyalar sistemasi mavjud bo'lib, ular (1-8)-(1-10) integral tenglamalar sistemasining yechimlari bo'lsin va bunda [1.4] tenglamaning yechimi mavjudligi haqidagi teoremani (1)-(4) shartlari bajarilgan bo'lsin, u holda  $u(x, y) = u_1(x, y) - u_2(x, y)$ ,  $v(x, y) = v_1(x, y) - v_2(x, y)$ ,  $w(x, y) = w_1(x, y) - w_2(x, y)$

funksiyalar  $\prod_{l_1, l_2} = \{[0; l_1] \times [0; l_2]\}$  to'g'ri to'rtburchakda aynan 0 ga teng bo'ladi.

**Isbot.** Shunday qilib  $u_1, u_2$  - (1.8) integral tenglamani yechimi bo'lsin.

$$u_1(x, y) = \varphi(y) + \phi(x) - \phi(0) + \int_0^x \int_0^y [a(\xi, \eta)v_1(\xi, \eta) + b(\xi, \eta)w_1(\xi, \eta)] d\eta d\xi + \int_0^x \int_0^y f(\xi, \eta, u_1(\xi, \eta)) d\eta d\xi;$$

$$u_2(x, y) = \varphi(y) + \phi(x) - \phi(0) + \int_0^x \int_0^y [a(\xi, \eta)v_2(\xi, \eta) + b(\xi, \eta)w_2(\xi, \eta)] d\eta d\xi + \int_0^x \int_0^y f(\xi, \eta, u_2(\xi, \eta)) d\eta d\xi.$$

Biridan ikkinchisini ayirib va  $f(x, y, p)$ , uchun Lipshis shartini qo'llab quyidagini hosil qilamiz:

$$|u_2 - u_1| \leq \int_0^x \int_0^y [M|v_2(\xi, \eta) - v_1(\xi, \eta)| + M|w_2(\xi, \eta) - w_1(\xi, \eta)| + M|u_2(\xi, \eta) - u_1(\xi, \eta)|] d\eta d\xi \Rightarrow$$

$$|u(x, y)| \leq \int_0^x \int_0^y [M|v(\xi, \eta)| + M|w(\xi, \eta)| + M|u(\xi, \eta)|] d\eta d\xi \quad (1.14)$$

Shunga o'xshash natija  $v(x, y)$ ,  $w(x, y)$  funksiyalar uchun ham o'rinli:

$$|v(x, y)| \leq \int_0^y [M|v(x, \eta)| + M|w(x, \eta)| + M|u(x, \eta)|] d\eta;$$

$$w \leq \int_0^x [M|v(\xi, y)| + M|w(\xi, y)| + M|u(\xi, y)|] d\xi.$$

Bundan ushbu funksiyalar  $P$  to'g'ri to'rtburchakda 0 ga tengligi kelib chiqishini isbotlaymiz. Dastlab ular  $\prod_{x_0, y_0} = \{[0; x_0] \times [0; y_0]\}$ , to'g'ri to'rtburchakda 0 ga tengligini

ko'rsatamiz. Bu yerda  $x_0, y_0$  quyidagi shartlarni qanoatlantiradi: 
$$\begin{cases} 3x_0 y_0 M < 1; \\ 3x_0 M < 1; \\ 3y_0 M < 1. \end{cases}$$

Faraz qilaylik:  $\bar{u} = \max_{\Pi_{x_0, y_0}} |u(x, y)|$ ;  $\bar{v} = \max_{\Pi_{x_0, y_0}} |v(x, y)|$ ;  $\bar{w} = \max_{\Pi_{x_0, y_0}} |w(x, y)|$

Umumiylikni chegaralashdan,  $\bar{u} \geq \max\{\bar{v}, \bar{w}\}$  bo'lishini faraz qilamiz.

Bu holda (1.14) tengsizlikdan quyidagi tengsizlik kelib chiqadi:

$$|u(x, y)| \leq M \int_0^x \int_0^y [\bar{u} + \bar{u} + \bar{u}] ds \leq 3Mx_0 y_0 \bar{u}, (x, y) \in \Pi_{x_0, y_0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \bar{u} \leq 3Mx_0 y_0 \bar{u}.$$

$3x_0y_0M < 1$  bo'lganligi sababli, bu faqat  $\bar{u} = 0$  da bajariladi. Bundan ko'rinib turibdiki  $u(x, y), v(x, y), w(x, y)$  funksiyalar  $\Pi_{x_0y_0}$  da aynan 0 ga teng. Keyingi qadamda biz shunday  $x_1$  ni olamizki,

$$\begin{cases} 3(x_1 - x_0)y_0M < 1; \\ 3(x_1 - x_0)M < 1; \\ 3y_0M < 1. \end{cases}$$

va uni  $\Pi_{x_1y_0}$  to'g'ri to'rtburchakda qaraymiz. U holda (1.14) tengsizlik quyidagi ko'rinishga ega:

$$|u(x, y)| \leq M \int_{x_0}^x \int_0^y [\bar{u} + \bar{u} + \bar{u}] ds, (x, y \in \Pi_{x_1y_0})$$

Oldingi qadamga o'xshash harakat qilib  $u(x, y), v(x, y), w(x, y)$  funksiyalar  $\Pi_{x_1y_0}$  to'g'ri to'rtburchakda aynan 0 ga tengligini hosil qilamiz.

Shunday mulaxozalarni davom etib, chekli sonli qadamlardan keyin bu funksiyalarning  $\Pi_{x_1y_0}$  da 0 ga teng ekanligini ko'rsatish mumkin.

Teorema isbotlandi.  $\square$

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Energiya integrali
2. Ma'lumotlar xarakteristikalarda berilgan masala.
3. Gursa masalasi.

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

1. Mavjudlik teoremasi.
2. Lipshis sharti.

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Xarakteristikalarda berilgan yechimning mavjudligi.
2. Umumiy 1 – chegaraviy masala uchun yagonalik teoremasi

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xaraktyerdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. Saloxiddinov M.S. *Matematik fizika tenglamolari*. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.
2. Mixlin S.G. *Kurs matematicheskoy fiziki*. M, 1968,
3. Sobolev S.L. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1966.
4. Bisadze L.V. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1976.
5. Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. *Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki*. M. 1977.

#### Qo'shimcha

1. Tixonov A.P., Samarskiy A.A. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1968.
2. Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. *Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1962.
3. Vladimirov B.C. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1981.
4. Polojii G.II. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1964.
5. Petrovskiy I.G. *Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi*. M., 1961.
6. Mixlin S.G. *Leksii po lineynym integralnym uravneniyam*. M. 1959.
7. Smirnov M.M. *Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki*.
8. Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. *Sbornik zadach po matematicheskoy fizike*. M. 1972.
9. Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. *Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki*. M. 1974.

### 1.4. O'qitish usullari qoidalari

#### 1.4.1. Aqliy hujum qoidalari

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastik va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;

- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

#### 1.4.2. "Insert" texnikasi qoidalari

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- "Insert" jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
Agar «←» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

#### 1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemadamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

### Mavzu 5. «Qo'shma differensial operator. Riman usuli. Limitga o'tish shaklidagi umumlashgan yechimlar» Ma'ruzaga reja-topshiriqlar

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O'quv soati:** 2 soat (ma'ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma'ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

**Ma'ruza rejasi:**

1. Qo'shma differensial operator
2. Chiziqli algebradagi qo'shma operator bilan bog'lanish.
3. Riman usuli.
4. Limitga o'tish shaklidagi umumlashgan yechimlar
5. Integrallik ayniyat ma'nosidagi umumlashgan yechimlar

**O'quv mashg'uloti maqsadi:**

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

**O'quv mashg'uloti masalalari:**

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarining matematik firlashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;

- *Rivojlantiruvchi*: kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi*: aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan birlashtirish, intizomlashtirish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari*: instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O'qitish shakllari*: frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari*: Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O'qitish sharoitlari*: texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring*: o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rnini va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta`riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo`nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

#### **• 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi**

##### **• 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;



- *Shakillar, usular, uslublar*: instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

## 2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma'ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati*: yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o'qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o'zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar*: frontav so'rov blits-so'rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

## 3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzu bo'yicha hulosa qilish, talabalarning e'tiborlarini asosiylarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o'tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o'zaro baholashning natijalarini chiqarish; o'quv mashg'ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko'rsatgichlari va me'zonlari;
- *Talabalar faoliyati*: *ishning* tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo'llash; o'zaro baholashni o'tkazish, yo'l qo'yilgan hatolar bo'yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: guruhlarda ishlash, kartochnalarda topshiriqlar.

### 1.3. O'quv-metodik materiallar

#### Ma'ruza rejasi:

1. Qo'shma differensial operator
2. Chiziqli algebradagi qo'shma operator bilan bog'lanish.
3. Riman usuli.
4. Limitga o'tish shaklidagi umumlashgan yechimlar
5. Integrallik ayniyat ma'nosidagi umumlashgan yechimlar

Tayanch iboralar: operator, differensial operator, qo'shma operator, chegaraviy masala, Grin formulasi, Riman usuli, limit, Dalamber formulasi, Puasson tenglamasi.

#### 1.3.1. Ma'ruza matni

##### 1. Qo'shma differensial operator.

$E^n$  fazoni qaraymiz. Faraz qilaylik  $x = (x_1, \dots, x_n)$ - bir necha o'zgaruvchilar,  $u(x)$  - esa p o'zgaruvchi funksiya bo'lsin

Tarif. Biror  $u(x) \in C^2(E^n)$  funksiya dan  $L[u]$  differensial operator quyidagicha aniqlanadi :

$$L[u] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) u_{x_i} + c(x) u \quad (1.15)$$

Bu yerda  $a_{ij}, b_i \in C^2(E^2)$ ,  $c(x)$  qandaydir funksiyalar. Bu holda ikkinchi tartibli xususiy hosila differensiallash tartibiga bog'liq bo'lmaganligi sababli  $a_{ij}(x) = a_{ji}(x)$  bir biriga to'g'rilikni qabul qilinadi.

**Tarif.** Har qanday  $L[u]$  differensial operatorga o'zaro bir qiymatli moslik bo'yicha keluvchi  $M[v]$  qo'shma operator olish mumkin.

$$M[v] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij}(x)v)_{x_i x_j} - \sum_{i=1}^n (b_i(x)v)_{x_i} + c(x)v$$

Tarif. Agar  $L[u] = M[v]$  bo'lsa operator o'z-o'ziga qo'shma operator deyiladi. Bizga quyidagi formula kerak bo'ladi.

$$vL[u] - uM[v] = \sum_{i=1}^n (p_i(x))_{x_i} \quad (1.16)$$

Bu yerda  $p_i(x) = \sum_{j=1}^n [va_{ij}u_{x_j} - u(a_{ij}v)_{x_j}] + b_i uv$ .

Bu formulani isbotlash uchun  $p_i(x)$  ni (1.16) ning o'ng tomoniga qo'yamiz va qo'shiluvchilarni guruhlaymiz

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (p_i(x))_{x_i} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [va_{ij}u_{x_i x_j} - u(a_{ij}v)_{x_i x_j}] + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [(va_{ij})_{x_i} u_{x_j} - u_{x_i} (a_{ij}v)_{x_j}] + \\ &+ \sum_{i=1}^n [vb_i u_{x_i} + u(b_i v)_{x_i}] + cuv - cuv = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n va_{ij}u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n vb_i u_{x_i} + cuv - \\ &- \left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u(a_{ij}v)_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n u(b_i v)_{x_i} + cuv \right) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [(va_{ij})_{x_i} u_{x_j} - u_{x_i} (a_{ij}v)_{x_j}] = \\ &vL[u] - uM[v] + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [(va_{ij})_{x_i} u_{x_j} - u_{x_i} (a_{ij}v)_{x_j}]. \end{aligned}$$

Qolgan ikkilangan yig'indi 0 ga teng –bu qo'shiluvchilar indekslarining simmetrikligidan kelib chiqadi. Bu yerdan (1.16) formula to'g'riligi kelib chiqadi.

## 2. Chiziqli algebradagi qo'shma operator bilan bog'lanish.

Chiziqli algebra A operatorga qo'shma  $A^*$  operatorni deb quyidagi  $(Au, v) = (u, A^*v)$  munosabatga aytiladi. Bu  $E^n$  dan olingan barcha  $u, v$  lar uchun bajarilishi kerak edi. Bizning tarifimiz shu berilgan tarif bilan qanchalik mos kelishini ko'rib chiqamiz.

**Misol 1.**  $\Omega \subset E^3$  bo'lsin va skalyar ko'paytma quyidagicha aniqlansin :

$$(f, g) = \iiint_{\Omega} fgd \tau, \quad f, g \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$$

u holda

$$u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega}),$$

$u, v|_{\Sigma} = 0$ , ( $\Sigma - \Omega$  ning chegarasi) bo'lgan funksiyalar uchun quyidagi

$$(v, L[u]) = (M[v], u)$$

ifoda to'g'ri bo'lsin. Buni ko'rsatamiz:

$$\begin{aligned}
(v, L[u]) - (M[v], u) &= \iiint_{\Omega} (vL[u] - uM[v])d\tau = \{(1.16)\} = \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial p_1}{\partial x_1} + \frac{\partial p_2}{\partial x_2} + \frac{\partial p_3}{\partial x_3} \right) d\tau = \\
&= \{\vec{P} = (p_1, p_2, p_3)\} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{P} d\tau = \{\text{Ostrogradskiy - Gauss formulasi (5.3)}\} = \\
\iint_{\Sigma} (\vec{P}, \vec{n}) d\sigma &= \{\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)\} = \iint_{\Sigma} (p_1 n_x + p_2 n_y + p_3 n_z) d\sigma = 0
\end{aligned}$$

$p_i|_{\Sigma} = 0, u, v$  uchun chegaraviy shartdan kelib chiqadi.

**Misol 2.** Qo'shma operator uchun oddiy misol bu Laplas operatori hisoblanadi, masalan  $E^3$

da  $L[u] = \Delta u = u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + u_{x_3 x_3}$  bo'ladi

Bu yerda  $M[u] = \Delta v$  tekshirish oson.

### 3. Riman usuli

$E^2$  fazoda  $u(x, y)$  funksiya uchun quyidagi differensiallanuvchi operatorni qaraymiz:

$$L[u] = u_{xy} + a(x, y)u_x(x, y) + b(x, y)u_y(x, y) + c(x, y)u(x, y)$$

Ta'rifga ko'ra, unga qo'shma operator quyidagi ko'rinishga ega:

$$M[v] = u_{xy} - (a(x, y)v)_x - (b(x, y)v)_y + c(x, y)v$$

Shunday qilib, (1.15) formulada

$$a_{11} = a_{22} = 0, \quad a_{12} = a_{21} = \frac{1}{2}, \quad b_1 = a, \quad b_2 = b, \quad c = c.$$

Ko'rinib turibdiki (1.16) formuladagi  $P_1, P_2$  lar quyidagicha hisoblanadi:

$$p_1 = \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv;$$

$$p_2 = \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv;$$

Endi  $Oxy$  tekisligida  $y = f(x)$  egri chiziq berilgan bo'lsin, va unda  $\forall x$  lar uchun  $f'(x) < 0$ . Uning grafigini  $L_f$  bilan belgilaymiz. Nuqtalari  $f(x)$  funksiya grafigidan yuqorida yotgan yarim tekislikni  $R_f^+$  deb belgilaymiz:

$$R_f^+ = \{(x, y) : y > f(x)\},$$

Quyidagi chegaraviy masalani (shuni ta'kidlash lozimki, bu masala giperbolik tipdagi tenglama uchundir) ko'rib chiqamiz:

$$[1.5] \begin{cases} (1) & L[u] = F(x, y), & (x, y) \in R_f^+; \\ (2) & u(x, y) = \phi(x, y), & (x, y) \in L_f; \\ (3) & \frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = \psi(x, y), & (x, y) \in L_f; \end{cases}$$

( $L[u]$  (1.17) formulasi bilan aniqlanadi.)

Keltirilgan chegaraviy masalaning yechimini  $R_f^+$  da izlaymiz.

Uning ixtiyoriy  $A(x_0, y_0) \in R_f^+$  nuqtada qanday qilib xisoblanilishini ko'rsatib beramiz.

Buning uchun biz  $A$  nuqtani  $L_f$  egri chiziq bilan koordinata o'qlariga parralel bo'lgan kesmalar vositasida birlashtiramiz va shu orqali kesishuv nuqtalari  $B(x, y_0)$  va

$C(x_0, y)$  ni hosil qilamiz. AB, AC kesmalar hamda BC yoy orasida hosil bo'lgan konturni L deb, uning ichki qismini D bilan belgilaymiz.

Qo'shma differensial operator  $M[v]$  ning (bunda  $v$  - muayan bir funksiya). (1.16) formulasidan foydalanamiz.

$$\iint_D (vL[u] - uM[v]) ds = \iint_D \left( \frac{\partial p_1}{\partial x} + \frac{\partial p_2}{\partial y} \right) ds$$

Buning o'ng qismini o'zgartirish uchun egri chiziqli integrallar uchun Grin formulasidan foydalanamiz:

$$\int_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) ds$$

Bu holda quyidagiga ega bo'lamiz.

$$\begin{aligned} \iint_D (vL[u] - uM[v]) ds &= \int_L -p_2 dx - p_1 dy = \quad (\text{kontur qismlari koordinata o'qlariga parralel}) \\ &= \int_B^C \left\{ \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy - \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx \right\} + \\ &+ \int_C^A \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy + \int_B^A \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx. \quad (1.18) \end{aligned}$$

Ma'lumki,

$$\begin{aligned} &\int_C^A \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy + \int_B^A \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx = \\ &= \underbrace{\int_C^A \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy}_{I_{CA}} + \underbrace{\int_B^A \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx}_{I_{BA}} \end{aligned}$$

Bungacha biz  $v$  funksiyaning oddiygina ikki marta uzluksiz differensiallanuvchi funksiya deb belgilagan edik. Endi  $M[v]=0$  bo'lishini aniqroq aytganda quyidagi masalaning yechimi bo'lishi kerak:

$$\left\{ \begin{array}{l} (4) \quad v_{xy} - (a(x, y)v)_x - (b(x, y)v)_y + c(x, y)v = 0, \quad x \leq x_0, y \leq y_0; \\ (5) \quad v(x_0, y) = \exp \left\{ \int_{y_0}^y a(x_0, s) ds \right\}, \quad y \leq y_0; \\ (6) \quad v(x, y_0) = \exp \left\{ \int_{x_0}^x b(s, y_0) ds \right\}, \quad x \leq x_0; \end{array} \right.$$

Bu masala [1.4] ko'rinishdagi xarakteristikalar yordamida berilgan ma'lumotlarga ega bo'lgan masaladir. Oldingi bo'limlarda ko'rsatgan edikki uning yechimidan isbot bo'lgan va yagona bo'lgani  $(x, y)$  funksiya mavjud. Bu funksiya bizga ma'lum deb hisoblaymiz va aynan shu funksiyadan foydalanamiz.

Birinchi boshlang'ich tenglamadan  $F(x, y)$  funksiyaning qo'ygan holda  $u(x, y)$  uchun (1.18) ifodaga qaytamiz.

$$\iint_D v(x, y)F(x, y) ds = \int_B^C \left\{ \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy + \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx \right\} + I_{CA} + I_{BA}.$$

$I_{CA}$ ,  $I_{BA}$  integrallarda koordinatalaridan biri fiksirlanganidan foydalanamiz.  $v(x, y)$  uchun (4) shartdan  $x = x_0$  bo'lsa,  $v_y - av = 0$  bo'lishini oson aniqlash mumkin. Shunday qilib:

$$I_{CA} = \int_C^A [\frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv] dy = \int_C^A [\frac{1}{2}(vu)_y - u(v_y - av)] dy = \frac{1}{2}(uv)|_A - \frac{1}{2}(uv)|_C$$

Xuddi shunday,  $y = y_0$  bo'lganda  $u_x - bu = 0$  ekanligini ko'rsatish mumkin. Demak,

$$I_{BA} = \int_B^A [\frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv] dx = \int_B^A [\frac{1}{2}(vu)_x - u(v_x - bv)] dx = \frac{1}{2}(uv)|_A - \frac{1}{2}(uv)|_B.$$

Shunday qilib, (1.18) ifodani quyidagicha yozish mumkin.

$$\iint_D v(x, y)F(x, y)ds = \int_B^C \{ [\frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv] dy - [\frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv] dx \} + uv|_A - \frac{1}{2}(uv)|_C - \frac{1}{2}(uv)|_B.$$

Bundan  $A(x_0, y_0)$  nuqtada  $u(x, y)$  funksiyasini qiymatini aniqlash mumkin:

$$u(x_0, y_0)v(x_0, y_0) = - \int_B^C \{ [\frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv] dy - [\frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv] dx \} + \frac{1}{2}(uv)|_C + \frac{1}{2}(uv)|_B + \iint_D v(x, y)F(x, y)ds.$$

$v(x, y)$  ning (5),(6) chegaraviy shatlardan  $v(x_0, y_0) = 1$  ekanligi kelib chiqadi.

U holda

$$u(x_0, y_0) = - \int_B^C \{ [\frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv] dy - [\frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv] dx \} + \frac{1}{2}(uv)|_C + \frac{1}{2}(uv)|_B + \iint_D v(x, y)F(x, y)ds$$

hosil bo'ladi. Bu  $u(x_0, y_0)$  uchun yakuniy formuladir. Konturdagi xususiy hosilalar  $u(x, y)$  bizga noaniq ekanligi ko'rinishi mumkin. Ularni (2),(3) chegaraviy shatlardan topish mumkinligini ko'rsatamiz:

$$\begin{cases} u(x, f(x)) = \phi(x, f(x)); \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x, f(x)) = \varphi(x, f(x)); \end{cases}$$

$L_f$  ga o'rinmaning birlik vektori  $\vec{\tau}$  quyidagi ko'rinishga ega:

$$\vec{\tau} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}; \frac{f'(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}} \right\}.$$

Bundan quyidagini hosil qilamiz:

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = \frac{\partial u}{\partial n} \frac{1}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{f'(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}$$

$\frac{\partial u}{\partial \tau}$  quyidagi o'zgartirishlardan topiladi.

$$\frac{\partial}{\partial n} u(x, f(x)) = u_x(x, f(x)) + u_y(x, f(x))f'(x) = \sqrt{1 + (f'(x))^2} \frac{\partial u}{\partial \tau}(x, y).$$

Ma'lumki,

$$\frac{\partial y}{\partial n} = (\bar{n}, \text{gradu}).$$

$L_j$  ga normalning,  $\bar{\tau}$  vektorga ortogonal bo'lgan birlik vektori quyidagicha hisoblanadi:

$$\bar{n} = \left\{ \frac{f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}}; -\frac{1}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} \right\}.$$

Bundan:

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = \frac{\partial u}{\partial n} \frac{f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{1+(f'(x))^2}}$$

Yuqoridagilarga asoslanib, chegaraviy shartlardan  $L$  konturda  $u(x, y)$  ni topish uchun sistemani hosil qilamiz.

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \phi(x, f(x)) = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} f'(x) \\ \phi(x, f(x)) = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} \end{cases}$$

Uning determinanti hech qayerda 0 ga teng emas. Bundan kelib chiqadiki,  $u_x(x, y)$ ,  $u_y(x, y)$  lar mavjud va ular bir qiymatli aniqlanishi mumkin.

Shunday qilib, biz (1.19) formula to'g'riligini asosladik. Uni hosil qilish uchun qo'llaniladigan usul **Riman usuli** deyiladi.

**Eslatma:** Dalamber formulasi (1.19) formulaning xususiy holdan iborat uzluksiz umumlashtirilgan yechim.

Shunday hollar bo'ladiki, amaliy masalalarning yechimlari bo'ladi. Bunday yechimlar ushbu kursdagi standart formulalar yordamida hosil qilib bo'lmaydi. Ammo, ularni masalan, oddiy yechimlarning chegarasidek tasvirlash mumkin.

#### 4. Limitga o'tish shaklidagi umumlashgan yechimlar

**Umumiy yondoshuv:**  $L[u]=0$  tenglamadan topish lozim bo'lgan  $u$  funksiya berilgan va bunda shu funksiyaga ba'zi bir  $F$  va  $F$  funksiyalar ko'rinishida shartlar qo'yilgan bo'lsin. Agar bu masala yechimga ega bo'lmasa, masalan,  $F \notin C^2, \Phi \notin C^2$  bo'lganligi tufayli bu holda biz tekis yaqinlashuvchi ketma-ketliklar  $F_n \Rightarrow F, \Phi_n \Rightarrow \Phi$  ni tuzamiz. Bu yerda  $F \notin C^2, \Phi \notin C^2$ . Shunda agar  $F_n$  va  $\Phi_n$  funksiyalarga mos keluvchi yechim ( $u_n$ ) mavjud bo'lsa  $u$  sifatida  $u_n$  funksiyalarning limitini olamiz:

$$u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$$

Bunda  $u_n$  ketma-ketlik  $u$  ga tekis yaqinlashish sharti bajarilgan.

**Misol.** Bizlarga berilgan giperbolik tenglama uchun Koshi masalasini ko'rib chiqamiz:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, -\infty < x < +\infty, 0 < t \leq T; \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty; \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

Ma'lumki agar  $\phi \in C^2(E), \psi \in C^1(E)$  bo'lsa yechim Dalamber formulasi bilan berilgan bo'ladi?

$$u(x, t) = \frac{\phi(x - at) + \phi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

Faraz qilaylik bizlarga xuddi shunday masalada  $\bar{\phi}, \bar{\psi}$  funksiya faqatgina uzluksiz bo'lsa, ya'ni biz Dalamber formulasidan foydalana ololmaymiz. Polosada fikr yuritamiz.  $[-d; d]$  kesmadan tashqarida  $\bar{\phi} = \bar{\psi} = 0$  bo'lishini talab qilamiz. Bu yerda  $d$  ma'lum bir o'zgarmas. Bunday xossa

$$\text{supp } \bar{\phi}, \bar{\psi} = [-d; d]$$

kabi belgilanadi. Faraz qilaylikki shunday  $\phi_n(x), \psi_n(x)$  funksiyalar mavjud bo'lib,  $\phi_n \in C^2(E), \psi_n \in C^1(E)$  shuningdek  $|x| \geq 2d$  uchun  $\bar{\phi}_n(x) = \bar{\psi}_n(x) = 0$ , hamda  $[-2(d + aT); 2(d + aT)]$  kesmada

$$\begin{cases} \phi_n(x) \Rightarrow \bar{\phi}(x); \\ \psi_n(x) \Rightarrow \bar{\psi}(x). \end{cases}$$

$\Phi_n, \psi_n$  funksiyalarga mos keluvchi Koshi masalasining yechimi uchun Dalamber formulasi o'rinlidir.

$$u_n(x, t) = \frac{\phi_n(x - at) + \phi_n(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \Rightarrow u_n(x, t) \in C^2\{E \times [0; T]\}$$

Bunday funksiyalarning limitini bizlar yechim deb nomlaymiz.

$$\bar{u}(x, t) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x, t)$$

Aniqlashni to'g'ri deb hisoblash mumkin agar biz

$$\prod = \{(x, t) : -2d - aT \leq x \leq 2d + aT, 0 \leq t \leq T\}$$

To'g'ri burchakda  $u_n(x, t)$  ketma-ketlikning tekis yaqinlashishini ko'rsata olsak (ravshanki to'g'ri to'rt burchakdan tashqarida ketma-ketlikning barcha hadlari 0 ga aynan teng). Buning uchun  $u_n$  fundamental ketma-ketlik ekanligini, ya'ni

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists M : \forall m > M, \forall p > 0 \quad |u_{m+p}(x, t) - u_m(x, t)| < \varepsilon \quad \forall (x, t) \in \prod \text{ ni isbotlaymiz}$$

Bu ayirmani Dalamber formulasi orqali baholaymiz.

$$\begin{aligned} |u_{m+p}(x, t) - u_m(x, t)| &\leq \frac{|\phi_{m+p}(x + at) - \phi_m(x + at)|}{2} + \frac{|\phi_{m+p}(x - at) - \phi_m(x - at)|}{2} + \\ &+ \frac{1}{2} \int_{x-at}^{x+at} |\psi_{m+p}(\xi) - \psi_m(\xi)| d\xi \end{aligned}$$

Hosil qilingan yig'indini har qanday ilgaridan berilgan  $\varepsilon$  dan kichik qilish mumkin –bu tekis yaqindashish shartidan, demak  $\Phi_n, \psi_n$  ketma-ketliklarning fundamentalligidan kelib chiqadi. Shundan hosil qilamizki

$$u_n(x, t) \Rightarrow \bar{u}(x, t), (x, t) \in \prod \quad \text{bu yerda} \quad \bar{u}(x, t) \in C[\prod]$$

Bundan tashqari  $u_n(\pm(2d + aT), t) = 0$ , bo'lgani uchun  $u(\pm(2d + aT), t) = 0$ , va  $\prod$  to'g'ri burchakdan tashqarida  $\bar{u}(x, t) = 0$  bo'ladi. Shunday tarzda tuzilgan funksiya limitik o'tish shaklidagi umumlashtirilgan yechim deyiladi. Bu yechim yagonami degan savol tug'iladi (chunki biz  $\Phi_n, \psi_n$  ketma-ketliklarni ixtiyoriy ravishda tanlagan edik)? Bu savolga javob berish uchun bizlar ixtiyoriy ikki  $\phi_n^1, \phi_n^2$  va  $\psi_n^1, \psi_n^2$  juft ketma-ketlik olamiz va ular

$$\begin{cases} \phi_n^1 \Rightarrow \bar{\phi}, & \phi_n^2 \Rightarrow \bar{\phi}; \\ \psi_n^1 \Rightarrow \bar{\psi}, & \psi_n^2 \Rightarrow \bar{\psi}; \end{cases}$$

bo'ladi. Faraz qilaylikki bu ketma-ketliklarga mos ravishda D'alamber formulasi bo'yicha hosil qilingan  $u_n^1$  va  $u_n^2$  ketma-ketliklar hadlarining limitlaridan iborat bo'lgan  $\bar{u}^1(x,t), \bar{u}^2(x,t)$  ikki yechimlar to'g'ri kelsin  $\bar{u}^1(x,t) \equiv \bar{u}^2(x,t)$  isbotlaymiz. Buning uchun ularning ayirmasini baxolashimiz kerak  $\bar{u}^1(x,t) - \bar{u}^2(x,t)$

$$\left| \bar{u}^1(x,t) - \bar{u}^2(x,t) \right| \leq \left| \bar{u}^1(x,t) - u_n^1(x,t) \right| + \left| u_n^1(x,t) - u_n^2(x,t) \right| + \left| u_n^2(x,t) - \bar{u}^2(x,t) \right|$$

$u_n^1$  va  $u_n^2$  funksiyalarning mos ravishda  $\bar{u}^1$  va  $\bar{u}^2$  funksiyalarga tekis yaqinlashishi sababli ushbu ayirmaning birinchi va uchinchi qo'shiluvchilari nolga intiladi, chunki  $\phi_n^1, \phi_n^2$  va  $\psi_n^1, \psi_n^2$  ketma-ketliklarga mos ravishda yana o'sha funksiyalar  $\Phi$  va  $\Psi$  yaqinlashadi. Bu yerdan  $\bar{u}^1(x,t)$  va  $\bar{u}^2(x,t)$  funksiyalarning aynan tengligi kelib chiqadi.

## 6. Integrallik ayniyat ma'nosidagi umumlash yechimlar.

Umumlashgan yechimlar qo'llanilishining boshqa misoli sifatida Puasson tenglamasidagi  $\Delta u = -f(x, y, z)$   $f$  funksiya ikki marta diferensiyalanmaydigan holat, ya'ni normal yechim mavjud bo'lmagan holat bo'lishi mumkin (chunki hamma vaqt  $\Delta u \in C^2$ )

**Umumiy yondashuv.**  $\sum$  chegaraga ega bo'lgan  $\Omega \in E^3$  sohada  $u(x, y, z)$  funksiyalar  $L[u] = F$  tenglama bilan aniqlanadigan bo'lsin, bu yerda

$$L[u] = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{i,j}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^3 b_i(x) u_{x_i} + c(x) u$$

shunda burchakga bog'langan operator quyidagicha beriladi

$$M[v] = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (a_{i,j}(x) v)_{x_i x_j} - \sum_{i=1}^3 (b_i(x) v)_{x_i} + c(x) v$$

Bizlar faqat shunaqa  $\mathcal{V}$  funksiyalarni qaraymizki, ular uchun limitda to'liq quyidagi shart bajarilishi kerak. Ma'lumki agar  $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\Omega)$  bo'lsa (1.16) formula o'rinli bo'ladi

$$\iiint_{\Omega} (vL[u] - uM[v]) d\tau = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{\rho} d\tau = \iint_{\Sigma} (\vec{\rho}, \vec{n}) d\sigma$$

$\mathcal{V}$  ga qo'yilgan shartlardan  $v, v_x, v_y, v_z$  funksiyalar demak  $\vec{\rho}$  vektor funksiya ham  $\Sigma$  da 0ga aylanishini hosil qilamiz. Bundan kelib chiqadiki

$$\iiint_{\Omega} (vL[u] - uM[v]) d\tau = 0$$

$L[u] = F$  ekanligidan foydalanamiz

$$\iiint_{\Omega} vF d\tau = \iiint_{\Omega} uM[v] d\tau \quad (1.20)$$

$u$  funksiya uchun hosil qilingan ifoda integral o'xshashlik ma'nosidagi umumlashtirilgan yechim deyiladi. Shunday qilib biz uzluksiz differensiallanish talabini  $\mathcal{V}$  funksiyaga o'tkazib, shuningdek bu funksiya qat'iy  $\Omega$  ichida yotuvchi sohadagina 0ga teng bo'lmasligi shartini talab etib  $u$  funksiya uchun tenglamani o'zgartirdik.



### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Chiziqli algebradagi qo'shma operator bilan bog'lanish.
2.  $L[u]$  differensiallanuvchi operatorni yozing.
3.  $L[u]$  differensiallanuvchi operator qo'shma operator qanday ko'rinishga ega
4.  $L[u]$  differensiallanuvchi operator uchun chegaraviy masalani keltiring.

### 1.3.2-b. Blitz-so'rov uchun savollar

1. Differensial operator.
2. Qo'shma differensial operator .
3. Qo'shma differensial operator misol keltiring.
4. Dalamber formulasini yozing.
5. Puasson tenglamasini keltiring.

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Egri chiziqli integrallar uchun Grin formulasini yozing.
2. Limitga o'tish shaklidagi umumlashgan yechimlar. Umumiy yondoshuv.
3. Giperbolik tenglama uchun Koshi masalasini keltiring
4. Integrallik ayniyat ma'nosidagi umumlash yechimlar. Umumiy yondoshuv.

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xaraktyerdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### *Asosiy*

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlnn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

#### **1.4. O'qitish usullari qoidalari**

##### **1.4.1. Aqliy hujum qoidalari**

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastic va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

##### **1.4.2. "Insert" texnikasi qoidalari**

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- "Insert" jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
Agar «←» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

##### **1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari**

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemadamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

## **Mavzu 6. Parabolik tipdagi tenglamalar Ma`ruzaga reja-topshiriqlar**

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O'quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

**Ma`ruza rejasi:**

1. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasini chiqarilishi
2. Bir fazoviy o'zgaruvchi bilan berilgan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi
3. Birinchi chegaraviy masala yechimining mavjudligi.
4. O'zgaruvchilarni ajratish usuli.

**O'quv mashg'uloti maqsadi:**

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

**O'quv mashg'uloti masalalari:**

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarning matematik firlashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan birlashtirish, intizomlashtirish.

**O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari:* instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O'qitish shakillari:* frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari:* Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;

- *O'qitish sharoitlari*: texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring*: o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rni va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma'ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma'ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma'ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta'riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma'ruzalarining asosiy yo'nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

#### **• 1.2. Ma'ruzaning xronologik xaritasi**

##### **• 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi,); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma'ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma'ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

##### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma'ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati*: yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi,; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o'qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o'zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar*: frontav so'rov blits-so'rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

##### **3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)**

- *O'qituvchining faoliyati:* mavzu bo'yicha hulosalar qilish, talabalarning e'tiborlarini asosiyalarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o'tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o'zaro baholashning natijalarini chiqarish; o'quv mashg'ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko'rsatgichlari va me'zonlari;
- *Talabalar faoliyati:* ishning tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo'llash; o'zaro baholashni o'tkazish, yo'l qo'yilgan hatolar bo'yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar:* guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

### 1.3. O'quv-metodik materiallar

#### Ma'ruza rejasi:

1. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasini chiqarilishi
2. Bir fazoviy o'zgaruvchi bilan berilgan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi
3. Birinchi chegaraviy masala yechimining mavjudligi.
4. O'zgaruvchilarni ajratish usuli.

Tayanch iboralar: Fur'ye qonuni, Ostragradskiy-Gauss formulasi, Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi, Chegaraviy shartlar, Boshlang'ich shartlar, Birinchi chegaraviy masala, Ikkinchi chegaraviy masala, Yarim to'g'ri chiziqdagi masala, Koshi masalasi

#### 1.3.1. Ma'ruza matni

##### 1. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasini chiqarilishi

Uch o'lchovli fazoda biror issiqlik o'tkazuvchi va koordinatalari  $(x, y, z)$  bo'lgan ixtiyoriy  $M$  nuqtaning temperaturasi  $t$  vakt momentida  $u(x, y, z, t)$  funksiya ko'rinishida beriluvchi jismni qaraymiz. Ma'lumki, issiqlik potoki vektori uchun  $\vec{W}$  quyidagi Fur'ye qonuni deb ataluvchi formula o'rinlidir.

$$\vec{W} = -k \operatorname{grad} u$$

Bu yerda  $k(x, y, z)$  - issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti.

Agar jism  $E^3$  fazoda berilgan bo'lsa  $\Omega$  soxaning chegarasi  $\Sigma$  bo'ladi. Shunda jismning issiqlik miqdori  $t$  vaqt momentida quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$\begin{aligned} Q_2 - Q_1 &= \iiint_{\Omega} c(M) \rho(M) u(M, t_2) d\tau_M - \iiint_{\Omega} c(M) \rho(M) u(M, t_1) d\tau_M = \\ &= (t_2 - t_1) \iiint_{\Omega} c(M) \rho(M) u_t(M, t_3) d\tau_M \end{aligned}$$

$[t_1; t_2]$  ( $Q(t_1) = Q_1, Q(t_2) = Q_2$ ) vaqt oralig'ini qaraymiz. Shunda

$$Q_2 - Q_1 = \iiint_{\Omega} c(M) \rho(M) u(M, t_2) d\tau_M - \iiint_{\Omega} c(m) \rho(M) u(m, t_1) d\tau_M$$

bo'ladi. Issiqlik miqdorining o'zgarishi tashqaridan issiqlik oqib kelish natijasida va ba'zi ichki manbaning (stoklarning) harakati tufayli ro'y beradi:

$$Q_2 - Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} \left[ - \iint_{\Sigma} (\vec{W}, \vec{n}) dv \right] dt + \int_{t_1}^{t_2} \left[ \iiint_{\Omega} F(M, t) d\tau \right] dt$$

Birinchi integral uchun Ostogradskiy-Gauss formulasini qo'llaymiz va o'rta qiymat haqidagi formulani esa ikkinchi integral uchun qo'llaymiz:

$$Q_2 - Q_1 = - \int_{t_1}^{t_2} \left[ \iiint_{\Omega} (\operatorname{div} \vec{W}) d\tau \right] dt + (t_1 - t_2) \iiint_{\Omega} F(M, t_4) d\tau$$

Bu yerda  $t_4 \in [t_1; t_2]$  ga qarashli.

Lagranj formulasidan quyidagi silliq (buni faraz qilamiz) u funksiya uchun foydalanamiz:

$$u(M, t_2) - u(M, t_1) = u_t(M, t_3)(t_2 - t_1), \quad t_3 \in [t_1; t_2]$$

Bundan quyidagini hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} Q_2 - Q_1 &= \iiint_{\Omega} c(M)\rho(M)u(M, t_2) d\tau_M - \iiint_{\Omega} c(M)\rho(M)u(M, t_1) d\tau_M = \\ &= (t_2 - t_1) \iiint_{\Omega} c(M)\rho(M)u_t(M, t_3) d\tau_M \end{aligned}$$

Demak,

$$(t_2 - t_1) \iiint_{\Omega} c(M)\rho(M)u_t(M, t_3) d\tau_M = - \int_{t_1}^{t_2} \left[ \iiint_{\Omega} (\operatorname{div} \vec{W}) dr_M \right] dt + (t_1 - t_2) \iiint_{\Omega} F(M, t_4) dr.$$

Endi hamma integral uchun umumlashtirilgan o'rat qiymat formulani qo'llaymiz:

$$c(M_1)\rho(M_1)u_t(M_1, t_3)V_{\Omega}(t_2 - t_1) = - \operatorname{div} \vec{W} \Big|_{M=M_2}^{t=t_3} V_{\Omega}(t_2 - t_1) + F(M_3, t_4)V_{\Omega}(t_2 - t_1),$$

Bunda  $t_3 \in [t_1; t_2]$ ,  $M_1, M_2 \in \Omega$ ,  $V_{\Omega} - \Omega$  ning hajmi bo'ladi.  $V_{\Omega}(t_2, t_1)$  ga qisqartirib,  $\Omega$  dan olingan biror bir  $M_1, M_2$  nuqtalar uchun quyidagini hosil qilamiz:

$$c(M_1)\rho(M_1)u_t(M_1, t_3)V_{\Omega}(t_2 - t_1) = - \operatorname{div} \vec{W} \Big|_{M=M_2}^{t=t_3} + F(M_3, t_4).$$

Endi biror  $M_0$  nuqtagacha  $\Omega$  ni qissak,  $[t_1, t_2]$  kesma ham  $t_0$  nuqtagacha qisiladi. Bundan ko'rinadiki  $M_1, M_2$  nuqtalar  $M_0$  ga o'tadi,  $t_3, t_4, t_5$  lar esa  $t_0$  ga. Bundan limitga o'tganda quyidagi hosil bo'ladi:

$$c(M_0)\rho(M_0)u_t(M_0, t_0) = - \operatorname{div} \vec{W} \Big|_{M=M_0}^{t=t_0} + F(M_0, t_0)$$

$\vec{W}$  uchun Fur'ye qonunini qo'llab quyidagini hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{W} &= \operatorname{div}(-k \operatorname{grad} u) = - \frac{\partial}{\partial x} k \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} k \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial z} k \frac{\partial u}{\partial z} \Rightarrow \\ \Rightarrow c(M_0)\rho(M_0)u_t(M_0, t_0) &= \frac{\partial}{\partial x} k \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} k \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} k \frac{\partial u}{\partial z} + F(M_0, t_0) \end{aligned}$$

$M_0, t_0$  nuqtalarni ixtiyoriy olganimiz sababli, hosil qilingan formulani butun  $[t_1, t_2]$  va  $\Omega$  ni soha uchun yoyish mumkin:

$$\begin{aligned} c(x, y, z)\rho(x, y, z)u_t(x, y, z, t) &= \frac{\partial}{\partial x} (k(x, y, z)u_x(x, y, z, t)) + \frac{\partial}{\partial y} (k(x, y, z)u_y(x, y, z, t)) + \\ &+ \frac{\partial}{\partial z} (k(x, y, z)u_z(x, y, z, t)) + F(x, y, z, t) \end{aligned}$$

Bu ifoda **fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi** deb nomlanadi.

$c, \rho, k$  larni konstanta da deb olib, quyidagi tenglik hosil qilamiz:

$$u_t = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + f(x, y, z, t), \quad a^2 = \frac{k}{c\rho}, \quad f = \frac{F}{c\rho} \quad (2.1)$$

Agar  $u, f$  faqat  $x$  va  $t$  o'zgaruvchilari bilan bog'liq bo'lsa, u holda bu tenglik quyidagicha yoziladi:

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad (2.2)$$

Fizik interpretasiyada bir jinsli yupqa sterjinda issiqlik o'tkazuvchanlik (yoyilish) tenglamasidir. (2.2) tenglamani biz keyinchalik **issiqlik o'tkazuvchi tenglamasi** deb yuritamiz.

Analogik fikrlashni boshqa bir fizik proseslar uchun ham o'tkazishimiz mumkin, masalan diffuziya uchun. Agar  $u(x, y, z, t)$ - fazoda gazning konsentratsiyasi bo'lsa, u holda **diffuziya tenglamasi** quyidagicha bo'ladi:

$$cu_t = \text{div}(D \text{gradu}) + F(x, y, z, t)$$

$D$  – diffuziya koeffitsiyenti

$F$  – biror bir funktsiya

## 2. [Bir fazoviy o'zgaruvchi bilan berilgan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi](#)

Quyidagi tenglamani qarab chiqamiz:

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t \leq T$$

Agar bizga sterjinning boshlang'ich vaqt momentidagi temperaturasi malum bo'lsa, u holda biz [boshlang'ich shartga](#) ega bo'lamiz:

$$u(x, 0) = \phi(x), \quad 0 \leq x \leq l$$

Agar chetlarida temperaturani o'zgarishini bilsak, u holda ayrim [chegaraviy shartlar](#) xosil qilamiz:

$$\begin{array}{l} x = l, 0 \leq t \leq T \\ \\ x = 0, 0 \leq t \leq T \end{array} \left\{ \begin{array}{l} (1) u(l, t) = \mu_2(t) - \text{birinchi chegaraviy shart} \\ (2) u_x(l, t) = v_2(t) - \text{ikkinchi chegaraviy shart} \\ (3) u_x(l, t) = -\lambda_2[u(l, t) - \theta_2(t)] - \text{uchinchi chegaraviy shart} \\ \\ (4) u(0, t) = \mu_1(t) - \text{birinchi chegaraviy shart} \\ (5) u_x(0, t) = v_1(t) - \text{ikkinchi chegaraviy shart} \\ (6) u_x(0, t) = -\lambda_1[u(0, t) - \theta_1(t)] - \text{uchinchi chegaraviy shart} \end{array} \right.$$

Bu shartlardan bir nechtasini tanlab har xil tipli masalalarni hosil qilamiz:

### [Birinci chegaraviy masala](#)

$$\left\{ \begin{array}{l} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < l, 0 < t \leq T \\ u(0, t) = \mu_1(t), \quad 0 \leq t \leq T \\ u(l, t) = \mu_2(t), \quad 0 \leq t \leq T \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad 0 \leq x \leq l \end{array} \right.$$

### [Ikkinchi chegaraviy masala](#)

$$\left\{ \begin{array}{l} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < l, 0 < t \leq T \\ u_x(0, t) = v_1(t), \quad 0 \leq t \leq T \\ u_x(l, t) = v_2(t), \quad 0 \leq t \leq T \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad 0 \leq x \leq l \end{array} \right.$$

### [Yarim to'g'ri chiziqdagi masala](#)

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x,t), & x > 0, 0 < t \leq T \\ u(0,t) = \mu(t), & 0 \leq t \leq T \\ u(x,0) = \phi(x), & x \geq 0 \end{cases}$$

### Koshi masalasi

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x,t), & -\infty < x < +\infty, 0 < t \leq T \\ u(x,0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

### 3. Birinchi chegaraviy masala yechimining mavjudligi

O'zgaruvchilarni ajratish usuli.

Birinchi chegaraviy masalaga kengroq to'xtalib o'tamiz:

$$[2.1] \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x,t), & 0 < x < l, 0 < t \leq T \\ u(0,t) = \mu_1(t), & 0 \leq t \leq T \\ u(l,t) = \mu_2(t), & 0 \leq t \leq T \\ u(x,0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

Yechimning mavjud va yagonaligini qarab o'tamiz, shu bilan birga turhunligini va **Grinn funksiyasini** qo'llashini qaraymiz. Birinchi chegaraviy masalaning yechima nima. Aniqki, birjinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi holatida  $\bar{u}(x,t)$  uzilishga ega bo'lgan funksiyalar tuplami qanoatlantiradi:

$$\begin{aligned} \bar{u}(x,t) &= const, (x,t) \in Q_T = \{(x,t) : (0;l) \times (0;T)\}; \\ \bar{u}(0,t) &= \mu_1(t); 0 \leq t \leq T; \\ \bar{u}(l,t) &= \mu_2(t); 0 \leq t \leq T; \\ \bar{u}(x,0) &= \phi(x); 0 \leq x \leq l. \end{aligned}$$

Shuning uchun funksiya dan uzluksizlikni talab qilamiz, bu talab bilan keyinchalik biz barcha funksiyani o'rganishdagi noqulayliklar bartaraf etamiz.

Ta'rif.  $u(x,t)$  funksiya [2.1] **issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun 1-chegaraviy masalasining yechimi** deyiladi, agar u quyidagi 3 shartni qanoatlantirsa:

1.  $u \in C[\bar{Q}_T]$
2.  $u_t, u_{xx} \in C[Q_T]$
3.  $u(x,t)$  [2.2]

Bir jinsli issiqlik o'tazuvchanlik tenglamasi nolinch chegaraviy shartlar bilan berilgan birinchi chegaraviy masala uchun yechimni topamiz:

$$[2.2] \begin{cases} (1) u_t = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, 0 < t \leq T; \\ (2) u(0,t) = 0, 0 \leq t \leq T; \\ (3) u(l,t) = 0, 0 \leq t \leq T; \\ (4) u(x,0) = \phi(x), 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Yechimni quyidagi yo'l bilan aniqlaymiz, avvalo berilgan tenglamani almashtirish yordamida biror  $u(x,t)$  funksiyani tuzatamiz, keyin esa, boshlang'ich shartlarga qo'yilgan ma'lum bir cheklanishlarda biz tuzgan funksiya 1-chi chegaraviy masalaning yechimi bo'lishini isbotlaymiz.

Yangi funksiyani aniqlaymiz:

$$v(x,t) = X(x)T(t)$$

Funksiyamizni issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasiga qo'yib quyidagini hosil qilamiz:

$$X(x)T'(t) = a^2 X''(x)T(t).$$



Tenglikning ikki tomonini ham  $a^2 X(x)T(t)$  ga bo'lamiz:

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

O'ng va chap tomondagi funksiyalar har xil o'zgaruvchilarga bog'lik bo'lganligi tufayli, aniqki ularning har ikkalasi ham biror konstantaga teng bo'ladi, biz uni  $-\lambda$  bilan belgilaymiz:

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

Bundan 2 ta tenglamaga ega bo'lamiz:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0; \quad (2.3)$$

$v(x, t)$  funksiyamiz uchun chegaraviy shartlarni yozib olamiz:

$$\begin{cases} v(0, t) = 0; \\ v(l, t) = 0. \end{cases} \quad t \in [0; T],$$

Quyidagini hosil qilamiz:

$$\begin{cases} X(0) = 0 \\ X(l) = 0. \end{cases}$$

(2.3) ni xosil bo'lgan sistema bilan birlashtirsak, **Shturm-Liuivill masalasini** hosil qilamiz:

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0; \\ X(0) = 0; \\ X(l) = 0. \end{cases}$$

Barcha  $\lambda$  larni topish talab qilinadi.

Differensial tenglama kursidan malumki,

$$\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2, n \in N \\ X_n(x) = c_n \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right), n \in N \end{cases}$$

$\lambda_n$  ni (2.4) ga qo'yib, quyidagi ko'rinishdagi tenglikni hosil qilamiz:

$$T_n'(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = 0.$$

Yechim

$$T_n = c_n^2 \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\} \quad \text{bo'ladi.}$$

$X_n(x)$  va  $T_n(t)$  ni birlashtirib quyidagini hosil qilamiz:

$$v_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = c_n \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\}$$

Qayd etib o'tamizki, xamma shunday funksiyalar (1) issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasining yechimi va (2), (3) chegaraviy shartlarni qanoatlantiradi.  $u(x, t)$  funksiyani qatorning yig'indisi sifatida aniqlaymiz:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(x, t)$$

Takidlab o'tamizki bu chegaraviy shartlarni qanoatlantiradi. Konstantalarni shunday tanlaymizki, boshlang'ich shartlar bajarilsin:

$$\phi(x) = u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right)$$

Tenglikni  $\sin\left(\frac{\pi m}{l} x\right)$  ga ko'paytiramiz (m-butun).  $x \rightarrow s$  almashtirish olamiz va s bo'yicha integrallaymiz:

$$\int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi m}{l} s\right) ds = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_0^l \sin\left(\frac{\pi m}{l} s\right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds.$$

$$\int_0^l \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \sin\left(\frac{\pi m}{l} x\right) dx = \begin{cases} 0, n \neq m; \\ l/2, n = m. \end{cases} \Rightarrow \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi m}{l} s\right) ds = \frac{l}{2} c_m \Rightarrow$$

$$c_m = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi m}{l} s\right) ds$$

Natijada u(x,t) uchun quyidagi formulani hosil qilamiz:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \left( \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\}. \quad (2.5)$$

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Ostragradskiy-Gauss formulasi
2. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi
3. Birinchi chegaraviy masalani yechimining ta'rifi.

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

1. Fur'ye qonuni
2. Chegaraviy shartlar
3. Boshlang'ich shartlar

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Birinchi chegaraviy masala
2. Ikkinchi chegaraviy masala
3. Yarim to'g'ri chiziqdagi masala
4. Koshi masalasi

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xaraktyerdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Presentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### 1.4. O'qitish usullari qoidalari

#### 1.4.1. Aqliy hujum qoidalari

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastik va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;

- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

#### 1.4.2. "Insert" texnikasi qoidalari

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- "Insert" jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
Agar «-» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

#### 1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemandamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

### Mavzu 7. Parabolik tipdagi tenglamalar

#### Ma`ruzaga reja-topshiriqlar

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O'quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

**Ma`ruza rejasi:**

1. Bir fazoviy o'zgaruvchi bilan berilgan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Mavjudlik teoremasi
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun maksimal qiymat prinsipi
3. Birinchi chegaraviy masalani yechimining yagonaligi.
4. Birinchi chegaraviy masalani yechimining turg'unligi.

**O'quv mashg'uloti maqsadi:**

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

**O'quv mashg'uloti masalalari:**

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarining matematik firflashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;

- *Rivojlantiruvchi*: kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi*: aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan birlashtirish, intizomlashtirish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari*: instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O'qitish shakllari*: frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari*: Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O'qitish sharoitlari*: texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring*: o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rni va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta'riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo'nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

### **• 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi**

#### **• 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi.); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;

- *Shakillar, usular, uslublar*: instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

## 2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma'ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati*: yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi,; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o'qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o'zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar*: frontav so'rov blits-so'rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

## 3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzu bo'yicha hulosa qilish, talabalarning e'tiborlarini asosiyalarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o'tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o'zaro baholashning natijalarini chiqarish; o'quv mashg'ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko'rsatgichlari va me'zonlari;
- *Talabalar faoliyati*: *ishning* tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo'llash; o'zaro baholashni o'tkazish, yo'l qo'yilgan hatolar bo'yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

### 1.3. O'quv-metodik materiallar

#### Ma'ruza rejasi:

1. Bir fazoviy o'zgaruvchi bilan berilgan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Mavjudlik teoremasi
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun maksimal qiymat prinsipi
3. Birinchi chegaraviy masalani yechimining yagonaligi.
4. Birinchi chegaraviy masalani yechimining turg'unligi.

Tayanch iboralar: issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi, fazoviy o'zgaruvchi, maksimum prinsipi, chegaraviy masala, yagonalik, turg'unlik

#### 1.3.1. Ma'ruza matni

- a. Bir fazoviy o'zgaruvchi bilan berilgan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Mavjudlik teoremasi

$$[2.1] \begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, 0 < t \leq T; \\ u(0, t) = \mu_1(t), & 0 \leq t \leq T; \\ u(l, t) = \mu_2(t), & 0 \leq t \leq T; \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Bizga malumki issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalaning yechimi quyidagicha:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} \beta\right) ds \left| \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\} \right. \quad (2.5)$$

#### Teorema 2.1(mavjudlik):

Faraz qilaylik bizga  $\phi(x)$  funksiya berilgan va u quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

$$1) \phi(x) \in C^1[0, l] \quad 2) \phi(0) = \phi(l) = 0$$

Shunda (2.5) formula [2.2] chegaraviy masalala uchun yechimlar sinfini aniqlanadi.

**Isboti.** (1)  $u(x, t)$  funksiyamiz  $\bar{Q}_T = [0, l] * [0, T]$  soxada uzluksiz ekanini ko'rsatishimiz kerak.

$$|u(x, t)| \leq \sum |v_n(x, t)| \leq \sqrt{\frac{2}{l}} \sum_{n=1}^{\infty} |\phi_n|. \quad \text{Bu yerda } \phi_n = \sqrt{\frac{2}{l}} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \quad \text{Agar bizlar } \sum_{n=1}^{\infty} |\phi_n|$$

qatorni yaqinlashishini ko'rsatsak, shunda Veyershtass alomatiga ko'ra  $\sum_{n=1}^{\infty} |v_n(x, t)|$  qator

tekis yaqinlashuvchi bo'ladi.

Olingan  $v_n(x, t)$  funksiya uzluksiz bo'lganligi sababli  $u(x, t)$  funksiyamiz ham uzluksiz bo'ladi, chunki bu funksiyamiz uzluksiz funksiyalardan tuzilgan tekis yaqinlashuvchi bo'lgan qator bilan aniqlanadi. Endi  $\phi_n$  funksiyani qaraymiz. Agarda bu funksiyani integrallasak quyidagicha bo'ladi.

$$\begin{aligned} \phi_n &= \sqrt{\frac{2}{l}} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = -\sqrt{\frac{2}{l}} \frac{1}{\pi n} \phi(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l + \sqrt{\frac{2}{l}} \int_0^l \phi'(s) \left(\frac{l}{\pi n}\right) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = \\ &= \frac{1}{n} \int_0^l \frac{l}{\pi} \phi'(s) \sqrt{\frac{2}{l}} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds. \end{aligned}$$

$$\bar{\phi}_n = \int_0^l \phi'(s) \sqrt{\frac{2}{l}} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \quad \text{belgilash olamiz.}$$

Ortonormallashtirilgan funksiyalar sistemasiga taluqli bo'lgan Bessel tengsizlikdan foydalansak bizlar quyidagi tengsizlikka kelamiz:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \bar{\phi}_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \int_0^l \phi'(s) \sqrt{\frac{2}{l}} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right)^2 \leq \int_0^l (\phi'^2(s)) ds$$

Endi bizlar  $\sum_{n=1}^{\infty} |\phi_n|$  qator uchun almashtirish olishimiz mumkin

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\phi_n| = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} |\bar{\phi}_n| \leq \left\{ ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \right\} \leq \frac{l}{\pi} \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \bar{\phi}_n^2 \right)$$

Qavs ichidagi 1-qator ma'lumki yaqinlashuvchi, 2-chi qator esa yangi ko'rsatganimizdek yaqinlashuvchi qator. Bundan xulosa Fur'ye koeffitsientlaridan iborat bo'lgan  $\sum_{n=1}^{\infty} |\phi_n|$  qator yaqinlashuvchi.

Demak avval ko'rsatganimizdek  $u(x, t)$  funksiyamiz uzluksizligini isbotladik.

(2) Endi bizlar  $Q_T$  sohada  $u_t, u_{xx}$  bo'yicha xosilalarning mavjudligi va uzluksizligini isbotlashimiz kerak. Barcha  $0 < x < l, t_0 < t < T$  (bu yerda  $t_0$  qandaydir ixtiyoriy musbat sonlar uchun  $u_{xx}$  funksiyamiz mavjud ekanligini ko'rsatamiz. Shunda bizlar  $u_{xx}$  funksiyamiz  $Q_T$  to'plam ustida mavjud ekanligini isbotlay olamiz. Endi bizlar (2.5) formula bilan berilgan  $u(x, t)$  funksiyamizni 2 marta  $x$  bo'yicha differensiallaymiz. Shunda  $u_{xx}(x, t) =$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \phi_n \sqrt{\frac{2}{l}} \left( -\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 \right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \cdot e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t} \quad \text{hosil bo'ladi. } e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t} \text{ ko'paytuvchimiz bizlarga } t_0 < t < T \text{ da mojaranta qatorining tekis yaqinlashuvchiligi beradi. Bu yerdan bizlar}$$

quyidagi xulosaga kelamiz: yuqorida berilgan  $u_{xx}(x, t)$  qator  $Q_T$  sohada tekis yaqinlashuvchiligi va mavjudligi kelib chiqadi. Endi  $u_{xx}(x, t)$  ni uzluksizligini ko'rsatishimiz kerak. Bu xulosa  $\sum_{n=1}^{\infty} (v_n(x, t))_{xx}$  qatorni har bir hadini uzluksizligidan kelib chiqadi.

(3) Endi  $u(x, t)$  funksiyamiz [2.2] chegaraviy masalaning barcha shartlarini qanoatlantiradi, chunki uni ko'rinishini chiqarganda bu shartlardan foydalangan edik.

## 2. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun maksimum prinsipi

$Q_T = \{(x, t) : (0, l) * (0, T]\}$  to'plamni qaraylik.

$\Gamma_T = \overline{Q_T} \setminus Q_T$  to'plamning chegarasi.

Bizlar  $u(x, t)$  funksiyamiz o'zining max qiymatiga  $\Gamma_T$  chegarada erishadi, agarda u issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasini qanoatlantirsa.

**Teorema 2.2 (max qiymat prinsipi):** Agar  $u(x, t) \in C[\overline{Q_T}]$ ,  $u_t, u_{xx} \in C[Q_T]$  va  $u_t = a^2 u_{xx}$ ,  $Q_T$  bo'lsin, u xolda  $\max_{Q_T} u(x, t) = \max_{\Gamma} u(x, t)$ ,  $\min_{Q_T} u(x, t) = \min_{\Gamma} u(x, t)$

bo'ladi.

**Isbot.** Bizlar max ga chegarada erishishini ko'rsatishimiz kerak. Teskarisi: faraz qilamiz  $\max_{\Gamma} u(x, t) = M$  va shunday  $(x_0, t_0) \in Q_T$  mavjudki, shu nuqtada funksiyaning qiymati:

$u(x_0, t_0) = M + \varepsilon, \varepsilon > 0$ . Endi yangi  $v(x, t)$  funksiyani quyidagicha aniqlaymiz:

$$v(x, t) = u(x, t) - \frac{\varepsilon}{2T}(t - t_0) \quad (2.6)$$

Bundan quyidagi tenglikni xosil qilish oson:  $v(x_0, t_0) = u(x_0, t_0) = M + \varepsilon$ . Bundan tashqari,

$t \in [0, T]$  bo'lganda  $\left| \frac{\varepsilon}{2T}(t - t_0) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$  bo'lganligi sababli

$\max_{\Gamma} v(x, t) = \max_{\Gamma} \left[ u(x, t) - \frac{\varepsilon}{2T}(t - t_0) \right] \leq M + \frac{\varepsilon}{2}$  tengsizlik o'rinlidir.

Demak shunday  $(x_1, t_1) \in Q_T$  nuqta mavjudki, bu nuqtada  $v(x, t)$  funksiyamiz max ga erishadi. Ikki marta differensiallanuvchi funksiyaning maksimumning zaruriy shartiga ko'ra

$\begin{cases} v_t(x_1, t_1) \geq 0 \\ v_{xx}(x_1, t_1) \leq 0 \end{cases}$ . Agar  $t_1 = T$  bo'lsa tengsizliklar qat'iy bo'ladi.

Endi biz (2.6) tenglikni ikkala tomonini  $t$  bo'yicha 2 marta differentsiallashdan quyidagini

xosil qilamiz:  $u_t(x, t) = v_t(x, t) + \frac{\varepsilon}{2T}$

Endi  $x$  bo'yicha 2 marta differensiallab quyidagini xosil qilamiz:  $u_{xx}(x, t) = v_{xx}(x, t)$ . Yuqorida yozilgan tengsizliklar sistemasidan quyidagi tengsizliklarni xosil qilamiz:

$$u_t(x_1, t_1) = v_t(x_1, t_1) + \frac{\varepsilon}{2T} > 0 \geq a^2 v_{xx}(x_1, t_1) = a^2 u_{xx}(x_1, t_1)$$

bu esa issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasiga zid. Biz qarama-qarshilikga keldik. Demak bizlar noto'g'ri faraz qilgan edik. Shuning uchun  $\max_{Q_T} u(x, t) = \max_{\Gamma} u(x, t)$  va birinchi qism isbotladi.



Teoremaning 2-qismini isbotlash uchun  $u(x, t)$  funksiyadan  $w(x, t) = -u(x, t)$  funksiyaga o'tish kerak. Xosil bo'lgan funksiya maksimumga erishgan nuqtalarda  $u(x, t)$  funksiya minimal qiymatlarga erishadi. Teorema isbotlandi. Chegaraviy masalalarga maksimum prinsipini qo'llasak, quyidagini xosil qilamiz. Endi

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, x \in (0, l), t \in (0, T) \\ u(0, t) = \mu_1(t), t \in [0, T] \\ u(l, t) = \mu_2(t), t \in [0, T] \\ u(x, 0) = \phi(x), x \in [0, l] \end{cases}$$

Shunda  $\max_{Q_T} u(x, t) = \max_{t \in [0, T]} \mu_1(t), \max_{t \in [0, T]} \mu_2(t), \max_{x \in [0, l]} \phi(x)$

Bu tenglik oddiy fizikaviy ma'noga ega. Sterjenning temperaturasi uning chegaralaridagi va boshlang'ich vaqt momentidagi temperaturasidan baland bo'lishi mumkin emas.

3. Birinchi chegaraviy masalani yechimining yagonaligi.

**Teorema 2.3(yagonalik).** Bizga  $u_1(x, t), u_2(x, t)$  funksiyalar

$$C[\overline{Q_T}], \quad \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, \frac{\partial u_i}{\partial t} \in C[Q_T], \quad i = 1, 2$$

sifdan olingan bo'lib, bu funksiyalarning ikkalasi ham [2.1] chegaraviy masalaning yechimi bo'lsa, shunda quyidagi tenglik o'rinli:  $u_1(x, t) \equiv u_2(x, t)$

Isboti: Yangi  $v(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$  funksiya kiritamiz. Shunda  $v \in C[\overline{Q_T}]$   $v_t, v_{xx} \in C[Q_T]$  bo'lishi aniq.

Bu funksiyamiz quyidagi masalaning yechimi bo'ladi

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx}, x \in (0, l), t \in (0, T) \\ v(0, t) = 0, t \in [0, T] \\ v(l, t) = 0, t \in [0, T] \\ v(x, 0) = 0, x \in [0, l] \end{cases}$$

$v(x, t)$  funksiya uchun max prinsipining barcha shartlari bajarilishi aniq. Demak max

prinsipini qo'llaganimizda  $\begin{cases} \max_{Q_T} v(x, t) = \max_{\Gamma} v(x, t) = 0 \\ \min_{Q_T} v(x, t) = \min_{\Gamma} v(x, t) = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow v(x, t) \equiv 0 \Rightarrow u_1(x, t) \equiv u_2(x, t)$  teorema isbotlandi.

#### 4. Birinchi chegaraviy masala turg'unligi.

**Lemma 1.** Bizlarga  $u_1(x, t)$  va  $u_2(x, t)$  funksiyalar berilgan va quyidagi shartlar bajarilsin:

$$u_i \in C[\overline{Q_T}], \quad \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, \frac{\partial u_i}{\partial t} \in C[Q_T], \quad i = 1, 2$$

va

$$\begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t} \geq a^2 \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, x \in (0, l), t \in (0, T), i = 1, 2 \\ u_1(0, t) \geq u_2(0, t), t \in [0, T] \\ u_1(l, t) \geq u_2(l, t), t \in [0, T] \\ u_1(x, 0) \geq u_2(x, 0), x \in [0, l] \end{cases}$$

o'rinli bo'lsa, shunda  $\overline{Q_T}$  sohada  $u_1(x,t) \geq u_2(x,t)$ .

**Isboti:**

Yana  $v(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t)$  bunda  $v \in C[\overline{Q_T}]$ ,  $v_t, v_{xx} \in C[Q_T]$  shu bilan birgalikda

$$\begin{cases} v_t = a^2 u_{xx}(x,t), x \in (0,l), t \in (0,T] \\ v(0,t) \geq 0, t \in [0,T] \\ v(l,t) \geq 0, t \in [0,T] \\ v(x,0) \geq 0, x \in [0,l] \end{cases}$$

o'rinli.

Endi bizlar max prinsipining 2-qismidan foydalanamiz:  $\min_{Q_T} v(x,t) = \min_{\Gamma} v(x,t) \geq 0$  demak

xulosa  $u_1(x,t) \geq u_2(x,t), (x,t) \in \overline{Q}$

Lemma isbotlandi.

**Birinchi chegaraviy masalani yechimining turg'unligi.**

**Teorema 2.4** (turg'unlik). Bizga  $u_1(x,t), u_2(x,t)$  funksiyalar berilgan va quyidagi shartlar:

$$\begin{cases} u_i \in C[\overline{Q_T}], \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, \frac{\partial u_i}{\partial t} \in C[Q_T], \quad i=1,2 \\ \frac{\partial u_i}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, x \in (0,l), t \in (0,T], i=1,2 \\ u_i(0,t) = \mu_1^i(t), t \in [0,T], i=1,2 \\ u_i(l,t) = \mu_2^i(t), t \in [0,T], i=1,2 \\ u_i(x,0) = \phi_i(x), x \in [0,l], i=1,2 \end{cases}$$

o'rinli bo'lsa, shunda

$$\max_{Q_T} |u_1(x,t) - u_2(x,t)| = \max \left\{ \max_{t \in [0,T]} |\mu_1^1(t) - \mu_1^2(t)|, \max_{t \in [0,T]} |\mu_2^1(t) - \mu_2^2(t)|, \max_{x \in [0,l]} |\phi_1(x) - \phi_2(x)| \right\}$$

tenglik o'rinli

Isboti:  $v(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t)$  almashtirish olamiz.

Unda

$$\begin{cases} v \in C[\overline{Q_T}] \\ v_t, v_{xx} \in C[Q_T] \\ v_t = a^2 u_{xx}(x,t), x \in (0,l), t \in (0,T] \end{cases}$$

Tengliklar o'rinli. Quyidagicha almashtirish olamiz:

$$\varepsilon = \max \left\{ \max_{t \in [0,T]} |\mu_1^1(t) - \mu_1^2(t)|, \max_{t \in [0,T]} |\mu_2^1(t) - \mu_2^2(t)|, \max_{x \in [0,l]} |\phi_1(x) - \phi_2(x)| \right\}, \varepsilon > 0$$

Bu tenglikdan  $\max_{\Gamma} |v(x,t)| \leq \varepsilon$  kelib chiqadi.

Demak  $-\varepsilon \leq v(x,t) \leq \varepsilon$ ,  $\Gamma$  to'g'ri chiziqda bajariladi:  $(-\varepsilon, v(x,t))$  va  $(v(x,t), \varepsilon)$  fuksiyalar uchun 1-lemmani qo'llasak  $-\varepsilon \leq u_1(x,t) - u_2(x,t) \leq \varepsilon$   $\overline{Q_T}$  sohada bo'ladi.

TEOREMA ISBOTLANDI.

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalaning echimi keltiring.

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Mavjudlik teoremasi
2. Yagonalik teoremasi
3. Turg'unlik teoremasi

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xarakterdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*

8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

## **1.4. O'qitish usullari qoidalari**

### **1.4.1. Aqliy hujum qoidalari**

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastic va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

### **1.4.2. “Insert” texnikasi qoidalari**

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- “Insert” jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
 Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
 Agar «←» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
 Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
 Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

### **1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari**

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemadamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

**Mavzu 8. “Umumiy chegaraviy masala yechimining yagonaligi va mavjudligi. Koshi masalasi yechimining mavjudligi va yagonaligi ”**

## **Ma`ruzaga reja-topshiriqlar**

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O`quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O`quv mashg`uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o`rganish.

### **Ma`ruza rejasi:**

1. Umumiy chegaraviy masala yechimining yagonaligi
2. Koshi masalasining yechimining mavjudligi.
3. Koshi masalasi yechimining mavjudligi teoremaning isboti.

### **O`quv mashg`uloti maqsadi:**

O`quv fani to`g`risida umumiy ta`surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

### **O`quv mashg`uloti masalalari:**

- *O`rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang`ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarning matematik firflashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag`zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o`tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo`llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o`rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg`ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan birlashtirish, intizomlashtirish.

### **O`qitish texnologiyasi:**

- *O`qitish usullari:* instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O`qitish shakillari:* frontal; jamoaviy;
- *O`qitish vositalari:* Ma`ruza matni; javdallar, multimediya;
- *O`qitish sharoitlari:* texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring:* o`g`zaki savol-javob, blits-so`rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o`quv fanlar sistemasidagi o`rni va roli bilan tanishtirish;
- O`quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o`quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o`qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O`qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O`quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;

- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o`qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta`riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo`nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to`liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag`ulotlarni bajarishda o`rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

- **1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi**

- **1 bosqich. O`quv mashg`ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O`qituvchining faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o`ziga ishonch, aniqligi,); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o`quv mashg`ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so`zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro`yhati; o`quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati:* o`quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko`rinish; o`quv materiallar va qo`llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o`quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko`rish;
- *Shakillar, usular, uslublar:* instruktaj; frontal so`rov; mustahkamlovchi so`rov.

- **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):**

- *O`qituvchining faoliyati:* mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o`tgan fanlar va mashg`ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo`yishni taklif etadi; birinchi savol bo`yicha matn o`qiladi; qo`shimcha o`quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo`yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati:* yangi mavzuda doir oldingi mashg`ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi,; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o`qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o`zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar:* frontav so`rov blits-so`rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

- **3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)**

- *O`qituvchining faoliyati:* mavzu bo`yicha hulosa qilish, talabalarning e`tiborlarini asosiyalarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o`tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o`zaro baholashning natijalarini chiqarish; o`quv mashg`ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko`rsatgichlari va me`zonlari;
- *Talabalar faoliyati:* ishning tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo`llash; o`zaro baholashni o`tkazish, yo`l qo`yilgan hatolar bo`yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar:* guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

- **1.3. O`quv-metodik materiallar**

**Ma`ruza rejasi:**

1. Umumiy chegaraviy masala yechimining yagonaligi
2. Koshi masalasining yechimining mavjudligi.

#### 4. Koshi masalasi yechimining mavjudligi teoremaning isboti.

Tayanch iboralar: chegaraviy masala, shartlar, yagonalik teoremasi, Koshi masalasi

##### 1.3.1. Ma`ruza matni

Umumiy chegaraviy masala yechimining yagonaligi.

$$[2.3] \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x,t); & 0 < t \leq T, \quad 0 < x < l; \\ \alpha_1 u(0,t) - a_2 u_x(0,t) = p(t); & 0 \leq t \leq T; \\ \beta_1 u(l,t) + \beta_2 u_x(l,t) = q(t); & 0 \leq t \leq T; \\ u(x,0) = \varphi(x); & 0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

Bu yerda  $\alpha_1 + \alpha_2 > 0$ ;  $\beta_1 + \beta_2 > 0$ . -manfiy bo'lmagan o'zgarmlar. Bu o'zgarmlar uchun quyidagi shart bajarilishi kerak.

$$\alpha_1 + \alpha_2 > 0; \quad \beta_1 + \beta_2 > 0;$$

Bu chegaraviy masala uchun quyidagi teorema o'rinli.

**Teorema 2.5 (yagonalik).** Faraz qilaylik,  $Q_T$  sohada  $u_1, u_2(x,t)$  funksiyalar aniqlangan bo'lsin. Bu funksiyalar quyidagi shartlarni qanoatlantiradi:

$$u_i, \frac{\partial u_i}{\partial x} \in C[\bar{Q}_T], \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u_i}{\partial t} \in C[Q_T], \quad i = 1, 2,$$

va bir xil [2.3] chegaraviy masalaning yechimlari bo'lsin.

Shunda  $\bar{Q}_T$  sohada  $u_1(x,t) = u_2(x,t)$

**Isbot.** Har doimdagidek  $v(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t)$ , funksiyani kiritamiz. Bu funksiya uchun quyidagi shartlar bajariladi:  $v, v_x \in C[\bar{Q}_T], v_t, v_{xx} \in C[Q_T]$  va  $v(x,t)$  funksiyamiz quyidagi chegaraviy masalani yechimi bo'ladi:

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx} & 0 < t \leq T, \quad 0 < x < l; \\ \alpha_1 v(0,t) - a_2 v_x(0,t) = 0; & 0 \leq t \leq T; \\ \beta_1 v(l,t) + \beta_2 v_x(l,t) = 0; & 0 \leq t \leq T; \\ v(x,0) = 0; & 0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

1-chi tenglamani ikkala tomonini  $2v$  ko'paytiramiz  $2vv_t = \frac{\partial}{\partial t}(v^2)$ , inobatga olsak, quyidagi tenglikni xosil qilamiz:

$$\frac{\partial}{\partial t}(v^2(x,t)) = 2a^2 v(x,t)v_{xx}(x,t).$$

Funksiyalarning tengligidan aniq integrallarning tengligi ham kelib chiqadi:

$$\int_0^l \int_0^t \frac{\partial}{\partial \tau}(v^2(x,\tau)) d\tau dx = 2a^2 \int_0^l \int_0^t v(x,\tau)v_{xx}(x,\tau) d\tau dx,$$

Bu tenglikning ung tomonida bizlar integrallash tartibini o'zgartira olalamiz:

$$\int_0^l \int_0^t \frac{\partial}{\partial \tau}(v^2(x,\tau)) d\tau dx = 2a^2 \int_0^t \left[ \int_0^l v(x,\tau)v_{xx}(x,\tau) dx \right] d\tau. \quad (2.7)$$

Bochlang'ich shartdan foydalansak, quyidagi tenglikga kelamiz:

$$\int_0^l \int_0^t \frac{\partial}{\partial \tau} (v^2(x, \tau)) d\tau dx = \int_0^l (v^2(x, \tau)) dx.$$

(2.7) ni o'ng tomonidagi ichki integralni bo'laklab integrallaymiz:

$$\int_0^l v(x, \tau) v_{xx}(x, \tau) dx = v(x, \tau) v_x(x, \tau) \Big|_0^l - \int_0^l (v_x(x, \tau))^2 dx.$$

chegaraviy shartlardan foydalansak esa, ixtiyoriy  $t \in [0, T]$  ychun:

$$v(l, t) v_x(l, t) = \begin{cases} 0, & \text{agar } \beta_1 = 0, \beta_2 > 0; \\ 0, & \text{agar } \beta_1 > 0, \beta_2 = 0; \\ -\frac{\beta_1}{\beta_2} v^2(l, t), & \text{agar } \beta_1 > 0, \beta_2 > 0. \end{cases}$$

$$v(0, t) v_x(0, t) = \begin{cases} 0, & \text{agar } \alpha_1 = 0, \alpha_2 > 0; \\ 0, & \text{agar } \alpha_1 > 0, \alpha_2 = 0; \\ -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} v^2(0, t), & \text{agar } \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0. \end{cases}$$

Bundan xulosa, agar belgilash kiritsak:

$$P(\tau) = v(x, \tau) v_x(x, \tau) \Big|_0^l = v(l, \tau) v_x(l, \tau) - v(0, \tau) v_x(0, \tau), \quad \text{shunda } P(\tau) \leq 0, \forall \tau \in [0; T].$$

demak [2.7] tenglikni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin.

$$\int_0^l v^2(x, t) dx - 2a^2 \int_0^t P(\tau) d\tau + 2a^2 \int_0^t \int_0^l v_x^2(x, \tau) dx d\tau = 0$$

Birinchi va uchinchi yig'indilar manfiy emas. Ikkinchi integralning manfiy emasligi,  $P(\tau)$  funksiyaning musbat emasligidan kelib chiqadi. Demak, bizlar uchta manfiy bo'lmagan funksiyaning yig'indisi 0 ga teng ekanligini ko'rsatdik. Demak har bittasi 0 ga teng deb xulosa qilamiz. Teoremani isbotining boshlanishida bizlar  $v(x, t)$  funksiyamizning uzluksiz

ekanligini ko'rsatgan edik. Ikkinchi tomondan  $\int_0^l v^2(x, t) dx = 0$  teng. Demak  $v(x, t) \equiv 0$ .

Xulosa qilib aytganda:  $u_2(x, t) \equiv u_1(x, t)$ . Teorema isbotlandi.

Koshi masalaning yechimining mavjudligi.

Bir jinsli Koshi masalasini qaraymiz:

$$[2.4] \begin{cases} (1) & u_t = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, & 0 < t < T; \\ (2) & u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

[2.4] 1-chegaraviy masalani yechimini topayotganimizdek bu yerda ham oldin malum bir almashtirishlarni o'tkazamiz. So'ngra esa hosil bo'lgan funksiya yechim ekanligini ko'rsatamiz.

$$v(x, t) = X(x)T(t).$$

$v(x, t)$  funksiyadan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasini qanoatlantirishini talab qilamiz:

$$T'(t)X(x) = a^2 X''(x)T(t).$$

Ikkala tomonini  $a^2 X(x)T(t)$  ga bo'lamiz, shunda hosil bo'lgan tengliklar quyidagicha:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda^2;$$

Bu yerda  $\lambda = const > 0$  ikkita tenglama xosil bo'ladi:



$$X''(x) + \lambda^2 X(x) = 0; \quad (2.8)$$

$$T'(t) + a^2 \lambda^2 T(t) = 0. \quad (2.9)$$

$X(x) = e^{i\lambda x}$  funksiya (2.8), tenglamaning yechimi bo'ladi. Xuddi shunday qilib  $T(t) = e^{-a^2 \lambda^2 t}$  funksiyamiz (2.9) tenglamaning yechimi bo'ladi. Demak,

$v(x, t) = e^{i\lambda x - a^2 \lambda^2 t}$  birinchi tenglamaning yechimi bo'ladi.

$u_\lambda = A(\lambda) e^{i\lambda x - a^2 \lambda^2 t}$  funksiya ham yechim bo'ladi ( $A(\lambda)$ -qandaydir funksiya)

Endi yakuniy funksiya quyidagicha aniqlanadi

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(\lambda) e^{i\lambda x - a^2 \lambda^2 t} d\lambda$$

boshlang'ich shartlarni qanoatlantirishini talab qilamiz

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda$$

Endi, Fur'ye almashtirishlar nazariyasidan kelib chiqqan holda  $A(\lambda)$  quyidagicha topamiz

$$A(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda s} \varphi(s) ds.$$

Shunday qilib bizlar  $u(x, t)$ : funksiya uchun quyidagi ko'rinishini xosil qilamiz

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda s} \varphi(s) ds \right] e^{i\lambda x - a^2 \lambda^2 t} d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{i\lambda(x-s) - a^2 \lambda^2 t} d\lambda \right] \varphi(s) ds.$$

$u(x, t)$ : uchun yechim shunday ko'rinishga ega:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \varphi(s) ds. \quad (2.10)$$

$$G(x, s, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\},$$

belgilash kiritasak:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, s, t) \varphi(s) ds.$$

$G(x, s, t)$  funksiyamiz issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasini s-fiksirlangan bo'lganda qanoatlantirishini ko'rsatamiz:

$$G_x(x, s, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \left(-\frac{2(x-s)}{4a^2 t}\right);$$

$$G_t(x, s, t) = \frac{1}{2\sqrt{4\pi a^2 t^{\frac{3}{2}}}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} + \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \frac{(x-s)^2}{4a^2 t^2}$$

$$G_{xx}(x, s, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \frac{(x-s)^2}{4a^2 t^2} + \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \left(-\frac{2}{4a^2 t}\right)$$

$G(x, s, t) = a^2 G_{xx}(x, s, t)$  ekanligini tekshirish oson.

Endi bizlar xosil bo'lgan funksiyamizni qandaydir boshlang'ich shartlarda mavjud ekanligini ko'rishimiz kerak.

### 3. Koshi masalasi yechimining mavjudlik teoremaning isboti.

**Teorem 2.6 (mavjudlik teoremasi).** [2.4] Koshi masalaning boshlang'ich shartlarini  $\varphi(x)$  yordamidi aniqlangan bo'lsin va

$$\varphi(x) \in C(R), |\varphi(x)| \leq M, \forall x \in R.$$

Shunda 2.10 formula bilan aniqlangan  $u(x, t)$  funksiya  $x \in R, t > 0$  bo'lganda uzluksiz bo'ladi,  $u_t, u_{xx}$  uzluksiz xosilalarga ega, agarda  $x \in R, t > 0$  bo'lsa, va issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamani qanoatlantiradi.  $x \in R, t > 0$  va  $\forall x_0 \in R \lim_{\substack{t \rightarrow 0+ \\ x \rightarrow x_0}} u(x, t) = \varphi(x_0)$  lar uchun

**Izox:** Teoremaning oxirgi sharti quyidagi ma'noga ega.

$$u(x, t) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \varphi(s) ds, & t > 0; \\ \varphi(x), & t = 0. \end{cases}$$

$(x, t) : x \in R, t \geq 0$

da uzluksiz ekanligini oxirgi shart bildiradi.

**ISBOT.**

1. Avvalombor  $u(x, t)$  funksiyamiz  $x \in R, t > 0$  uzluksiz ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun funksiyamiz  $\Pi_{L, t_0, T} = \{(x, t) : -L < x < L; t_0 < t < T\}$  to'g'ri to'rtburchakda uzluksiz ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Bu yerda  $L, t_0, T$  - musbat konstantalar.

Integral ostidagi funksiya  $\Pi_{L, t_0, T}$  to'g'ri to'rtburchakda uzluksiz  $u(x, t)$  funksiya  $\Pi_{L, t_0, T}$  da uzluksiz ekanligini isbotlash uchun 2.10 formulada bo'lgan integral tekis yaqinlashuvchi ekanligini ko'rsatishimiz kerak.

Tekis yaqinlashishining Veyershtrass alomatidan foydalanish uchun shunday  $F(s)$  funktsiyani ko'rish kerakki, bu funksiya quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

$$\begin{cases} |G(x, s, t)| \leq F(s) \forall x, t \in \Pi_{L, t_0, T}; \\ \int_{-\infty}^{+\infty} F(s) ds \end{cases}$$

integral yaqinlashuvchi. Buning uchun xar xil s-lar uchun exponentaning darajasini baxolash kerak.

Agar  $s \leq -2L$   $\frac{(x-s)^2}{t} \geq \frac{(L+s)^2}{T} \Rightarrow -\frac{(x-s)^2}{4a^2 t} \geq -\frac{(L+s)^2}{4a^2 T}$ .

Agar  $|s| \leq 2L$   $-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t} \leq 0$ . Agar  $s \geq 2L$

$$\frac{(x-s)^2}{t} \geq \frac{(L-s)^2}{T} \Rightarrow -\frac{(x-s)^2}{4a^2 t} \leq -\frac{(L-s)^2}{4a^2 T}.$$

Endi  $t_0 \leq t \leq T$  bo'lsin. Shunda 2.10 integralda berilgan birinchi ko'paytiruvchi uchun quyidagi tengsizlikni yozish mumkin:

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \leq \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t_0}}$$

demak

$$|G(x, s, t)| \leq F(s) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t_0}}, |s| \leq 2L; \\ \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t_0}} \exp\left\{-\frac{(L-s)^2}{4a^2 T} + \frac{L^2}{4a^2 T}\right\}, s \geq 2L; \\ \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t_0}} \exp\left\{-\frac{(L+s)^2}{4a^2 T} + \frac{L^2}{4a^2 T}\right\}, s \leq -2L; \end{cases}$$

bu yerda  $\frac{L^2}{4a^2 T}$  bu funksiyani daraja ko'rsatgichga kushib yozganimizning sababi quyidagicha.  $F(s)$  funksiyamiz uzluksiz bo'lishi uchun qo'shgan funksiyamiz baxolashga ta'sir qilmaydi.  $\int_{-\infty}^{+\infty} F(s) ds$  yaqinlashuvchi to'g'risidagi dalolatni eksponent beradi. Shunday qilib  $|\varphi(x)|$  funksiyaning chegaralanganligini xisobga olib 2.10 formulada bo'lgan integral ostidagi ifodaning modulini  $MF(s)$  baxolay olamiz.

Bu funksiyadan olingan integral esa yaqinlashuvchi. Demak Veyershtross alomatiga ko'ra 2.10 formulada berilgan integral tekis yaqinlashuvchi. Ya'ni  $u(x, t)$  funksiyamiz  $\Pi_{L, t_0 T}$  da to'g'ri to'rtburchakda uzluksiz ekanligini isbotladik.

2. Endi bizlar yuqorida ko'rsatilgan  $\Pi_{L, t_0 T}$  to'g'ri to'rtburchak ustida  $u_{xx}$  funksiyamiz uzluksiz ekanligini ko'rsatishimiz kerak.  $G(x, s, t)$  funksiyamizning ko'rinishidan foydalanib quyidagi tenglikka kelamiz.

$$\begin{aligned} |G_{xx}(x, s, t)| &= \left| \frac{(x-s)^2}{4a^4 t^2} G(x, s, t) - \frac{1}{2a^2 t} G(x, s, t) \right| \leq \\ &\leq F(s) \left[ \frac{1}{2a^2 t_0} + \frac{L^2 + 2Ls + s^2}{4a^2 t_0^2} \right] = F_1(s). \end{aligned}$$

qavs ichida yozilgan 2-hadning suratidagi yozilgan ko'phad  $F(s)$  funksiyaning integraliga ta'sir qilmaydi. Shunda quyidagi ifodani xosil qilamiz.

$$\begin{aligned} u_{xx}(x, t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} G_{xx}(x, s, t) \varphi(s) ds \leq \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |G_{xx}(x, s, t)| |\varphi(s)| ds \leq M \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(s) ds < \infty \end{aligned}$$

Demak xosiladan olingan integral tekis yaqinlashuvchi. Xulosa qilib aytganda  $u_{xx}(t)$  funksiyamiz xam uzluksiz. Xuddi shunday qilib  $u_t$  funksiyamiz xam uzluksiz funksiya ekanligini ko'rishimiz mumkin.

3.  $G(x, s, t)$  funksiyamiz issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamani qanoatlantiruvchi funksiya ekanligini yuqorida ko'rsatgan edik. Bu yerda

$$u_t(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G_t(x, s, t) \varphi(s) ds = a^2 u_{xx}(x, t) = a^2 \int_{-\infty}^{+\infty} G_{xx}(x, s, t) \varphi(s) ds$$

yani  $u(x, t)$  funksiyamiz issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamaga mos keladi.

4. Demak

$$\forall x_0 \in R \lim_{\substack{t \rightarrow 0+ \\ x \rightarrow x_0}} u(x, t) = \varphi(x_0)$$

$$\forall x_0 \forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall x, t : t, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |u(x, t) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$$

Endi bizlar  $x_0$  nuqtani va ixtiyoriy  $\varepsilon > 0$  ni fiksirlaymiz.  $\varphi(x)$  funksiyamiz uzluksizligidan

$$\exists \Delta : |x - x_0| < \Delta \Rightarrow |\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{4}$$

kelib chiqadi.

Endi  $|u(x, t) - \varphi(x_0)|$  qaraymiz:

$$\begin{aligned} |u(x, t) - \varphi(x_0)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} G_t(x, s, t) \varphi(s) ds - \varphi(x_0) \right| \leq \\ &\leq \left| \int_{-\infty}^{x_0 - \Delta} G(x, s, t) \varphi(s) ds \right| + \left| \int_{x_0 + \Delta}^{+\infty} G(x, s, t) \varphi(s) ds \right| + \\ &\left| \int_{x_0 - \Delta}^{x_0 + \Delta} G(x, s, t) (\varphi(s) - \varphi(x_0)) ds \right| + \left| \int_{x_0 - \Delta}^{x_0 + \Delta} G(x, s, t) \varphi(x_0) ds - \varphi(x_0) \right| \end{aligned}$$

$J_1, J_2, J_3$  va  $J_4$ -lar bilan integrallarni belgilasak, quyidagilarni xosil qilamiz.

Bizlar  $J_3$  ifodani baxolaymiz.  $\Delta$  oralikda  $|\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{4}$  bo'lganligi sababli va

$\int_{-\infty}^{+\infty} G ds = 1$  bo'lganligi sababli quyidagini xosil qilamiz:

$$\begin{aligned} |J_3| &= \left| \int_{x_0 - \Delta}^{x_0 + \Delta} G(x, s, t) (\varphi(s) - \varphi(x_0)) ds \right| \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{4} \int_{x_0 - \Delta}^{x_0 + \Delta} G(x, s, t) ds \leq \frac{\varepsilon}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, s, t) ds \end{aligned}$$

Bundan  $|J_3| \leq \frac{\varepsilon}{4}$

Endi  $|x - x_0| < \delta_1 < \frac{\Delta}{2}$  talab qilamiz. Kelajakda olingan baxolar faqat shunaqa  $x$ -lar uchun.

$|J_4|$  : baxolaymiz:

$$\begin{aligned}
|J_4| &= \left| \int_{x_0-\Delta}^{x_0+\Delta} G(x,s,t)\varphi(x_0)ds - \varphi(x_0) \right| \leq \\
&\leq |\varphi(x_0)| \left| \int_{x_0-\Delta}^{x_0+\Delta} G(x,s,t)ds - 1 \right| = \\
&= \left\{ z \leftrightarrow \frac{s-x}{\sqrt{4a^2t}} \right\} = |\varphi(x_0)| \left| \int_{\frac{x_0-\Delta-x}{\sqrt{4a^2t}}}^{\frac{x_0+\Delta-x}{\sqrt{4a^2t}}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} dz - 1 \right|
\end{aligned}$$

Endi bizlar  $t$  ni kamaytirsak shunda integralning quyidagi chegarasi  $-\infty$  ga, yuqoridagi chegarasiga  $+\infty$  intiladi.

Shuning uchun,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} dz = 1 \text{ bo'lganligi sababli,}$$

$$\exists \delta_2 : t < \delta_2 \Rightarrow |J_4| \leq |\varphi(x_0)| \left| \int_{\frac{x_0-\Delta-x}{\sqrt{4a^2t}}}^{\frac{x_0+\Delta-x}{\sqrt{4a^2t}}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} dz - 1 \right| \leq \frac{\varepsilon}{4}$$

o'rinli

Endi  $|J_1|$  baxolaymiz.

$$\begin{aligned}
|J_1| &= \left| \int_{-\infty}^{x_0-\Delta} G(x,s,t)\varphi(s)ds \right| \leq \left| \int_{-\infty}^{x_0-\Delta} \frac{1}{4\pi a^2 t} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2t}\right\} \right. \\
&Mds \left. \right| = \left\{ z \leftrightarrow \frac{-(x-s)}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \right\} = \frac{M}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{-x+x_0-\Delta}{\sqrt{4a^2t}}} e^{-z^2} dz
\end{aligned}$$

Demak shunday  $\delta_3$  mavjudki  $\forall t < \delta_3$  bo'lganda  $|J_1| \leq \frac{\varepsilon}{4}$  bo'ladi.

Xuddi shunday  $|J_2|$  baxolash mumkin.

Shunday qilib

$$\begin{aligned}
|u(x,t) - \varphi(x_0)| &\leq |J_1| + |J_2| + |J_3| + |J_4| \leq \varepsilon \Rightarrow \\
&\Rightarrow \forall x_0 \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3) : \forall x, t : |x - x_0| < \delta \\
|u(x,t) - \varphi(x_0)| &< \varepsilon
\end{aligned}$$

Teorema to'liq isbotlandi.

**Natija 1:** Agarda teoremaning barcha shartlari ( $\varphi(x) \in C(R), |\varphi(x)| \leq M$ ) bajarilsa, demak biz  $u(x,t)$  funksiyamiz chegaralangan ekanligini xulosa qilishimiz mumkin.

$$|u(x,t)| = \int_{-\infty}^{+\infty} |G(x,s,t)| |\varphi(s)| ds \leq M \int_{-\infty}^{+\infty} G(x,s,t) ds = M.$$

**Natija 2:** Xuddi shunday qilib  $(R \times R^+)$  fazoda  $u(x,t)$  funksiyamiz cheksiz uzluksiz ekanligini xosil qilishimiz mumkin.

$$\frac{\partial^p u}{\partial x^k \partial t^m}(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^p G}{\partial x^k \partial t^m}(x, s, t) \varphi(s) ds, \quad (k+m=p)$$

bu integral esa tekis yaqinlashuvchi bulib, buni teorema isbotidagi tasdiklar orkali ko'rsatish mumkin.

**Natija 3:** Koshi masalasidagi shartlarni kabul qilib, biz issiqlik tarkalishining "cheksiz" tezligiga ega bo'lamiz.

Faraz qilaylik  $\varphi(x) = u(x, 0)$  uzluksiz funksiyamiz  $[a, b]$  oralikdan boshka barcha joyda nolga teng bo'lsin. U xolda quyidagiga ega bo'lamiz.

$$u(x, t) = \int_a^b G(x, s, t) \varphi(s) ds > 0 \quad \forall t > 0, \forall x \in R$$

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Umumiy chegaraviy masalaning qo'yilishi
2. Yagonalik teoremasi
3. Koshi masalasi

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar:* takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish:* yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xarakterdagi ishlar:* muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixltn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### 1.4. O'qitish usullari qoidalari

#### 1.4.1. Aqliy hujum qoidalari

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastic va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

#### 1.4.2. "Insert" texnikasi qoidalari

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- "Insert" jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
Agar «→» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

### 1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemandamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

**Mavzu 9. Yarim to'g'ri chiziqda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi va ikkinchi chegaraviy masalaning yechimini mavjudligi. Birinchi chegaraviy masala uchun Grin funksiyasi**

### Ma`ruzaga reja-topshiriqlar

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O'quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

**Ma`ruza rejasi:**

1. Koshi masalasi yechimining yagonaligi.
2. *Yarim to'g'ri chiziqda qo'ydagi birinchi chegaraviy masala.*
3. *Yarim to'g'ri chiziqda qo'ydagi ikkinchi chegaraviy masala.*
4. *Birinchi chegaraviy masala uchun Grin funksiyasi*
5. *Grin funksiyasining xossalari*

**O'quv mashg'uloti maqsadi:**

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

**O'quv mashg'uloti masalalari:**

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarning matematik firlashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan birlashtirish, intizomlashtirish.



### **O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari*: instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O'qitish shakllari*: frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari*: Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O'qitish sharoitlari*: texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring*: o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rni va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakllanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta`riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo`nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

### **• 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi**

#### **• 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;
- *Shakillar, usular, ushblar*: instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

#### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati*: yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib

borishadi; “Insert” usuli bilan belgilan o’qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o’zaro;

- *Shakillar, usular, uslublar*: frontav so’rov blits-so’rov; aqliy hujum, “Insert” texnikasi.

### **3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)**

- *O’qituvchining faoliyati*: mavzu bo’yicha hulosa qilish, talabalarning e’tiborlarini asosiyalarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o’tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o’zaro baholashning natijalarini chiqarish; o’quv mashg’ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko’rsatgichlari va me’zonlari;
- *Talabalar faoliyati*: *ishning tahlili*; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo’llash; o’zaro baholashni o’tkazish, yo’l qo’yilgan hatolar bo’yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

#### **1.3. O’quv-metodik materiallar**

#### **Ma’ruza rejasi:**

1. Koshi masalasi yechimining yagonaligi.
2. *Yarim to’g’ri chiziqda qo’ydagi birinchi chegaraviy masala.*
3. *Yarim to’g’ri chiziqda qo’ydagi ikkinchi chegaraviy masala.*
4. *Birinchi chegaraviy masala uchun Grin funksiyasi*
5. *Grin funksiyasining xossalari*

**Tayanch iboralar:** Koshi masalasi, mavjudlik teoremasi, yagonalik teoremasi. *issiqlik o’tkazuvchanlik tenglamasi, birinchi chegaraviy masala, Koshi masalasi, ikkinchi chegaraviy masal, Grin funksiyasi*

### 1.3.1. Ma`ruza matni

#### 1. Koshi masalasi yechimining yagonaligi.

Yuqorida bizlar chegaralangan va uzluksiz boshlangich shartlar uchun Koshi masalaning yechimini mavjudligini isbotlagan edik. Endi yuqoridagi shartlarda bizlar yagonalik teoremasini isbotlaymiz.

**Teorema 2.7 (yagonalik).** Koshi masalasi berilgan bo'lsin. Faraz qilaylik  $(R \times R^+)$  fazoda bizlarga 2 ta uzluksiz  $u_1, u_2(x, t)$  funksiyalar berilgan bo'lsin va ular [2.4] masalaning yechimlari bulib, quyidagi shartlarni qanoatlantirsin.

$$\begin{aligned} |u_i(x, t)| &\leq M, \forall (x, t) \in R \times \bar{R}^+; \\ \frac{\partial u_i}{\partial t}, \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} &\in C(R \times R^+) \end{aligned} \quad i = 1, 2$$

shunda

$$u_1(x, t) = u_2(x, t) \forall (x, t) \in (R \times \bar{R}^+)$$

**Isbot:** Yangi funksiya kiritamiz.  $u(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$

Aniqli bu funksiya xam uzluksiz funksiya bo'ladi va quyidagi shartlarni qanoatlantiradi.

$$\begin{cases} u_t, u_{xx} \in C(R \times \bar{R}^+); \\ u_t = a^2 u_{xx}; \\ u(x, 0) = 0, \forall x \in R \\ |u(x, t)| \leq 2M, \forall (x, t) \in (R \times \bar{R}^+); \end{cases}$$

Teoremani isbotlash uchun  $u(x, t)$  funksiyamiz aynan nolga teng ekanligini isbotlashimiz kerak. Buning uchun qandaydir ixtiyoriy  $(x_0, t_0)$  nuqtada nolga teng ekanligini ko'rsatish kerak. Buning uchun 2 ta konstanta **L** va **T** olamiz. Ularni shunday qilib olish kerakki ular quyidagi to'g'rito'rtburchakka qarashli bo'lsin.

Bu yerda  $\Pi_{L, T}$  - to'g'rito'rtburchakning chegarasi bo'lsin.

$$\begin{aligned} \Pi_{L, T} &= \{(x, t) : |x| \leq L, 0 \leq t \leq T\}, \\ v_t^L, v_{xx}^L &\in C[\Pi_{L, T}]; \\ v_t^L &= a^2 v_{xx}^L \in C[\Pi_{L, T}]; v^L(x, t) = \frac{4M}{L^2} \left( \frac{x^2}{2} + a^2 t \right) \end{aligned}$$

Yuqorida bizlar  $u(x, t)$  funksiya uchun baxolarni olgan edik. Shundan xulosa qilib aytganda  $\Pi_{L, T}$  chegara ustida  $v^L(x, t) \geq u(x, t)$  bo'ladi.

Endi maksimum prinsipidan foydalansak,

$$\begin{aligned} v^L(x, t) &\geq u(x, t) \forall (x, t) \in \Pi_{L, T}. \\ -v^L(x, t) &\leq u(x, t) \forall (x, t) \in \Pi_{L, T}. \end{aligned}$$

Bundan

$$|u(x_0, t_0)| \leq v^L(x_0, t_0) = \frac{4M}{L^2} \left( \frac{x_0^2}{2} + a^2 t_0 \right)$$

Endi **L** n cheksizlikka intiltirsak quyidagiga ega bo'lamiz.

$$|u(x_0, t_0)| \leq v^\infty(x_0, t_0) = 0$$

**Teorema isbotlandi.**

## 2. Yarim to'g'ri chiziqda qo'ydagi birinchi chegaraviy masala.

Yarim to'g'ri chiziqda qo'ydagi birinchi chegaraviy masalani ko'rib chiqamiz:

$$[2.5] \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0; \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0; \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0. \end{cases}$$

bu yerda  $\phi(x) = 0$ .

Butun Haqiqiy o'qda boshlang'ich shartni beruvchi  $\phi(x)$  funksiyani toq qilib davom ettirib yechimni topamiz:

$$\Phi(x) = \begin{cases} \phi(x), & x \geq 0; \\ -\phi(-x), & x < 0. \end{cases}$$

Mos ravishda qo'ydagi Koshi masalasini ko'rib chiqamiz:

$$[2.6] \begin{cases} U_{tt} = a^2 U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0; \\ U(0, t) = 0, & t \geq 0; \\ U(x, 0) = \Phi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Uning yechimi bizga malum:

$$U(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds.$$

Aytaylik  $(x, t) \in (\bar{R}^+ \times \bar{R}^+)$  da  $u(x, t) = U(x, t)$ . Bu funksiya [2.5] ning yechimi ekanligini ko'rsatamiz. Koshi masalasining qo'yilishiga ko'ra,

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0; \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0. \end{cases}$$

ekanligi malum. Chegaraviy shartni bajarilishini tekshiramiz:

$$u(0, t) = U(0, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{s^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds.$$

Integral ostida juft va toq funksiyalarning ko'paytmasi turibdi, shuning uchun u nolga teng. Chegaraviy shart bajarilayapti. endi yechim uchun to'liq formulani olamiz:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds = \\ &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} (-\phi(-s)) ds + \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \phi(s) ds = \\ &= -\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x+s)^2}{4a^2 t}\right\} \phi(s) ds + \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \phi(s) ds = \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \left[ \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} - \exp\left\{-\frac{(x+s)^2}{4a^2 t}\right\} \right] \phi(s) ds. \end{aligned}$$

Demak,

$$u(x, t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \left[ \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} - \exp\left\{-\frac{(x+s)^2}{4a^2 t}\right\} \right] \phi(s) ds. \quad (2.11)$$

bu yarim to'g'ri chiziqda birinchi chegaraviy masalaning yechimi bo'ladi.

## 3. Yarim to'g'ri chiziqda ikkinchi chegaraviy masala

Yarim to'g'ri chiziqda ikkinchi chegaraviy masala qo'ydagi ko'rinishga ega:

$$[2.7] \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0; \\ u_x(0, t) = 0, & t \geq 0; \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0. \end{cases}$$

Yana yechimni topish uchun boshlang'ich shartni beruvchi funksiyani endi juft qilib davom ettiramiz:

$$\Phi(x) = \begin{cases} \phi(x), & x \geq 0; \\ \phi(-x), & x < 0. \end{cases}$$

Boshlang'ich shartni o'zgartirib, quyidagi koshi masalasini olamiz:

$$\begin{cases} U_t = a^2 U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0; \\ U(0, t) = 0, & t \geq 0; \\ U(x, 0) = \Phi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Xuddi shunday uning yechimi

$$U(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds \quad \text{funksiya bo'ladi.}$$

Aytaylik  $(x, t) \in (\bar{R}^+ \times \bar{R}^+)$  da  $u(x, t) = U(x, t)$  bo'lsin.

Yana

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0; \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0. \end{cases}$$

ekanligi aniq.

Chegaraviy masalaning bajarilishini tekshiramiz:

$$u_x(x, t) = U_x(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \left(-\frac{(x-s)}{2a^2 t}\right) \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds \Rightarrow$$

$$u_x(0, t) = U_x(0, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \left(\frac{s}{2a^2 t}\right) \exp\left\{-\frac{s^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds \quad \forall t \geq 0.$$

Hosil bo'lgan integral ostida 2 ta juft va bitta toq funksiyaning ko'paytmas turibdi, demak u nolga aylanadi. Chegaraviy shart bajarilmoqda. [2.7] ning yechimi uchun qo'ydagi formulani xosil qilamiz:

$$u(x, t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x+s)^2}{4a^2 t}\right\} \phi(s) ds + \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \phi(-s) ds =$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \left[ \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} + \exp\left\{-\frac{(x+s)^2}{4a^2 t}\right\} \right] \phi(s) ds.$$

Bu yarim to'g'ri chiziqda 2-chegaraviy masalaning yechimidir.

#### 4. Birinchi chegaraviy masala uchun Grin funksiyasi.

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0; \\ u(0, t) = 0, & 0 \leq t \leq T; \\ u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T; \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Malumki, uning yechimi qo'ydagi ko'rinishga ega:

$$u(x, l) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \left( \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\}.$$

Uni Koshi masalasini yechishda qo'llaganimizday boshqacha ko'rinishda ifodalashimiz mumkin:

$$u(x,t) = \int_0^l G(x,s,t)\phi(s)ds,$$

$$G(x,s,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \sin\left(\frac{\pi n}{l}s\right) \sin\left(\frac{\pi n}{l}x\right) \exp\left\{-a^2\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\}. \quad (2.12)$$

-bu birinchi chegaraviy masala uchun Grin funksiyasidir.

### 5. Grin funksiyasining xossalari

**1-xossa.**  $G(x,s,t) = G(s,x,t)$ .

Bu xossa Grin funksiyasining tarifidan kelib chiqadi.

**2-xossa.**  $G(x,s,t) \in C^\infty(R \times R \times R^+)$ .

**Isboti:**  $(x,s,t)$  nuqtada uzluksizligini isbotlaymiz. Buning uchun,  $t > t_0$  da Veyershtress alomatiga ko'ra tekis yaqinlashuvchi ekanligini aytib o'tish yetarli, chunki uni eksponentialardan iborat yaqinlashuvchi qator bilan chegaralash mumkin:

$$|G(x,s,t)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \exp\left\{-a^2\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t_0\right\}.$$

Differensiallanuvchiligini isbotlash uchun, Hosilalardan iborat qator tekis yaqinlashishini takidlash yetarli, chunki differensiallash natijasida yani ko'paytuvchilar sifatida faqatgina palinomlar Hosil bo'ladi. Ular Halaqit bermaydi, ekisponenta baribir yaqinlashuvchilikni taminlaydi.

$$\mathbf{3-xossa.} \quad \begin{cases} G_t = a^2 G_{xx}; \\ G_t = a^2 G_{ss}; \end{cases}$$

Birinchi tenglamani (2.12) formulani differensiallash orqali, ikkinchi tenglamani esa 1-xossadagi tenglamani differensiallash orqali tekshirish mumkin.

**4-xossa.**  $G(x,s,t) \geq 0$ ,  $x,s \in [0;l]$ ,  $t > 0$ .

**Isboti:** Ixtiyoriy  $(x,s_0,t)$  nuqta uchun isbotlaymiz.  $\phi_h(x)$  funksiya  $(s_0-h; s_0+h)$  intervalda qandaydir  $\tilde{\phi}(x)$  musbat funksiyaga, intervaldan tashqarisida esa 0 ga teng bo'lsin:

$$\phi_h(x) = \begin{cases} \tilde{\phi}(x) > 0 & , x \in (s_0-h; s_0+h); \\ 0, & x \in [0,l] \setminus (s_0-h, s_0+h). \end{cases}$$

Bundan tashqari, quydagi shartlarni qanoatlantirsin:

$$\begin{cases} \phi_h(x) \in C[0;l]; \\ \int_0^l \phi_h(x) dx = 1. \end{cases}$$

va [2.2] turdagi qandaydir chegaraviy masala uchun boshlang'ich shartni bersin. U Holda bu chegaraviy masalaning yechimi bo'lgan  $u_h(x,t)$  funksiya quyidagi formila bilan anioqlanadi:

$$\begin{aligned} u_h(x,t) &= \int_0^l G(x,s,t)\phi_h(x)ds = \int_{s_0-h}^{s_0+h} G(x,s,t)\phi_h(s)ds = \\ &= G(x,\theta,t) \int_{s_0-h}^{s_0+h} \phi_h(s)ds = G(x,\theta,t), \theta \in (s_0-h; s_0+h). \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} G(x, \theta, t) = \lim_{h \rightarrow 0} u_h(x, t) \Rightarrow$$

$$G(x, s_0, t) = \lim_{h \rightarrow 0} u_h(x, t). \quad (2.12)$$

$u_h(0, t) \equiv 0 \equiv u_h(l, t)$ : bo'lgan xolda maksimal qiymat prinsipini qo'llaymiz:

$$\min_{\substack{x \in [0; l] \\ t \in [0; T]}} u_h(x, t) = \min \{0, 0, \min_{x \in [0; l]} \phi(x)\} = 0.$$

(2.13) ga ko'ra,  $G(x, s_0, t)$ . manfiy emasligini aniqlaymiz.

4-xossa isbotlandi.

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalaning keltiring.
2. Yarim to'g'ri chiziqda 1-chi chegaraviy masalaning yechimini keltiring.
3. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun ikkinchi chegaraviy masalaning keltiring.
4. Yarim to'g'ri chiziqda 2-chi chegaraviy masalaning yechimini keltiring.
5. Birinchi chegaraviy masala uchun Grin funksiyasi yozing.

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

4. Koshi masalasi
5. Yagonalik teoremasi
6. Mavjudlik teoremasi

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Grin funksiyasining 1-chi xossasini isbotlang.
2. Grin funksiyasining 2-chi xossasini isbotlang.
3. Grin funksiyasining 3-chi xossasini isbotlang.
4. Grin funksiyasining 4-chi xossasini isbotlang.

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xaraktyerdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.
2. Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,

3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### **1.4. O'qitish usullari qoidalari**

#### **1.4.1. Aqliy hujum qoidalari**

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastik va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

#### **1.4.2. "Insert" texnikasi qoidalari**

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- "Insert" jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;



Agar «-» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

### 1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemadamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

## Mavzu 10. “Laplas va Puasson tenglamalari. Grin formulasi.”

### Ma`ruzaga reja-topshiriqlar

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O'quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

**Ma`ruza rejasi:**

1. Laplas va Puasson tenglamalari. Chegaraviy masalalarning qo'yilishi. Laplas tenglamasining fundamental yechimi.
2. Birinchi Grin formulasi.
3. Grinning ikkinchi formulasi.
4. Grinning uchinchi formulasi. Tayanch iboralar: Laplas, Puasson, Grin, tenglama, fundamental yechim, formula,

**O'quv mashg'uloti maqsadi:**

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

**O'quv mashg'uloti masalalari:**

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarining matematik firlashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarining izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarining ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik

fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan birlashtirish, intizomlashtirish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari*: instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O'qitish shakllari*: frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari*: Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O'qitish sharoitlari*: texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring*: o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rni va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakllanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta`riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo`nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

#### **• 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi**

#### **• 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi,); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;
- *Shakllar, usular, uslublar*: instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

#### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural

obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);

- *Talabalar faoliyati:* yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o'qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o'zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar:* frontav so'rov blits-so'rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

### 3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)

- *O'qituvchining faoliyati:* mavzu bo'yicha hulosa qilish, talabalarning e'tiborlarini asosiyalarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o'tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o'zaro baholashning natijalarini chiqarish; o'quv mashg'ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko'rsatgichlari va me'zonlari;
- *Talabalar faoliyati:* ishning tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo'llash; o'zaro baholashni o'tkazish, yo'l qo'yilgan hatolar bo'yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar:* guruhlarda ishlash, kartochnalarda topshiriqlar.

#### 1.3. O'quv-metodik materiallar

#### Ma'ruza rejasi:

1. Laplas va Puasson tenglamalari. Chegaraviy masalalarning qo'yilishi. Laplas tenglamasining fundamental yechimi.
2. Birinchi Grin formulasi.
3. Grinning ikkinchi formulasi.
4. Grinning uchinchi formulasi. Tayanch iboralar: Laplas, Puasson, Grin, tenglama, fundamental yechim, formula,

*Tayanch iboralar:* Koshi masalasi, mavjudlik teoremasi, yagonalik teoremasi. *Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi, birinchi chegaraviy masala, Koshi masalasi, ikkinchi chegaraviy masal, Grin funksiyasi*

#### 1.3.1. Ma'ruza matni

$E^3$  fazoga qarashli qandaydir  $\Omega$  ochiq soxaning chegarasi  $\Sigma$  bo'lsin. Xuddi shunday,  $E^2$  fazodagi qandaydir  $D$  ochiq soxa chegarasi  $L$  bo'lsin.

1. [Laplas va Puasson tenglamalari. Chegaraviy masalalarning qo'yilishi. Laplas tenglamasining fundamental yechimi.](#)

Issiqlikni o'tkazuvchanlik tenglamasini qaraymiz:

$$u_t(x, y, z, t) = a^2 \Delta u(x, y, z, t) + f_1(x, y, z), (x, y, z) \in \Omega; \quad \Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz};$$

$$u_t(x, y, t) = a^2 \Delta u(x, y, t) + f_2(x, y), (x, y) \in D; \quad \Delta u = u_{xx} + u_{yy}.$$

Stasionar issiqlik proses holidagi ( $u_t \equiv 0$ ) elliptik tipdagi tenglamani tuzamiz :

$$\Delta u = -f$$

Bu xolda umumiy ko'rinishidan quyidagi ikki tip tenglama hosil bo'ladi :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -f(x, y, z), E^3 \text{ fazoda Puasson tenglamasi.}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -f(x, y), \quad E^2 \text{ fazoda Puasson tenglamasi.}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad E^3 \text{ fazoda Laplas tenglamasi.}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad E^2 \text{ fazoda Laplas tenglamasi.}$$

Bu tenglamalar ko'pincha turli stasionar fizik maydonlarni ta'riflashda yordam beradi.

**Ta'rif.**  $u(x, y, z)$  funksiya  $\Omega$ , soxada garmonik deyiladi, agar

$$u \in C^2(\Omega) \quad \text{va} \quad \Delta u = 0$$

Kompleks o'zgaruvchili funksiya analitikligidan, ikki o'zgaruvchili garmonik funksiyani tuzish mumkin. Agar  $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$  analitik bo'lsa,  $v$  funksiya uchun Koshi-

$$\text{Riman xossalari bajariladi: } \begin{cases} u_x(x, y) = v_y(x, y); \\ u_y(x, y) = -v_x(x, y) \end{cases}$$

Yuqoridagi tenglamani  $x$  bo'yicha, pastki tenglamani  $y$  bo'yicha differensiallaymiz:

$$\begin{cases} u_{xx}(x, y) = -v_{xy}(x, y) \\ u_{yy}(x, y) = -v_{xy}(x, y) \end{cases} \Rightarrow u_{xx} + u_{yy} = 0$$

Xuddi shunday tenglamani  $v$  funksiya uchun hosil qilish mumkin. Bundan xulosa qilish mumkinki,  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ -analitik funksiya bo'lsa,  $u$  holda  $u, v$ - garmonik funksiya bo'ladi.

Keyinchalik biz  $E^3$  fazoda quyidagi masalalarni qaraymiz:

**Dirixle ichki masalasi**

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u(x, y, z) = \mu(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

**Neyman ichki masalasi**

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z) = v(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

**Dirixle tashqi masalasi**

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in E^3 \setminus \bar{\Omega} \\ u(x, y, z) = \mu(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

**Neyman tashqi masalasi**

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in E^3 \setminus \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z) = v(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

Berilgan masalalarni Puasson tengligi uchun qo'llash tabiiydir. Bundan tashqari, ikki o'lchovli analoglar ham mavjud. Masalan:

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in D; \\ u(x, y, z) = \mu(x, y, z), & (x, y, z) \in L \end{cases} \quad E^2 \text{-fazoda Dirixli ichki masalasi}$$

$$u(x, y, z) = \frac{1}{R_{MM_0}} = \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} \text{ funksiyani qaraylik}$$

( $R_{MM_0} - M(x, y, z)$  va  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  nuqtalar orasidagi masofa) Keltirilgan funksiya  $E^3 \setminus M_0$  soxada Laplas tenglamasining yechimi bo'lishini isbotlaymiz.

$$\begin{aligned} u_x &= -\frac{1}{2} \frac{2(x-x_0)}{R^3_{MM_0}} = -\frac{x-x_0}{R^3_{MM_0}}; u_{xx} = -\frac{3(x-x_0)^2}{R^5_{MM_0}} - \frac{1}{R^5_{MM_0}} \\ u_y &= -\frac{1}{2} \frac{2(y-y_0)}{R^2_{MM_0}} = -\frac{y-y_0}{R_{MM_0}}; u_{yy} = -\frac{3(y-y_0)}{R^5_{MM_0}} - \frac{1}{R^5_{MM_0}} \\ u_z &= -\frac{1}{2} \frac{2(z-z_0)}{R^3_{MM_0}} = -\frac{z-z_0}{R^3_{MM_0}}; u_{zz} = -\frac{3(z-z_0)}{R^5_{MM_0}} - \frac{1}{R^5_{MM_0}} \\ \Rightarrow \Delta \frac{1}{R_{MM_0}} &= \frac{3(x-x_0)^2 + 3(y-y_0) + 3(z-z_0)}{R^5_{MM_0}} - \frac{3}{R^3_{MM_0}} \equiv 0 \end{aligned}$$

$E^3$  fazoda quyidagi funksiyani tekshirish oson:

$$u(x, y) = \ln \frac{1}{P_{MM_0}}$$

qachonki  $P_{MM_0} = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$   $E^2 \setminus M_0$  da Laplas tenglamasining yechimi bo'ladi. Bu funksiyalar Laplas tenglamasining fundamental yechimi deyiladi.

### Birinchi va ikkinchi Grin formulalari.

#### 2. Birinchi Grin formulasi.

Faraz qilaylik chekli sondagi yopiq qismlardan iborat bo'lib, har bir nuqtada o'rinmaga ega bo'lib, bu o'rinmalar koordinata o'qlariga parallel bo'lsa, shunda ular yo chekli sondagi nuqtalarda kesishadi yo kesishishdan xosil bo'lgan yopiq oraliqlar chekli bo'ladi. U holda  $\Omega$  soxa uchun  $\vec{A}(x, y, z) = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$ , bu yerda  $P, Q, R \in C^1(\overline{\Omega})$  Ostrogradskiy- Gauss formulasi o'rinli:

$$\iint_{\Sigma} (\vec{A}, \vec{n}) d\sigma = \iiint_{\Omega} \text{div} \vec{A} d\tau \quad (10.1)$$

$$u(x, y, z) \text{ va } v(x, y, z) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega}), \vec{A} = u \text{grad} v$$

berilgan bo'lsin. Shunda (10.1) formulaga ko'ra:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \text{div}(u \text{grad} v) d\tau &= \iint_{\Sigma} (u \text{grad} v, \vec{n}) d\sigma = \\ &= \left\{ (\text{grad} v, \vec{n}) = \frac{\partial v}{\partial n}; \text{div}(u \text{grad} v) = (\text{gradu}, \text{grad} v) + u \Delta v \right\} \\ &= \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma \Rightarrow \\ \iiint_{\Omega} ((\text{gradu}, \text{grad} v) + u \Delta v) d\tau &= \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma. \quad (10.2) \end{aligned}$$

Hosil bo'lgan formula Grinning birinchi formulasi deyiladi.

#### 3. Grinning ikkinchi formulasi.

Birinchi Grin formulasidan  $u$  va  $v$  funksiyalarning o'rnini almashtiramiz. Hosil bo'lgan ayniyatni (10.2) dan ayirsak, Grinning ikkinchi formulasi kelib chiqadi:


$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\tau = \iint_{\Sigma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma \quad (10.3)$$

#### 4. Grinning uchinchi formulasi.

Yuqorida ko'rsatganimizdek

$$v = \frac{1}{R_{MM_0}} = \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}$$

$E^3$  da Laplas tenglamasining yechimi deyiladi.  $M_0 \in \Omega$  nuqtani fikserlaymiz va uni  $\varepsilon$  radiusli  $\Sigma_\varepsilon$  sfera bilan aylantirib olamiz. Shunda  $v \in C^2(\overline{\Omega_\varepsilon}), \Omega_\varepsilon = \Omega \setminus S_{M_0}(\varepsilon)$ .



Qandaydir  $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$  funksiya olamiz.  $\Omega_\varepsilon$  soxa uchun Grinning ikkinchi formulasini yozamiz:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega_\varepsilon} (u \Delta v - v \Delta u) d\tau &= \iint_{\Sigma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma + \iint_{\Sigma_\varepsilon} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} + \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma \Rightarrow \{\Delta u \equiv 0\} \Rightarrow \\ &- \iiint_{\Omega_\varepsilon} \frac{1}{R_{MM_0}} \Delta u(M) d\tau_M = \iint_{\Sigma} \left( u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n}(M) \right) d\sigma_M + \\ &+ \iint_{\Sigma_\varepsilon} \left( u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n}(M) \right) d\sigma_M. \end{aligned}$$

$\varepsilon \rightarrow 0$  ikkinchi ikki karrali integralni qaraymiz. Ma'lumki, birlik  $\bar{n}$  normal  $\Sigma_\varepsilon$  sferaning  $\{x, y, z\}$

nuqtasida quyidagicha bo'ladi:  $\left\{ -\frac{x-x_0}{R_{MM_0}}, -\frac{y-y_0}{R_{MM_0}}, -\frac{z-z_0}{R_{MM_0}} \right\}$ . bundan,

$$\frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) = \left( \bar{n}, \text{grad} \frac{1}{R_{MM_0}} \right) = \frac{(x-x_0)^2}{R_{MM_0}^4} + \frac{(y-y_0)^2}{R_{MM_0}^4} + \frac{(z-z_0)^2}{R_{MM_0}^4} = \frac{1}{R_{MM_0}^2} = \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

Unda bu integral quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_\varepsilon} \left( u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\Sigma_\varepsilon} u d\sigma - \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\Sigma_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \\ &= u(M'_\varepsilon) \frac{4\pi\varepsilon^2}{\varepsilon^2} - \frac{\partial u}{\partial n}(M''_\varepsilon) \frac{4\pi\varepsilon^2}{\varepsilon} = 4\pi u(M'_\varepsilon) - 4\pi\varepsilon \frac{\partial u}{\partial n}(M''_\varepsilon), \end{aligned}$$

Bu yerda  $M''_\varepsilon, M'_\varepsilon$  nuqtalar  $\Sigma_\varepsilon$  sferada olingan.

$\frac{\partial u}{\partial n}$  chegaraviylikni hisobga olgan holda  $\mathcal{E}$  nolga intiltiramiz:

$$4\pi u(M'_\varepsilon) - 4\pi\varepsilon \frac{\partial u}{\partial n}(M''_\varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 4\pi u(M_0)$$

Qugiluvchilarni ma'lum bir qismini o'ng tomonga o'tkazib,  $u(M_0)$  uchun quyidagi formulani hosil qilamiz:

$$4\pi u(M_0) = -\iiint_{\Omega} \frac{1}{R_{MM_0}} \Delta u(M) d\tau_M - \iint_{\Sigma} \left[ u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n}(M) \right] d\sigma_M \quad (10.4)$$

**Bu Grinning uchinchi formulasi deb ataladi.**

$E^2$  fazoda analogik tahlillar olib borib, ikkinchi va uchinchi Grin formulalari uchun ikki o'lchovli analoglar hosil qilish oson:

$$\iint_D (u\Delta v - v\Delta u) ds = \int_L \left( u \frac{\partial u}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dl.$$

$$2\pi u(M_0) = -\iint_D \ln \left( \frac{1}{\rho MM_0} \right) \Delta u ds - \int_L \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho MM_0} \right) - \ln \frac{1}{\rho MM_0} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dl$$

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Laplas tenglamasi.
2. Puasson tenglamasi.

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

1. Birinchi Grin formulasi.
2. Grinning ikkinchi formulasi.
3. Grinning uchinchi formulasi.

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Chegaraviy masalalarning qo'yilishi.
2. Laplas tenglamasining fundamental yechimi.

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xaraktyerdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.
2. Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,

3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glispr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### 1.4. O'qitish usullari qoidalari

#### 1.4.1. Aqliy hujum qoidalari

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastik va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

#### 1.4.2. "Insert" texnikasi qoidalari

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- "Insert" jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;



Agar «-» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

### 1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemadamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

**Mavzu 11.** “Garmonik funksiyalarning xossalari Maksimum prinsipi.  
Dirixle masalasi”

### Ma`ruzaga reja-topshiriqlar

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O'quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

**Ma`ruza rejasi:**

1. Garmonik funksiya xossalari
2. Garmonik funksiyalar uchun maksimum prinsipi.
3. Dirixle ichki masalasining yechimi yagonaligi va turg'unligi
4. Dirixle tashki masalasi yechimi yagonaligi. Fazoda Dirixli tashki masalasi

**O'quv mashg'uloti maqsadi:**

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

**O'quv mashg'uloti masalalari:**

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarning matematik firlashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish;

- *Tarbiyalovchi*: aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan biriktirish, intizomlashtirish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari*: instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O'qitish shakllari*: frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari*: Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O'qitish sharoitlari*: texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring*: o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rni va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta`riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo`nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

#### • **1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi**

##### • **1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi,); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

##### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn

o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);

- *Talabalar faoliyati*: yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o'qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o'zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar*: frontav so'rov blits-so'rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

### 3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)

- *O'qituvchining faoliyati*: mavzu bo'yicha hulosa qilish, talabalarning e'tiborlarini asosiylarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o'tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o'zaro baholashning natijalarini chiqarish; o'quv mashg'ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko'rsatgichlari va me'zonlari;
- *Talabalar faoliyati*: ishning tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo'llash; o'zaro baholashni o'tkazish, yo'l qo'yilgan hatolar bo'yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

#### 1.3. O'quv-metodik materiallar

#### Ma'ruza rejasi:

1. Garmonik funksiya xossalari
2. Garmonik funksiyalar uchun maksimum prinsipi.
3. Dirixle ichki masalasining yechimi yagonaligi va turg'unligi
4. Dirixle tashki masalasi yechimi yagonaligi. Fazoda Dirixli tashki masalasi

Tayanch iboralar: Garmonik funksiya, Dirixli ichki, tashki masalasi, Fazoda Dirixli tashki masalasi

#### 1.3.1. Ma'ruza matni

##### 1. Garmonik funksiya xossalari

**Ta'rif.** Agar  $u$  funksiya  $u \in C^2(\Omega)$  va  $\forall x \in \Omega$  uchun  $\Delta u = 0$  bo'lsa,  $\Omega$  sohada garmonik deyiladi.

**1-xossa.** Agar  $v$  funksiya  $\Omega$  da garmonik bo'lsa, u holda  $\iint_{\tilde{\Sigma}} \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma = 0$  bo'ladi, bu yerda  $\tilde{\Sigma} :$

$\Omega$  da yotuvchi ixtiyoriy yopiq sirt.


**Isboti.**  $\tilde{\Sigma}$  bilan chegaralangan soha uchun Grinning 1-formulasida (3.2)  $u \equiv 1$  ni olamiz.

(ravshanki,  $u$  -garmonik funksiya) Demak  $\iint_{\tilde{\Sigma}} \frac{dv}{dn} d\sigma = 0$

**2-xossa.** (O'rta qiymat haqidagi teorema)

$u$  funksiya  $\Omega$  da garmonik bo'lsin va  $\Omega$  da yotuvchi markazi  $M_0$  no'qtada radiusi  $a$  ga teng ixtiyoriy  $\Sigma_a$  sfera uchun

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Sigma_a} u(p) d\sigma_p \quad (3.5)$$



formula o'rinli.

**Isbot.**  $\Sigma_a$  sferaning ichki sohasi uchun Grinning uchinchi formulasi (3.4) ni yozamiz:

$$4\pi u(M_0) = -\iint_{\Sigma_a} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} \right] d\sigma = \left\{ \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) = -\frac{1}{a^2} \right\} =$$

$$= \frac{1}{a^2} \iint_{\Sigma_a} u d\sigma + \iint_{\Sigma_a} \frac{1}{a^2} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma$$

Garmonik funksiyaning 1-xossasiga ko'ra ikkinchi integral nolga aylanadi va shu bilan (3.5) formula isbotlandi.

**3-xossa :** Agar  $u$  funksiya-  $\Omega$  da garmonik bo'lsa,  $u$  holda  $u$   $\Omega$  da cheksiz differentsiallanuvchi bo'ladi.

**Isboti .**  $u(M_0) = u(x, y, z), (P(P_x, P_y, P_z) \in \Sigma_a)$  uchun Grinning 3-formulasini yozamiz.

$$4\pi u(x, y, z) = -\iint_{\Sigma} \left[ u(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{\sqrt{(x-P_x)^2 + (y-P_y)^2 + (z-P_z)^2}} \right) - \frac{1}{\sqrt{(x-P_x)^2 + (y-P_y)^2 + (z-P_z)^2}} \frac{\partial u(P)}{\partial n} \right] d\sigma_P \quad (11.4)$$

Ko'rinib turibdiki: agar  $M$  no'kta  $\Sigma$  ning chegarasida yotmasa,  $u$  holda integral tagidagi funksiya  $x$  (xudi shunday  $y$  va  $z$ ) argumentlari bo'yicha cheksiz differentsiallanuvchi.

Ma'lumki, bu holda butun integral, demak,  $u(M)$  funksiya ham cheksiz differentsiallanuvchi funksiya.

## 2 Garmonik funksiyalar uchun maksimum prinsipi.

### Teorema 11.1 (Maksimum prinsipi)

Agar funksiya  $u \in C(\tilde{\Omega})$  va  $\Omega$  da garmonik bo'lsa, bu holda  $u$  o'zining maksimum(minimum) iga sohaning chegarasida erishadi .

$$\max_{M \in \Omega} u(M) = \max_{M \in \Sigma} u(M);$$

$$\min_{M \in \Omega} u(M) = \min_{M \in \Sigma} u(M);$$

**Isboti:** faraz qilaylik  $u(M)$  funksiya masalan, biror  $M_0$  ichki no'qtada maksimumga erishsin:

:  $u(M_0) = \max_{M \in \Omega} u(M)$   $u$  holda (11.5) o'rta qiymat formulasiga ko'ra (a-yetarlicha kichik son)

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Sigma_a} u(P) d\sigma_P \leq \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Sigma_a} u(M_0) d\sigma = u(M_0)$$

$u$  funksiya uzluksiz bo'lgani uchun,  $u$  holda  $u(P) \equiv u(M_0)$ , (ya'ni maksimum butun sferada erishiladi).

Bu almashtirishlarni yetarlicha marta davom ettirib, maksimum chegarada ham erishishini xosil qilamiz.

### 3. Dirixle ichki masalasining yechimi yagonaligi va turg'unligi

Bu yerda va keyin xam  $\mu$ ,  $\nu$  lar qandaydir berilgan funksiyalar.

**Ta'rif:**  $u(x,y,z)$  funksiya Dirixle ichki masalasining yechimi deyiladi, agar u quyidagi shartlarni qanoatlantirsa:

$$(11.1) \begin{cases} (1) u(x, y, z) \in C(\overline{\Omega}), u \in C^2(\Omega) \\ (2) \Delta u(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in \Omega \\ (3) u(x, y, z) = \mu(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

$\Omega$  da uzluksiz va garmonik yechimning yagonalik hakidagi teoremani isbotlaymiz:

#### **Teorema. 11.2 (yagonaligi teoremasi)**

$u_1(x, y, z), u_2(x, y, z)$  funksiya [11.1] Dirixle ichki masalasining yechimlari bo'lsin. U holda  $u_1(x, y, z) = u_2(x, y, z); \forall (x, y, z) \in \overline{\Omega}$ .

**Isboti:**  $v = u_1 - u_2$  yangi funksiyalarni aniqlaymiz. Oson ko'rinadiki, u  $\overline{\Omega}$  da uzluksiz,  $\Omega$  da garmonik va  $v(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in \Sigma$ .

U holda  $v$  funksiya uchun maksimum prinsipining hamma shartlarini qanoatlantirgan va bundan quyidagi kelib chiqadi:

$$\left. \begin{array}{l} \max_{\Omega} v = \max_{\Sigma} v = 0 \\ \min_{\Omega} v = \min_{\Sigma} v = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow v(x, y, z) \equiv 0, (x, y, z) \in \Omega$$

teorema isbotlandi.

Endi Dirixle ichki masalasini yechimi turg'unligini ko'rsatamiz. Lekin undan avval quyidagi lemmani isbot qilamiz:

**Lemma 1.**  $u_1(x, y, z), u_2(x, y, z)$  funksiyalar quyidagi uchta shartlarni qanoatlantirsin:

1.  $u_1, u_2 \in C(\overline{\Omega});$
2.  $u_1, u_2 - \Omega$  da garmonik
3.  $u_1(x, y, z) \geq u_2(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma$

U xolda  $u_1 \geq u_2, \forall (x, y, z) \in \Omega$

**Isboti:**  $v = u_1 - u_2$  funksiyani qaraymiz. U holda  $v(x, y, z) \geq 0, \forall (x, y, z) \in \Sigma$ . Minimum prinsipidan foydalanib (ravshanki barcha shartlar bajarilgan)  $\overline{\Omega}$  da  $\min_{\Omega} v = \min_{\Sigma} v \geq 0 \Rightarrow u_1 \geq u_2$  ni olamiz.

Lemma isbotlandi.

**Teorema 11.3 (turg'unlik teoremasi).**  $u_1(x, y, z), u_2(x, y, z)$  funksiyalar quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

$$\begin{cases} (1) u_1, u_2 \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega); \\ (2) \Delta u_1(x, y, z) = \Delta u_2(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in \Omega; \\ (3) u_i(x, y, z) = \mu_i(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma, i = 1, 2. \end{cases}$$

U holda  $\max_{\Omega} |u_1 - u_2| \leq \max_{\Sigma} |\mu_1 - \mu_2|$  bo'ladi.

**Isboti.**  $\varepsilon = \max_{\Sigma} |\mu_1 - \mu_2|, v = u_1 - u_2$  belgilash olamiz. U holda  $v$  funksiya  $\Omega$  da garmonik,

$-\varepsilon \leq v \leq \varepsilon; (x, y, z) \in \Sigma$ , U holda  $(-\varepsilon, v)$  va  $(\varepsilon, v)$  funksiyalar jufti uchun lemmani qo'llab (ravshanki uning shartlari bajariladi)  $\overline{\Omega}$  da

$-\varepsilon \leq v \leq \varepsilon; (x, y, z) \in \overline{\Omega} \Rightarrow |u_1 - u_2| \leq \varepsilon$  ni olamiz.

teorema isbotlandi.

### Natija.

$u_n(x, y, z)$  funksiyalar ketma-ketligi, har bir funksiya hamda  $u(x, y, z)$  mos  $\Sigma$  da  $u_n = \mu_n$ ,  $\Omega$  da  $u = \mu$  Dirixle masalasi yechimi bo'lsin. U holda  $\mu_n$  ning tekis yaqinlashishidan  $\Sigma$  da  $\mu_n (\mu_n \Rightarrow \mu)$ ,  $\Omega$  da  $u_n \Rightarrow u$  kelib chiqadi.

**Eslatma.** Isbotlangan teorema ikki ulchamli hol uchun to'lik o'rinli. Bunga ishonch hosil qilish uchun shunga uxshash muloxazalar yuritish kerak. Endi Dirixli masalasining boshqa varianti- Dirixli tashqi masalasini qaraymiz.

### 4. Dirixle tashki masalasi yechimi yagonaligi

#### Fazoda Dirixli tashki masalasi

**Ta'rif.**  $u(x, y, z)$  funksiya fazodagi Dirixle tashki masalasining yechimi deyiladi, agar u quyidagi shartlarni qanoatlantirsa:

$$\begin{cases} (1) u(x, y, z) \in C(E^3 \setminus \Omega); \\ (2) \Delta u(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in E^3 \setminus \bar{\Omega}; \\ (3) u(x, y, z) = \mu(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma. \\ (4) u(x, y, z) \Rightarrow 0, (x, y, z) \rightarrow \infty \end{cases}$$

Uzluksiz yechimning yagonaligini isbotlaymiz:

**Teorema 11.4 (yagonalig teoremasi).**  $u_1, u_2(x, y, z)$  funksiyalar quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

$$\begin{cases} (1) u_1, u_2(x, y, z) \in C(E^3 \setminus \Omega); \\ (2) \Delta u_1(x, y, z) = \Delta u_2(x, y, z), (x, y, z) \in E^3 \setminus \bar{\Omega}; \\ (3) u_1, u_2(x, y, z) = \mu(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma. \\ (4) u_1, u_2(x, y, z) \Rightarrow 0, (x, y, z) \rightarrow \infty \end{cases}$$

U holda  $u_1(x, y, z) = u_2(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma^3 \setminus \bar{\Omega}$  bo'ladi.

**Isboti.**  $v(x, y, z) = u_1(x, y, z) - u_2(x, y, z)$  bo'lsin. U holda  $v$  funksiya teoremaning  $\mu(x, y, z) \equiv 0$  shartini qanoatlantiradi.  $v \equiv 0$  ekanligini isbotlaymiz; Teskarisini faraz qilaylik, ya'ni,

$\exists M_0(x_0, y_0, z_0) \in E^3 \setminus \bar{\Omega} : v(x_0, y_0, z_0) = A > 0$  bo'lsin.

U holda tekis yaqinlashish ta'rifiga ko'ra  $M_0$  no'qtani to'la uz ichiga oluvchi  $R$  radiusli shunday  $\Sigma_R$  sfera mavjudki  $|v(x, y, z)| \leq \frac{A}{2}, (x, y, z) \in \Sigma_R$ , u holda

$$\max_{\Sigma_R} v(x, y, z) \leq \frac{A}{2};$$

bo'ladi.

$$\min_{\Sigma_R} v(x, y, z) \geq -\frac{A}{2}.$$

$v$  funksiya ga  $\Omega_R$  ochik sohada maksimal qiymat prinsipini qo'llab (bu soha tashqarisidan  $\Sigma_R$  bilan ichkarisidan-  $\Sigma$  bilan chegaralangan):

$$\begin{cases} \max_{\Omega_R} v = \max_{\Sigma \cup \Sigma_R} v \leq \frac{A}{2}; \\ \min_{\Omega_R} v = \min_{\Sigma \cup \Sigma_R} v \leq -\frac{A}{2}; \end{cases} \Rightarrow |v(x_0, y_0, z_0)| \leq \frac{A}{2}. \quad \text{ni olamiz.}$$

$v(x_0, y_0, z_0) = A$  bilan qarama-qarshilikga kelamiz. U holda  $v(x, y, z) = 0$  ekanligi kelib chikadi. Teorema isbotlandi.

**Misol.**  $\Omega : x^2 + y^2 + z^2 < a^2$ ; bo'lsin.  
 $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ .

Endi quyidagi Dirixli tashki masalasini qaraymiz.

1.  $u \in C(E^3 \setminus \bar{\Omega})$ ;

2.  $u - E^3 \setminus \bar{\Omega}$  da garmonik funksiya

3.  $u(x, y, z) = C = const, (x, y, z) \in \Sigma$ .

Oson ko'rish mumkinki  $u_1(x, y, z) = C$  va  $u_2(x, y, z) = \frac{Ca}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$  funksiyalar berilgan

masalaning yechimlari bo'ladi, lekin  $u_1 \neq u_2$ , shuning uchun bu qo'yilgan shartlar masala yechimi yagonaligiga zid.

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Dirixli tashki masalasining yechimi ta'rifi.

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

1. Garmonik funksiya ta'rifi.
2. Garmonik funksiya xossalari.
3. Maksimum prinsipi teoremasi.

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Dirixle ichki masalasining yechimi yagonaligi teoremasi.
2. Dirixle ichki masalasining yechimi turg'unligi teoremasi.
3. Dirixle tashki masalasi yechimi yagonaligi teoremasi.

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xarakterdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. Saloxiddinov M.S. *Matematik fizika tenglamolari*. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.
2. Mixlin S.G. *Kurs matematicheskoy fiziki*. M, 1968,
3. Sobolev S.L. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1966.
4. Bisadzs L.V. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1976.

5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixltn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### 1.4. O'qitish usullari qoidalari

#### 1.4.1. Aqliy hujum qoidalari

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastic va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

#### 1.4.2. "Insert" texnikasi qoidalari

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- "Insert" jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
Agar «-» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qityotganingiz siz uchun yangilik;



Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

### 1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmat ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemandamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

## Mavzu 12. "Tekislikda Dirixlening tashqi masalasi"

### Ma'ruzaga reja-topshiriqlar

**Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O'quv soati:** 2 soat (ma'ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma'ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

### Ma'ruza rejasi:

1. Yagonalik teoremasi.
2. Neymanning ichki masalasi
3. Neymanning ichki masalasi yechilishi uchun zaruriy shartlar.
4. Yechimning yagonaligi.
5. Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasi va uning xossalari.

### O'quv mashg'uloti maqsadi:

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

### O'quv mashg'uloti masalalari:

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarning matematik firlashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarning izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan birlashtirish, intizomlashtirish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari:* instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O'qitish shakllari:* frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari:* Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O'qitish sharoitlari:* texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring:* o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rni va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakllanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta`riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo`nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

#### **• 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi**

##### **• 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;
- *Shakllar, usular, uslublar:* instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

##### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati:* mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib bo'rish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati:* yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib

borishadi; “Insert” usuli bilan belgilan o’qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o’zaro;

- *Shakillar, usular, uslublar*: frontav so’rov blits-so’rov; aqliy hujum, “Insert” texnikasi.

### 3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)

- *O’qituvchining faoliyati*: mavzu bo’yicha hulosa qilish, talabalarning e’tiborlarini asosiylarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o’tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o’zaro baholashning natijalarini chiqarish; o’quv mashg’ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko’rsatgichlari va me’zonlari;
- *Talabalar faoliyati*: ishning tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo’llash; o’zaro baholashni o’tkazish, yo’l qo’yilgan hatolar bo’yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

#### 1.3. O’quv-metodik materiallar

#### Ma’ruza rejasi:

1. Yagonalik teoremasi.
  2. Neymanning ichki masalasi
  3. Neymanning ichki masalasi yechilishi uchun zaruriy shartlar.
  4. Yechimning yagonaligi.
  5. Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasi va uning xossalari.
- Tayanch iboralar: Yagonalik teoremasi, Neymanning tashqi masalasi, Laplas tenglamasi, Grin funksiyasi, Grin funksiyasi xossalari

#### 1.3.1. Ma’ruza matni

#### 1. Yagonalik teoremasi. Tekislikda Dirixlening tashqi masalasi

Endi tashki masalani tekislikda qaraymiz.

**Ta’rif:** Agar  $u(x, y)$  funksiya quyidagi shartlarni qanoatlantirsa, shunda tekislikda Dirixle tashqi masalasining yechimi deyiladi:

$$[3.3] \quad \begin{cases} (1) & u(x, y) \in C(E^2 \setminus D), \quad u \in C^2(E^2 \setminus \bar{D}) \\ (2) & \Delta u(x, y) = 0, \quad (x, y) \in E^2 \setminus \bar{D} \\ (3) & u(x, y) = \mu(x, y), \quad (x, y) \in L \\ (4) & |u(x, y)| \leq C = \text{const}, \quad (x, y) \in E^2 \setminus \bar{D} \end{cases}$$

**3.5. teorema (yagonalik):** Faraz qilamiz,  $u_1, u_2(x, y)$  shunday funksiyalar bo’lsinki, ular uchun

$$\begin{cases} (1) & u_1, u_2(x, y) \in C(E^2 \setminus D), \quad u \in C^2(E^2 \setminus \bar{D}) \\ (2) & \Delta u_1(x, y) = \Delta u_2(x, y), \quad (x, y) \in E^2 \setminus \bar{D} \\ (3) & u_1, u_2(x, y) = \mu(x, y), \quad (x, y) \in L \\ (4) & |u_i(x, y)| \leq C_i = \text{const}, \quad i = 1, 2; \quad (x, y) \in E^2 \setminus \bar{D} \end{cases}$$

U holda  $E^2 \setminus \bar{D}$  fazoda  $u_1(x, y) = u_2(x, y)$  bo’ladi.

**Isbot:**

Faraz qilamiz,  $u = u_1 + u_2$ . Unda  $v$  uchun:  
 $v(x, y) = 0, \quad (x, y) \in L, \quad |v(x, y)| \leq C = c_1 + c_2$ . Isbot qilamizki,  $v(x, y) \equiv 0, \quad (x, y) \in E^2 \setminus \bar{D}$ .

Teskarisini faraz qilamiz: shunday  $M^*(x^*, y^*)$ ,  $(x^*, y^*) \in E^2$  mavjudki,  $v(x^*, y^*) = A > 0$ . U holda shunday  $a$ -ni olamizki, markazi  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  nuqtada bo'lgan  $L_a$  aylana to'lig'icha  $D$  da yotsin va shunday  $R$  tanlaymizki  $L_R$  aylana  $D$  sohani ham  $M^*$  nuqtani ham o'zida saqlasin.

Ushbu funktsiyani aniqlaymiz:

$$w_R(x, y) = C \frac{\ln \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}}{\ln \frac{R}{a}}$$

Ko'rinib turibdiki,

- 1)  $w_R(x, y) \in C(E^2 \setminus D)$
- 2)  $w_R(x, y)$  funksiya  $E^2 \setminus \bar{D}$  sohada garmonik funksiya.
- 3)  $L$  chegarada  $w_R(x, y) \geq 0$  bo'ladi.
- 4)  $L_R$  chegarada  $w_R(x, y) = C$  bo'ladi.

Bu yerdan

$$\begin{cases} |v(x, y)| \leq w_R(x, y), & (x, y) \in L \\ |v(x, y)| \leq C = w_R(x, y), & (x, y) \in L_R \end{cases}$$

kelib chiqadi.

Maksimumlar prinsipini qo'llab, ichkaridan  $L$  bilan va tashqaridan  $L_R$  bilan chegaralangan  $D_{LL_R}$  sohada

$$|v(x, y)| \leq w_R(x, y), \quad (x, y) \in D_{LL_R}$$

ni hosil qilamiz. Bu yerdan

$$|v(x^*, y^*)| \leq w_R(x^*, y^*) = w_R(x, y) = C \frac{\ln \sqrt{(x^* - x_0)^2 + (y^* - y_0)^2}}{\ln \frac{R}{a}}.$$

$R$  ni cheksizlikka intiltirib,

$$|v(x^*, y^*)| \leq w_\infty(x^*, y^*) = 0$$

ni hosil qilamiz.

Bu esa,  $v(x^*, y^*) = A > 0$  deb qilgan farazimiz noto'g'riligini isbotlaydi. Demak,  $v(x, y) \equiv 0$  ekanligi kelib chiqadi. Teorema isbotlandi.\*

(4) shart muhim ekanini ko'rsatuvchi misol keltiramiz:

**Misol:**

Faraz qilaylik:

$$D: x^2 + y^2 < b^2$$

$$\bar{D}: x^2 + y^2 = b^2$$

Dirixlening tashqi masalasini quyidagicha qo'yamiz:

$$\begin{cases} \Delta u \equiv 0, & E^2 \setminus \bar{D} \\ u(x, y) = C = const, & (x, y) \in L \end{cases}$$

Osongina tekshirib ko'rish mumkinki,  $u_1(x, y) = C$  va  $u_2(x, y) = C + \ln \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{b}$

funksiyalar berilgan masalaning yechimlari bo'ladi. Ammo  $u_2$  funksiya hych qanday

o'zgaras bilan chegaralanmagan, shuning uchun ham masalaning bunday qo'yilishida yagonalik buzilyapti.

## 2. Neymanning ichki masalasi.

**Ta'rif.** Agar  $E^3$  fazoda aniqlangan  $u(x, y, z)$  funksiya quyidagi 3 ta [3.4] masalaning shartlarini qanoatlantirsa, shunda  $u$  Neyman ichki masalasining yechimi deyiladi:

$$[3.4] \quad \begin{cases} (1) & u(x, y, z) \in C^1(\bar{\Omega}), & u \in C^2(\Omega) \\ (2) & \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ (3) & \frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z) = v(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

Shunga diqqatingizni qaratingki,  $u$  funksiya  $\bar{\Omega}$  sohada va uning 1-tartibli hosilasilalari bilan birgalikda uzluksiz bo'lishi kerakligi talab qilinmoqda, va bu bilan Dirixle masalasidan farq qiladi. Chunki, Dirixle masalasida faqat  $u$  funksiyaning uzluksizligi talab etilgan edi.

## 3. Neymanning ichki masalasi yechilishi uchun zaruriy shartlar.

Faraz qilamiz,  $u$  funksiya [3.4] masalaning yechimi va  $v$  – ixtiyoriy ikki marta differensiallanuvchi funksiya bo'lsin. Bu funksiyalar uchun Grinning 2-formulasini qo'llaymiz:

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) d\tau = \iint_{\Sigma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma$$

$v \equiv 1$  bo'lganda quyidagi hosil bo'ladi:

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \iint_{\Sigma} v(x, y, z) d\sigma = 0 \quad (3.6)$$

(3.6) tenglik Neyman ichki masalasining yechilishi uchun zaruriy shart deyiladi.

Neyman masalasi yechimining yagonaligini isbotlaymiz. Osongina ko'rish mumkinki, agar  $u$  funksiya ([3.4] masalaning yechimi bo'lsa, unda  $(u + const)$  ham yechimdir. Buni trivial bir qiymatli emaslik deb ataymiz.

Faqat shunday bir qiymatli emaslik bo'lishi mumkinligini isbotlaymiz.

## 4. Yechimning yagonaligi.

**3.6. teorema (yagonalik teoremasi):** Faraz qilamiz,  $u_i(x, y, z)$ ,  $i = 1, 2$  uchun:

- 1)  $u_i \in C^1(\bar{\Omega})$
- 2)  $\Omega$  sohada  $u_i$  garmonik funksiya
- 3)  $\frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z) = v(x, y, z)$ ,  $(x, y, z) \in \Sigma$

o'rinli.

U holda  $u_1 - u_2 \equiv const$  (bu shuni bildiradiki,  $v \equiv 0$  da, faqatgina trivial yechim mavjud).

**Isbot:** Grinning 1-formulasini ixtiyoriy ikki marta differensiallanuvchi  $u$  va  $v$  funksiyalar uchun yozamiz:

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - grad^2 u) d\tau = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma$$

$u_1 - u_2$  funksiya [3.4] masalaning  $v \equiv 0$  bo'lgan holdagi yechimidir. Grin formulasida  $u = v = u_1 - u_2$  deylik. Unda

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (u\Delta v - \text{grad}^2 u) d\tau &= \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma \\ \Rightarrow \iiint_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) d\tau &= 0 \Rightarrow u_x \equiv u_y \equiv u_z \equiv 0 \Rightarrow u \equiv \text{const} \end{aligned}$$

Teorema isbotlandi.\*

### 5. Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasi va uning xossalari.

$E^3$  fazoda aniqlangan garmonik  $u$  funksiya uchun Grinning 3-formulasini yozib olamiz:

$$u(M) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[ \frac{1}{R_{MP}} \frac{\partial u}{\partial n} - u(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) \right] d\sigma_P \quad (3.7)$$

Bu yerda -  $P \in \Sigma$ ,  $M \in \Omega$ .

Demak biz  $u(M)$  funksiya uchun ifoda oldik. Uni Dirixle va Neyman masalalari uchun qo'llashga harakat qilamiz. Grinning 2-formulasini yozib olamiz. Bunda  $v$  funksiya  $\Omega$  sohada garmonik bo'lgan funksiya:

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - \text{grad}^2 u) d\tau = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma$$

$u$  va  $v$  funksiyalar garmonik, demak,

$$\iint_{\Sigma} \left[ u(P) \frac{\partial v}{\partial n} - v(P) \frac{\partial u}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) \right] d\sigma_P = 0 \quad (3.8)$$

(3.7) formuladan (3.8) formulani ayirib,

$$u(M) = \iint_{\Sigma} \left[ \left( \frac{1}{4\pi} + u(P) \right) \frac{\partial v}{\partial n}(P) - u(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi R_{MP}} + v(P) \right) \right] d\sigma_P$$

ni hosil qilamiz.

$$G(M, P) = \frac{1}{4\pi R_{MP}} + v(P) \text{ deylik.}$$

Unda

$$u(M) = \iint_{\Sigma} \left[ G(M, P) \frac{\partial v}{\partial n}(P) - u(P) \frac{\partial G}{\partial n}(M, P) \right] d\sigma_P$$

Demak,  $u(M)$  funksiya uchun ixtiyoriy garmonik funksiya ishtirok etgan yangi formula hosil qildik. Uni o'zgartirib, turli yechimlarni hosil qilish mumkin.

**Misol:**

1) Agar  $G|_{P \in \Sigma} = 0$  bo'lsa, u holda

$$u(M) = - \iint_{\Sigma} u(P) \frac{\partial G}{\partial n}(M, P) d\sigma_P$$

Biz [3.1] Dirixle masalasining yechimi uchun formula hosil qildik:

2) Agar  $\tilde{G} : \frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} \Big|_{P \in \Sigma} = 0$ , bo'lsa, u holda

$$u(M) = \iint_{\Sigma} \tilde{G}(M, P) \frac{\partial v}{\partial n}(P) d\sigma_P$$

Biz [3.4] Neyman masalasi yechimi uchun formula hosil qildik.

Demak, biz Dirixle va Neyman masalalarini yechishni ularga mos Grin funksiyalariga olib kelib soddalashtirishga, osonlashtirishga erishdik. Endi lo'nda ta'rifdan beramiz.

**Ta'rif:** Agar

$$1) \frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial \eta^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial \zeta^2} = 0, \quad \forall P \in \Omega, \quad P \neq M$$

2)  $G(M, P)$  quyidagi ko'rinishda:

$$G(M, P) = \frac{1}{4\pi R_{MP}} + v, \text{ bu yerda } v - \Omega \text{ sohadagi garmonik funksiya.}$$

$$3) G(M, P)|_{P \in \Sigma} = 0$$

$v$  funksiyaga quyidagi talablar qo'yiladi:

$v$  -  $\Omega$  sohada garmonik funksiya

$$v|_{\Sigma} = -\frac{1}{4\pi R_{MP}} \text{ bo'lsa, shunda } G(M, P): M(x, y, z), \quad P(\xi, \eta, \zeta) \in \bar{\Omega} \text{ funksiya Dirixle}$$

ichki masalasi uchun Grin funksiyasi deyiladi.

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Dirixle ichki masalasi uchun Grin funksiyasining ta'rifi?

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

2. Dirixle tashqi masalasining yechimining ta'rifi?
3. Neymanning ichki masalasining ta'rifi?

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Yagonalik teoremasi?
2. Yechimning yagonalik teoremasi?

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xarakterdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. Saloxiddinov M.S. *Matematik fizika tenglamolari*. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.
2. Mixlin S.G. *Kurs matematicheskoy fiziki*. M, 1968,
3. Sobolev S.L. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1966.
4. Bisadzs L.V. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1976.

5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.11. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixltn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### 1.4. O'qitish usullari qoidalari

#### 1.4.1. Aqliy hujum qoidalari

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastic va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

#### 1.4.2. "Insert" texnikasi qoidalari

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- "Insert" jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
Agar «–» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qityotganingiz siz uchun yangilik;



Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

### 1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmat ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemadamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

### Mavzu 13. “Grin funksiyaning xossalari. Ikkilangan qatlam potentsiali. Potensial xossalari. Fredgolm alternativasi.”

#### Ma`ruzaga reja-topshiriqlar

#### Fan: Matematik fizika tenglamalari

**O'quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O'quv mashg'uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o'rganish.

#### Ma`ruza rejasi:

1. Grin funksiyaning 1-chi xossasi
2. Grin funksiyaning 2-chi xossasi
3. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichlik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali

#### O'quv mashg'uloti maqsadi:

O'quv fani to'g'risida umumiy ta'surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

#### O'quv mashg'uloti masalalari:

- *O'rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang'ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarining matematik firlashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag'zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarining izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o'tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo'llash; talabalarining ijodiy mahoratini shakillantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o'rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan birlashtirish, intizomlashtirish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *O'qitish usullari:* instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O'qitish shakllari:* frontal; jamoaviy;
- *O'qitish vositalari:* Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O'qitish sharoitlari:* texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring:* o'g'zaki savol-javob, blits-so'rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o'quv fanlar sistemasidagi o'rni va roli bilan tanishtirish;
- O'quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o'quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O'qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakllanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o'qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta`riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo`nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to'liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag'ulotlarni bajarishda o'rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

#### **• 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi**

#### **• 1 bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o'ziga ishonch, aniqligi); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o'quv mashg'ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so'zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro'yhati; o'quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko'rinish; o'quv materiallar va qo'llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o'quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rish;
- *Shakllar, usular, uslublar:* instruktaj; frontal so'rov; mustahkamlovchi so'rov.

#### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):**

- *O'qituvchining faoliyati:* mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o'tgan fanlar va mashg'ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo'yishni taklif etadi; birinchi savol bo'yicha matn o'qiladi; qo'shimcha o'quv materiallarini aytib bo'rish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo'yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati:* yangi mavzuda doir oldingi mashg'ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib

borishadi; “Insert” usuli bilan belgilan o’qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o’zaro;

- *Shakillar, usular, uslublar*: frontav so’rov blits-so’rov; aqliy hujum, “Insert” texnikasi.

### 3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)

- *O’qituvchining faoliyati*: mavzu bo’yicha hulosa qilish, talabalarning e’tiborlarini asosiylarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o’tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o’zaro baholashning natijalarini chiqarish; o’quv mashg’ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko’rsatgichlari va me’zonlari;
- *Talabalar faoliyati*: ishning tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo’llash; o’zaro baholashni o’tkazish, yo’l qo’yilgan hatolar bo’yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar*: guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

#### 1.3. O’quv-metodik materiallar

#### Ma’ruza rejasi:

1. Grin funksiyaning 1-chi xossasi
2. Grin funksiyaning 2-chi xossasi
3. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichlik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali


**Tayanch iboralar:** Grin funksiyasi, 1-chi xossa, 2-chi xossa, oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali.

#### 1.3.1. Ma’ruza matni

1. Grin funksiyaning 1-chi xossasi

$$G(M, P) > 0, \quad M, P \in \Omega, \quad P \neq M.$$

Isbot:  $\Omega$  ichida biror  $M_0(\cdot)$  nuqtani olamiz. Yetarlicha kichik  $a$  radiusi va markazi  $M_0$  da bo’lgan sferani xamda  $\Sigma$  va  $\Sigma_a$  urtasidagi  $\Omega_a$  soxani qaraymiz.



$\Omega_a$  soxada  $M_0, R$  o’zgaruvchilarga bog’liq bo’lgan Grin funksiyani ko’rib chikaylik. U xolda  $\Omega_a$  garmonikdir. Demak, max kiymat prinsipining barcha shartlari bajariladi.  $G,( M_0, P)$  uchun ushbu ifoda o’rinli: (3.9)

$$G(M_0, P) = \frac{1}{4\pi R_{M_0P}} + v(P), \quad \text{bu yerda} \quad \frac{1}{4\pi R_{M_0P}} \xrightarrow{R \rightarrow 0} \infty$$

$v$  esa  $\Omega$  da garmonik (demak chegaralangan) funksiya bo’lgani uchun, shunday  $a$  ni olish mumkinki,  $G | P \in \Sigma_a < 0$  o’rinli bo’ladi.

$G(M, P) | P \in \Sigma = 0$  bo’lgani uchun  $G(M_0, P) \geq 0$  ifoda  $\Omega_a$  dagi  $\forall P$  uchun o’rinli.

$G$  funksiya konstanta bo’lmagani uchun, u  $\Omega_a$  ichida minimumga (ya’ni 0 kiymatga) erishmaydi. U xolda ( $a$  ni  $\infty$  kichraytirish mumkin bo’lgani uchun)  $\Omega$  dagi ixtiyoriy nuqtalar uchun  $P \neq M$   $G(M, P) > 0$  o’rinli. Tasdiq o’rinli.

#### 2. Grin funksiyaning 2-chi xossasi

$$G(M, P) = G(P, M) \quad \forall M, P \in \Omega, M \neq P. \quad (3.10)$$

Isbot:  $M_1, M_2$  nuqtalarni fiksirlaymiz – ular  $\Omega$  dagi 2 ta har xil ixtiyoriy nuqtalar.  $G(M_1, M_2) = G(M_2, M_1)$  ni isbotlash yetarli.

Belgilash kiritamiz:  $u(\xi, \eta, \zeta) = G(M_1, P)$ ;

$$v(\xi, \eta, \zeta) = G(M_2, P).$$

$\sum_{\Omega_\varepsilon}^1$  yetarlicha kichik  $\varepsilon$  radiusli sfera ( $\Omega_\varepsilon^1$  – unga mos shar) bulib,  $\mathbf{M}_1(\cdot)$  ni o'rab tursin,  $\sum_{\Omega_\varepsilon}^2$ ,  $\Omega_\varepsilon^2$  esa mos xolda  $\mathbf{M}_2(\cdot)$  uchun sfera va shar bo'lsin.  $\Omega_\varepsilon$  -  $\Omega$  soxaning ichki qismi bo'lsin va  $\Omega_\varepsilon^2, \Omega_\varepsilon^1$  sharlar bu soxaga tegishli bo'lmasin.  $u$  va  $v$  funksiyalar uchun Grinning 2 – formulasini yozib olamiz (Grin aniqlanishiga ko'ra  $\Omega_\varepsilon$  da ular garmonik funksiyalar) va quyidagiga ega bo'lamiz.

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega_\varepsilon} (u \Delta v - v \Delta u) dr &= \iint_{\Sigma} \left( u \frac{dv}{dn} - v \frac{du}{dn} \right) d\sigma + \iint_{\Sigma_\varepsilon^1} \left( u \frac{dv}{dn} - v \frac{du}{dn} \right) + \\ &+ \iint_{\Sigma_\varepsilon^2} \left( u \frac{dv}{dn} - v \frac{du}{dn} \right) d\sigma \Rightarrow \left\{ G|_p \in \Sigma \Rightarrow u|_{\Sigma} = v|_{\Sigma} = 0 \right\} \Rightarrow \\ &\iint_{\Sigma_\varepsilon^1} \left[ G(M_1, P) \frac{\partial G(M_2, P)}{\partial n} - G(M_2, P) \frac{\partial G(M_1, P)}{\partial n} \right] d\sigma_p + \\ &+ \iint_{\Sigma_\varepsilon^2} \left[ G(M_1, P) \frac{\partial G(M_2, P)}{\partial n} - G(M_2, P) \frac{\partial G(M_1, P)}{\partial n} \right] d\sigma_p = 0 \end{aligned} \quad (3.11)$$

1 – integralni 1- qo'shiluvchini ko'rib chiqamiz.  $\varepsilon \rightarrow 0$  da (3.9) dagi  $G(M_2, P)$  funksiya ifodasida qatnashuvchi  $u$  va  $v$  funksiyalar  $\sum_{\Omega_\varepsilon}^1$  da garmonik va chegaralangan funksiyalar (Masalan:  $\frac{\partial G(M_2, P)}{\partial n}$   $S_1$  va  $S_2$  konstantalar bilan chegaralangan). U xolda ushbuga ega bo'lamiz;

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_\varepsilon^1} G(M_1, P) \frac{\partial G(M_2, P)}{\partial n} d\sigma_p &\leq \iint_{\Sigma_\varepsilon^1} \left| \frac{1}{4\pi R_{M_1 P}} \right| \left| \frac{\partial G(M_1, P)}{\partial n} \right| d\sigma_p \leq \\ &\leq \left| \frac{C_1}{4\pi R_{M_1 P}} - c_1 c_2 \right| d\sigma = \iint_{\Sigma_\varepsilon^1} \left| \frac{c_1}{4\pi \varepsilon} + c_1 c_2 \right| d\sigma_p = c_1 \varepsilon + 4\pi c_1 c_2 \varepsilon^2 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

2-qo'shiluvchi esa murakkabrok.  $G(M_1, P)$  funksiya uchun (3,9) ifodadan foydalanib, uni 2 ta integralga ajratamiz:

$$\iint_{\Sigma_\varepsilon^1} G(M_2, P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi R_{M_1 P}} \right) d\sigma + \iint_{\Sigma_\varepsilon^2} G(M_2, P) \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma_p$$

$\varepsilon$  kichrayishi bilan 2 – integral ham 0 ga intiladi. (yuqorida keltirilgan tushuntirishlarga ko'ra)

$\frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi R_{M_1 P}} \right)$  ko'paytuvchini tekshiramiz. Ta'rifga kura:  $\frac{\partial f}{\partial n} = (\vec{n}, \text{grad } f)$ . Bizning xolda

$$n = \left\{ -\frac{(\xi - x)}{R_{M_1 P}}, -\frac{(\eta - y)}{R_{M_1 P}}, -\frac{(\zeta - z)}{R_{M_1 P}} \right\}, \text{grad } \frac{1}{R_{M_1 P}} = \left\{ -\frac{(\xi - x)}{R_{M_1 P}^3}, -\frac{(\eta - y)}{R_{M_1 P}^3}, -\frac{(\zeta - z)}{R_{M_1 P}^3} \right\}$$

Bundan kelib chikadiki,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{M_1 P}} \right) &= \frac{1}{4\pi R_{M_1 P}^2} \Rightarrow \iint_{\Sigma_\varepsilon^1} G(M_2, P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi R_{M_1 P}} \right) d\sigma_p = \\ &= \frac{1}{4\pi \varepsilon^2} \iint_{\Sigma_\varepsilon^1} G(M_2, P) d\sigma_p = \end{aligned}$$

$$= \frac{G(M_2 P^i)}{4\pi\epsilon^2} \iint_{\Sigma^i} \partial\sigma \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} G(M_2, M_1)$$

(3.11) formuladagi 2 – integral birinchisidan o'zgaruvchini almashtirish va ishorasini almashtirish orkali xosil qilinadi. Shunga uxshash fikr yuritib, u  $G(M_1, M_2)$  ga intilishni topamiz. Bu yerdan quyidagi formulaga ega bo'lamiz:

$$G(M_2, M_1) - G(M_1, M_2) = 0$$

Bu formula  $\Omega$  dagi barcha xar xil  $M_1, M_2 (\cdot)$  uchun to'g'ridir. Tasdiq isbotladi.

3. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichlik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali

Shunlay qilib, tekislik va fazodagi Laplas tenglamasining yechimlari quyidagicha:

$$E^3 : \frac{1}{R_{MP}}; \quad E^2 : \ln \frac{1}{\rho_{MP}},$$

Bu yerda  $M(x, y, z)$ - fiksirlangan nuqta,  $P(\xi, \eta, \zeta)$  - o'zgaruvchi. Faraz qilaylik  $\Sigma$  bu  $M$  nuqtani o'z ichiga oladigan  $\Omega$  soxani chegaralab turuvchi qandaydir yopiq sirt bo'lsin.  $E^3$  da quyidagi funktsiyani qarab chiqaylik:

$$v(M) = \iint_{\Sigma} g(P) \frac{1}{R_{MP}} \partial\sigma_P$$

va unga **oddiy qatlam potentsial** deb nom qo'yamiz. Va shu bilan bir qatorda quyidagi funktsiyani qaraymiz

$$u(M) = - \iint_{\Sigma} f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) \partial\sigma_P$$

va bu funktsiyaga **ikkilangan katlamning potentsiali** degan nom qo'yamiz. Qo'yidagi narsani ko'rsatamiz

$$\forall M \notin \Sigma \quad \partial a \quad \Delta v \equiv \Delta u \equiv 0$$

$$\Delta_M v = \Delta_M \iint_{\Sigma} g(P) \frac{1}{R_{MP}} d\sigma_P =$$

$$= \iint_{\Sigma} g(P) \Delta \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) d\sigma_P = 0$$

$$\text{чужку} \quad \Delta \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) \equiv 0$$

Ikkilangan qatlam potentsiali uchun natija xuddi shunaqa:

$$\Delta_M u = \Delta_M \iint_{\Sigma} f(P) \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{R_{MP}} d\sigma_P =$$

$$= \iint_{\Sigma} f(P) \frac{\partial}{\partial n} \Delta \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) d\sigma_P = 0$$

Tekislikda potentsial tushunchasini aniqlaylik.  $L - M(x, y)$  ( $\cdot$ ) ni o'rab turuvchi yopik egri chiziq bo'lsin:

$$v(M) = \int_L g(P) \ln \frac{1}{\rho_{MP}} dl_P \quad \text{oddiy katlam potentsiali.}$$

$$u(M) = - \int_L f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) dl_P \quad \text{ikkilangan katlam potentsiali.}$$

Shunday qilib, potentsiallar garmonik funktsiyalardir. Bundan kelib chikadiki, ularni, ba'zi masalalarni yechishda, masalan Neyman masalasini yechishda qo'llash mumkin, buning uchun mos  $g$  va  $f$  funktsiyalarni tanlaymiz va bu funktsiyalarni mos potentsiallarning **zichliklari** deb ataymiz.

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Grin funksiyaning 1-chi xossasi
2. Grin funksiyaning 2-chi xossasi

### 1.3.2-b. Blitz-so'rov uchun savollar

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali.

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xaraktyerdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Prezentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### *Asosiy*

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobole» SL. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadzs L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.11. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixltn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*

8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

## **1.4. O'qitish usullari qoidalari**

### **1.4.1. Aqliy hujum qoidalari**

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastik va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;
- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

### **1.4.2. “Insert” texnikasi qoidalari**

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- “Insert” jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
 Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
 Agar «→» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
 Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
 Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

### **1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari**

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemadamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;

## **Ma'ruza № 14**

### **“Potensial xossalari. Fredgolm alternativasi.”**

## **Ma`ruzaga reja-topshiriqlar**

### **Fan: Matematik fizika tenglamalari**

**O`quv soati:** 2 soat (ma`ruza);

**O`quv mashg`uloti turi:** ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o`rganish.

### **Ma`ruza rejasi:**

1. Ikkilangan qatlam potentsiali
2. Potentsiallar xossalari.
3. Dirixlening ichki masalasini Fredgolmning 2-chi turdagi integral sistemasiga keltirish.
4. Fredgolm alternativasi.

### **O`quv mashg`uloti maqsadi:**

O`quv fani to`g`risida umumiy ta`surotlar berish, Matematik fizika tenglamalari va keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli.

### **O`quv mashg`uloti masalalari:**

- *O`rgatuvchi:* talabalarda qabul qilish faoliyatini tashkil qilish, yangi materialni boshlang`ich esda qoldirish va anglash; Matematik fizika tenglamalarining terminlari, iboralarini xarakterlovchi elementlar; talabalarining matematik firlashini rivojlantirish muammoli masalalarni yechimini mahoratini oshirish; matematik masalalarni yechishda matematik simvollarning hususiyatlari bilan tanishtirish;
- *Rivojlantiruvchi:* kitob matni bilan ishlay bilishligi – mag`zlarini tanlab olish, tahlil qilish; gaplar tuzish, hulosa chiqarish, materialni talabalarining izlash faoliyatini stimullashtirish; hususiydan umumiy holga o`tish usuli bilan tekshirish; tekshirish natijalarini tahlil qilib va uni umumlashtira olishini rivojlantirish; analitik-sintetik faoliyatning mantiqiy fikrlashini qo`llash; talabalarining ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *Tarbiyalovchi:* aktiv faoliyatga, mustaqil ishga jalb qilish; guruhlarda ishlash qoidalariga rioya qila olish; fanni o`rganishga qiziqishni rivojlantirish; Matematik fizika tenglamalarini matematik-komunikativ kursni bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg`ularini tarbiyalash, mehnatsevarlik, individual ishni jamoaviy ish bilan biriktirish, intizomlashtirish.

### **O`qitish texnologiyasi:**

- *O`qitish usullari:* instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, "Insert" texnikasi;
- *O`qitish shakllari:* frontal; jamoaviy;
- *O`qitish vositalari:* Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya;
- *O`qitish sharoitlari:* texnik jihozlashtirilgan auditoriya;
- *Baholash va monitoring:* o`g`zaki savol-javob, blits-so`rov.

### **Pedagogik masalalar:**

- Fanning masalalari va uning o`quv fanlar sistemasidagi o`rni va roli bilan tanishtirish;
- O`quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o`quv-metodik adabiyotlarni tasvirlash;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash shakli va muddatlari;
- Fan ma`ruzasi paytida o`qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy bosqichlarini xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish.
- O`qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;

### **O`quv faoliyati natijalari:**



- Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi;
- Matematik fizika tenglamalari doirasidagi yutuqlar yoritiladi;
- Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlari hamda baholash shakli va muddatlari aytiladi
- Fan ma`ruzasida o`qitish jarayonini tashkil qilishning umumiy sxemasini kengaytirib xarakterlab beradi;
- Fanning asosiy ta`riflarini beradi, Matematik fizika tenglamalari fani ma`ruzalarining asosiy yo`nalishlari beriladi;
- Nazariy bilimlarning to`liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi;
- Amaliy mag`ulotlarni bajarishda o`rganilgan iboralar bilan ishlay olishligi;

## • 1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi

### • 1 bosqich. O`quv mashg`ulotiga kirish (10 daqiqa):

- *O`qituvchining faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (davomat, konspektning borligi; o`ziga ishonch, aniqligi.); kerakli materiallarni tarqatish (konspekt, tarqatma materiallar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadini bayon qilish; o`quv mashg`ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar va so`zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro`yhati; o`quv natijalari haqida aytish;
- *Talabalar faoliyati:* o`quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko`rinish; o`quv materiallar va qo`llanmalar); ma`ruzaning mavzusi va maqsadi bilan tanishish; o`quv materialini qabul qilishga tayyorgarlik ko`rish;
- *Shakillar, usular, uslublar:* instruktaj; frontal so`rov; mustahkamlovchi so`rov.

### 2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa):

- *O`qituvchining faoliyati:* mavzuga kiritadi; yangi mavzuga doir o`tgan fanlar va mashg`ulotlarning mavzularini eslashga chorlaydi; ma`ruza matnini tarqatadi, tanishishni taklif etadi, "Insert" usuli bilan belgilar qo`yishni taklif etadi; birinchi savol bo`yicha matn o`qiladi; qo`shimcha o`quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon qilish va izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish; birinchi savol bo`yicha nazar (shunday qilib qolgan savollarga ham);
- *Talabalar faoliyati:* yangi mavzuda doir oldingi mashg`ulotlarda va fanlarda olgan bilimlarni mustahkamlaydi; har bir kalit ibora va terminlarni eshitib, yozib borib, konspekt qilib aytib borishadi; "Insert" usuli bilan belgilan o`qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o`zaro;
- *Shakillar, usular, uslublar:* frontav so`rov blits-so`rov; aqliy hujum, "Insert" texnikasi.

### 3 bosqich. Yakunlovchi qism (10 daqiqa)

- *O`qituvchining faoliyati:* mavzu bo`yicha hulosalar qilish, talabalarning e`tiborlarini asosiyalarda jalb qilish; qilingan ishning muhimligini aytib o`tish; alohida talabalarning bajarilgan ishlarini baholash; o`zaro baholashning natijalarini chiqarish; o`quv mashg`ulotning yutuqlik darajasini baholash va tahlil qilish; mustaqil ish uchun topshiriqlar; baho ko`rsatgichlari va me`zonlari;
- *Talabalar faoliyati:* ishning tahlili; natijalarni olish; texnologik bilimlarni qo`llash; o`zaro baholashni o`tkazish, yo`l qo`yilgan hatolar bo`yicha tahlil va aniqlik kiritish; mustaqil ish topshiriqlarini yozib olish;
- *Shakillar, usular, uslublar:* guruhlarda ishlash, kartochkalarda topshiriqlar.

## 1.3. O`quv-metodik materiallar

### Ma`ruza rejasi:

1. Ikkilangan qatlam potentsiali
2. Potentsiallar xossalari.
3. Dirixlening ichki masalasini Fredgolmning 2-chi turdagi integral sistemasiga keltirish.
4. Fredgolm alternativasi.

Tayanch iboralar: Ikkilangan qatlam potentsiali, potentsiallar xossalari, Dirixlening ichki masalasi, Fredgolmning 2-chi turdagi integral sistemasiga keltirish, Fredgolm alternativasi

### 1.3.1. Ma`ruza matni

#### 1. Ikkilangan qatlam potentsiali

Tekislikda ikkilangan qatlam potentsialini birmuncha batafsil ko`rib chiqamiz.

$$u(M) = - \int_L f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) dl_P \quad (3.12)$$

Faraz qilamiz L egri chiziq va unga o`tkazilgan urinmalar (ma`lum ma`noda) uzluksizdir. Shundan kelib chiqan holda


$$\begin{aligned}
 & - \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right): \\
 & \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) = \left\{ \rho_{MP} = \sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2} \right\} = - \frac{1}{\rho_{MP}} \frac{1}{2} \frac{2(\xi-x)}{\rho_{MP}} = - \frac{\xi-x}{\rho_{MP}^2}; \\
 & \frac{\partial}{\partial \eta} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) = - \frac{\eta-y}{\rho_{MP}^2}; \\
 & \vec{MP} = \{\xi-x, \eta-y\} \Rightarrow - \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) = - \left( \vec{n}, \text{grad} \ln \left( \frac{1}{\rho_{MP}} \right) \right) = \\
 & = \left( \vec{n}, \frac{\vec{MP}}{\rho_{MP}^2} \right) = \rho_{MP} \Rightarrow u(M) = \int_L f(P) \frac{\cos \angle(\vec{MP}, \vec{n})}{\rho_{MP}} dl_P
 \end{aligned} \quad (3.13)$$

Zichligi 1 ga teng bo`lgan potensial bo`lsin.

$$u_e(M) = \int_L \frac{\cos \angle(\vec{MP}, \vec{n})}{\rho_{MP}} dl_P$$

Qutb koordinatasi sistemasidan foydalanib hisoblaymiz. M no`qta orqali ma`lum bitta o`q o`tkazamiz va undan  $\phi$  burchaklarni hisoblaymiz. L egri chiziqning R nuqtasidan unga o`tkazilgan urinma bilan shu o`q o`rtasidagi burchakni  $[0, \pi/2]$  oraliqda  $\alpha$  burchagi deb belgilaymiz. Shunda quyidagi munosabatlar to`g`ri bo`ladi.

$$\begin{aligned}
 & \angle(\vec{MP}, \vec{n}) = \frac{\pi}{2} - \phi - \alpha \Rightarrow \cos \angle(\vec{MP}, \vec{n}) = \sin(\phi + \alpha) \Rightarrow \\
 & \Rightarrow u_e(M) = \int_L \frac{\sin(\phi + \alpha)}{\rho_{MP}} dl_P \quad (3.14)
 \end{aligned}$$



$$\begin{array}{ccc} & \phi & \\ M & & L \end{array}$$

$P(\varepsilon, \eta)$  nuqta koordinatalarida, to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasida qutb koordinatalar sistemasiga o'tamiz.

$$\begin{aligned} \xi &= r(\phi) \cos \phi; & d\xi &= [(r'(\phi) \cos(\phi) - r(\phi) \sin(\phi))] d\phi \\ \eta &= r(\phi) \sin \phi; & d\eta &= [(r'(\phi) \sin(\phi) + r(\phi) \cos(\phi))] d\phi \end{aligned} \quad (*)$$

Rasmdan ko'rinib turibdiki  $\begin{cases} d\xi = -dl \cos \alpha; \\ d\eta = dl \sin \alpha; \end{cases}$

(3.14) dagi integral ostidagi funksiyani o'zgartiramiz.

$$\begin{aligned} \sin(\phi + \alpha) dl &= \sin \phi \cos \alpha dl + \cos \phi \sin \alpha dl = \begin{cases} d\xi = -dl \cos \alpha \\ d\eta = dl \sin \alpha \end{cases} = \\ &= \cos \phi d\eta - \sin \phi d\xi = (*) \\ &= (\cos \phi \sin \phi' + r' \cos^2 \phi - r' \sin \phi \cos \phi + r \sin^2 \phi) d\phi = \\ &= r d\phi \Rightarrow \cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n}) dl = r(\phi) d\phi \Rightarrow u_e(M) = \int_L \frac{r(\phi)}{r(\phi)} d\phi = 2\pi \end{aligned}$$

Xuddi shunday o'zgartirishlar asosida nuqta soxadan tashqarida yoki uning chegarasida yotgan bo'lsa quyidagi munosabatlar o'rinli bo'lishini hosil qilamiz:

$$u_e(M) = \begin{cases} \pi, & M \in L \\ 0, & M \notin D \end{cases}$$

Shunday qilib

$$u_e(M) = \begin{cases} 2\pi, & M \in D \\ \pi, & M \in L \\ 0, & M \notin \overline{D} \end{cases} \quad (3.15)$$

## 2. Potensiallar xossalari.

Endi zichligi 1 ga teng bo'lgan potensial ifodasini bilgan holda bizning boshlang'ich potensialimizning ba'zi xossalari chiqaramiz.

Buning uchun quyidagi ta'rif kerak bo'ladi.

**Ta'rif**

$$\int_l F(P, M) dl_P$$

Integral  $M_0 \in L$  nuqtada tekis yaqinlashuvchi deyiladi, agar  $\forall \varepsilon > 0 \exists V(M_0) - M_0$  nuqtaning atrofii va  $l \in L$  yoy shunaqakim,  $\int_l F(P, A) dl_p$  integral  $\forall A \in V(M_0)$

yaqinlashuvchi bo'lsa va  $\left| \int_l F(P, A) dl_p \right| \leq \varepsilon$ .

Quyidagi teoremadan isbotsiz foydalanamiz.

**Teorema: 3.7**

$F(P, M)$  funksiya  $P \neq M$  hamma nuqtalarda uzluksiz bo'lsin. Shunda  $\int_l F(P, M) dl_p$

integral tekis yaqinlashadigan nuqtalarda uzluksiz funksiyadan iborat bo'ladi.

$L$  chegarada  $M_0$  nuqtani olib  $u(M) - f(M_0)u_e(M)$  funksiyani ko'rib chiqamiz.

**Teorema: 3.8**

**(3.12) dagi  $f(P)$  funksiya  $M_0$  nuqtada uzluksiz bo'lsa  $u(M) - f(M_0)u_e(M)$  funksiya  $M_0$  nuqtada uzluksiz bo'ladi.**

**Isbot:**

$$\begin{aligned} u(M) - f(M_0)u_e(M) &= \\ &= (3.13) = \int_L f(P) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n})}{p_{MP}} dl_p - \int_L f(M_0) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n})}{p_{MP}} dl_p = \\ &= \int_L f(P) - f(M_0) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n})}{p_{MP}} dl_p \end{aligned}$$

Bizning funksiyamiz uzluksizligidan  $\forall \varepsilon > 0$   $M_0$  nuqtaning shunday atrofi mavjud ekanligi kelib chiqadi. U yerda  $|f(P) - f(M_0)| \leq \varepsilon$

Demak markazi  $M_0$  nuqtada bo'lgan qutb koordinatalariga o'tib biz tomonimizdan egri chiziqqa qo'yilgan shartlarda

$$\left| \int_L f(P) - f(M_0) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n})}{p_{MP}} dl_p \right| = \left| \int_L f(P) - f(M_0) d\phi \right| \leq \varepsilon \left| \int_L d\phi \right| = 2\pi\varepsilon$$

hosil qilamiz.

Teorema isbotlandi.

Endi  $u_p(M)$  funksiya uchun (3.15) formuladan foydalanib teorema da'vosini hisobga olib

$u(M)$  funksiya  $M_0$  nuqtadagi ko'rinishi  $u_e(M)f(M_0)$

fnksiyaningg ko'rinishiga teng ekanligini hosil qilamiz.

Biz birinchi natijani hosil qildik.

**1.Natija**

$$\begin{aligned} u_{ich}(M_0) &= \lim_{\substack{M \rightarrow M_0 \\ M \in D}} u(M) \\ u_{tash}(M_0) &= \lim_{\substack{M \rightarrow M_0 \\ M \notin \bar{D}}} u(M) \end{aligned}$$

Shunda

$$\begin{aligned} u_{ich}(M_0) &= \lim_{\substack{M \rightarrow M_0 \\ M \in D}} u(M) + \pi f(M_0); \\ u_{tash}(M_0) &= \lim_{\substack{M \rightarrow M_0 \\ M \notin \bar{D}}} u(M) - \pi f(M_0) \end{aligned}$$

Shunday qilib, potensialni konturda shunday tasvirlash mumkin.

$$u(M_0) = \frac{u_{ich}(M_0) + u_{tash}(M_0)}{2}$$

## Natija 2.

agar  $f(P)$  funksiya  $L$  uzluksiz bo'lsa,  $u(M)$  funksiya  $M \in L$  uzluksiz bo'ladi.

### Isbot.

Biz konturda  $f(M)u_e(M) = \pi f(M)$ ;  $u(M) - f(M_0)u_e(M) = \psi(M)$

Uzluksiz funksiya ega bo'lamiz. Shunda  $u(M)$  funksiya quyidagi ko'rinishga keladi.

$$u(M) = \pi f(M) + \psi(M)$$

### 3. Dirixlening ichki masalasini Fredgolmning 2-chi turdagi integral sistemasiga keltirish.

Dirixlening ichki masalasini  $E^2$  da qaraymiz.

$$\begin{cases} (1) & u(x, y) \in C(\bar{D}); \\ (2) & u(x, y) = 0; \quad (x, y) \in D; \\ (3) & u(x, y) = \mu(x, y) \quad (x, y) \in L. \end{cases}$$

Yechimni ikki qatlam potentsialli ko'rinishda izlaymiz.

$$\bar{u}(M) = \int_L f(P) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n})}{r_{MP}}$$

Bo'lsin.

Shunda birinchi shart bajariladi.  $f(P)$  funksiyaning o'zgartirib ikkinchi va uchinchi shartlarni hosil qilamiz.

$$u(M) = \begin{cases} \bar{u}(M), & M \in D; \\ u_{ich}(M), & M \in L, \end{cases}$$

Yangi funksiya kiritamiz. Bu yerda  $\bar{u}_{tash}(M) = \lim_{A \rightarrow D} \bar{u}(A)$ .

Hosil qilingan funksiya  $D$  da garmonik bo'lishini tekshirish oson. Uchinchi shartni hosil qilish uchun 3.8 teoremadagi birinchi natijadan foydalanamiz. Shunda

$$\begin{cases} \bar{u}_{\text{shym}}(M) = \pi f(M) + \int_L f(P) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{u})}{r_{MP}} dl_P, & M \in L; \\ \bar{u}_{\text{shym}}(M) = \mu(M), & M \in L \end{cases} \Rightarrow \quad (3.16)$$

$$\Rightarrow \pi f(M) + \int_L f(P) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{u})}{r_{MP}} dl_P = \mu(M), \quad M \in L$$

Hosil bo'ladi. Hosil qilingan tenglama  $f(P)$  funksiya nisbatan Fredgolmaning ikkinchi turdagi integral tenglamasi deyiladi. Keyingi teoremani isbotsiz qabul qilamiz.

### 4. Teorema 3.9 (Fredgolm alternativasi).

**Agar bir jinsli integral tenglama (3.16) (ya'ni  $(\mu(M) \equiv 0)$ ) faqat oli yechimga ega bo'lsa shunda va faqatgina shu holda Fredgolmaning ikkinchi turdagi integral tenglamasi yagona uzluksiz yechim  $\forall \mu(M) \in C(L)$  ga ega bo'ladi.**

Bu teoremadan foydalanib Dirixlening [3.5] masalasining yechimi yagonaligini isbotlaymiz.

### Ta'rif.

Biz  $L$  konturda har qanday ikkita nuqtani olganda shu nuqtalarni birlashtiruvchi kesma butunligicha kontur ichida yotsa, bu kontur qa'tiy qavariq deb ataladi.

### Teorema 3.10 (Yagonalik teoremasi).

$D$  soxa qa'tiy qavariq ( $L$  qa'tiy qavariq kontur) bo'lsin. Shunda Dirixlening 3.5 ichki masalasi istalgan  $L$  dagi uzluksiz  $\mu(M)$  funksiya uchun yagona yechimga ega.

### Isbot

Fredgolmaning boshqa holiga muvofiq

$$\pi f(M) + \int_L f(P) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n})}{pMp} dl_p = 0, M \in L; \quad (3.17)$$

Faqat 0 li yechimga ega ekanligini isbotlash etarli. Shunday  $M_0 \in L$

nuqtani olamizki unda  $|f(M_0)| = \max_{M \in L} |f(M)|$  bilamizki zichligi 1 ga teng bo'lgan potensial formulasi 3.15 ga muvofiq

$$\pi f(M_0) = \int_L f(M_0) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{M_0P}, \vec{n})}{pM_0P} dl_p, M_0 \in L;$$

Bundan tashqari  $f(M)$  3.17 ning yechimi bo'lgani uchun

$$\pi f(M_0) + \int_L f(P) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{M_0P}, \vec{n})}{pM_0P} dl_p = 0;$$

bo'ladi. Hosil bo'lgan tengliklardan  $\int_L [f(P) + f(M_0)] \frac{\cos \angle(\overrightarrow{M_0P}, \vec{n})}{pM_0P} dl_p = 0$ ; hosil qilamiz.

$M_0 : |f(M_0)| \geq |f(P)| \forall P \in L$  ta'rifdan hamda

$\frac{\cos \angle(\overrightarrow{M_0P}, \vec{n})}{pM_0P} = \frac{d\varphi}{dl_p} > 0$  ekanligidan ham foydalanib

$f(M_0) + f(P) = 0 \quad (\forall P \in L)$  hosil qilamiz.

$P = M_0$  deb  $f(M_0) = 0 \Rightarrow f \equiv 0$

hosil qilamiz.

Teorema isbotlandi.

### 1.3.2-a. Frontal so'rov uchun savollar

1. Ikkilangan qatlam potentsiali?
2. Dirixlening ichki masalasi?

### 1.3.2-b. Blits-so'rov uchun savollar

1. Potensiallar xossalari?

### 1.3.2-c. Og'zaki so'rov uchun savollar

1. Fredgolm alternativasi?
2. Yagonalik teoremasi?

### 1.3.3. Mustaqil ish uchun topshiriqlar

- *takrorlash va mashqlar*: takrorlash, o'z-o'zini tekshirish, tahlil, qayta ishlash, mustahkamlash, eslab qolish, chuqurlashtirish;
- *yangi materiallarning mustaqil o'zlashtirish*: yangi adabiy va internet materiallar, konspekt qo'shimchasi; mustaqil iboralar tuzish;
- *ilmiy xarakterdagi ishlar*: muammoli holatlar, testlar, savollar, topshiriqlar tuzish; topshiriqlarni bajarish.

### 1.3.4. Kartochkalar uchun testlar

### 1.3.5. ekranga tayanch materiallarni ko'rsatish(slaydlar)

- Presentatsiya

### 1.3.6. Tavsiya etilgan adabiyotlar

#### Asosiy

1. Saloxiddinov M.S. *Matematik fizika tenglamolari*. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.
2. Mixlin S.G. *Kurs matematicheskoy fiziki*. M, 1968,
3. Sobolev S.L. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1966.
4. Bisadze L.V. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1976.
5. Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. *Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki*. M. 1977.

#### Qo'shimcha

1. Tixonov A.P., Samarskiy A.A. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1968.
2. Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. *Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1962.
3. Vladimirov B.C. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1981.
4. Polojii G.II. *Uravneniya matematicheskoy fiziki*. M. 1964.
5. Petrovskiy I.G. *Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi*. M., 1961.
6. Mixlin S.G. *Leksii po lineynym integralnym uravneniyam*. M. 1959.
7. Smirnov M.M. *Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki*.
8. Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. *Sbornik zadach po matematicheskoy fizike*. M. 1972.
9. Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. *Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki*. M. 1974.

## 1.4. O'qitish usullari qoidalari

### 1.4.1. Aqliy hujum qoidalari

- Hech qanday o'zaro baholash va tanqid;
- Taklif etilayotgan g'oyalarni baholashdan o'zingni tiy, hatto ular fantastik va iloji yo'q bo'lsa ham – hammasi mumkin;
- Tanqid qilma – hamma aytilgan g'oyalar birhirda;
- Bayon qiluvchi gapini bo'lma;
- Izoh berishdan o'zingni tiy;
- Maqsad bu - miqdor;
- Qancha g'oyalar ko'p bo'lsa chuncha yaxshi: yangi va zarur g'oya tug'ulishi imkoniyati ko'proq
- Agar g'oyalar takrorlansa o'ksinma,
- Tasavvo'ringga erk ber;

- Senda yaralgan g'oyalarni tashlama, agal ular sening nazaringda qabul qilingan sxemaga tegishli bo'lmasa ham;
- Bu muammo aniq usullar bilan yechiladi deb o'ylama.

#### **1.4.2. "Insert" texnikasi qoidalari**

- Matndi o'qib, ularda savollat tug'dirayotgan joylarni, ularni bilimlariga mos kelayotgan va mos kelmayotgan joylarni qalam bilan belgilab qo'yiladi;
- "Insert" jadvalini quyidagi belgilashlar bilan to'ldirish:  
Agar «!» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki siz o'ylagan fikrga to'g'ri kelayotganini o'qiyapsiz;  
Agar «–» bo'lsa siz o'z bilimingizga yoki tyo'g'ri deb o'ylaganingizga mutlaqo zid bo'lganini o'qiyapsiz;  
Agar «+» bo'lsa siz o'qiyotganingiz siz uchun yangilik;  
Agar «?» bo'lsa, siz o'qiyotganingiz siz uchun tushunarsiz yoki siz bu savolga yanada ko'proq ma'lumotlar olishni istaysiz.

#### **1.4.3. Guruhlarda ishlash qoidalari**

- Hamma o'z do'stlarini tinglashi kerak, unga yaxshi munosabatda bo'lib hurmar ko'rsatishi kerak;
- Hamma aktiv harakat qilishi lozim; berilgan topshiriqqa nisbatan birgalikda va javobgarlik bilan ishlashi kerak;
- Har kim o'ziga kerak paytda yordam so'rashi kerak;
- Har kim undan yordam so'ralganda yordam ko'rsatishi kerak;
- Guruhning ish natijalarini baholashda ishtirok etishi lozim;
- Biz bir kemandamiz, o'zgalarga yordam berib o'zimiz o'rganamiz, shuni har kim tushunishi lozim;



## **Mavzu 1. 2-chi tartibli chiziqli tenglamalar.2-chi tartibli xususiy xosilali differensial tenglamalar.**

### **Amaliy mashg'ulotlar rejasi**

**Fan:** “ Matematik fizika tenglamalari“.

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejasi:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

**O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

**O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash
- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

**O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish;o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari:* auditoriya
- *monitoring va baholash:* og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

**Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

**O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;

- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

## **1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.**

### **1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;
- *talaba faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;
- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;
- *talaba faoliyati:* oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi
- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

### **3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)**

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari
- *talaba faoliyati:* ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari*: guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### 1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

#### Misol va mashqlar namoishi

1.Xususiy hosilali tenglamaning umumiy yechimi haqida tushincha.

n-chi tartibli oddiy defferensial tenglamani qarab chiqamiz  $f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ .

Uning umumiy integrali n-ta ixtiyoriy o'zgarmas funksialar oilasini tashkil etadi

$F(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0$ . Ixtiyoriy xususiy yechimlarni -  $C_1, C_2, \dots, C_n$

parametrlarini aniq qiymati berilgan holda hosil qilish mumkin.

1.1Misol Faraz qilaylik  $u_x = 0$  tenglama berilgan bo'lsin .Bu tenglama shuni anglatadiki,  $u(x, y)$ -funksiya  $x$  -dan bog'liq emas. Ya'ni echimlar  $u(x, y) = y^2 + 2y$ ,  $u(x, y) = e^y + \sin y$  funksialardan iborat .Umumiy yechim:  $u(x, y) = C(y)$ , bo'lsa bu yerda  $C$  ,y-o'zgaruvchiga bog'liq bo'lgan funksiya .

1.2Misol  $u_x = f(x, y)$  tenglamani qaraymiz .Bu tenglama yechimini topish uchun,uni  $x$ -bo'yicha integrallaymiz 
$$\int u_x dx = \int f(x, y) dx + C. \quad (1.2)$$
  $x$ -bo'yicha integrallashda ,biz  $y$ -ni o'zgarmas deb olamiz va shuning uchun (1.2) dan  $C$ -ixtiyoriy o'zgarmas  $y$ -dan bog'liq bo'lishi mumkin.Xuddi shunday umumiy yechim quyidagicha.

$$u(x, y) = \int f(x, y) dx + C(y).$$

1.3Misol faraz qilaylik  $u_{xy} = 0$  tenglama berilgan 1.1 Misoldan shu narsa kelib chiqadiki  $u_y = C(y)$ .Bu tenglama (1.2) misol kabi quyidagiga ega bo'lamiz.

$$u(x, y) = \int C(y) dy + C_1(x).$$

$C_2(y) = \int C(y) dy$  deb olamiz .U holda umumiy yechim quyidagicha

$$u(x, y) = C_1(x) + C_2(y).$$

Shuni takidlaymizki , ixtiyoriy o'zgarishga bog'liq bo'lgan oddiy differensial tenglamalarning umumiy yechimidan farqli xususiy hosilali tenglamalarning umumiy yechimi ixtiyoriy funksiyadan bog'liq bo'ladi

Xususiy hosilali differensial tenglamalarning umumiy yechimida ixtiyoriy funksiya bor , ularning soni tenglamaning tartibiga teng

Faraz qilaylik 
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0. \quad (1.1)$$

tenglama berilgan bo'lsin.

Buning uchun tenglamani  $\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$ . ko'rinishga yozamiz. X-bo'yicha hosila

nolga tengligidan uni y-ixtiyoriy funksiyaga bog'liq diyish mumkin  $\frac{\partial u}{\partial y} = f(y)$ .

Shuning uchun  $u(x, y) = \int f(y) dy$ . Lekin ixtiyoriy  $f(y)$ , funksiyani integrallab, ixtiyoriy yangi  $F(y)$ , funksiyani,

plyus ixtiyoriy  $f(y)$ , -ni hosil qilamiz. Xuddi shunday (1.1) tenglamaning umumiy integrali  $u(x, y) = \phi(x) + F(y)$

Ikki ixtiyoriy funksiyaga ega. Endi  $u(x; y)$  -ng umumiy yechimidan xususiy yechimini topish uchun  $\phi(x)$  va  $F(y)$  konkret ko'rinishini topish kerak .Biroq shu yerda oddiy differensial tenglamalar va xususiy hosilali differensial tenglamalarning umumiy yechimini topish farqi shundan iboratki xususiy hosilali differensial tenglamalarning umumiy yechimini umumiylik tufayli konkret yechimni topish qiyinlashadi.

1.Xususiy hosilali differensial tenglamaning umumiy yechimini toping:

$$\frac{\partial^2 u(x; y)}{\partial x^2} = 0$$
 bu yerda  $u(x; y)$  -ikki o'zgaruvchili noma'lum funksiya

Echish: Tenglamani  $\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0$ . ko'rinishga yozamiz .Bu yerda  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,

x dan bog'liq emas ,ya'ni undan x bo'yicha xususiy hosila nolga teng

Shuning uchun  $\frac{\partial u}{\partial x} = C_1(y)$ , bu yerda  $C_1(y)$ -y-ga bog'liq ixtiyoriy funksiya

$\frac{\partial u}{\partial x} = C_1(y)$  tenglamada  $\frac{\partial u}{\partial x}$ -xususiy hosila x bo'yicha olinib, y-o'zgarmas sanaladi

.Chap va O'ng tomonni integrallab, qo'yilgan masalaning yechimini qo'lga kiritamiz.

$u(x, y) = \int C_1(y) dx = xC_1(y) + C_2(y)$ , Bu yerda  $C_1(y)$  va  $C_2(y)$ -ga bog'liq ixtiyoriy funksiya. Agar topilgan  $u(x, y)$  funksiyani ikki marta x-bo'yicha

defferensiallasak, u xolda  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ , bo'ladi, demak topilgan funksiya tenglamani umumiy yechimi ekan.

2. Tenglamani umumiy yechimini toping  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 - y$ .

Echish: Tenglamani  $\frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = x^2 - y$  ko'rinishga yozib uning chap va o'ng

tomonlarini y-bo'yicha integrallasak, (x-o'zgarmas sanaladi), u holda;

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \int (x^2 - y) dy = x^2 y - \frac{y^2}{2} + C_1(x).$$

Endi x-bo'yicha integrallaymiz (y-o'zgarmas sanaladi), ya'ni

$$u(x, y) = \int \left( x^2 y - \frac{y^2}{2} + C_1(x) \right) dx = \frac{x^3 y}{3} - \frac{y^2 x}{2} + C_1^*(x) + C_2(y). \text{ Bu yerda}$$

$C_1^*(x) = \int C_1(x) dx$ . Xuddi shunday, qaralayotgan tenglamani umumiy yechimi quyidagicha:

$$u(x, y) = \int \left( x^2 y - \frac{y^2}{2} + C_1(x) \right) dx = \frac{x^3 y}{3} - \frac{y^2 x}{2} + C_1^*(x) + C_2(y).$$

Bu yerda  $C_1^*(x) = \int C_1(x) dx$ . Ixtiyoriy funksiyalar bo'lib,  $C_1^*(x)$ -defferensiallanuvchi.

3. Xususiy hosilali defferensial tenglamani yeching:  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 2 \frac{\partial u}{\partial x}$ .

Echish: Tenglamani  $\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial y} - 2u \right) = 0$  ko'rinishda yozib chap va o'ng

tomonlarini x-bo'yicha integrallaymiz. U holda  $\frac{\partial u}{\partial y} - 2u = C_1(y)$ . Bu tenglamada

$\frac{\partial u}{\partial y}$  ni y-bo'yicha oddiy hosila kabi qarab, x-ni parametr deb sanaymiz. U holda

tenglama  $\frac{du}{dy} - 2u = C_1(y)$ . ko'rinishda bo'ladi. Biz birjinsli bo'lmagan birinchi

tartibli chiziqli tenglamaga ega bo'ldik. Uni yechsak :

$$u(x, y) = e^{\int 2dy} \left( C_2(x) + \int C_1(y) e^{-\int 2dy} dy \right) = C_2(x) e^{2y} + C_1^*(y).$$

Shunday qilib,  $u(x, y) = C_2(x) e^{2y} + C_1^*(y)$ , bu yerda  $C_2(x)$  va  $C_1^*(y)$  -ixtiyoriy funksiyalar.

### O'quv mashqlar

–misol va masalalarni eching

–teoremani isbotlang

–shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

### Uyga vazifa

Xususiy xosilali differensial tenglamalarni umumiy yechimini toping:

1.  $u(x, y) = C_1(x) + C_2(y)$ .
2.  $u(x, y) = \frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} + C_1(x) + C_2(y)$ .
3.  $u(x, y) = \frac{x^4}{12} + \frac{yx^2}{2} + xC_1(y) + C_2 y$ .
4.  $u(x, y) = e^{x+y} + yC_1(x) + C_2(x)$ .
5.  $u(x, y) = C_1(x) + \frac{1}{x} C_2(y)$ .
6.  $u(x, y) = C_1(x) e^{y^2} + C_2(y)$ .
7.  $u(x, y) = C_1(x) + C_2(y) e^{5x}$ .
8.  $u(x, y) = x^2 + C_1(y)x + C_2(y)$ .
9.  $u(x, y) = x^2 y + C_1(y) + C_2(x)$ .
10.  $u(x, y) = C_1(x) e^y + C_2(x)$ .
11.  $u(x, y) = \frac{xy^2}{2} + \frac{y^3}{6} + yC_1(x) + C_2(x)$ .
12.  $u(x, y) = x^3 + xC_1(y) + C_2(y)$ .

**Tavsiya etiladigan adabiyotlar**  
*Asosiy*

11. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
12. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
13. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
14. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
15. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

## Qo'shimcha

19. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
20. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
21. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
22. *Polojii G.11. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
23. *Petrovskiy I.G. Lekcii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
24. *Mixlenn S.G. Lekcii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
25. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
26. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
27. *Vladimirov I.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.

1. Xususiy xosilali differensial tenglama ta'rif bering.
2. Kvazichiziqli differensial tenglama qanday ko'rinishga ega?
3. Xususiy xosilali differensial tenglama tartibi deb nima aytiladi.
4. Kvazichiziqli differensial tenglama umumiy yechimi to'g'risidagi teoremani keltiring.
5. Bir jinsli tenglamaning yechimi to'g'risidagi teoremani keltiring.
6. Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglama qachon chiziqli deyiladi?
7. Matematik fizik tenglamalar kursi uchun xarakterli belgilashlarni keltiring.

### Mavzu 2. 2-chi tartibli xususiy xosilali differensial tenglamalarning klassifikasiya(giperbolik tip)

#### Amaliy mashg'ulotlar rejasi

Fan: "Matematik fizika tenglamalari".

O'quv soati: 2 s. (amaliy)

O'quv mashg'ulotlar turi: kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.



- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

#### **O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

#### **O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash
- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

#### **O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari:* auditoriya
- *monitoring va baholash:* og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

#### **Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

#### **O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

### **1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.**

#### **1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiq);**

- *o'qituvchi faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish ; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;
- *talaba faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

## **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;

- *talaba faoliyati*: oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashtirishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

## **3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari

- *talaba faoliyati*: ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari*: guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### **1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma**

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

#### **Misol va mashqlar namoishi**

Xuddi hosilali ikkinchi tartibli tenglamalar klassifikatsiyasi.

O'zgaruvchilarni almashtirish yordamida

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (2.1)$$

Tenglamani soddaroq ko'rinishga keltiramiz  $c \neq 0$ , deb yangi

$\xi = x + \lambda_1 y$ ,  $\eta = x + \lambda_2 y$ , o'zgaruvchilarni kiritamiz, bu yerda  $\lambda_1$  va  $\lambda_2$  hozircha

o'zgaruvchilarni bo'lib turli xil (aks holda  $\xi$  va  $\eta$  bir biriga erkli funksiyaga bo'lmaydi)

son shunday qilib,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}$$

va

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \lambda_1 \frac{\partial u}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial u}{\partial \eta},$$

U holda quyidagi munosabat o'rinli .  $\frac{\partial}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}$ ,  $\frac{\partial}{\partial y} \rightarrow \lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta}$ .

Shuning uchun

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \left( \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \left( \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \left( \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \left( \lambda_1 \frac{\partial u}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \lambda_1 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (\lambda_1 + \lambda_2) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \lambda_2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left( \lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \left( \lambda_1 \frac{\partial u}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \lambda_1^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2\lambda_1 \lambda_2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \lambda_2^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.$$

Bu ikkinchi tartibli hosilalarni a,2b va c- ga ko'paytirib qo'shamiz .U holda (2.1) tenglamaning chap tomoni quyidagicha bo'ladi .

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + C \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

Bu yerda

$$A = a + 2b\lambda_1 + c\lambda_1^2, \quad B = a + b(\lambda_1 + \lambda_2) + c\lambda_1\lambda_2, \quad C = a + 2b\lambda_2 + c\lambda_2^2.$$

Endi yordamchi kvadrat tenglamani qaraymiz  $c\lambda^2 + 2b\lambda + a = 0$ . Uning ildizlari

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{c}. \quad D = b^2 - ac \text{ diskriminantning qiymatiga qarab uch hol bo'ladi:}$$

Agar qaralayotgan sohada  $b^2 - ac > 0$ , bo'lsa u holda tenglama gepirbolik tipli, agar  $b^2 - ac = 0$ , bo'lsa u holda (2.1) tenglama parabolic tipli ,agar  $b^2 - ac < 0$ , bo'lsa, tenglama elliptic tipli bo'ladi.

U holda gipirbolik tipli tenglamaning kanonik ko'rinishi quyidagicha

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f(x, y, z, z'_x, z'_y), \text{ (yoki } \frac{\partial^2 z}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial \beta^2} = \Phi\left(\alpha, \beta, z, \frac{\partial z}{\partial \alpha}, \frac{\partial z}{\partial \beta}\right))$$

Bu yerda  $\alpha = \frac{x-y}{2}, \beta = \frac{x+y}{2}$ ;

Parabolik tipli uchun:  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f(x, y, z, z'_x, z'_y)$ ;

Elliptik tipli uchun:  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f(x, y, z, z'_x, z'_y)$

Umumiy holda yangi  $\xi = \xi(x, y)$ ,  $\eta = \eta(x, y)$ . -o'zgaruvchilar kiritiladi,  $\xi(x, y)$

va  $\eta(x, y)$  -ikki marta uzliksiz defferensialanuvchi funksiyalar va  $\begin{vmatrix} \xi'_x & \xi'_y \\ \eta'_x & \eta'_y \end{vmatrix} \neq 0$ .

$a dy^2 - 2b dx dy + c dx^2 = 0$  defferensiyal tenglama

$a \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y})$ . tenglamaning xarakteristik

tenglamasi diyiladi.

### Misollar

1.  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \sin x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \cos^2 x \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \cos x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ . tenglamani qaraymiz. Bu

tenglamani gepirbolik tipli, Yani  $b^2 - ac = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$ . Xarakteristik tenglamani tuzamiz  $dy^2 + 2 \sin x dx dy - \cos^2 x dx^2 = 0$  yoki tenglamaning chap

qismida  $dx dy - dx dy + \sin x dx^2 - \sin x dx^2$  yozib va uni guruxlasak, u holda

$(dy + (1 + \sin x) dx)(dy - (1 - \sin x) dx) = 0$ . Tenglamani integrallasak

$dy + (1 + \sin x) dx = 0$  va  $dy - (1 - \sin x) dx = 0$  u holda

$x + y - \cos x = C_1$ ,  $x - y + \cos x = C_2$ . Yangi o'zgaruvchilarni

$\xi = x + y - \cos x$ ,  $\eta = x - y + \cos x$ . formulalar buyicha kiritamiz. Uholda

yangi o'zgaruvchili tenglama  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ . ko'rinishda bo'ladi .  $\xi = \alpha + \beta$ ,  $\eta = \alpha - \beta$ ,

deb,kanonik ko'rinishdagi tenglamaga kelamiz  $\frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \beta^2} = 0$ .

Javob:Berilgan gepirbolik tipli tenglamaning kanonik ko'rinishi:  $\frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \beta^2} = 0$ .

2.Tenglamani kanonik ko'rinishga keltiring

$$u_{xx} + 3u_{xy} + 2u_{yy} = 0.$$

2)Xarakteristik tenglamani yozamiz

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0.$$

Bu yerda  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$  Tenglama gepirbolik tipli, shuning uchun

$\xi = y - x, \eta = y - 2x$  yoki  $\xi = y - \frac{3}{2}x, \eta = x$ . almashtirish olamiz. O'zgaruvchilarni

almashtirishdan keyin tenglama  $u_{\xi\eta} = 0$  yoki  $u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} = 0$ . ko'rinishni oladi. Shuni

ta'kidlaymizki  $u_{\xi\eta} = 0$  tenglamani yechimi 1.3 misolda qaralgan edi. Xuddi shunday, biz

(r) tenglamaning umumiy yechimini quyidagicha yozamiz .

$$u = \varphi(\xi) + \psi(\eta) = \varphi(y - x) + \psi(y - 2x).$$

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

### Uyga vazifa

1. Tenglamani kanonik ko'rinishga keltring .  $x^2u_{xx} - y^2u_{yy} = 0$ .

Ya'ni,  $b^2 - ac = 0 + x^2y^2 = x^2y^2 > 0$ , u holda tenglama gepirbolik tipli

Xarakteristik tenglamani tuzamiz:

$$x^2(dy)^2 - y^2(dx)^2 = 0 \Leftrightarrow (x dy + y dx)(x dy - y dx) = 0.$$

Ikkita differensial tenglamaga ega bo'lamiz

$$x dy + y dx = 0, \quad x dy - y dx = 0.$$

O'zgaruvchilarni ajratib va uni integrallasak

$$\frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0, \quad \ln |y| + \ln |x| = \ln C_1,$$

$$\frac{dy}{y} - \frac{dx}{x} = 0, \quad \ln |y| - \ln |x| = \ln C_2.$$

Potinsirlashdan keyin ikkita

$$xy = C_1, \quad \frac{y}{x} = C_2$$

Tenglamalar oilasining xarakteristikalarini topamiz. Ya'ni o'zgaruvchilarni kiritamiz .

$$\xi = xy, \quad \eta = y/x.$$

Yuqorida keltirilgan formulalardan foydalanib ,xususiy hosilalarni topamiz . Ya'ni

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = y u_\xi - \frac{y}{x^2} u_\eta,$$

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = x u_\xi + \frac{1}{x} u_\eta,$$

$$\begin{aligned} u_{xx} &= (u_{\xi\xi} \xi_x + u_{\xi\eta} \eta_x) y - (u_{\eta\xi} \xi_x + u_{\eta\eta} \eta_x) \frac{y}{x^2} + \frac{2y}{x^3} u_\eta = (y u_{\xi\xi} - \frac{y}{x^2} u_{\xi\eta}) y - \\ &- \left( y u_{\xi\eta} - \frac{y}{x^2} u_{\eta\eta} \right) \frac{y}{x^2} + \frac{2y}{x^3} u_\eta = y^2 u_{\xi\xi} - 2 \frac{y^2}{x^2} u_{\xi\eta} + \frac{y^2}{x^4} u_{\eta\eta} + 2 \frac{y}{x^3} u_\eta, \\ u_{yy} &= x(u_{\xi\xi} \xi_y + u_{\xi\eta} \eta_y) + \frac{1}{x}(u_{\eta\xi} \xi_y + u_{\eta\eta} \eta_y) = x \left( x u_{\xi\xi} + \frac{1}{x} u_{\xi\eta} \right) + \\ &+ \frac{1}{x} \left( x u_{\xi\eta} + \frac{1}{x} u_{\eta\eta} \right) = x^2 u_{\xi\xi} + 2 u_{\xi\eta} + \frac{1}{x^2} u_{\eta\eta}. \end{aligned}$$

Bularni berilgan tenglamaga quysak

$$x^2 \left( y^2 u_{\xi\xi} - 2 \frac{y^2}{x^2} u_{\xi\eta} + \frac{y^2}{x^4} u_{\eta\eta} + 2 \frac{y}{x^3} u_\eta \right) - y^2 \left( x^2 u_{\xi\xi} + 2 u_{\xi\eta} + \frac{1}{x^2} u_{\eta\eta} \right) = 0.$$

$$u_{\xi\eta} - \frac{1}{2\xi} u_\eta = 0.$$

Oxirgi ifodani soddalashtirib ,kanonik ko'rinishga kelamiz

2. Tenglamani kanonik ko'rinishga keltring  $z_{xx} \sin^2 x - z_{xy} 2y \sin x + z_{yy} y^2 = 0.$  ya'ni

$$b^2 - ac = y^2 \sin^2 x - y^2 \sin^2 x = 0, \text{ u holda tenglam gepirbolik tipli}$$

Xarakteristik tenglama quyidagicha bo'ladi :

$$\sin^2 x (dy)^2 + 2y \sin x dx dy + y^2 (dx)^2 = 0,$$

Yoki

$$(\sin x dy + y dx)^2 = 0.$$

$$(\sin x dy + y dx)^2 = 0.$$

tenglamadagi o'zgaruvchilarni ajratamiz va uni integrallab quyidagiga ega bo'lamiz :

$$\frac{dy}{y} + \frac{dx}{\sin x} = 0, \ln |y| + \ln \operatorname{tg} \frac{x}{2} = \ln C, y \operatorname{tg} \frac{x}{2} = C.$$

O'zgaruvchilarni ajratamiz

$$\xi = y \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \quad \eta = y,$$

Bu yerda y-ixtiyoriy funksiya bo'lib

$$\begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0.$$

Shartni qanoatlantirsin

Xususiy hosilali yangi o'zgaruvchilar ifodalaymiz u holda

$$z_x = z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x = \frac{1}{2} z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2},$$

$$z_y = z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y = z_\xi \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_\eta,$$

$$z_{xx} = \frac{1}{2} (z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\xi\eta} \eta_x) y \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{1}{4} z_{\xi\xi} y^2 \sec^4 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} y z_\xi \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2},$$

$$z_{yy} = (z_{\xi\xi} \xi_y + z_{\xi\eta} \eta_y) \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\eta\xi} \xi_y + z_{\eta\eta} \eta_y = z_{\xi\xi} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 2 z_{\xi\eta} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\eta\eta},$$

$$z_{xy} = \frac{1}{2} (z_{\xi\xi} \xi_y + z_{\xi\eta} \eta_y) y \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} z_\xi \sec^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2} (z_{\xi\xi} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\xi\eta}) y \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} z_\xi \sec^2 \frac{x}{2}.$$

Olingan xususiy hosilalarni berilgan differensial tenglamaga quysak:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4} z_{\xi\xi} y^2 \sec^4 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} y z_\xi \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} - \\ & - \left( z_{\xi\xi} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\xi\eta} \right) y^2 \sec^2 \frac{x}{2} \sin x - z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2} \sin x + \\ & + y^2 \left( z_{\xi\xi} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 2 z_{\xi\eta} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\eta\eta} \right) = 0. \end{aligned}$$

Soddalashtirib quyidagiga ega bo'lamiz

$$\frac{1}{2} z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} \sin^2 x + y^2 z_{\eta\eta} - z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2} \sin x = 0,$$

Yoki

$$y z_{\eta\eta} = z_\xi \sin x.$$

$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg}(x/2)}{1 + \operatorname{tg}^2(x/2)}$ , bolsa, u holda  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{\xi}{\eta}$ ,  $\sin x = \frac{2\xi\eta}{\xi^2 + \eta^2}$ . oxirgi  $z_{\eta\eta} = \frac{2\xi}{\xi^2 + \eta^2} z_\xi$  ga

ega bolamiz

3.  $U_{yy} - 2U_{xy} + 2U_x - U_y - 4e^x = 0$  Hususiy hosilali 2- tartibli tenglamani kanonik ko'rinishga keltiring.

Yechilishi: Bu tenglamani ko'rinishini quyidagi ko'rinishga keltiramiz.

$$0U_{xx} - 2U_{xy} + U_{yy} + 2U_x - U_y - 4e^x = 0$$

Bu tenglamani kanonik ko'rinishga keltiraylik. Bunda

$$a_{11} = 0, a_{12} = -1, a_{22} = 1$$

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11} a_{22} = (-1)^2 - 0 \cdot 1 = 1;$$

$$\Delta > 0;$$

Demak, tenglama giperbolik ko'rinishdagi tenglama ekan. Xarakteristik tenglamasi

$$a_{11} dy - (a_{12} \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11} a_{22}}) dx = 0$$

formulaga asosan

$$0 dy - (-1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 01}) dx = 0$$

kelib chiqadi. Bundan ikkita dif.tenglama hosil bo'ladi.

$$0 dy - (-1 - 1) dx = 0$$

$$0 dy - (-1 + 1) dx = 0$$

Hosil bo'lgan tenglamalardan esa mos ravishda

$$x = -y + C_1$$

$$C_2 = y$$

ildiz chiqadi .

Umumiy nazariyaga asosan o'zgarivchilarni quydagicha almashtiramiz.

$$\xi = y + x;$$

$$\eta = y;$$

Hosilalarni hisoblasak,

$$U_x = U_\xi;$$

$$U_y = U_\xi + U_\eta;$$

$$U_{xx} = U_{\xi\xi};$$

$$U_{xy} = U_{\xi\xi} + U_{\xi\eta};$$

$$U_{yy} = U_{\xi\xi} + 2U_{\xi\eta} + U_{\eta\eta}.$$

Biz tenglamani kanonik ko'rinishga keltirishdan oldin x ni topishimiz kerak.

$$\xi = y + x$$

$$\eta = y$$

dan  $x = \xi - \eta$  kelib chiqadi.

Bularni tenglamaga qo'yib soddalashtirish natijasida

$$U_{\xi\xi} - U_{\eta\eta} - U_\xi + U_\eta + 4e^{\xi-\eta} = 0$$

ko'rinishdagi kanonik tenglamaga kelamiz.

$$4. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial z}{\partial x} + 6 \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$



$$J. \frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial z}{\partial \xi} = 0, \quad \xi = x + y, \quad \eta = 3x + y.$$

$$5. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

$$J. \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} = 0, \quad \xi = \frac{x^2}{2} + y, \quad \eta = x.$$

$$6. U_{xx} - 9U_{yy} + 2U_x = 0.$$

$$7. u_{xx} + 8u_{xy} + 3u_x = 0$$

### **Javoblar**

$$2. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0.$$

Kanonik shakliga kelting

1.

$$u_{\xi\eta} - \frac{1}{2\xi} u_{\eta} = 0.$$

2.

$$z_{\eta\eta} = \frac{2\xi}{\xi^2 + \eta^2} z_{\xi}.$$

$$3. U_{\xi\xi} - U_{\eta\eta} - U_{\xi} + U_{\eta} + 4e^{\xi-\eta} = 0$$

$$4. \frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial z}{\partial \xi} = 0, \quad \xi = x + y, \quad \eta = 3x + y.$$

$$5. \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} = 0, \quad \xi = \frac{x^2}{2} + y, \quad \eta = x.$$

### **Tavsiya etiladigan adabiyotlar**

#### *Asosiy*

1. **Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.**
2. **Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,**
3. **Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.**
4. **Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.**
5. **Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.**

## 6. Qo'shimcha

7. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
8. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
9. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
10. *Polojii G.11. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
11. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
12. *Mixltn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
13. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
14. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
15. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.

1. Xususiy xosilali differensial tenglama qachon giperbolik tipdagi tenglama deyiladi?
2. 2–chi tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli giperbolik tipdagi tenglamani kanonik shakliga keltirish yo'lini ayting.

### Mavzu 3. 2-chi tartibli xususiy hosilali d.t. klassifikasiya (parabolic tip)

#### Amaliy mashg'ulotlar rejasi

**Fan:** “ Matematik fizika tenglamalari“.

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejasi:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

**O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

**O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash

- *rivojlantiruvchi*: o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy*: mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

#### **O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari*: individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari*: individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari*: daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari*: auditoriya
- *monitoring va baholash*: og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

#### **Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

#### **O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

### **1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.**

#### **1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqqa);**

- *o'qituvchi faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish ; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;
- *talaba faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;
- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

#### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqqa);**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi

topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;

- *talaba faoliyati*: oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

### 3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari

- *talaba faoliyati*: ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari*: guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### 1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

### Misol va mashqlar namoishi

2-chi tartibli hosilali defferensial tenglamalar klassifikasiasini (parabolic tip)

Faraz qilaylik  $U=U(x,y)$ -ikkita  $x$  va  $y$  o'zgaruvchili noma'lum funksia bo'lsin.

Uholda 2-chi tartibli tenglama deb quyidagicha aytamiz.

$$a(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x} + c(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + f(x,y,u,\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}) = 0 \quad (3.1)$$

Tenglamani  $\Delta = b^2 - ac$  ga qarab aniqlanadi.

Agar  $\Delta > 0$  bo'lsa, tenglama giperbolik tipli

Agar  $\Delta = 0$  bo'lsa, tenglama parabolic tipli

Agar  $\Delta < 0$  bo'lsa, elliptik tipli

(4)ni kanonik ko'rinishga keltirish uchun uning xarakteriteklarni tenglamasini yozish kerak.

$$\begin{cases} ady - (b + \sqrt{b^2 - ac})dx = 0, \\ ady - (b - \sqrt{b^2 - ac})dx = 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

So'ngra uning umumiy yechimini toppish kerak

$b^2 - ac > 0$  Bo'lganda, tenglama giperbolik tipli (3.2)-tenglama sestimasining umumiy integrallarini  $\varphi(x, y) = c_1; \psi(x, y) = c_2,$

Bilan ifodalab, yangi  $\xi, \eta$  -o'zgaruvchilarni  $\xi = \varphi(x, y); \eta = \psi(x, y).$

formula bilan kiritamiz. U holda (3.1) tenglama  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = F(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta})$

kurinishini oladi .Bu gepirbolik tipdagi tenglamaning kanonik ko'rinishidir.

$b^2 - ac = 0$  Bo'lganda, tenglama parabolic tipli (3.2) tenglamalar sestimasini umumiy integrallari  $\varphi(x, y) = \tilde{c}$  bilan ustma-ust tushadi .Yani  $\xi, \eta$  - o'zgaruvchilarni  $\xi = \varphi(x, y); \eta = \eta(x, y),$  formula bilan kiritamiz, bu yerda

$\eta(x, y)$  -funksia quydagi shartni qanoatlantiradi  $\begin{vmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{vmatrix} \neq 0,$  masalan  $\eta = x.$

U holda (3.1) tenglama  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + F(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}) = 0$  ko'rinishni oladi

bu parabolic tipdagi tenglamaning kanonik ko;rinishidir.

$b^2 - ac < 0.$  Bo'lganda ,tenglama elliptic tipli (3.2) tenglamalar sestimasining umumiy integrallari quyidagicha  $\varphi(x, y) \pm i\psi(x, y) = \tilde{c}$

Yangi  $\xi$  va  $\eta.$  -o'zgaruvchilarni  $\xi = \varphi(x, y); \eta = \psi(x, y).$  orqali kiritamiz. U holda

(3.1) tenglama  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + F(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}) = 0$  ko'rinishni oladiki, bu elliptic

tipdagi tenglamalarni kanonik ko'rinishidir.

1. Tenglamani kanonik ko'rinishiga keltiring  $x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$

Echish:Buyerda  $a = a = x^2, b = xy, c = y^2, b^2 - ac = x^2 y^2 - x^2 y^2 = 0;$  ya'ni tenglama parabolic tipli. Xarakteristik tenglamani tuzamiz  $x^2 dy^2 - 2xy dx dy + y^2 dx^2 = 0.$  Bu xolda ikkita xarakteristikalar oilasi ustma-ust tushadi  $x dy = y dx.$  tenglamani

qaraymiz. O'zgaruvchilarni ajratib uni integrallaymiz  $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$  yoki  $\ln|y| - \ln|x| = \ln|C|$ ,

$\frac{y}{x} = C$ . Yangi uzgaruvchilarni kiritamiz .  $\eta$ . ni shunday tanlaymizki

$\frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial \xi}{\partial y} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \neq 0$ . shart bajarilsin .Yani  $\xi$  va  $\eta$ . uzgaruvchi olib,u holda

berilgan tenglamani kanonik ko'rinishi quyidagicha  $\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2} = 0$ .

2.misol; 2.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + 9u_x + 9u_y = 0$

Xarakteristik tenglamani tuzamiz:

$$a_{11} = 1 \quad a_{12} = -1 \quad a_{22} = 1$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$(\lambda + 1)^2 = 0$$

Bu yerda  $\lambda_{1,2} = -1$  bulganligi uchun bu parabolik tipdagi tenglama. U xolda kuyidagi almashtirish kiritamiz:

$$\begin{cases} \xi = y - \lambda x \\ \eta = x \end{cases} \quad \begin{cases} \xi = y + x \\ \eta = x \end{cases}$$

$$u_x = u_\xi + u_\eta$$

$$u_y = u_\xi$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi}$$

Tenglama urniga kuyamiz:

$$u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} - 2u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\xi\xi} + 9u_\xi + 9u_\eta + 9u_\xi = u_{\eta\eta} + 18u_\xi + 9u_\eta$$

Demak, parabolik tipdagi tenglamamiz kanonik shakli kuyidagicha:

$$u_{\eta\eta} + 18u_\xi + 9u_\eta = 0$$

3.misol:Tenglamani kanonik ko'rinishga keltiring

$$u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y = 0. \quad (3.3)$$

Xarakteristik tenglamani yechib  $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ ,  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$  ga ega bulamiz. Yani,

(3.3) tenglama parabolic tipli.

$\xi = y - x, \eta = x$  Almashtirish kiritamiz, u holda

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = u_\eta - u_\xi,$$

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = u_\xi,$$

$$u_{xx} = (u_\eta - u_\xi)_\xi \xi_x + (u_\eta - u_\xi)_\eta \eta_x = -(u_{\eta\xi} - u_{\xi\xi}) + (u_{\eta\eta} - u_{\xi\eta}) = u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

$$u_{yy} = (u_\xi)_\xi \xi_y + (u_\xi)_\eta \eta_y = u_{\xi\xi},$$

$$u_{xy} = (u_\eta - u_\xi)_\xi \xi_y + (u_\eta - u_\xi)_\eta \eta_y = u_{\xi\eta} - u_{\xi\xi}.$$

Hosil bo'lgan ifodani (3.3) tenglamaga quyib, o'xshash hadlarini ixchamlasak,

$$u_{\eta\eta} + u_\eta = 0.$$

Hosil bo'ladi. Shuni takidlaymizki, biz bu tenglamani  $\eta$  parametriga bog'liqlik bo'lgan oddiy differensial tenglamadik qarash mumkin. Uni yechsak:

$$u = C_1(\xi) + C_2(\xi)e^{-\eta} = C_1(y-x) + C_2(y-x)e^{-x}.$$

Teorema: Agar  $z = \varphi(x, y)$  funksiya quyidagi tenglamaning

$$a_{11}z_x^2 + 2a_{12}z_xz_y + a_{22}z_y^2 = 0, \quad (3.4)$$

Yechim bo'lsa, u holda  $\varphi(x, y) = C$  (C-ixtiyoriy konstanta)

$$a_{11}(y')^2 - 2a_{12}y' + a_{22} = 0 \quad (3.5)$$

Umimiy integrali hisoblanadi. (bu yerda  $u = y = y(x), y' = dy/dx$ ).

Teskari, agar  $\varphi(x, y) = C$  (3.5) tenglamaning umumiy integrali bo'lsa, u holda  $u = z = \varphi(x, y)$  (3.4) tenglamaning yechimi bo'ladi. Ikki o'zgaruvchili 2-chi tartibli xususiy xosilali chiziqli tenglama  $u = u(x, y)$  funksiyani ko'rinishi quyidagicha

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu + f = 0 \quad (3.6)$$

Bu yerda  $a_{11}, a_{12}, a_{22}, b_1, b_2, c, f$   $x$  va  $y$  o'zgaruvchili funksiya, bundan tashqari

$a_{11}, a_{12}, a_{22}, b_1, b_2, c, f$  larning koefitsientlari orasida noldan farqli bor.  $x$  va  $y$  o'zgaruvchili (3.6) tenglamada, ya'ni  $\xi, \eta$  o'zgaruvchiga  $\xi = \varphi(x, y), \eta = \psi(x, y)$ , formula orqali o'tamiz. Faraz qilaylik  $\varphi(x, y), \psi(x, y)$ , funksiyalar,  $D$  sohaning  $x$  va  $y$  tekisligida ikki marta differensialanuvchi va o'tish yakobiani noldan farqli bo'lsin

Sohaning har bir nuqtasida

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0$$

U holda quydagilar o'rinli:

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \cdot \xi_x + u_\eta \cdot \eta_x, & u_y &= u_\xi \cdot \xi_y + u_\eta \cdot \eta_y, \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} \cdot \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \cdot \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \cdot \eta_x^2 + u_\xi \cdot \xi_{xx} + u_\eta \cdot \eta_{xx}, \\ u_{xy} &= u_{\xi\xi} \cdot \xi_x \cdot \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \cdot \xi_{xy} + u_\eta \cdot \eta_{xy}, \\ u_{xy} &= u_{\xi\xi} \cdot \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \cdot \xi_{xy} + u_\eta \cdot \eta_{xy}, \end{aligned}$$

(3.7)

$$\overline{a_{11} u_{\xi\xi} + 2a_{12} u_{\xi\eta} + a_{22} u_{\eta\eta} + F = 0}, \quad (3.8)$$

$$\overline{a_{11} = a_{11} \xi_x^2 + 2a_{12} \xi_x \xi_y + a_{22} \xi_y^2}, \quad (3.9)$$

$$\overline{a_{12} = a_{11} \xi_x \eta_x + a_{12} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + a_{22} \xi_y \eta_y}, \quad (3.10)$$

$$\overline{a_{22} = a_\eta \eta_x^2 + 2a_{12} \eta_x \eta_y + a_{22} \eta_y^2}, \quad (3.11)$$

Bu holda F bilan U-funksianing ikkinchi tartibli hosilasiga bog'liq bo'lmagan ifoda belgilangan

3.31 Masala. Tenglamani umumiy yechimini toping va uni kanonib ko'rinishga keltiring .

$$\text{Yechish } a_{11} = 2, a_{12} = \frac{5}{2}, a_{22} = -3, a_{12}^2 - a_{11} a_{22} = \frac{49}{4} > 0.$$

gaega bo'lamiz. Demak butun x O y tekislikida gipirbolik tipli tenglama (3.8)

$$\text{tenglamaning xarakteristik tenglamasi quyidagicha } 2(y')^2 - 5y' - 3 = 0. \quad t = y',$$

deb,  $2t^2 - 5t - 3 = 0$  kvadrat tenglamaga kelamiz. Uning yecimlari

$$t_1 = 3, t_2 = -\frac{1}{2} \quad (\text{turli haqiqiy yechimlar}), \quad y' \text{ ga qaytib, ikkita 1-chi tartibli oddiy}$$

defglamaga ega bo'lamiz:  $y' = 3$  va  $y' = -1/2$  Bularni ehamiz



$$y' = 3 \Leftrightarrow y = 3x + C \Leftrightarrow y - 3x = C,$$

$$y' = -0,5 \Leftrightarrow y = -0,5x + C \Leftrightarrow y + 0,5x = C.$$

Xarakteristik metodga asosan yani  $\xi, \eta$  - o'zgaruvchilarni  $\xi = y - 3x, \eta = y + 0,5x$  formula orqali kirirtamiz xususiy hosilalarni

hisoblaymiz  $\xi_x = -3, \xi_y = 1, \xi_{xx} = 0, \xi_{xy} = 0, \xi_{yy} = 0,$

$\eta_x = 0,5, \eta_y = 1, \eta_{xx} = 0, \eta_{xy} = 0, \eta_{yy} = 0$ . hosilalarni (3.8) ga quysak:

$$u_x = -3u_\xi + u_\eta \cdot 0,5, u_x = u_\xi + u_\eta, u_{xx} = 9u_{\xi\xi} - 3u_{\xi\eta} + 0,25u_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = -3u_{\xi\xi} - 2,5u_{\xi\eta} + 0,5u_{\eta\eta}, u_{yy} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}.$$

(3.3) ga  $u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}$  larni qo'ysak, u holda

$$2(9u_{\xi\xi} - 3u_{\xi\eta} + 0,25u_{\eta\eta}) + 5(-3u_{\xi\xi} - 2,5u_{\xi\eta} + 0,5u_{\eta\eta}) - 3(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) = 0.$$

O'xshash hadlarni ixchamlab, tenglamaning kanonik shaklini hosil qilamiz

$$: -24,5u_{\xi\eta} = 0 \text{ yoki } u_{\xi\eta} = 0$$

Bu tenglamani yechish uchun uni  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$  yoki  $\frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0$  ko'rinishga

yozamiz. Bu yerdan, bu yerda  $\frac{\partial u}{\partial \eta} = h(\eta)$  -ixtiyoriy faqat  $\eta$  bog'liq funksia  $\eta$  -

o'zgaruvchi bo'yicha integrallab  $u = u(\xi, \eta) = \int h(\eta) d\eta = f(\eta) + g(\xi)$

Bu yerda  $f'(\eta) = h(\eta)$  g-funksia bo'lsa, faqat  $\xi$  dan bog'liq. Ya'ni (3.2) tenglamani umumiy yechimi  $u(x, y) = f(y + 0,5x) + g(y - 3x)$  Bu yerda f va g ixtiyoriy ikki marta differensialanuvchi funksia

2. Faraz qilamizki sohada  $D: a_{11}^2 - a_{11} \cdot a_{22} = 0$  ya'ni (3.7) tenglama, parabolic tipli bo'lsin Xarakteristik tenglama faqat bitta  $y' = \frac{a_{12}}{a_{11}}$  faraz kilaylik

$\varphi(x, y) = C$  uning umumiy integrali  $\xi = \varphi(x, y)$ , deb olamiz  $\eta = \psi(x, y)$  funksia sifatida ixtiyoriy shunday funksiani olamizki

$$J(x, y) = \xi_x \cdot \eta_y - \xi_y \cdot \eta_x \neq 0. \text{ bo'lsa. U holda (3.7) tenglama } u_{\eta\eta} = \Phi. \text{ ko'rinishga}$$

ega

2.31 Masala Tenglamaning umumiy yechimini toping

$$49u_{xx} - 14u_{xv} + u_{vv} + 14u_x - 2u_v = 0 \quad (3.12)$$

Yechish: Bu yerda  $a_{11} = 49, a_{12} = -7, a_{22} = 1, b_1 = 14, b_2 = -2, c = f = 0,$

Tenglama parabolic tipli. Xarakteristik tenglamasi:  $49(v')^2 + 14v' + 1 = 0.$

Bu tenglamaning diskriminanti nolga teng.  $v' = \frac{1}{7}, v = -\frac{x}{7} + C, v + \frac{x}{7} = C$

Faqat bir guruh xarakteristikalar.  $\xi = v + \frac{x}{7}.$

Deb olamiz  $\eta$  funksiani ixtiyoriy tanlaymiz  $\eta = x$  (biroq

$J(x, y) = \xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x = \frac{1}{7} \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 \neq 0$ ). shartni tekshiramiz ). xususi

hosilalarni topamiz

$$\xi_x = \frac{1}{7}, \xi_y = 1, \xi_{xx} = 0, \xi_{yy} = 0, \xi_{xy} = 0, \eta_x = 1, \eta_y = 0, \eta_{xy} = 0, \eta_{yy} =$$

Va bularni (3.8) formulaga quyamiz, u holda

$$u_{xx} = \frac{1}{49} u_{\xi\xi} + \frac{2}{7} u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, u_{xv} = \frac{1}{7} u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}, u_{yv} = u_{\xi\xi}, u_x = \frac{1}{7} u_{\xi} + u_{\eta}, u_y = u_{\xi}.$$

$u_x, u_y, u_{xx}, u_{xv}, u_{yv}$  larni (3.12) tenglamaga quysak

$$49\left(\frac{1}{49} u_{\xi\xi} + \frac{2}{7} u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}\right) - 14\left(\frac{1}{7} u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}\right) + u_{\xi\xi} + 14\left(\frac{1}{7} u_{\xi} + u_{\eta}\right) - 2u_{\xi} = 0.$$

Qavslarni ochib, o'xshash hadlarni ixchamlasak, kanonik shakldagi tenglamaga kelamiz

$$49u_{\eta\eta} + 14u_{\eta} = 0 \text{ yoki } 7u_{\eta\eta} + 2u_{\eta} = 0$$

Xar bir  $r$  uchun, bu 2-chi tartibli o'zgarmas koefsentli chiziqli bir jinsli tenglamadir: uning xarakteristik tenglamalari esa  $7r^2 + 2r = 0$  yoki

$$r_1 = 0, r_2 = -\frac{2}{7};$$

Shuning uchun umumiy yechim quydagicha  $u = u(\xi, \eta)C_1(\xi) + C_2(\xi)e^{-2\eta/7}$  bu yerda  $C_1(\xi)$  va  $C_2(\xi)$  O'zgaruvchiga bog'liq ixtiyoriy funksia. Eski

o'zgaruvchilarga qaytib,

$$u(x, y)C_1\left(y + \frac{x}{7}\right) + C_2\left(y + \frac{x}{7}\right)e^{-2x/7} \text{ Bu yerda}$$

$C_1 C_2$  - Ikki marta differensialanuvchi funksiada

Faraz qilaylik  $D: a_{12}^2 - a_{11} \cdot a_{22} < 0$  (3.7) tenglama elliptic tipli bo'lsin, uning karakteristik tenglamasi 2-ta turli kompleks tenglamalardan iborat. Bulardan faqat bittasini qaraymiz, faraz qilamiz  $\varphi(x, y) = C$  uning umumiy integrali  $\xi = \operatorname{Re} \varphi(x, y)$ ,  $\eta = \operatorname{Im} \varphi(x, y)$  deb olamiz ( $\eta$ -haqiqiy qism,  $\eta$ -esa  $\varphi(x, y)$ ) funksianing mavhum qismi) U holda (3.7) tenglama  $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \Phi$  ko'rinishi oladi.

- 1.1 Misol. Tenglamani kanonik ko'rinishga keltiring

$$u_{xx} - 2u_{xy} + 2u_{yy} = 0. \quad (3.13)$$

Yechish. Karakteristik tenglamasi  $(y')^2 + 2y' + 2 = 0$   $t = y'$  belgilash olib,  $t^2 + 2t + 2 = 0$  kvadrat tenglamani hosil qilamiz. Uning yechimi  $t_{12} = -1 \pm \sqrt{-1} = -1 \pm i$ -kompleks sonlar. U holda  $y' = -1 \pm i$  faqat bitta tenglamani qaraymiz  $y' = -1 + i$  uning umumiy yechimi  $y = (-1 + i)x + C$  yoki  $y + x - ix = C$

Buyerda  $\varphi(x, y) = y + x - ix$   $\xi = \operatorname{Re} \varphi(x, y) = y + x$ ,  $\eta = \operatorname{Im} \varphi(x, y) = -x$  Deb olamiz hosilalarni topamiz  $\xi_x = \xi_y = 1$ ,  $\eta_x = -1$ ,  $\eta_y = 0$ , ikkinchi tartibli hosilalar nolga teng (3.8) formulaga asosan

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, u_{xy} = u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta}, u_{yy} = u_{\xi\xi}.$$

$$(1.13) \text{ qo'ysak } (u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) - 2(u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta}) + 2u_{\xi\xi}$$

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

### Uyga vazifa

Tenglamani tipini aniqlang va uni kanonik ko'rinishga keltiring.

$$1) \mathbf{1.} U_{xx} + 2U_{xy} + U_{yy} + 3U_x - 5U_y = 0$$

**Yechilishi:**

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1, \\ \text{Bunda } a_{12} &= -2, & \lambda^2 - 2\lambda + 1 &= 0 \\ a_{22} &= 1 \end{aligned}$$

$$(\lambda - 1)^2 = 0$$

$\lambda = 1$  demak tenglama parabolik kurinishdagi tenglama ekan.

Umumiy nazariyaga asosan uzgaruvchilarni quyidagicha almashtiramiz

$$\xi = y - x \quad \eta = x$$

Xosilalarni xisoblasak

$$U_x = -U_\xi + U_\eta;$$

$$U_{xx} = U_{\xi\xi} - 2U_{\xi\eta} + U_{\eta\eta};$$

$$U_y = U_\xi;$$

$$U_{yy} = U_{\xi\xi};$$

$$U_{xy} = -U_{\xi\xi} + U_{\xi\eta};$$

Bularni tenglamaga quyib

$$U_{\xi\xi} - 2U_{\xi\eta} + U_{\eta\eta} - 2U_{\xi\xi} + 2U_{\xi\eta} + U_{\xi\xi} - 3U_\xi + 3U_\eta - 5U_\xi = 0$$

soddalashtirish natijasida  $U_{\eta\eta} + 3U_\eta - 8U_\xi = 0$  kurinishdagi kanonik tenglamag kelamiz.

$$2. \quad u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + u_y = 0$$

Xarakteristik tenglamasini tuzamiz:

$$a_{11} = 1 \quad a_{12} = -1 \quad a_{22} = 1$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$(\lambda + 1)^2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -1 \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = -1$$

Bu yerda  $\lambda_{1,2} = -1$  bulganligi uchun bu parabolik tipdagi tenglama.

U xolda quyidagicha almashtirish kiritamiz:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -1$$

$$\begin{cases} \xi(x, y) = y - \lambda x \\ \eta(x, y) = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi(x, y) = y + x \\ \eta(x, y) = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi_x = 1 & \xi_y = 1 \\ \eta_x = 1 & \eta_y = 0 \end{cases}$$

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = u_\xi + u_\eta$$

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = u_\xi \cdot 1 + u_\eta \cdot 0 = u_\xi$$

$$u_{xx} = (u_\xi + u_\eta)_x = (u_\xi)_x + (u_\eta)_x = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{yy} = (u_{\xi})_y = u_{\xi\xi} \cdot 1 + u_{\xi\eta} \cdot 0 = u_{\xi\xi}$$

$$u_{xy} = (u_{\xi} + u_{\eta})_y = (u_{\xi})_y + (u_{\eta})_y = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}$$

Tenglamani urniga kuyamiz:

$$u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} - 2u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\xi\xi} + u_{\xi} = 0$$

Berilgan tenglamaning kanonik kurinishi quyidagicha buladi:

$$u_{\eta\eta} + u_{\xi} = 0$$

3.  $y^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + x^2 u_{yy} = 0;$

### Tavsiya etiladigan adabiyotlar Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

### Qo'shimcha

6. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
7. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
8. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
9. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
10. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
11. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
12. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*

13. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
14. *Vladimirov I.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

**Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.**

1. Xususiy xosilali differensial tenglama qachon parabolik tipdagi tenglama deyiladi?
2. 2–chi tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli parabolik tipdagi tenglamani kanonik shakliga keltirish yo'lini ayting.

## Mavzu 4. 2-chi tartibli xususiy xosilali d.t. klassifikasiya (elliptik tip)

### Amaliy mashg'ulotlar rejasi

**Fan:** "Matematik fizika tenglamalari".

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejasi:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

**O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

**O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash
- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

**O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari:* auditoriya
- *monitoring va baholash:* og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

**Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

**O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

## 1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.

### 1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqa);

- *o'qituvchi faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;
- *talaba faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;
- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

### 2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;
- *talaba faoliyati:* oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi
- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

### 3 bosqich. Yakuniy qism (10 daqiqa)

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari
- *talaba faoliyati:* ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;
- *qabul qilish shakli metodlari:* guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

## 1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

### Misol va mashqlar namoishi

### 2-chi tartibli xususiy xosilali d.t. klassifikasiya (elliptik tip)



2-chi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar klassifikatsiyasi (elliptic tip)

Ikkinchi tartibli chiziqli tenglama

§1. Ikkinchi tartibli chiziqli tenglamalarning klassifikatsiyasi.

Ikkinchi tartibli xususiy hosilali chiziqli yuqori tartibli gosilaga rga bo`lgan tenglamani qarab chiqamiz

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + F(x, y, u, u_x, u_y) = 0, \quad (4.1)$$

Bu yerda  $a_{11}, a_{12}, a_{22}$  lar X va Y funksiyalar hisoblanadi.

O`zgaruvchilarni almashtirish yordamida

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y),$$

Buning uchun detirminantnoldan farqli bo`lishi kerak

$$D = \begin{vmatrix} \varphi_x & \psi_x \\ \varphi_y & \psi_y \end{vmatrix}$$

Berilgan tenglamaga ekvivalent tenglamaga ega bo`lamiz. Bizni qo`yidagi savol qiziqtiradi:  $\xi$  va  $\eta$  yangi o`zgaruvchilarni qanday olish kerakki, berilgan tenglama soddaroq (kanonik) ko`rinishga ega bo`lsa.

Yangi o`zgaruvchilarga o`tib:

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x,$$

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y,$$

$$\begin{aligned} u_{xx} &= (u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x)_\xi \xi_x + (u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x)_\eta \eta_x = u_{\xi\xi} \xi_x^2 + u_\xi (\xi_x)_\xi \xi_x + \\ &+ u_{\eta\xi} \eta_x \xi_x + u_\eta (\eta_x)_\xi \xi_x + u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_\xi (\xi_x)_\eta \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\eta (\eta_x)_\eta \eta_x = \\ &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi [(\xi_x)_\xi \xi_x + (\xi_x)_\eta \eta_x] + u_\eta [(\eta_x)_\xi \xi_x + (\eta_x)_\eta \eta_x] = \\ &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Xuddi shunday

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy}, \quad (4.3)$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy}.$$

Bu hosilalarni (4.1)-ga qo`ysak:

$$\bar{a}_{11}u_{\xi\xi} + 2\bar{a}_{12}u_{\xi\eta} + \bar{a}_{22}u_{\eta\eta} + F_1(\xi, \eta, u_\xi, u_\eta, u) = 0, \quad (4.4)$$

Bu yerda

$$\begin{aligned}
\bar{a}_{11} &= a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{22}\xi_y^2, \\
\bar{a}_{12} &= a_{11}\xi_x\eta_x + a_{12}(\xi_x\eta_y + \eta_x\xi_y) + a_{22}\xi_y\eta_y, \\
\bar{a}_{22} &= a_{11}\eta_x^2 + 2a_{12}\eta_x\eta_y + a_{22}\eta_y^2.
\end{aligned}
\tag{4.5}$$

Shuni ta'kidlaymizki, agar berilgan tenglama chiziqli, ya'ni

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = b_1u_x + b_2u_y + cu + f,$$

U holda  $F_1$  qo'yidagi ko'rinishga ega.

$$F_1(\xi, \eta, u_\xi, u_\eta, u) = \beta_1u_\xi + \beta_2u_\eta + \gamma u + \delta.$$

Bu yo'l bilan, tenglama yana chiziqli bo'ladi.

$\xi = \varphi(x, y)$  o'zgaruvchini hunday olamizki,

(4.4) tenglamadagi  $\bar{a}_{11}$  nolga teng bo'lsa Buni uchun  $\xi = \varphi(x, y)$

$$a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{22}\xi_y^2 = 0. \tag{4.6}$$

tenglamaning yechimi bo'lishi zarur

(4.6) tenglamani ko'paytma shaklida yozish mumkin.

$$\left(a_{11}\xi_x - \left(-a_{12} + \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}\right)\xi_y\right)\left(a_{11}\xi_x - \left(-a_{12} - \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}\right)\xi_y\right).$$

Bu yo'l bilan (4.6) tenglama yechimi, ikkita chiziqli birinchi tartibli tenglamadan iborat bo'ladi.

$$a_{11}\xi_x - \left(-a_{12} \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}\right)\xi_y = 0. \tag{4.7}$$

§3 da kelib chiqadiki, (4.7) tenglamani yechish uchun, qo'yidagi tenglamaning umumiy integralini toppish kerak.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}}. \tag{4.8}$$

(4.8) tenglama yechimining ko'rinishiga ildiz ostidagi  $a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$  ifodani ishorasi ta'sir qiladi.

Bu ifodaning ishorasi yordamoda (4.1) tenglamaning tipi aniqlanadi.

(4.1) Tenglamani M nuqtada

Giperbolik tipli, agar  $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} > 0$

Elliptic tipli, agar  $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0$

Parabolic tipli, agar  $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 0$  bo'lsa,

$\bar{a}_{12}^2 - \bar{a}_{11}\bar{a}_{22} = (a_{12}^2 - a_{11}a_{22})D^2$ , tenglikning o'rinli ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin, bu yerdan tenglanning tipi o'zgaruvchilarni almashtirishda o'zgarmaydi.

Shuni ta'kidlash joyizki, tenglamaning tipi M nuqtaga bog'liq ba turli nuqtada turlicha bo'lishi mumkin.

1.1 Misol. Qo'yidagi tenglamani qaraymiz

$$u_{xx} + xu_{yy} = 0, \quad (4.9)$$

Buyerda .  $a_{11} = 1, a_{12} = 0$  va  $a_{22} = x$  ya'ni

$$a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -x.$$

Xuddi shunday  $x < 0$  bo'lganda (4.9) tenglamani gepirbolik tipli ,  $x = 0$  da parabolic tipli va  $x > 0$  da elliptic tipli.

§2. Ikkinchi tartibli chiziqli tenglamani kanonik ko'rinishga keltirish

$$a_{11}dy^2 - 2a_{12}dxdy + a_{22}dx^2 = 0 \quad (4.10)$$

Tenglamani (4.1) tenglamaning xarakteristik tenglamasi deymiz, uning integrallari esa – xarakteristikalar. (4.10) tenglama ikkita (4.8) tenglamaga ajraladi va (4.1) tenglamani kanonik ko'rinishiga keltirish uchun kattarol uynaydi Gepirbolik tenglamalar uchun xarakteristikalar haqiqiy va turli xil, elliptik tipdagi tenglamalar uchun kompleks va turlicha, parabolik tipli tenglamalar uchun ikkala xarakteristikalar haqiqiy va mos tushadi.

Bu holatlarni alohida qarab chiqamiz.

1. Gepirbolik tenglamalar uchun  $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} > 0$  va (4.8) tenglamaning o'ng qismi haqiqiy va turlicha. Uning umumiy integral  $\varphi(x, y) = C$  va  $\psi(x, y) = C$ , xarakteristikalar oilasini anglatadi.

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y),$$

Deb qo'ysak , u holda (4.5) ni  $\bar{a}_{11}$  va  $\bar{a}_{22}$  koeffisientlari nolga aynada va (4.4) tenglama  $u_{\xi\eta}$  oldidagi koeffisientiga bo'lsak, qo'yidagi ko'rinishni oladi.

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y),$$

Bu yerda  $\Phi = -\frac{F_1}{2\bar{a}_{12}}$ , Bu gepirbolikn tipdagi tenglamalarning kanonik ko`rinishi

deyiladi. Ko`pincha boshqa kanonik ko`rinishdan foydalaniladi.

$$\alpha = \frac{\xi + \eta}{2}, \quad \beta = \frac{\xi - \eta}{2},$$

Bu yerda  $\alpha$  va  $\beta$  - yangi o`zgaruvchilar. U holda

$$u_\xi = \frac{1}{2}(u_\alpha + u_\beta), \quad u_\eta = (u_\alpha - u_\beta), \quad u_{\xi\eta} = (u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta})$$

va (4.2) tenglama qo`yidagi ko`rinishga ega

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = \Phi_1,$$

Bu yerda  $\Phi_1 = 4\Phi$

2.Parabolik tipdagi tenglamalar uchun  $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 0$ , va (4.8) tenglama bitta  $\varphi(x, y) = C$ . umumiy integralni beradi.

Bu holda

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y),$$

Bu holda  $\psi(x, y)$  - ixtiyoriy funksiya,  $\varphi(x, y)$  bilan birgalikda teskari almashtirishli o`zgaruvchilar.

U holda

$$\bar{a}_{11} = a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{12}\xi_y^2 = a_{11}\left(\xi_x + \frac{a_{12}}{a_{11}}\xi_y\right)^2 = 0$$

$$\bar{a}_{12} = a_{11}\left(\xi_x + \frac{a_{12}}{a_{11}}\xi_y\right)\left(\eta_x + \frac{a_{12}}{a_{11}}\eta_y\right) = 0,$$

ya`ni,  $a_{12}^2 = a_{11}a_{22}$  (4.4) tenglamani  $u_{\xi\eta}$  oldidagi koeffisientiga bo`lsak, qo`yidagi parabolik tipdagi tenglama uchun kanonik ko`rinishiga ega bo`lamiz

$$u_{\eta\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta),$$

Bu yerda  $\Phi = -\frac{F_{11}}{\bar{a}_{22}}$ .

2. Elliptik tipdagi tenglamalar uchun

$a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0$  va (4.8) tenglamaning o'ng tomoni qo'shma kompleksdir, shuning uchun bu tenglamaning umumiy integrali ham qo'shma kompleksdir

$$\varphi(x, y) = C, \quad \bar{\varphi}(x, y) = C.$$

Kompleks o'zgaruvchilar va funksiyalar bilan ishlamaslik uchun, yangi haqiqiy  $\alpha$  va  $\beta$  o'zgaruvchilarni kiritamoz.

$$\alpha = \frac{\varphi + \bar{\varphi}}{2}, \quad \beta = \frac{\varphi - \bar{\varphi}}{2i},$$

yoki  $\varphi = \alpha + i\beta$ ,  $\bar{\varphi} = \alpha - i\beta$ . Bu yo'l bilan

$$\begin{aligned} 0 &= a_{11}\varphi_x^2 + 2a_{12}\varphi_x\varphi_y + a_{22}\varphi_y^2 = a_{11}(\alpha_x + i\beta_x)^2 + 2a_{12}(\alpha_x + i\beta_x)(\alpha_y + i\beta_y) + \\ &+ a_{22}(\alpha_y + i\beta_y)^2 = (a_{11}\alpha_x^2 + 2a_{12}\alpha_x\alpha_y + a_{22}\alpha_y^2) - (a_{11}\beta_x^2 + 2a_{12}\beta_x\beta_y + a_{22}\beta_y^2) + \\ &+ 2i(a_{11}\alpha_x\beta_x + a_{12}(\alpha_x\beta_y + \alpha_y\beta_x) + a_{22}\alpha_y\beta_y). \end{aligned}$$

bu yerdan ((4.5)ga qarang),  $\bar{a}_{11} = \bar{a}_{22}$ ,  $\bar{a}_{12} = 0$ .

(4.4) tenglama  $u_{\alpha\alpha}$  oldidagi koeffisientga bo'lgandan so'ng qo'yidagi ko'rinishni oladi.

$$u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = \Phi(\alpha, \beta, u, u_\xi, u_\beta),$$

Bu yerda  $\Phi = -\frac{F_1}{\bar{a}_{11}}$ .

Ya'ni  $a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$  ifodani ishorasidan (4.1) tenglamaning qo'yidagi kanonik ko'rinishini qo'lga kiritamiz.

1. Giperbolik tipli:  $u_{\xi\eta} = \Phi$  yoki  $u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = \Phi$ .
2. Parabolik tipli:  $u_{\eta\eta} = \Phi$ .
3. Elliptik tipli:  $u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = \Phi$ .

2. O'zgarmas koeffisientli chiziqli tenglamalarning kanonik ko'rinishi

O'zgaras koeffisientli ikkinchi tartibli chiziqli tenglamaning umumiy ko'rinishi qo'yidagicha.

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu + f(x, y) = 0. \quad (4.11)$$

(4.8) tenglamani yechib, xarakteristikalari qo'yidagi to'g'ri chiziqlarni hosil qilamiz

$$y = \lambda_1 x + C_1, \quad y = \lambda_2 x + C_2,$$

bu yerda  $\lambda_1$  va  $\lambda_2$  tenglamaning yehimlari (uni qo'laylik uchun xarakteristikakar ataymiz)

$$a_{11}\lambda^2 - 2a_{12}\lambda + a_{22} = 0. \quad (4.12)$$

Endi o'zgaruvchilarni almashtirish yordamida, ya'ni.

1. Agar  $\lambda_1$  va  $\lambda_2$  haqiqiy va va turlicha bo'lsa (giperbolik tipli)

$$\xi = y - \lambda_1 x, \quad \eta = y - \lambda_2 x \quad \text{yoki} \quad \xi = y - \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} x, \quad \eta = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} x;$$

2. Agar  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$  bo'lsa (parabolik tipli)

$$\xi = y - \lambda x, \quad \eta = x;$$

3. Agar  $\lambda_{1,2} = a \pm ib$  ( $b \neq 0$ ) bo'lsa (elliptic tipli)

$$\xi = y - ax, \quad \eta = bx;$$

(4.11) tenglama qo'yidagi ko'rinishlardan biriga keladi

1.  $u_{\xi\eta} + \Phi = 0$  yoki  $u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} + \Phi = 0$ ;

2.  $u_{\eta\eta} + \Phi = 0$ ;

3.  $u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} + \Phi = 0$ ;

bu yerda  $\Phi = \beta_1 u_\xi + \beta_2 u_\eta + cu + f$ .

1. Misol: Tenglamaning tipini aniqlang va uni kanonik ko'rinishiga keltiring.

$$u_{xx} + 2u_{xy} + 2u_{yy} + u_x = 0,$$

$$a = 1, b = 1, c = 2$$

$\Delta = b^2 - ac = -1$ ; Tenglama elliptic tipli, Xarakteristika tenglamalari

$$ady - (b \pm \sqrt{b^2 - ac})dx = 0,$$

$$dy - (1 \pm i)dx = 0.$$

$$y - x \pm ix = c, \xi = y - x, \eta = x.$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right) \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right) \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}.$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{\partial \xi}{\partial \eta} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left( \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) \frac{\partial \eta}{\partial \xi} = -\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}.$$

Olingan hosilalarni tenglama qo`ysak, u holda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0$$

Jabob:  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = -\frac{\partial u}{\partial \eta} + \frac{\partial u}{\partial \xi}.$

2. Misol. Tenglamani kanonik ko`rinishiga keltiring.

$$u_{xx} - 2u_{xy} + 2u_{yy} + u_x + u_y = 0. \quad (4.15)$$

Tenglamaning xarakteristik ildizlari

$$\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$$

$\lambda_{1,2} = -1 \pm i$  teng . tenglama-elliptik tipli, shuning qo`yidagi almashirishni olamiz

$$\xi = x + y, \quad \eta = x.$$

Qo`yidagi ifodalarni

$$\begin{aligned}
u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = u_\xi + u_\eta, \\
u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = u_\xi, \\
u_{xx} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \\
u_{xy} &= u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}, \quad u_{yy} = u_{\xi\xi},
\end{aligned}$$

(4.15) tenglamaga qo`ysak, u holda

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + 2u_\xi + u_\eta = 0. \quad (4.16)$$

Ikkinchi tartibli o`zgarmas koeffisientli chiziqli tenglamalar uchun, kanonik ko`rinishga keltirishini yanada soddaroq ko`rinishi mavjud. Buning uchun  $u$ -funksiyaning o`rniga yangi  $\mathcal{G}$  funksiya kiritamiz.

$$u = e^{\lambda\xi + \mu\eta} \mathcal{G},$$

Bu yerda  $\lambda$  va  $\mu$  - o`zgarmaslar. U holda

$$\begin{aligned}
u_\xi &= e^{\lambda\xi + \mu\eta} (\mathcal{G}_\xi + \lambda\mathcal{G}), \\
u_\eta &= e^{\lambda\xi + \mu\eta} (\mathcal{G}_\eta + \mu\mathcal{G}), \\
u_{\xi\xi} &= e^{\lambda\xi + \mu\eta} (\mathcal{G}_{\xi\xi} + 2\lambda\mathcal{G}_\xi + \lambda^2\mathcal{G}), \\
u_{\xi\eta} &= e^{\lambda\xi + \mu\eta} (\mathcal{G}_{\xi\eta} + \lambda\mathcal{G}_\eta + \mu\mathcal{G}_\xi + \lambda\mu\mathcal{G}), \\
u_{\eta\eta} &= e^{\lambda\xi + \mu\eta} (\mathcal{G}_{\eta\eta} + 2\mu\mathcal{G}_\eta + \mu^2\mathcal{G}).
\end{aligned} \quad (4.17)$$

Bu ifodalarni qo`yidagi tenglamaga qo`yib  $u_{\xi\xi} + \beta_1 u_\xi + \beta_2 u_\eta + cu + f = 0$

va so`ngra  $e^{\lambda\xi + \mu\eta}$  qisqartirsak, u holda

$$\mathcal{G}_{\xi\eta} + (\mu + \beta_1)\mathcal{G}_\xi + (\lambda + \beta_2)\mathcal{G}_\eta + (\lambda\mu + \beta_1\lambda + \beta_2\mu + C)\mathcal{G} + f_1 = 0.$$

$\lambda$  va  $\mu$  parametrni shunday tanlaymizki, birinchi hosila oldidagi koeffisientlar nolga

$$\text{aylansa } (\lambda = -\beta_2, \mu = -\beta_1)$$

Natijada

$$\mathcal{G}_{\xi\eta} + \gamma\mathcal{G} + f_1 = 0,$$



Bu yerda  $\gamma = \lambda\mu + \beta_1\lambda + \beta_2\mu + c = c - \beta_1\beta_2$ ,  $f_1 = fe^{-(\lambda\xi + \mu\eta)}$ .

Shunga o'xshash boshqa kanonik ko'rinishi uchun xam soddalashtirishlarni keltirishi mumkin. Nihoyat koeffisientlari o'zgarmas bo'lgan qo'yidagi tenglamalarning kanonik ko'rinishiga kelamiz.

1. Giperbolik tipli:  $\mathcal{G}_{\xi\eta} + \gamma\mathcal{G} + f_1 = 0$  yoki  $\mathcal{G}_{\xi\xi} - \mathcal{G}_{\eta\eta} - \gamma\mathcal{G} + f_1 = 0$ .
2. Parabolik tipli:  $\mathcal{G}_{\eta\eta} + \beta_1\mathcal{G}_\xi + f_1 = 0$ .
3. Elliptik tipli:  $\mathcal{G}_{\xi\xi} + \mathcal{G}_{\eta\eta} + \gamma\mathcal{G} + f_1 = 0$ .

2.4 Misol: 2 misoldagi (4.16) tenglamani soddalashtiramiz. (4.17)dagi ifodadagi hosilalarni qo'yib,  $e^{\lambda\xi + \mu\eta}$  ga qisqartirsak, u holda

$$\mathcal{G}_{\xi\xi} + \mathcal{G}_{\eta\eta} + 2(\lambda + 1)\mathcal{G}_\xi + (2\mu + 1)\mathcal{G}_\eta + (\lambda^2 + \mu^2 - 2\lambda + \mu)\mathcal{G} = 0.$$

$$\lambda = -1, \quad \mu = -\frac{1}{2}. \text{ deb olamiz.}$$

U holda tenglama qo'yidagi ko'rinishga ega.

$$\mathcal{G}_{\xi\xi} + \mathcal{G}_{\eta\eta} - \frac{5}{4}\mathcal{G} = 0.$$

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

### Uyga vazifa

### Tavsiya etiladigan adabiyotlar

#### Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*

4. *Bisadzs L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.11. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixltn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

#### Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.

1. Xususiy xosilali differensial tenglama qachon elliptik tipdagi tenglama deyiladi?
2. 2–chi tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli elliptik tipdagi tenglamani kanonik shakliga keltirish yo'lini ayting.

#### Mavzu 5. Dalamber formulasi

##### Amaliy mashg'ulotlar rejasi

**Fan:** “ Matematik fizika tenglamalari“.

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejasi:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish

- Yakuniy tahlil

### **O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

### **O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash

- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;

- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish

- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.

- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar

- *o'qitish shartlari:* auditoriya

- *monitoring va baholash:* og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

### **Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish

- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;

- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;

- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashgulotlarda ishlay olish;

- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;

- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;

- tajriba natijalarini analiz qila olish;

## **1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.**

### **1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish ; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;

- *talaba faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

## **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;

- *talaba faoliyati*: oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashtirishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

## **3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari

- *talaba faoliyati*: ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari*: guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### **1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma**

O'quv mashg'ulotlar rejası:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

### **Misol va mashqlar namoishi**

#### **Dalamber formulasi**

To'lqin tenglamasi uchun Koshi masasalasi

$$u_{tt} = a^2 \Delta u + f(x, t)$$

Boshlang'ich shartlarda

$$u|_{t=0} = u_0(x), \quad u_t|_{t=0} = u_1(x),$$

Bu yerda  $f$ ,  $u_0$ ,  $u_1$  berilgan funksiyalar bo'lib, Dalamber formulasi orqali topiladi

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[u_0(x + at) + u_0(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} u_1(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

4.1 Misol.  $u_{tt} = 4u_{xx}$   $u|_{t=0} = x^2$ ,  $u_t|_{t=0} = x$ . tenglamaning yeching. Tenglamada  $a = 2$ ,  $u_0(x) = x^2$ ,  $u_1(x) = x$ ,

U holda  $u_1(\xi) = \xi$ .

Dalamber formulasini qo'llasak

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2}[(x + 2t)^2 + (x - 2t)^2] + \frac{1}{4} \int_{x-2t}^{x+2t} \xi d\xi = \\ &= \frac{1}{2}(2t^2 + 8t^2) + \frac{1}{4} \xi^2 \Big|_{x-2t}^{x+2t} = x^2 + 4t^2 + 4xt = (x + 2t)^2. \end{aligned}$$

4.2 Misol.  $u_{tt} = 4u_{xx} + e^x + t$  при  $u|_{t=0} = x$ ,  $u_t|_{t=0} = \frac{\ln x}{x}$ . tenglamani yeching

Dalamber formulasidan:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2}[(x + 2t) + (x - 2t)] + \frac{1}{4} \int_{x-2t}^{x+2t} \frac{\ln \xi}{\xi} d\xi + \frac{1}{4} \int_0^t \int_{x-2(t-\tau)}^{x+2(t-\tau)} (e^\xi + \tau) d\xi d\tau = \\ &= x + \frac{1}{8} \ln^2 \xi \Big|_{x-2t}^{x+2t} + \frac{1}{4} \int_0^t (e^\xi + \xi\tau) \Big|_{x-2(t-\tau)}^{x+2(t-\tau)} d\tau = x + \frac{1}{8} [\ln^2(x + 2t) - \ln^2(x - 2t)] + \\ &+ \frac{1}{4} \int_0^t [e^{x+2(t-\tau)} + (x + 2(t - \tau))\tau - e^{x-2(t-\tau)} - (x - 2(t - \tau))\tau] dt = \\ &= x + \frac{1}{8} [\ln^2(x + 2t) + \ln^2(x - 2t)] - \frac{1}{4} e^x + \frac{1}{6} t^3 + \frac{1}{8} (e^{x+2t} + e^{x-2t}). \end{aligned}$$

ya'ni, torni erkin tebranishi uchun biz qo'yidafi bir jinsli tenglamani

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (5.1)$$

$$u|_{t=0} = f(x), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = F(x), \quad (5.2)$$

boshlang'ich shartlarda yechish kerak, bu yerda  $f(x)$  va  $F(x)$  butun sonli o'qda berilgan funksiyalardir. Bunday masala boshlang'ich shartli masala'ki Koshi masalasi deyiladi. Bu masalani to'liqin yugirishi metodi bilan yechish mumkin. (5.1) tenglama umumiy yechimining ko'rinishi qo'yidagicha:

$$u(x, t) = \varphi(x - at) + \psi(x + at), \quad (5.3)$$

bu yerda  $\varphi$  va  $\psi$  ikki marta differensiallanuvchi sanaladi.  $\varphi$  va  $\psi$  ni shunday tanlaymizki  $u = u(x, t)$  funksiya (5.2) boshlang'ich shartlarni qanoatlantirsak, u holda differensial tenglamaning yechishini keltirib chiqamiz.

$$u = \frac{f(x - at) + f(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} F(z) dz.$$

### Uyga vazfa

5.3 tenglamaning yechimini toping.  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ,

Agar  $u|_{t=0} = x$ ,  $\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$ . bo'lsa

Yechish. Ya'ni  $a=1$ ,  $F(x)=0$ , u holda

$$u = \frac{f(x - at) + f(x + at)}{2} \quad \text{Bu yerda } u = \frac{x - t + x + t}{2}$$

va  $u=x$

Javob:  $u=x$

5.4 Tenglamaning yechimini toping  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ , agar  $u|_{t=0} = 0$ ,  $\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = x^3$ .

Yechish. Bu yerda  $f(x) = 0$ ,  $F(x) = x^3$ .

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} z^3 dz = \frac{1}{8a} z^4 \Big|_{x-at}^{x+at} = \frac{1}{8a} ((x+at)^4 - (x-at)^4) = \\ &= \frac{1}{8a} (x^2 + 2axt + a^2t^2 + x^2 - 2axt + a^2t^2)(x^2 + 2axt + a^2t^2 - x^2 + 2axt - a^2t^2) = \\ &= \frac{1}{8a} (2x^2 + 2a^2t^2) \cdot 2 \cdot 2axt = \frac{1}{a} (x^3at + xa^3t^3) = x^3t + xt^3a^2. \end{aligned}$$

Javob:  $u = x^3t + xt^3a^2$ .

5.5  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ , tenglama bilan aniqlanadigan torning formasini toping  $t = \pi$ ,

momentda

Agar  $u|_{t=0} = \cos x$ ,  $\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = x$ .

Yechish

$$\begin{aligned} u &= \frac{\cos(x+at) + \cos(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} z dz = \\ &= \cos x \cos at + \frac{1}{2a} \cdot \frac{z^2}{2} \Big|_{x-at}^{x+at} = \cos x \cos at + \frac{1}{4a} \cdot 4atx = \cos x \cos at + xt. \end{aligned}$$

Agar  $t = \pi$ , bo'lsa, u holda  $u = \cos a\pi \cdot \cos x + \pi x$ .

Javob:  $u = \cos a\pi \cdot \cos x + \pi x$ .

Bir jinsli tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masala

$u_{tt} = a^2 u_{xx}$ , birjinsli to'liq tenglamasi  $u(0, x) = \varphi(x)$ ,  $\frac{\partial u(0, x)}{\partial t} = \psi(x)$  boshlang'ich shartlar va  $U(t, 0) = U(t, l) = 0$ . va chegaraviy shartlar bilan berilgan bo'lsin

Berilgan masala Fure metodi bilan yechiladi agarda yechim  $U(t, x) = X(x)T(t)$ . ko'rinishda ifodalansa  $U(t, x)$  berilgan tenglamaga qo'yib  $X(x)$  va  $T(t)$  funksiyhala

uchun tenglamaga ega bo'lamiz.  $X'' = -\lambda^2 X$  tenglamani  $X(x)$  ga  $X(0) = X(l) = 0$  chegaraviy shartlarga nisbatan yechsak

$$X(x) = X_n(x) = A_n \sin \frac{\pi n}{l} x, \lambda = \lambda_n = \frac{\pi n}{l}.$$

$T'' = -\lambda^2 a^2 T$  tenglamani  $T(t)$  nisbatan yechsak,  $T(t) = T_n(t) = C_n \sin \frac{a\pi n}{l} t + D_n \cos \frac{a\pi n}{l} t$ ,

bu yerda,  $A_n, C_n, D_n$  konstantalar. Tenglamani birjinsligidan  $A_n = 1$  deb olish mumkin.

Demak, berilgan tenglamani umumiy yechimi qo'yidagicha:

$$U(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \sin \frac{a\pi n}{l} t + D_n \cos \frac{a\pi n}{l} t) \sin \frac{\pi n}{l} x.$$

$C_n, D_n$  Konstantalarni topish uchun boshlang'ich shartlardan foydalanamiz.

$$U(0, x) = \varphi(x), \frac{\partial U(0, x)}{\partial x} = \psi(x).$$

U holda qo'yidagi tenglamalarga ega bo'lamiz

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{\pi n}{l} x &= \varphi(x), & D_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx, \\ \sum_{n=1}^{\infty} C_n \frac{a\pi n}{l} \sin \frac{\pi n}{l} x &= \psi(x), & C_n &= \frac{2}{a\pi n} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx. \end{aligned}$$

1. Misol. Bir jinsli to'liq tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$\begin{aligned} U_{tt} &= a^2 U_{xx}, a = 1,5 \\ U(0, x) &= x(l-x), \frac{\partial U(0, x)}{\partial t} = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0. \end{aligned}$$

Yechim qo'yidagi ko'rinishga yoziladi.

$$U(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \sin \frac{a\pi n}{l} t + D_n \cos \frac{a\pi n}{l} t) \sin \frac{\pi n}{l} x, \text{ bu yerda}$$



$$C_n = 0, \psi(x) = 0, D_n = \frac{2}{l} \int_0^l x(l-x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx, \varphi(x) = x(l-x), D_n$$

Hisoblashlarni ikki marta qismlarga integrallashlardan boshlaymiz

$$\begin{aligned} D_n &= \frac{2}{l} \int_0^l x(l-x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx = -\frac{2}{\pi n} \int_0^l x(l-x) d \cos \frac{\pi n}{l} x = -\frac{2}{\pi n} x(l-x) \cos \frac{\pi n}{l} x \Big|_0^l + \\ &+ \frac{2}{\pi n} \int_0^l \cos \frac{\pi n}{l} x(l-2x) dx = \frac{2l}{(\pi n)^2} \int_0^l (l-2x) d \sin \frac{\pi n}{l} x = \frac{2l}{(\pi n)^2} (l-2x) \sin \frac{\pi n}{l} x \Big|_0^l + \\ &+ \frac{4l}{(\pi n)^2} \int_0^l \sin \frac{\pi n}{l} x dx = -\frac{4l^2}{(\pi n)^3} \cos \frac{\pi n}{l} x \Big|_0^l = -\frac{4l^2}{(\pi n)^3} \cos \pi n + \frac{4l^2}{(\pi n)^3} = \frac{4l^2}{(\pi n)^3} [1 - \cos \pi n] = \\ &= \frac{4l^2}{(\pi n)^3} [1 + (-1)^{n+1}] \end{aligned}$$

$$\text{Jabob: } U(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4l^2}{(\pi n)^3} [1 + (-1)^{n+1}] \cos \frac{1,5\pi n}{l} t \sin \frac{\pi n}{l} x.$$

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

### Uyga vazifa

$$4.3 \text{ Tenglamani yechimini toping: } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \text{ yeyoki } u|_{t=0} = x, \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0.$$

$$4.4 \text{ Tenglamani yechimini toping } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \text{ yoki } u|_{t=0} = 0, \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = x^3.$$

$$1. U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = (l-x) \sin \frac{\pi x}{l}, \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$2. U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x \sin(l-x), \left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{t=0} = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$3) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 4, U(0, x) = 2(l-x) \sin x, \left. \frac{\partial U}{\partial t} \right|_{t=0} = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$4) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 10, U(0, x) = 10x, U(t, 0) = U(t, l) = 0, \left. \frac{\partial U}{\partial t} \right|_{t=0} = 0.$$

**Tavsiya etiladigan adabiyotlar**  
**Asosiy**

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

**Qo'shimcha**

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

**Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.**

5. Dalamber formulasini yozing.
6. Xususiy xosilali tenglamaga uchun klassifikasiyani keltiring.
7. Tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasi.

**Mavzu 6. Shturm-Liuvil masalasi**

**Amaliy mashg'ulotlar rejasi**

**Fan:** "Matematik fizika tenglamalari".

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejasi:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

**O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

**O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash
- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

**O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari:* auditoriya
- *monitoring va baholash:* og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

**Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

**O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

## 1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.

### 1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqa);

- *o'qituvchi faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish ; o'quv

darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;

- *talaba faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayorgarlik;

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

## **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;

- *talaba faoliyati*: oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

## **3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari

- *talaba faoliyati*: ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari*: guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### **1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma**

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

### **Misol va mashqlar namoishi Shturm-Liuvil masalasi**

1.Misol Shturm-Liuvil masalasini yeching

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, \\ y(3/2) = y'(1/2) = 0. \end{cases}$$

Faraz qilaylik  $\lambda = \omega^2$  ( $\omega > 0$ ). U holda tenglamaning umumiy yechimi quyidagicha bo'ladi

$$y = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x$$

va

$$y' = -\omega C_1 \sin \omega x + \omega C_2 \cos \omega x.$$

Quyidagi sistemani hosil qilamiz

$$\begin{cases} C_1 \cos \frac{3}{2}\omega + C_2 \sin \frac{3}{2}\omega = 0, \\ -\omega C_1 \sin \frac{\omega}{2} + \omega C_2 \cos \frac{\omega}{2} = 0. \end{cases}$$

Quyidagi tenglamani yechamiz

$$\begin{vmatrix} -\sin \frac{\omega}{2} & \cos \frac{\omega}{2} \\ \cos \frac{3}{2}\omega & \sin \frac{3}{2}\omega \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \cos \omega = 0 \Leftrightarrow \omega = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

U holda xos qiymat quyidagiga teng

$$\lambda = \omega^2 = \pi^2 \left( \frac{1}{2} + n \right)^2.$$

Kiyinchalik:

$$\begin{aligned} -C_1 \sin \frac{\omega_n}{2} + C_2 \cos \omega_n 2 &= 0, \\ \frac{C_2}{C_1} = \operatorname{tg} \frac{\omega_n}{2} = \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2} \right) &= (-1)^n = \frac{\sin(\omega_n/2)}{\cos(\omega_n/2)}. \end{aligned}$$

Xos funksialarni quyidagi shartdan topamiz

$$y = y_n = C_1 \cos \omega_n x + C_2 \sin \omega_n x.$$

$C_1$  : Va  $C_2$ : ni topamiz

$$C_1 = C \cos \frac{\omega_n}{2}, \quad C_2 = C \sin \frac{\omega_n}{2}, \quad C = 1.$$

U holda

$$y = y_n = \cos \frac{\omega_n}{2} \cos \omega_n x + \sin \frac{\omega_n}{2} \sin \omega_n x = \cos \left[ \omega_n \left( x - \frac{1}{2} \right) \right].$$

Shturm-Liuvil masalasi ,xosfunktiali qatorlar

Quyidagi bir jinsli chiziqli defferensial tenglamani qaraymiz

$$-y''(x) + q(x)y'(x) - \lambda y(x) = 0 \tag{6.1}$$

$$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0, \quad \beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0. \tag{6.2}$$

Chegaraviy shartlar

Bu yerda  $q(x) - [a, b]$  da uzluksiz  $q(x) \geq 0$ ;

$$\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \neq 0, \beta_1^2 + \beta_2^2 \neq 0.$$

Shunday  $\lambda$  -ni qiymatini kerakli (6.1) tenglamani noldan farqli (interval)yechimlari mavjud bo'lsin va (6.2) shartni qanoatlantirsin.

Shunday  $\lambda$  -ni qiymatiki, bu holda (6.1) - (6.2) tenglamaning notrival yechimlari mavjud, chegaraviy masalaning xos qiymatlari deyiladi unga mos notrival yechimlar esa -xos funksialar deyiladi. Quyidagi tasdiq urinli:

1) Xos qiymatlar ketmaketliklardan iborat

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_n < \dots < \lambda_n \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty. \text{ ,xar bir } \lambda_n \text{ songa, yagona } y_n(x).$$

-xos funksia mos keladi.

2) Barcha  $n \neq m$  uchun

3) Faraz qilaylik shartlar bajarilsin. U holda

$$\int_a^b y_n(x) y_m(x) dx = 0.$$

chegaraviy masalaning barcha xos sonlarni musbat

1.3. Teorima Har qanday  $f(x)$  funksiya (6.2) tenglamaning chegaraviy shartlarini qanoatlantruvchi ,birinchi tartibli uzluksiz hosilaga ega va  $[a, b]$  da ikkinchi tartibli qism uzluksiz hosilaga ega funksiya ,xos funksialar buyicha absalyut va tekis yaqinlashuvchi qatorga yoyiladi.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n y_n(x), \quad C_n = \int_a^b f(x) y_n(x) dx / \int_a^b y_n^2(x) dx. \quad (6.3)$$

1.1 Misol. Chegaraviy masalani barcha yechimlarini toping.

Yechim: Bu yerda  $q(x) = 0, \alpha_1 = \beta_1 = 0$ . 3 xossaga asosan  $\lambda \geq 0$ . Ikki holni qaraymiz.

a)  $\lambda = 0. \quad y'' = 0$  Tenglama quyidagi umumiy yechimga ega ixtiyoriy  $y = C_1 x + C_2; C_1, C_2$  -ixtiyoriy o'zgarmas Chxegaraviy shartdan

$$C_1 = 0 \quad y = C_2 = const$$

b)  $\lambda > 0$ . Tenglamaning umumiy yechimi quyidaghicha :

$$y = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x;$$

$$y' = -A\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}x + B\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}x,$$

,bu yerda  $A, B$  -ixtiyoriy o'zgarimas.

Chegaraviy shartlardan :

$$-A \sin \sqrt{\lambda} + B \cos \sqrt{\lambda} = 0, \quad -A \sin 3\sqrt{\lambda} + B \cos 3\sqrt{\lambda} = 0. \quad (6.4)$$

Bu yerdan va o'zgarimaslardan nisbatan bir jinsli chiziqli tenglamalar sestimasining qulga kiritdik Ya'ni (6.4) nolga teng bo'lmagan yechimga ega bo'lish kerak,uning detirminanti  $\Delta$  nolga teng bo'lishi kerak

$$\Delta = -\sin \sqrt{\lambda} \cos 3\sqrt{\lambda} + \sin 3\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin(3\sqrt{\lambda} - \sqrt{\lambda}) = 0 \Leftrightarrow \sin 2\sqrt{\lambda} = 0.$$

Buyerdan 
$$\lambda = \frac{\pi^2 n^2}{4}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad y = A \cos \frac{\pi n x}{2} + B \sin \frac{\pi n x}{2}.$$

Kiyinchalik (6.4) -ni birinchi tenglamasidan  $B = A \operatorname{tg} \sqrt{\lambda} = A \operatorname{tg} \frac{\pi n}{2},$

shuning uchun  $y = A \cos \frac{\pi n x}{2} + A \operatorname{tg} \frac{\pi n}{2} \sin \frac{\pi n x}{2}.$

$$y = A \cos \frac{\pi n x}{2} + A \operatorname{tg} \frac{\pi n}{2} \sin \frac{\pi n x}{2}.$$

Quyidagiga ega bo'lamiz  $y = C_n y_n = C_n \cos \frac{\pi n}{2} (x - 1), \quad n = 1, 2, \dots$

1.2 Misol  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$  funksiyani 1.1 Misolning chegaraviy shartlaridan foydalanib xos funksiyalar bo'yicha qator yig'indisi shaklida ifodalang.

Echish  $f(x)$  funksiya  $f'(1) = f'(3) = 0,$  shartlarni qanoatlantradi uning hosilalari  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$  va  $f''(x) = 6x - 12$  uzluksizdirlar. (6.3)dagi integrallarni hisoblaymiz (3,5,7 formuladan foydalanamiz ).

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x) y_n(x) dx &= \int_1^3 (x^3 - 6x^2 + 9x) \cos \frac{\pi n}{2} (x - 1) dx = \\ &= \int_1^3 x^3 \cos \frac{\pi n}{2} (x - 1) dx - 6 \int_1^3 x^2 \cos \frac{\pi n}{2} (x - 1) dx + 9 \int_1^3 x \cos \frac{\pi n}{2} (x - 1) dx = \end{aligned}$$

$$= \left( \frac{3x^2}{\alpha_n^2} - \frac{6}{\alpha_n^4} - \frac{12x}{\alpha_n^2} + \frac{9}{\alpha_n^2} \right) \cos \alpha_n(x-1) \Big|_1^3 = \frac{6}{\alpha_n^4} (1 - \cos \pi n) =$$

$$= \begin{cases} 0, & n - \text{четное} \\ \frac{12}{\alpha_n^4}, & n - \text{нечетное} \end{cases}$$

Bu yerda  $\alpha_n = \frac{\pi n}{2}$ . Kiyinchalik  $n=0$  bo'lganda

$$\int_1^3 f(x) y_0(x) dx = \int_1^3 (x^3 - 6x^2 + 9x) dx = 4, \quad \int_1^3 y_0^2(x) dx = 2$$

Bundan tashqari  $\int_1^3 y_n^2(x) dx = \int_1^3 \cos^2 \frac{\pi n}{2} (x-1) dx = \frac{1}{2} \int_1^3 [1 + \cos \pi n (x-1)] dx =$

$$= \frac{1}{2} \left[ x + \frac{1}{\pi n} \sin \pi n (x-1) \right]_1^3 = 1, \quad n \neq 0.$$

(6.3) formula qo'ysak, u holda  $C_0 = \frac{4}{2} = 2$ ; bo'lganda

$$C_n = \frac{12}{\alpha_n^4} = 12 \left( \frac{2}{\pi n} \right)^4 = \frac{192}{\pi^4 n^4}, \text{ xuddi shunday,}$$

$$f(x) = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{192}{\pi^4 n^4} \cos \frac{\pi n}{2} (x-1) =$$

***n*-нечетное**

$$= 2 + \frac{192}{\pi^4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)} \cos \pi \left( k - \frac{1}{2} \right) (x-1), \quad 1 \leq x \leq 3$$

Berilgan qator [1;3] kesmada tekis va absolyut yaqinlashuvchidir.

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

### Uyga vazifa

1. Shturm-Liuvill masalasi.



A operatorning  $D(A) = C_0^2[0, l]$  da  $X_1(x), \dots, X_k(x), \dots$  vektorlarni topamiz.

$$\begin{cases} AX_k = \lambda_k X_k; \\ X_k \in D(A), \quad X_k \neq 0. \end{cases} \quad (6.5)$$

To'laroq (6.5) shuni anglatadiki

$$\begin{cases} X_k''(x) = \lambda_k X_k(x), & 0 < x < l, \\ X_k(0) = X_k(l) = 0, & X_k(x) \neq 0. \end{cases} \quad (6.6)$$

A operator bu  $\frac{d^2}{dx^2}$ ,  $D(A) = C_0^2[0, l]$  soha

2 (6.5) Shturm-Liuuill masalasining yechimi (6.6) tenglamadan,

$$X_k(x) = A_k e^{\sqrt{\lambda_k} x} + B_k e^{-\sqrt{\lambda_k} x}. \quad (6.7)$$

$$\begin{cases} A_k + B_k = 0, \\ A_k e^{\sqrt{\lambda_k} l} + B_k e^{-\sqrt{\lambda_k} l} = 0. \end{cases} \quad (6.8)$$

(6.6) chegaraviy shartlarni qo'ysak Bu sistemaning matrisasi tug'ma bo'lishi kerak, bo'lmasa  $A_k = B_k = 0$  va  $X_k(x) \equiv 0$ , bu (6.6) ga zid. Ya'ni,  $\lambda_k$  xarakteristik tenglamani qanoatlantiradi.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{\sqrt{\lambda_k} l} & e^{-\sqrt{\lambda_k} l} \end{vmatrix} = e^{-\sqrt{\lambda_k} l} - e^{\sqrt{\lambda_k} l} = 0. \quad (6.9)$$

Bu yerdan

$$e^{-\sqrt{\lambda_k} l} = e^{\sqrt{\lambda_k} l} \Rightarrow e^{2\sqrt{\lambda_k} l} = 1. \quad (6.10)$$

Ya'ni  $2\sqrt{\lambda_k} l = 2k\pi i$ ,  $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow$

$$\sqrt{\lambda_k} = \frac{k\pi i}{l} \Rightarrow \lambda_k = -\left(\frac{k\pi}{l}\right)^2; \quad (6.11)$$

Bu yerda deb o'tamiz. Shu narsa kutilgan edi,  $\lambda_k \leq 0$ .

Demak,  $\lambda_k$  xos sonlarni topdik.

Endi  $X_k(x)$  xos funksiyani topamiz. Buning uchun (6.8) sistemani tug'ma deb faraz qilamiz

Ya'ni tenglamada faqat ularning bittasini hisobga olish etarli:  $B_k = -A_k$ . shuning uchun (6.7) dan (6.11) ko'rinishiga ega bo'lamiz

Bu yerda biz Eyler formulasini qo'lladik:

$$X_k(x) = A_k(e^{\frac{k\pi i}{l}x} - e^{-\frac{k\pi i}{l}x}) = A_k 2i \sin \frac{k\pi x}{l}. \quad (6.12)$$

$e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} = 2i \sin \varphi$ . Biroq  $X_k$  xos funksiya to sonli ko'paytuvchilar aniqlik bilan topilgan, u holda

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{l}; \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.13)$$

Bu yerda  $k > 0$ , deb  $k = 0$  da  $X_0(x) \equiv 0$ .

Masala: Shturm-Liuwill masalasini yeching, xos funksiyalarni toping


$$X_k(0) = X'_k(l) = 0, \quad (6.14)$$

$$X'_k(0) = X_k(l) = 0, \quad (6.15)$$

$$X'_k(0) = X'_k(l) = 0. \quad (6.16)$$

Shartlar (6.15), (6.16)

Masala: har bir (6.14)-(6.16) chegarabiy shart uchun mashqlarni bajaring. Javob (6.14) uchun 65 –rasmga qarang




Puc. 65

$$\lambda_k = -\left(\frac{(k + \frac{1}{2})\pi}{l}\right)^2,$$


$$X_k(x) = \sin \frac{(k + \frac{1}{2})\pi x}{l},$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

(6.15) uchun 66 – rasmga qarang.



Puc. 67



Puc. 66

$$\lambda_k = -\left(\frac{k\pi}{l}\right)^2,$$

$$X_k(x) = \cos \frac{k\pi x}{l},$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

(6.16) 67 – rasmga qarang.

$$\lambda_k = -\left(\frac{k\pi}{l}\right)^2,$$
$$X_k(x) = \cos \frac{k\pi x}{l},$$
$$k = 0, 1, 2, \dots$$

Shuningdek qo`yidagi ixtiyoriy chegaraviy shartlarni qarashi mumkin (6.16)

- haqiqiy sonlar

### Tavsiya etiladigan adabiyotlar Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O`zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

### Qo`shimcha

6. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
7. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
8. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
9. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
10. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
11. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
12. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
13. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*

14. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

**Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.**

4. Bir jinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan bir jinsli tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalani keltiring.
5. Shturm – Liuvill masalasi.
6. Mavjudlik teoremasi.

## Mavzu 7. Tor tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalasi

### Amaliy mashg'ulotlar rejasi

**Fan:** "Matematik fizika tenglamalari".

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejasi:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

**O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

**O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash
- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

**O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari:* auditoriya
- *monitoring va baholash:* og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

**Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

**O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

### 1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.

1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiq);

- *o'qituvchi faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish ; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;

- *talaba faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

## **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;

- *talaba faoliyati*: oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

## **3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari

- *talaba faoliyati*: ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari*: guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### **1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma**

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

### **Misol va mashqlar namoishi**

**Tor tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalasi**

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \text{ dif-1} \quad \text{tenglama } u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x) \text{ boshlang'ich}$$

shartlari va  $u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0$ , chegaraviy shartlar bilan berilgan bo'lsa, u holda uning yechimi cheksiz qator yig'indisi ko'rinishida ifodalanish mumkin.

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left( a_k \cos \frac{k\pi at}{l} + b_k \sin \frac{k\pi at}{l} \right) \cdot \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad \text{bu yerda}$$

$$a_k = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx, \quad b_k = \frac{2}{k\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx.$$

Chegaraviy shartlarga tor tebranishining uzunligi  $l$  mos keladiki,  $y \quad x=0$  va  $x=l$  nuqtalarga maxkamlangan.

1. Uzunligi  $l$  bo'lgan torning oxirlari mahkamlangan. Boshlang'ich moment vaqtida u  $x = \frac{l}{2}$  nuqtadan  $\frac{l}{10}$  masofaga tortilgan keyin qimirlatmasdan qo'yib yuborilgan. Furi metodi orqali  $u(x, t)$  tortilish nuqtalarini ixtiyoriy vaqt momentida aniqlang

Echish Qo'yilgan masalada biz, ikkila tomondan maxkamlangan torning erkin tebranishi bilan ish olib boramiz. Uning yechimi quyidagi matematik masala keltiriladi.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (\text{bu yerda } a^2 = \frac{T}{\rho}, \text{ -t-torning taranglanishi s-tor zichligi)} \quad \text{tenglama}$$

yechimini topish kerakki, quyidagi boshlang'ich chegaraviy shartlarni qanoatlantirsin:


1). Boshlang'ich shartlar:

$$a) \quad u(x, 0) = \varphi(x) = \begin{cases} \frac{x}{5}, & \text{npu } 0 \leq x \leq \frac{l}{2}, \\ -\frac{1}{5}(x-l), & \text{npu } \frac{l}{2} \leq x \leq l. \end{cases}$$

bo'lganda.

b)  $\frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x) = 0$ -(tor qimirlamasdaqn qo'yib yuborilgan ,demak nuqtadagi

boshlang'ichteqlik nolga teng )



2)Chegaraviy shartlar :  $u(0,t)=0, u(l,t)=0$  fizik ma'nosi shuki,

$X=0$  va  $x=l$  nuqtalarda  $u$  mahkamlangan  $a_n$ ,-ni hisoblaymiz , $u$  holda

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx = \frac{2}{l} \frac{1}{5} \left( \int_0^{l/2} x \sin \frac{\pi n x}{l} dx + \int_{l/2}^l (l-x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx \right) =$$

$$= \frac{4}{5l} \cdot \frac{l^2}{\pi^2 n^2} \cdot \sin \frac{\pi n}{2}.$$

Bu yul bilan,  $a_n = \frac{4}{5} \cdot \frac{l}{\pi^2 n^2} \cdot \sin \frac{\pi n}{2}$  ( $n = 1,2,\dots$ ). Ta'kidlaymizki, $n$ -juft

bo'lganda ,  $a_n = 0$ , ,ya'ni  $\sin \frac{\pi n}{2} = \sin \frac{2\pi k}{2} = 0$ . $n$ -toq bo'lganda ,ya'ni  $n=2k$ -

$\sin \frac{\pi n}{2} = \sin \frac{(2k-1)\pi}{2} = (-1)^{k-1}$  ( $k = 1,2,\dots$ ). natijada  $a_n$  koefsentrari uchun

$$a_{2n-1} = (-1)^{n-1} \frac{4l}{5\pi^2 (2n-1)^2} \quad (n = 1,2,\dots).$$
 formulani hosil qilamiz.

Qaralayotgan masalada  $\psi(x) = 0$ ,  $u$  holda  $b_n = 0$  ( $n = 1,2,\dots$ ).

Ya'ni,

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{\pi a n}{l} t \cdot \sin \frac{\pi n x}{l} = \frac{4l}{5\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{(2n-1)^2} \cdot \cos \frac{\pi a n}{l} t \cdot \sin \frac{\pi n x}{l}.$$

2.Tenglamani yeching  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + bshx$



$u(0,t) = 0, \quad u(l,t) = 0$ . boshlang'ich va chegaraviy shartlar.

$$shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad chx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Ko'rsatma .Echimi  $u(x,t) = v(x) + w(x,t)$ , yig'indi ko'rinishda izlaymiz, bu yerda  $v(x)$ ,

$$a^2 v''(x) + bshx = 0, \text{ tenglamani yechimi bo'lib}$$

$v(0) = v(l) = 0$ , chegaraviy shartlarni qanoatlantradi w- balsa

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \text{ tenglamani yechimi}$$

$w(0,t) = 0, w(l,t) = 0$ , bo'lganda

$$-\frac{2b\pi shl}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 \pi^2 + l^2} \cos \frac{n\pi at}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

$$w(x,0) = -v(x), \quad \frac{\partial w(x,0)}{\partial t} = 0.$$

$$\text{Javob : } u(x,t) = \frac{b}{a^2} \left( \frac{x}{l} shl - shx \right) + \frac{2b}{a^2 \pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \cos \frac{n\pi at}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} -$$

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

### Uyga vazifa

1.uzunligi 1 gat eng tor, oxirlaridan mahkamlangan bo'lib, shunday tortilganki u

$u = 2 \sin \frac{\pi x}{l}$ , sinusaida ko'rinishni olib, boshlang'ich tezliksiz qo'yib yuborilgan

.Torning tebranish qonunini toping.

$$\text{Javob: } u(x,t) = 2 \cos \frac{\pi at}{l} \sin \frac{\pi x}{l}.$$

2.oxirlari  $x=0$  va  $x=l$  maxkamlangan tor boshlang'ich vaqt momentida

$$u(x,0) = 2 \sin \frac{5\pi x}{l}. \text{ tenglama bilan aniqlanadigan formaga ega.}$$

Torning nuqtalaridagi boshlang'ich tezligi quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$\frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = 3 \sin \frac{4\pi x}{l}.$$

$u(x,t)$ -tor nuqtalarining aralashmasini toping.

$$\text{Javob } u(x,t) = \frac{3l}{4\pi a} \sin \frac{4\pi a t}{l} \sin \frac{4\pi x}{l} + 2 \cos \frac{5\pi a t}{l} \sin \frac{5\pi x}{l}.$$

3.  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + bx(x-l)$  tenglamani  $u(0,t) = 0, u(l,t) = 0$ . boshlang'ich va chegaraviy shartlarda yeching.

Javob:

$$u(x,t) = -\frac{bx}{12}(x^3 - 2x^2l + l^3) + \frac{8l^4}{\pi^5} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi t}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l}}{(2n+1)^5}.$$

4. Torning tebranish qonuni topingki, uning oxirlari  $X=-L$  va  $X=L$  nuqtalarda maxkamlangan boshlang'ich vaqt moment esa, tor nuqtalari parabola buyicha torning markazi nisbatan sennitrik tasvirlangan biroq Boshlang'ich maksimal aralashma b gat eng.

$$\text{Javob: } u(x,t) = \frac{32h}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} \cos \frac{2n+1}{2l} \pi x \cdot \cos \frac{2n+1}{2l} \pi a t.$$

### Tavsiya etiladigan adabiyotlar Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadzs L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*

5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlnn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

#### Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.

8. Tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasi.
9. Tebranish tenglamasi uchun masalaning quyilishi.
10. Ideal torning tebranish tenglamasini keltiring.

#### Mavzu 8. Bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masala

##### Amaliy mashg'ulotlar rejasi

**Fan:** "Matematik fizika tenglamalari".

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejasi:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

**O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

### **O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash
- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari:* auditoriya
- *monitoring va baholash:* og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

### **Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

## **1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.**

### **1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish ; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;

- *talaba faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;

- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;

- *talaba faoliyati*: oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashtirishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

### 3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari

- *talaba faoliyati*: ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari*: guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### 1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

#### Misol va mashqlar namoishi

#### Bir jinsli bo'lmagan tebranish teglamasi uchun chegaraviy masala

Quyidagi bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi bilan cheklanamiz;

$$U_{tt} = a^2 U_{xx} + f_1(x)f_2(t) \quad (8.1)$$

Uning boshlang'ich va chegaraviy shartlari, ya'ni

$$U(0, x) = \frac{\partial U(0, x)}{\partial t} = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

bo'lsin. (8.1) tenglamani yechimini  $u(t, x)$  qator ko'rinishida izlab,  $x$ - bo'yicha Fure qatoriga yoyamiz.

$$U(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{\pi n}{l} x \quad (8.2)$$

(8.2) ni (8.1) ga qo'yib , noma'lum fuksiya uchun Koshi masalasini hosil qilamiz.

$$T_n(t) : T_n'' + \left(\frac{a\pi n}{l}\right)^2 T_n = d_n f_2(t), T_n(0) = T_n'(0) = 0, d_n = \frac{2}{l} \int_0^l f_1(x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx.$$

Bu masalaning yechimini  $T_n(t)$  belgilab va (8.2) yoyilmaga qo'yib  $U(t,x)$  funksiyani hosil qilamiz.

1.Misol . bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching.

$$U_{tt} = a^2 U_{xx} = xt, a = 1$$

$$U(0,x) = \frac{\partial U(0,x)}{\partial t} = U(t,0) = U(t,l) = 0.$$

$T_n(t)$  dagi noma'lum funksiyalar Koshi masalasini qanoatlantiradi.

$$T_n'' + \frac{n^2 \pi^2}{l^2} T_n = d_n t,$$

$$d_n = \frac{2}{l} \int_0^l x \sin \frac{\pi n}{l} x dx = -\frac{2}{\pi n} \int_0^l x d \cos \frac{\pi n}{l} x = -\frac{2}{\pi n} x \cos \frac{\pi n}{l} x \Big|_0^l + \frac{2}{\pi n} \int_0^l \cos \frac{\pi n}{l} x dx =$$

$$= -\frac{2}{\pi n} l \cos \pi n + \frac{2l}{(\pi n)^2} \sin \frac{\pi n}{l} x \Big|_0^l = \frac{2l}{\pi n} (-1)^{n+1}$$

ya'ni ,  $T_n'' + \frac{\pi^2 n^2}{l^2} T_n = \frac{2l}{\pi n} (-1)^{n+1} t$

(8.3)

tenglamaga ega bo'ldik. Uning umumiy yechimi

$$T_n'' + \frac{\pi^2 n^2}{l^2} T_n = 0 \tag{8.4}$$

Bir jinsli tenglama umumiy yechimining yig'indisi va (8.3) tenglamaning xususiy yechimidan iborat. (8.4) tenglamaning xarakteristik tenglamasi quyidagicha:

$$K^2 + \frac{\pi^2 n^2}{l^2} = 0, \text{ ya'ni } K_{1,2} = \pm \frac{\pi n}{l} i.$$

(8.4) tenglamaning umumiy yechimi quyidagicha bo'ladi:

$$T_n = d_1 \cos \frac{\pi n}{l} t + d_2 \sin \frac{\pi n}{l} t$$

(8.3) tenglamaning xususiy yechimini topamiz. Uni  $T_n(t) = At + B$  ko'rinishda izlab (8.3) tenglamaga qo'ysak, u holda

$$\frac{\pi^2 n^2}{l^2}(At + B) = \frac{2l}{\pi n}(-1)^{n+1}t, B = 0, A = (-1)^{n+1} \frac{2l^3}{\pi^3 n^3}.$$

ya'ni, (8.3) tenglamaning umumiy yechimi quyidagicha bo'ladi:

$$T_n(t) = d_1 \cos \frac{\pi n}{l}t + d_2 \sin \frac{\pi n}{l}t + (-1)^{n+1} \frac{2l^3}{\pi^3 n^3}t.$$

$d_1, d_2$  konstantalarni  $T_n(0) = T_n'(0) = 0$  boshlang'ich shartlardan topamiz.

Shuning uchun

$$d_1 = 0, d_2 = (-1)^n \frac{2l^4}{(\pi n)^4}$$

$$\text{Javob } U(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( (-1)^n \frac{2l^4}{\pi^4 n^4} \sin \frac{\pi n}{l}t + (-1)^{n+1} \frac{2l^3}{\pi^3 n^3} \right) \sin \frac{\pi n x}{l}.$$

#### Uyga vazifa:

$$1. U_{tt} = a^2 U_{xx} + t \sin \frac{\pi x}{2}, a = 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t+5)x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$3) U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t^2 - 1)x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$4) U_{tt} = a^2 U_{xx} + 10(t-1) \cos 2x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

#### Tavsiya etiladigan adabiyotlar

##### Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadzs L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*

5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.11. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlnn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.

1. Bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun masalaning quyilishi.
2. Bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasini keltiring.

### Mavzu 9. To'g'ri to'rtburchakli membranani tebranishi

#### Amaliy mashg'ulotlar rejasi

Fan: "Matematik fizika tenglamalari".

O'quv soati: 2 s. (amaliy)

O'quv mashg'ulotlar turi: kartochna, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

O'quv mashg'ulotlar maqsadi:

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish



### **O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash
- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari:* auditoriya
- *monitoring va baholash:* og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

### **Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

## **1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.**

### **1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish ; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;
- *talaba faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;
- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar

matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;

- *talaba faoliyati*: oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi

- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

### 3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarining muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari

- *talaba faoliyati*: ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari*: guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### 1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

### Misol va mashqlar namoishi

#### To'g'ri to'rtburchakli membrani tebranishi

Tomonlari  $p$  va  $q$  bo'lgan bir jinsli to'g'ri to'rtburchakli membrananing kichik tebranishini qarab chiqamizki, kontur buyicha mahkamlangan . Bu masala

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (9.1)$$

Tebranish tenglamasining yechimiga keladi .Chegaraviy shartlar

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=p} = 0, \quad u|_{y=0} = 0, \quad u|_{y=q} = 0 \quad (9.2)$$

Boshlang'ich shartlar

$$u|_{t=0} = \varphi_0(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \varphi_1(x, y) \quad (9.3)$$

(9.1)tenglamaning xususiy yechimi

$$u(x, y, t) = T(t)v(x, y), \quad (9.4)$$

Ko'rinishda izlaymiz (9.4) ni (1) tenglamaga quysak, u holda

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{v_{xx} + v_{yy}}{v} = -k^2.$$

Bu yerdan (9.2) chegaraviy shartlarni hisobga olib quyidagilarga ega bo'lamiz.

$$T''(t) + a^2 k^2 T(t) = 0, \quad (9.5)$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + k^2 v = 0, \quad (9.6)$$

$$v|_{x=0} = 0, \quad v|_{x=p} = 0, \quad v|_{y=0} = 0, \quad v|_{y=q} = 0. \quad (9.7)$$

(9.6) va (9.7) masalaning xos qiymatlari va xos funksiyalarini topamiz.

$$v(x, y) = X(x)Y(y). \quad (9.8)$$

(9.8) va (9.6) tenglamaga quysak, u holda

$$\frac{Y''}{Y} + k^2 = -\frac{X''}{X}, \text{ bu yerdan ikkita tenglamani hosil qilamiz.}$$

$$X''(x) + k_1^2 X(x) = 0, \quad Y''(y) + k_2^2 Y(y) = 0,$$

(9.9)

Bu yerda

$$k^2 = k_1^2 + k_2^2. \quad (9.10)$$

(9.9) tenglamani umumiy yechimi quyidagicha

$$X(x) = C_1 \cos k_1 x + C_2 \sin k_1 x; \quad Y(y) = C_3 \cos k_2 y + C_4 \sin k_2 y. \quad (9.11)$$

Chegaraviy shartlaridan:

$$X(0) = 0, \quad X(p) = 0, \quad Y(0) = 0, \quad Y(q) = 0, \text{ bu yerdan tushinarliki}$$

$$C_1 = C_3 = 0, \text{ va agar biz } C_2 = C_4 = 1, \text{ deb olsak, u holda}$$

$$X(x) = \sin k_1 x, \quad Y(y) = \sin k_2 y, \text{ biroq}$$

$$\sin k_1 p = 0, \quad \sin k_2 q = 0. \quad (9.12)$$

Bo'lishi shart. (9.12) tenglamalardan shu narsa kelib chiqadi  $k_1$  va  $k_2$  cheksiz qiymatlar tuplashga ega:

$$k_{1,m} = \frac{m\pi}{p}, \quad k_{2,n} = \frac{n\pi}{q} \quad (m, n = 1, 2, 3, \dots). - \text{U holda}$$

$$k_{m,n}^2 = k_{1,m}^2 + k_{2,n}^2 = \pi^2 \left( \frac{m^2}{p^2} + \frac{n^2}{q^2} \right). \quad (9.13)$$

Bu yul bilan (9.13) –ng xos qiymatlariga (9.6) , (9.7) ga chegaraviy masalaning

$$v_{mn}(x, y) = \sin \frac{m\pi x}{p} \sin \frac{n\pi y}{q} \text{ Xos funksiyasiyalari mos keladi .}$$

Endi (9.5) tenglamaga qaytib , shuni ko'ramizki, har bir  $k^2 = k_{mn}^2$  -xos qiymat uning umumiy yechimi quyidagicha bo'ladi.

$$T_{mn}(t) = A_{mn} \cos ak_{mn}t + B_{mn} \sin ak_{mn}t, \quad (9.14)$$

Bu yerda  $A_{mn}$ , va  $B_{mn}$  –ixtiyoriy o'zgarmaslar.

Shunday qilib (9.1) tenglamaning xususiy yechimi quyidagicha bo'ladi:

$$u_{mn}(x, y, t) = (A_{mn} \cos ak_{mn}t + B_{mn} \sin ak_{mn}t) \sin \frac{m\pi x}{p} \sin \frac{n\pi y}{q} \quad (m, n = 1, 2, \dots).$$

Boshlang'ich shartlarni qanoatlantrish uchun quyidagi qatorni tuzamiz .

$$u(x, y, t) = \sum_{m,n=1}^{\infty} (A_{mn} \cos ak_{mn}t + B_{mn} \sin ak_{mn}t) \sin \frac{m\pi x}{p} \sin \frac{n\pi y}{q}.$$

Agar bu qator tekis yaqinlashsa, undan x,y,t bo'yicha ikki marta hadma-had defferensiallash natijasida hosil bo'lgan qatorlar ma'lumki, uning yig'indisi (9.1) tenglama va (9.2) chegaraviy shartlari qanoatlantradi.

$$u|_{t=0} = \varphi_0(x, y) = \sum_{m,n=1}^{\infty} A_{mn} \sin \frac{m\pi x}{p} \sin \frac{n\pi y}{q}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \varphi_1(x, y) = \sum_{m,n=1}^{\infty} ak_{mn} B_{mn} \sin \frac{m\pi x}{p} \sin \frac{n\pi y}{q}.$$

Bu formulalar  $\varphi_0(x, y)$  va  $\varphi_1(x, y)$  berilgan funksiyalarni sinus bo'yicha Fure qatoriga ifodalaydi .yoyilish koefsentlari quyidagi formulalardan aniqlanadi.

$$A_{mn} = \frac{4}{pq} \int_0^p \int_0^q \phi_0(x, y) \sin \frac{m\pi x}{p} \sin \frac{n\pi y}{q} dx dy,$$

$$B_{mn} = \frac{4}{ak_{mn}pq} \int_0^p \int_0^q \phi_1(x, y) \sin \frac{m\pi x}{p} \sin \frac{n\pi y}{q} dx dy.$$

Misollar

1.1 tomonli kvadratik membrananing erkin tebranish qonuni toping, agar boshlang'ich moment tortilishi xar bir nuqtada

$$u(x, y, t)|_{t=0} = \frac{l}{100} \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{\pi y}{l}. \text{ tenglik bilan aniqlansa}$$

Boshlang'ich tezlik nolga teng. Kontur tashqarisida membrana maxkamlangan

Eyichish: Qaralayotgan holda

$$\varphi_0(x, y) = \frac{l}{100} \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{\pi y}{l}, \quad \varphi_1(x, y) = 0. \text{ bu yerdan}$$

$$B_{mn} = 0, \quad m = 1, 2, \dots, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$A_{mn} = \frac{4}{l^2} \int_0^l \int_0^l \frac{l}{100} \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{\pi y}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi y}{l} dx dy.$$

Trigonometrik funksiyalar sestimasining ortogonalligidan faqat  $A_{11} \neq 0$ ,

$$A_{mn} = 0. \quad A_{11} = \frac{4}{100l} \left( \int_0^l \sin^2 \frac{\pi x}{l} dx \right)^2 =$$

$$= \frac{4}{100l} \left( \frac{1}{2} \int_0^l \left( 1 - \cos \frac{2\pi x}{l} \right) dx \right)^2 = \frac{1}{100l} \left( x \Big|_0^l - \frac{l}{2\pi} \sin \frac{2\pi x}{l} \Big|_0^l \right)^2 = \frac{l}{100}.$$

$$\text{Ya'ni, } u(x, y, t) = \frac{l}{100} \cos \frac{a\pi\sqrt{2}}{l} t \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{\pi y}{l}.$$

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

**Tavsiya etiladigan adabiyotlar**  
**Asosiy**

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

**Qo'shimcha**

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

**Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.**

1. To'g'ri to'rtburchakli membranani tebranish tenglamasini keltiring.
2. To'g'ri to'rtburchakli membrananing erkin tebranishi qonuni toping.

## **Mavzu 10. Bir jinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan giperbolik tipli tenglama uchun chegaraviy masala .Fure usuli**

### **Amaliy mashg'ulotlar rejasi**

**Fan:** “ Matematik fizika tenglamalari“.

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejasi:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

**O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

**O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash
- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

**O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari:* auditoriya
- *monitoring va baholash:* og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

**Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

**O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashgulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

## 1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.

### 1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqa);

- *o'qituvchi faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;
- *talaba faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;
- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

### 2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;
- *talaba faoliyati:* oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi
- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

### 3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari
- *talaba faoliyati:* ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;
- *qabul qilish shakli metodlari:* guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

## 1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish



### Misol va mashqlar namoishi

$U(x, t)$  – boshlang'ich chegaraviy masalaning yechimini toping

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x), \\ u(0, t) = u(l, t) = 0. \end{cases} \quad (10.1)$$

1. Qadam  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$  tenglama  $U(0, t) = U(l, t) = 0$  chegaraviy shartlar bilan berilgan bo'lib, uning yechimini  $U(x, t) = X(x)T(t)$  ko'rinishda yozamiz. Chegaraviy shartlar  $X(x)$  funksiya uchun quyidagini aniqlaydi

$$X(0) = X(l) \quad (10.2)$$

$U(x, t)$  ni tenglamaga quysak, u holda

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

$X(x)T(t) \neq 0$  deb, butenglikni  $X''(x)T(t) \neq 0$  ga bo'lamiz :

$$-\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \lambda.$$

Bu yerdan  $X(x)$  funksiya uchun quyidagi masalaga ega bo'lamiz

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \quad (10.3)$$

$$X(0) = X(l) = 0 \quad (10.4)$$

$T(t)$  funksiya uchun tenglama quyidagicha :

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad t > 0. \quad (1.5)$$

(10.3) - (10.4) masala, Shturm Liuvill masalasi deyiladi (10.3) tenglamaning umumiy yechimini ko'rinishi quyidagicha .

$$X(x) = c_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + c_2 \cos(\sqrt{\lambda}x) \quad \text{при } \lambda > 0 \quad (10.6)$$

$$X(x) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x} \quad \text{при } \lambda < 0 \quad (10.7)$$

$$X(x) = c_1 x + c_2 \quad \text{при } \lambda = 0 \quad (10.8)$$

$\lambda > 0$  bo'lganda  $X(0) = 0$ , chegaraviy shartdan  $c_2 = 0$ ,  $\Rightarrow X(x) = c_1 \sin(\sqrt{\lambda}x)$  shuning uchun ikkinchi chegaraviy shartdan  $X(l) = 0$ ,  $\sqrt{\lambda}l = \pi n$  -ni hosil qilamizki, Shturm Liuvill masalasining cheksiz xos qiymatlar to'plamiga ega bo'lamiz.

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{l^2}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (10.9)$$

Bunga cheksiz xos funksiyalar to'plami mos keladi.

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi nx}{l}\right), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (10.10)$$

$\lambda < 0$  bo'lganda chegaraviy shartdan  $c_2 = -c_1$ ,  $\Rightarrow X(x) = 2c_1 \operatorname{sh} \sqrt{-\lambda} x$ . Shuning uchun ikkinchi chegaraviy shartdan  $c_1 = 0$ , ni hosil qilamiz, ya'ni, Shturm Liuvill masalasi manfiy xos qiymatlarga ega emas.

bo'lganda chegaraviy shartdan  $c_2 = 0$ ,  $\Rightarrow X(x) = c_1 x$ . Shuning uchun ikkinchi chegaraviy shartdan  $c_1 = 0$ , ya'ni, Shturm Liuvill masalasi nolga teng bo'lgan xos qiymatga ega emas.

Shunday qilib biz (10.3) (10.4) masalalarning cheksiz netrivial yechimlari to'plamiga ega bo'ldik

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{l^2}, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi nx}{l}\right), \quad n \in \mathbb{N}$$

(10.5) masalani qarab chiqish qoldiki, u faqat  $\lambda = \lambda_n$ , bo'lganda ma'noga ega va biz :

$$T''_n(t) + \lambda_n a^2 T_n(t) = 0, \quad t > 0. \quad (10.11)$$

Masalalar oilasini hosil qilamiz

Bu bir jinsli ikkinchi tartibli chiziqli tenglamaning umumiy yeichimi quyidagicha :

$$T_n(t) = A_n \cos\left(\frac{\pi na}{l} t\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi na}{l} t\right), \quad t > 0, \quad (10.12)$$

Bu yerda  $A_n, B_n$  -ixtiyoriy o'zgarmlar

2.Qadam (10.1) masalani yechamiz

(10.1) masalani yechimini  $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t)$ , t.e. ko'rinishda izlaymiz,

$$\text{Ya'ni } u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi nx}{l}\right) \left( A_n \cos\left(\frac{\pi na}{l} t\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi na}{l} t\right) \right) \quad (10.13)$$

Masala shartlaridan biz hali boshlang'ich shartlaridan foydalanmadik  $u(x, 0) = \varphi(x)$ ,  $u_t(x, 0) = \psi(x)$ . funksiya uchun bular quyidagilarni ifodalaydi.

$$\varphi(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x), \quad (10.14)$$

$$\psi(x) = u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n'(0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n a \sqrt{\lambda_n} X_n(x). \quad (10.15)$$

Faraz qilamiz boshlang'ich shartlarga kiruvchi  $\varphi(x)$  va  $\psi(x)$ , funksiyalar

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n X_n(x), \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n X_n(x), \quad (10.16)$$

Qatorga yoyilsin .

Aniqlaymizki  $\alpha_n, \beta_n$  koeffisientlar qanday bo'lishi kerak. Bu uchun (10.16)

$X_m = \sin\left(\frac{\pi m x}{l}\right)$  ga  $L_2[0, l]$  ma'nosiga skalyar ko'paytramiz.

$$(\varphi, X_m) = \alpha_m \int_0^l \sin^2\left(\frac{\pi m x}{l}\right) dx = \frac{\alpha_m}{2} \int_0^l \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi m x}{l}\right)\right) dx = \frac{\alpha_m}{2} \int_0^l dx = \frac{l\alpha_m}{2},$$

Bu yerdan

$$\alpha_n = \frac{2}{l}(\varphi, X_n) = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx. \quad (10.17)$$

Xuddi shunday  $\beta_n$  uchun:

$$\beta_n = \frac{2}{l}(\psi, X_n) = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx. \quad (10.18)$$

Shunday qilib  $A_n, B_n$  koeffisientlari uchun (10.13) tasvirdan yechimni (10.14)-(10.16) ga qo'ysak

$$A_n = \alpha_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx; \quad (10.19)$$

$$B_n = \frac{\beta_n}{a\sqrt{\lambda_n}} = \frac{2}{a\pi n} \int_0^l \psi(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx. \quad (10.20)$$

Endi qolgan narsa (10.19) (10.20) dagi topilgan  $A_n, B_n$  larni (10.13) formulaga quyish qoldi

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, \\ u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (10.21)$$

Tenglamaning yechimni toping

1. Qadam  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$  tenglama  $u(0, t) = u_x(l, t) = 0$  chegaraviy shartlar bilan berilgan bo'lsin, u holda uning yechimi  $U(x, t) = X(x)T(t)$ . ko'rinishda izlaymiz. Shuni ta'kidlaymiz –funksiya uchun chegaraviy masala quyidagini ifodalaydi.

$$X(0) = X'(l) = 0. \quad (10.22) \quad \text{ni tenglamaga quysak, u holda}$$

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

$X(x)T(t) \neq 0$ , deb, bu tenglamani  $a^2 X(x)T(t) \neq 0$ : ga bo'lamiz.

$$-\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \lambda.$$

Bu yerda funksiya uchun

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad (10.23) \quad X(0) = X'(l) = 0, \quad (10.24)$$

Masalalarga ega bo'lamiz

$$\text{funksiya uchun esa, } T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad t > 0. \quad (10.25)$$

$$X(x) = c_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + c_2 \cos(\sqrt{\lambda}x) \quad \text{при } \lambda > 0; \quad (10.26)$$

$$X(x) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x} \quad \text{при } \lambda < 0; \quad (10.27)$$

$$X(x) = c_1 x + c_2 \quad \text{при } \lambda = 0; \quad (10.28)$$

$\lambda > 0$  bo'lganda, chegaraviy shartdan

$$\lambda > 0 \quad c_2 = 0, \quad \Rightarrow \quad X(x) =$$

$c_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) \Rightarrow X'(x) = c_1 \sqrt{\lambda} \cos(\sqrt{\lambda}x)$  Shuning uchun ikkinchi chegaraviy shartdan  $X'(l) = 0$ ,  $\sqrt{\lambda}l = \pi(\frac{1}{2} + k)$ -ni hosil qilamizki, u Shturm-Liuvill masalasining cheksiz xos qiymatlari to'plamlaridan iborat bo'lad.

$$\lambda_n = \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} \right)^2, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (10.29)$$

Bunga cheksiz xos funksiyalar to'plami mos keladi:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (10.30)$$

$\lambda < 0$  chegaraviy shartdan

$$c_2 = -c_1, \quad \Rightarrow \quad X(x) = 2c_1 \operatorname{sh} \sqrt{-\lambda}x \Rightarrow X'(x) = 2c_1 \sqrt{-\lambda} \operatorname{ch}(\sqrt{-\lambda}x)$$

Shuning uchun ikkinchi chegaraviy shartdan  $X'(l) = 0 \Rightarrow c_1 = 0$ - Ya'ni, Shturm-Liuvill masalasi manfiy xos qiymatlarga ega emas.

$\lambda = 0$  bo'lganda chegaraviy shartdan  $c_2 = 0, \Rightarrow X(x) = c_1 x \Rightarrow X'(x) = c_1$ . Shuning uchun ikkinchi chegaraviy shartdan  $X'(l) = 0 \Rightarrow c_1 = 0$  ni hosil qilamiz, ya'ni Shturm-Liuuill masalasini teng bo'lgan xos qiymatga ega emas. Shunday qilib, biz (10.23), (10.24) masalalarining cheksiz netrivial yechimlar to'plamiga ega bo'ldik.

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right), \quad n \in \mathbb{N}$$

(10.25) masalani qarab chiqish qoldi, u faqat  $\lambda_n > 0$  bo'lganda ma'noga ega va biz

$$T''_n(t) + \lambda_n a^2 T_n(t) = 0, \quad t > 0. \quad (10.31)$$

Masalalar oilasini hosil qilamiz. Bu bir jinsli ikkinchi tartibli chiziqli tenglamaning yechimi quyidagicha bo'ladi.

$$T_n(t) = A_n \cos\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right), \quad t > 0, \quad (10.32)$$

Bu yerda  $A_n, B_n$  -lar ixtiyoriy o'zgarmaslar.

2. Qadam (10.21) masalani yechamiz. (10.21) masalaning yechimini

$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(t)$ , ko'rinishda izlaymiz

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right) \left( A_n \cos\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) \right). \quad (10.33)$$

Masala shartlaridan biz faqat  $u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$  boshlang'ich shartlardan foydalanmadik

funksiya uchun u quyidagini ifodalaydi.

$$\varphi(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x), \quad (10.34)$$

$$\psi(x) = u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T'_n(0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n a \sqrt{\lambda_n} X_n(x). \quad (10.35)$$

Faraz qilamiz  $\varphi(x), \psi(x)$ -boshlang'ich shartlarga kiruvchilar

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n X_n(x), \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n X_n(x), \quad (10.36)$$

Qatorga yoyilsin  $\alpha_n, \beta_n$  koefsantlarining qanday ekanligini aniqlaymiz. Buning uchun (10.36) ni  $X_m = \sin\left(\frac{\pi(2m-1)}{2l}x\right)$ -ga  $L_2[0, l]$  ga skalyar ko'paytramiz.

$$\begin{aligned}
 (\varphi, X_m) &= \alpha_m \int_0^l \sin^2 \left( \frac{\pi(2m-1)}{2l} x \right) dx = \frac{\alpha_m}{2} \int_0^l \left( 1 - \cos \left( \frac{\pi(2m-1)}{l} x \right) \right) dx = \\
 &= \frac{\alpha_m}{2} \int_0^l dx = \frac{l\alpha_m}{2},
 \end{aligned}$$

Bu yerdan 
$$\alpha_n = \frac{2}{l} (\varphi, X_n) = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} x \right) dx. \quad (10.37)$$

Xuddi shunday  $\beta_n$  uchun

$$\beta_n = \frac{2}{l} (\psi, X_n) = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} x \right) dx. \quad (10.38)$$

Shu yul bilan (10.33) dan  $A_n, B_n$  koefsentlari uchun  $U(x, t)$  yechim uchun quyidagilarni hosil qilamiz

$$A_n = \alpha_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} x \right) dx; \quad (10.39)$$

$$B_n = \frac{\beta_n}{a\sqrt{\lambda_n}} = \frac{4}{a\pi(2n-1)} \int_0^l \psi(x) \sin \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} x \right) dx. \quad (10.40)$$

Qolgan narsa (10.39), (10.40) dan topilga  $A_n, B_n$  koefsentlari (10.33) ga qo'yish qoldi.

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, \\ u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = x, \quad u_t(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{2l} + \sin \frac{3\pi x}{2l}. \end{cases} \quad (10.41)$$

Tenglamaning  $U(x, t)$  yechimni toping

Berilgan masala №649<sup>m</sup>. masalaning xususiy holidir. Shuning uchun biz birdan (10.33) (10.39) (10.44) masalani javobini chiqarish uchun foydalanamiz (10.31) bo'yicha  $A_n$ :- koefsentlarini topamiz

$$\begin{aligned}
 A_n &= \frac{2}{l} \int_0^l x \sin \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} x \right) dx = \\
 &= \frac{2}{l} \left[ -\frac{2l}{(2n-1)\pi} x \cos \left( \frac{(2n-1)\pi}{2l} x \right) \Big|_{x=0}^{x=l} + \frac{2l}{(2n-1)\pi} \int_0^l \cos \left( \frac{(2n-1)\pi}{2l} x \right) dx \right] =
 \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{l} \left[ \frac{4l^2}{(2n-1)^2\pi^2} \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}x\right) \right]_{x=0}^{x=l} = \frac{2}{l} \left[ \frac{4l^2}{(2n-1)^2\pi^2} (-1)^{n+1} \right] = \frac{8l}{(2n-1)^2\pi^2} (-1)^{n+1}. \quad (10.42)$$

$B_n$ , -ni topishda  $\psi(x)$ -funksiya  $X_n(x) = \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}x\right)$  funksiya bo'yicha qatorga yoyilgandeb aytamiz

$$\psi(x) = \sin \frac{\pi x}{2l} + \sin \frac{3\pi x}{2l}. \quad (10.43)$$

Shunday qilib  $\beta_1 = \beta_2 = 1$ ,  $\beta_3 = \beta_4 = \dots = 0$ bu yerdan ,yani

$$B_n = \beta_n \frac{2l}{\pi(2n-1)a}$$

$$B_1 = \frac{2l}{\pi a}, \quad B_2 = \frac{2l}{3\pi a}, \quad B_3 = B_4 = \dots = 0. \quad (10.44)$$

Topilgan  $A_n$  va  $B_n$  larni

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right) \left( A_n \cos\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) \right).$$

ga qo'yamiz.

Javobni hosil qilamiz.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right) \left( \frac{8l}{(2n-1)^2\pi^2} (-1)^{n+1} \cos\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) \right) + \frac{2l}{a\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2l}x\right) \sin\left(\frac{\pi a}{2l}t\right) + \frac{2l}{3a\pi} \sin\left(\frac{3\pi}{2l}x\right) \sin\left(\frac{3\pi a}{2l}t\right).$$

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

### Tavsiya etiladigan adabiyotlar

#### Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.11. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlnn S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov 13.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### **Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.**

3. Yarim to'g'ri chiziqdagi bir jinsli chegaraviy shart bilan berilgan ikkinchi chegaraviy masala quyilishini keltiring
4. Bir jinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan bir jinsli tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalani keltiring.

### **Mavzu 11. O'zgaruvchilarni ajratish uchun (umumiy hol)**

#### **Amaliy mashg'ulotlar rejasi**

**Fan:** "Matematik fizika tenglamalari".

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejasi:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

**O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

**O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash



- *rivojlantiruvchi*: o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy*: mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

### **O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari*: individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari*: individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari*: daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari*: auditoriya
- *monitoring va baholash*: og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

### **Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

### **O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminologiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

## **1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.**

### **1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish ; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;
- *talaba faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;

- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

## **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;

- *talaba faoliyati:* oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi

- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

## **3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)**

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari

- *talaba faoliyati:* ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari:* guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### **1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma**

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

#### **Misol va mashqlar namoishi**

#### **O'zgaruvchilarni ajratish uchun (umumiy hol)**

Faraz qilamiz

$$\rho(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) - q(x)u \quad (11.1)$$

Tenglamaning umumiy yechimini topish kerak.

( bu yerda  $\rho(x), p(x), q(x)$  )- yetarlicha silliq funksiyalar , biroq  $p(x)>0, \rho(x)>0, q(x)\geq 0$

Bu tenglama

$$\begin{cases} \alpha u(0,t) + \beta \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} = 0, \\ \gamma u(l,t) + \delta \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} = 0. \end{cases} \quad (11.2)$$

Shartlarni va

$$u(x,0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x) \quad (0 \leq x \leq l). \quad (11.3)$$

Boshlang'ich shartlarni qanoatlantradi.

Birinchidan berilgan tenglamaning , chegaraviy shartlarini qanoatlantruvchi netrival yechimini

$$u(x,t) = T(t)X(x) \quad (11.4)$$

(11.4) ni (11.1) tenglamaga quysak,

$$\rho(x)T''(t)X(x) = T(t) \frac{d}{dx} \left( p(x) \frac{dX}{dx} \right) - q(x)T(t)X(x) \text{ yoki}$$

$$\frac{\frac{d}{dx} \left( p(x) \frac{dX}{dx} \right) - q(x)X(x)}{\rho(x)X(x)} = \frac{T''(t)}{T(t)} = -\lambda, \text{ bu yerdagi } \lambda \text{ - o'zgarmas}$$

Bu yerdan.

$$\frac{d}{dx} \left( p(x) \frac{dX}{dx} \right) + (\lambda \rho(x) - q(x))X = 0, \quad (11.5)$$

$$T''(t) + \lambda T(t) = 0 \quad (11.6)$$

Shunday qilib ,  $T(t) \neq 0$ , holda (11.4) tenglama (11.2) boshlang'ich shartlarni qanoatlantrish uchun.

$$\begin{cases} \alpha X(0) + \beta X'(0) = 0, \\ \gamma X(l) + \delta X'(l) = 0. \end{cases} \quad (11.7)$$

Shartlarni bajarilishi zarur va yetarli.

Shunday qilib  $X(x)$  - funksiyani aniqlash uchun quyidagi oddiy differensial tenglama uchun chegaraviy masalaga kelamiz:

Shunday  $\lambda$  ni topish kerakki, u xos qiymatga namlanib, bunda (11.5) tenglamaning netrivali yechimlari mavjud bo'lib (11.7) shartlarni qanoatlantirsak hamda xos funksiyalar deb nomlanuvchi netrival yechimlarni topish kerak.

Chegaraviy masaladagi xos qiymatlar va xos funksiyalar xossalari:

1. Sanoqli xos qiymatlar  $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots$ , mavjud bo'lib, unga  $X_1(x), X_2(x), \dots$  xos funksiyalar mos keladi.
2.  $q(x) \geq 0$  va  $\left(p(x)X_n(x)X_n'(x)\right)_{x=0}^{x=l} \leq 0$  bo'lganda  $\lambda_n$ -ng barcha xos qiymatlari musbatdir.
3. Xos funksiyalar  $[0, l]$  kesmada  $\rho(x)$  og'rligidagi ortogonal va normalangan sestimani ifodalaydi,

Ya'ni

$$\int_0^l \rho(x) X_n(x) X_m(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{npu } m \neq n, \\ 1, & \text{npu } m = n. \end{cases} \quad (11.8)$$

4. (Steklov teoremasi) Har bir  $f(x)$  funksiya (11.7) chegaraviy shartlarni qanoatlantradi va birinchi tartibli uzluksiz va ikkinchi tartibli qism -uzluksiz hosilalarga ega bo'lib,  $X_n(x)$  - xos funksiyalar bo'yicha absolyut va tekis yaqinlashuvchi qatorga yoyiladi:

$$X_n(x): f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n X_n(x), \quad a_n = \int_0^l \rho(x) X_n(x) f(x) dx.$$

Kiyinchalik, har bir  $\lambda_n$  -xos qiymat uchun (11.6)-tyenglamani yechamiz (11.6) tenglamaning umumiy yechimini  $\lambda = \lambda_n$  (uni  $T_n(t)$  bilan belgilaymiz) bo'lganda quyidagicha belgilaymiz:

$$T_n(t) = a_n \cos \sqrt{\lambda_n} t + b_n \sin \sqrt{\lambda_n} t, \text{ bu yerda } a_n \text{ va } b_n \text{ ixtiyoriy o'zgarmlar.}$$

Shunday qilib, biz (11.1) tenglamaning cheksiz yechimlari to'plamini hosil qildik.

$$u_n(x, t) = T_n(t) X_n(x) = (a_n \cos \sqrt{\lambda_n} t + b_n \sin \sqrt{\lambda_n} t) X_n(x).$$

(11.3) boshlang'ich shartni qanoatlantirish uchun

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \sqrt{\lambda_n} t + b_n \sin \sqrt{\lambda_n} t) X_n(x) \quad (11.9)$$

Qatorni tuzamiz.

Agar bu qator tekis yaqinlashuvchi bo'lsa, xuddi shunday,  $x$  va  $t$  bo'yicha ikki marta hadma-had undan hosil bo'luvchi qator ham tekis yaqinlashuvchi va uning yig'indisi (11.1) tenglamani va (11.2) chegaraviy masalani qanoatlatradi.

(11.3) – boshlang'ich shartlarning bajarilishi uchun,  $a_n$  va  $b_n$  koefsentlarni umumlashgan Fure qatorning ortonormalangan  $(X_n)$  funksiya sestimasi bo'yicha  $\varphi$  va  $\psi$  funksiyalarning koefsentlari yiyilmasi kabi topamiz.

Endi o'zgaruvchilarni ajratish usulini qullash sohasida ba'zi bir umumiy izohlarni keltiramiz.

Usulning qullanishi asosida defferensial tenglamalar va chegaraviy shartlar kabi chiziqlilik yotadi. Defferensial tenglamalarning koefsentlari yoki o'zgarmas bo'lishi mumkin, yoki funksiya ko'rinishda tasvirlanadiki har biri bitta o'zgaruvchiga ega. Masalan, ikkita erkli o'zgaruvchiga ya'ni  $x$  va  $t$  -ga bog'liq defferensial tenglama holda, unga mos defferensial tenglama quyidagi ko'rinishga ega.

$$A(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B(t) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + C(x) \frac{\partial u}{\partial x} + D(t) \frac{\partial u}{\partial t} + (F_1(x) + F_2(t))u = 0 \quad \text{yoki}$$

Bu holga keltiriladi. Agar bu masalada bu shartlar birjinsli bo'lmasa, uni birjinsliga keltirish kerak. Ikki o'lchovli holda (vaqtni hisobga olmagan holda) qaralayotgan masala chegarasining sohasi kordinata chiziqlaridan (uch o'lchovli hol uchun – fazoviy- kordinatalardan) iborat bo'lishi kerak. Shunday qilib, agar dekart kordinata sestimasi ishlatilsa sohaning chegarasi kordinata o'qlariga parallel to'g'ri kesmalardan iborat;

Qutbiy kordinata sestimasi ishlatilganda soha chegarasi – qutibdan chiquvchi markazi qutib va kesma nurlaridan iborat aylana yoyini tashkil etadi va h-a.

Bu hol usulning kuchli ekanligini cheklanadi. Fazodagi to'lqin tarqalishi masalasi va potenseallar nazaryasida o'zgaruvchilarni ajratish usullarining faqat eng oddiy konfiguratsiyalarini qaralayotgan sohada qaraymiz.

Ikkinchi tartibli birjinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan to'lqin tebranish tenglamasi uchun birjinsli bo'lmagan boshlang'ich chegaraviy masala

Ikkinchi tartibli birjinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan to'liq tebranish tenglamasi uchun birjinsli bo'lmagan boshlang'ich chegaraviy masalani yeching?

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad x \in (0, l), \quad t > 0, \quad (11.10)$$

$$u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad t > 0, \quad (11.11)$$

$$u(x, 0) = 0, \quad x \in [0, l]. \quad (11.12)$$

$$u_t(x, 0) = 0, \quad x \in [0, l]. \quad (11.13)$$

1.Qadam Shturm-Liuivill masalasining yechimi Bu qadamni biz masalada yechgan edik

Natija: cheksiz netrival yechimlar to'plami

$$\lambda_n = \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \left( \frac{\pi(2n-1)x}{2l} \right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

2.Qadam  $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0$  chegaraviy shartlar bilan berilgan

$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t)$  tenglamaning yechimini  $u(x, t) = \sum_n X_n T_n(t)$ , ko'rinishda izlaymiz, bu yerda  $X_n(x)$  funksiya quyidagicha ko'rinishga ega:

$$X_n(x) = \sin \left( \frac{\pi(2n-1)x}{2l} \right). \quad (11.14)$$

Faraz qilamiz  $f(x, t)$  funksiya har bir  $t \in [0, T]$  uchun Fure qatoriga  $X_n(x)$  - funksiya bo'yicha yoyilgan :

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left( \frac{\pi(2n-1)x}{2l} \right) f_n(t). \quad (11.15)$$

Bunda , berilgan Fure qatorining koefsntlari quyidagi formula orqali topiladi:

$$f_n(t) = (f, X_n) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \left( \frac{\pi(2n-1)x}{2l} \right) dx. \quad (11.16)$$

(11.10) tenglama quyidagi ko'rinishga ega :

$$\sum_{n=0}^{\infty} (X_n(x) T''_n(t) - a^2 X''_n(x) T_n(t)) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \left( \frac{\pi(2n-1)x}{2l} \right). \quad \text{Uning bajarilishi}$$

uchun ,

$$X_n(x) T''_n(t) - a^2 X''_n(x) T_n(t) = f_n(t) \sin \left( \frac{\pi(2n-1)x}{2l} \right) \quad \text{для } n \in \mathbb{N},$$

uchun

Bo'lishi yetarli , u holda

$$\left(T_n''(t) + \frac{\pi^2(2n-1)^2 a^2}{4l^2} T_n(t)\right) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right) = f_n(t) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right) \quad \text{для } n \in \mathbb{N}.$$

uchun

Bu bajariladi ,agar

$$T_n''(t) + \frac{\pi^2(2n-1)^2 a^2}{4l^2} T_n(t) = f_n(t) \quad \text{для } n \in \mathbb{N}, \quad (11.17)$$

Ya'ni , biz -funktsiya uchun yetarli shartga ega bo'ldikki

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos\left(\frac{\pi n x}{l}\right), \quad (\text{agar qator yaxshi bo'lsa}) \quad \text{funktsiya}$$

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0. \quad \text{chegaraviy shartlar bilan berilgan}$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad \text{tenglamaning yechimi bo'lsin.}$$

3.Qadam (11.1)-(11.13) masalani yechamiz .

(11.10)-(11.13) masala shartlaridan biz hali

boshlang'ich shartlardan foydalanmadik.  $\varphi(x) \equiv 0, \psi(x) \equiv 0$  boshlang'ich shartlarga

kiruvchi funksiyalar , funksiyasi bo'yicha qatorga yoyiladi.

$$\varphi(x) \equiv 0 = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right), \quad x \in [0, l] \quad \text{где } \varphi_n = 0, \quad (11.18)$$

$$\psi(x) \equiv 0 = \frac{\psi_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \cos\left(\frac{\pi n x}{l}\right), \quad x \in [0, l] \quad \text{где } \psi_n = 0 \quad (11.19)$$

$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right)$  funksiyani (ya'ni qatorni yaxshi deb) boshlang'ich shartlarga quyamiz.

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right) = 0;$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n'(0) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right) = 0.$$

Bu tenglamani bajarilishi uchun ,

$$T_n(0) = \varphi_n = 0 \quad T_n'(0) = \psi_n = 0 \quad \text{для } n \in \mathbb{N}.$$

Bo'lihi yetarli .

Shunday qilib , (11.17) va (11.18) –(11.19) lardan funksiya uchun koshi masalasiga ega bo'lamiz

$$\begin{cases} T_n''(t) + \frac{\pi^2(2n-1)^2 a^2}{4l^2} T_n(t) = f_n(t) \\ T_n(0) = 0 \\ T_n'(0) = 0 \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}. \quad (11.20)$$

Bu koshi masalalari ixtiyoriy  $f_n \in C[0, T]$  va ixtiyoriy  $\varphi_n \in \mathbb{R}$ ,  $\psi_n \in \mathbb{R}$ . qiymatlar uchun yagona yechimga ega,

Birinchi dan

$$T_n''(t) + \frac{\pi^2(2n-1)^2 a^2}{4l^2} T_n(t) = 0. \quad \text{Tenglamani yechamiz:}$$

Uning umumiy yechimi quyidagicha :

$$T_n(t) = c_1 \sin \frac{\pi(2n-1)at}{2l} + c_2 \cos \frac{\pi(2n-1)at}{2l}.$$

O'zgaruvchilarni variatsialash usulidan (11.11) tenglamaning yechimini

$$T_n(t) = c_1(t) \sin \frac{\pi(2n-1)at}{2l} + c_2(t) \cos \frac{\pi(2n-1)at}{2l} \quad \text{ko'rinishda izlaymiz,}$$

Bu yerda  $c_{1,2}(t)$  -quyidagi sestimaning yechimidir:

$$\begin{cases} c_1'(t) \sin \frac{\pi(2n-1)at}{2l} + c_2'(t) \cos \frac{\pi(2n-1)at}{2l} = 0; \\ \frac{\pi(2n-1)a}{2l} \left( c_1'(t) \cos \frac{\pi(2n-1)at}{2l} - c_2'(t) \sin \frac{\pi(2n-1)at}{2l} \right) = f_n(t). \end{cases}$$

Bu yedan

$$c_1'(t) = \frac{2l}{\pi(2n-1)a} f_n(t) \cos \frac{\pi(2n-1)at}{2l}, \quad c_2'(t) = -\frac{2l}{\pi(2n-1)a} f_n(t) \sin \frac{\pi(2n-1)at}{2l}.$$

Boshlang'ich shartlarni hisobga olsak :  $T_n(0) = \varphi_n = 0$ ,  $T_n'(0) = \psi_n = 0$  va quyidagiga ega bo'lamiz:

$$c_1(t) = \frac{2l}{\pi(2n-1)a} \int_0^t f_n(\tau) \cos \frac{\pi(2n-1)a\tau}{2l} d\tau, \quad c_2(t) = -\frac{2l}{\pi(2n-1)a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{\pi(2n-1)a\tau}{2l} d\tau. \quad (11.21)$$

Shunday qilib,

$$T_n(t) = \frac{2l}{\pi(2n-1)a} \left( \sin \frac{\pi(2n-1)at}{2l} \int_0^t f_n(\tau) \cos \frac{\pi(2n-1)a\tau}{2l} d\tau - \cos \frac{\pi(2n-1)at}{2l} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{\pi(2n-1)a\tau}{2l} d\tau \right). \quad (11.22)$$



Qolgan narsa , (11.13) –ni quyidagi formulaga quyish kerak:

№\_1, Masalaning  $U(x, t)$  –yechimni toping.

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad x \in (0, l), \quad t > 0, \quad (11.23)$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad t > 0, \quad (11.24)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in [0, l]. \quad (11.25)$$

$$u_t(x, 0) = 0, \quad x \in [0, l]. \quad (11.26)$$

Yechim: №1 ga qarang (klassik usul)

№\_II masalaning  $U(x, t)$  – yechimini toping:

$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x), \quad x \in (0, l), \quad t > 0, \quad (11.27)$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad t > 0, \quad (11.28)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in [0, l]. \quad (11.29)$$

Yechim: №1 ga qarang (klassik usul)

№\_II masalaning  $U(x, t)$  – yechimini toping:

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx} + x \cos 2t, a = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi.$$

$$2) U_t = U_{xx} + t^2 \sin x, U(x, 0) = 2x, U(0, t) = t, U(l, t) = \sqrt{t}, \\ x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$3) U_{tt} = a^2 U_{xx} + 2x \cos t, a = 1,5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi.$$

$$4) U_t = U_{xx} + t \sin x, U(x, 0) = x^4, U(0, t) = t, U(l, t) = t^2, \\ x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$5) U_{tt} = a^2 U_{xx} + e^x \sin t, a = 4, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = 1.$$

$$6) U_t = U_{xx} + tx, U(x, 0) = x, U(0, t) = 2t, U(l, t) = t, \\ x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

### Tavsiya etiladigan adabiyotlar

### Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S, Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.

1. O'zgaruvchilarni ajratish usuli.
2. Shturm – Liuvill masalasi.

### Mavzu 12. Birjinsli bo'lmagan chegaraviy shartni bir jinsliga keltrish;

#### Amaliy mashg'ulotlar rejasi

**Fan:** “ Matematik fizika tenglamalari“.

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejasi:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

**O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

**O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash
- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

**O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar
- *o'qitish shartlari:* auditoriya
- *monitoring va baholash:* og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

**Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

**O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

**1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.****1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqqa);**

- *o'qituvchi faoliyati:* tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;

- *talaba faoliyati:* o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;

- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

## **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;

- *talaba faoliyati:* oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi

- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

## **3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)**

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari

- *talaba faoliyati:* ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari:* guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### **1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma**

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

### Birjinsli bo'lmagan chegaraviy shartni bir jinsliga keltrish;

Birinchi tartibli birjinsli bo'lmagan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birjinsli bo'lmagan boshlang'ich chegaraviy nasalarni qaraymiz.

$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad x \in (0, l), \quad t > 0, \quad (12.1)$$

$$u(0, t) = \mu(t) \quad t > 0, \quad (12.2)$$

$$u(l, t) = \nu(t), \quad t > 0, \quad (12.3)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in [0, l]. \quad (12.4)$$

Bu masalani birjinsli chegaraviy masalaga osongina keltirish mumkin . bu o'zgaruvchilarni almashtirish yordamida amalga oshiriladi:

$$v(x, t) = u(x, t) - \left( \frac{l-x}{l} \mu(t) + \frac{x}{l} \nu(t) \right). \quad (12.5)$$

Ayni holda

$$v(0, t) = u(0, t) - \left( \frac{l}{l} \mu(t) + \frac{0}{l} \nu(t) \right) = \mu(t) - \mu(t) = 0.$$

Va

$$v(l, t) = u(l, t) - \left( \frac{l-l}{l} \mu(t) + \frac{l}{l} \nu(t) \right) = \nu(t) - \nu(t) = 0.$$

O'zgaruvchilarni almashtirgandan keyin boshlang'ich shartlar bilan berilgan tenglamada nima ruy beradi?

Savolni mulohaza qilamiz.

$$u_t = v_t + \left( \frac{l-x}{l} \mu'(t) + \frac{x}{l} \nu'(t) \right), \quad u_{xx} = v_{xx},$$

Bo'lganligidan tenglama quyidagi ko'rinishni oladi.

$$v_t - a^2 v_{xx} = f(x, t) - \left( \frac{l-x}{l} \mu'(t) + \frac{x}{l} \nu'(t) \right) = f_1(x, t).$$

Boshlang'ich shart quyidagicha ifodalanadi:

$$v(x, 0) = \varphi(x) - \left( \frac{l-x}{l} \mu(0) + \frac{x}{l} \nu(0) \right) = \varphi_1(x).$$

Demak , berilgan masala birjinsli chegaraviy masala bilan berilgan  $v(x, t)$  funksiyani topishga olib keldi.

$$\begin{aligned}
v_t - a^2 v_{xx} &= f_1(x, t), & x \in (0, l), & t > 0, \\
v(0, t) &= 0, & & t > 0, \\
v(l, t) &= 0, & & t > 0, \\
v(x, 0) &= \varphi_1(x), & & x \in [0, l],
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f_1(x, t) &= f(x, t) - \left( \frac{l-x}{l} \mu'(t) + \frac{x}{l} \nu'(t) \right), \\
\varphi_1(x) &= \varphi(x) - \left( \frac{l-x}{l} \mu(0) + \frac{x}{l} \nu(0) \right).
\end{aligned}$$

1,1Izoh. Ixtiyoriy chegaraviy shartlar hamda , II-tartibli shartdan tashqari kesmaning oxirlarida quyidagi

$$w(x, t) = (a_1x + b_1)\mu(t) + (a_2x + b_2)\nu(t)$$

Funksiyani shunday olish kerakki ,  $v(x, t) = u(x, t) - w(x, t)$  funksiya uchun birjinsli chegaraviy masala bajarilsin. Ajoyib hollardan biri , kesmaning oxiridagi II-tartibli shartlardir. Bu holda vaqt topib bo'lmaydi , lekin uni

$$w(x, t) = (a_1x^2 + b_1x)\mu(t) + (a_2x^2 + b_2x)\nu(t).$$

Ko'rinishda topish mumkin .

1.2 misol Ikkinchi tartibli chegaraviy shartlar

$$u_x(0, t) = \mu(t), \quad u_x(l, t) = \nu(t)$$

Birjinsliga quyidagicha keltirdik:

$w(x, t) = (a_1x^2 + b_1x)\mu(t) + (a_2x^2 + b_2x)\nu(t)$ Chegaraviy shartlarni qanoatlantirsin.

$$w_x(0, t) = \mu(t), \quad w_x(l, t) = \nu(t)$$

$$w_x(0, t) = b_1\mu(t) + b_2\nu(t), \quad w_x(l, t) = (2a_1l + b_1)\mu(t) + (2a_2l + b_2)\nu(t).$$

Birinchi chegaraviy shartdan

$$\mu(t) = b_1\mu(t) + b_2\nu(t)$$

$$b_1 = 1, \quad b_2 = 0.$$

-ni topamiz.

Ikkinchi chegaraviy shartdan topilgan larni hisobga olsak:

$$\nu(t) = (2a_1l + b_1)\mu(t) + (2a_2l + b_2)\nu(t) = (2a_1l + 1)\mu(t) + 2a_2l\nu(t)$$

$$a_1 = -\frac{1}{2l}, \quad a_2 = \frac{1}{2l}.$$

Ya'ni

$$w(x, t) = \left( x - \frac{x^2}{2l} \right) \mu(t) + \frac{x^2}{2l} \nu(t).$$

Masalaning  $U(x, t)$  yechimni toping.

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x), \quad x \in (0, l), \quad t > 0, \quad (12.6)$$

$$u_x(0, t) = \alpha, \quad u_x(l, t) = \beta, \quad t > 0, \quad (12.7)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in [0, l]. \quad (12.8)$$

$$u_t(x, 0) = \psi(x), \quad x \in [0, l]. \quad (12.9)$$

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

### Tavsiya etiladigan adabiyotlar

#### Asosiy

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

#### Qo'shimcha

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*

8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

### **Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.**

1. Bir jinsli bo'lmagan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasini keltiring.
2. Bir jinsli bo'lmagan issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasini bir jinsliga keltiring.

### **Mavzu 13. Laplas va Puasson tenglamasi uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli**

#### **Amaliy mashg'ulotlar rejası**

**Fan:** " Matematik fizika tenglamalari".

**O'quv soati:** 2 s. (amaliy)

**O'quv mashg'ulotlar turi:** kartochka, topshiriq, o'quv materiallar va metodik qullanma vositasi bilan amaliy mashg'ulotlar.

**O'quv mashg'ulotlar rejası:**

- tarqatma materiallar tayyorlash.
- o'quv masalalari.
- Misol va masalalar echish
- Yakuniy tahlil

**O'quv mashg'ulotlar maqsadi:**

Misol va masalalar echish vositasi bilan Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan chuqurlashtirish

**O'quv mashg'ulotlar vazifasi:**

- *o'qituvchi:* mavzu bo'yicha olgan bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlash
- *rivojlantiruvchi:* o'rganish tajribasini oshirish, Matematik fizika tenglamalari nazariyasini o'rganish, analiz va o'rganish natijalarini umumlashtirish mahoratini rivojlantirish; student ijodiy mahoratini shakllantirish;
- *tarbiyaviy:* mustaqil izlanish mahoratini uyg'otish ; jamoa bilan ish yuritish qoidalariga bo'ysunish. Fanga qiziqishni rivojlantirish, ma'suliyatni his qilish , mehnatsevarlik, individual ishni kollektiv bilan moslashni o'rgatish.

**O'qitish texnologiyasi:**

- *o'qitish metodlari:* individual savol-javob; birga o'qitish; o'quv qo'llanmalarga asoslanib teoremlarni isbotlash, misollar echish mahoratini o'rgatish
- *o'qitish shakllari:* individual, kollektiv.
- *o'qitish vositalari:* daftarda va dockada misol va masalalar echish, metodik ishlanmalar va amaliy ko'rsatmalar



- *o'qitish shartlari*: auditoriya
- *monitoring va baholash*: og'zaki nazorat, individual savol-javob , material tushuntirilishi, nazorat ishi.

#### **Pedagogik masalalar :**

- mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun o'rganuvchilarni anglash faoliyatini tashkillashtirish
- namuna bo'yicha amaliyotda bilimlarni mustahkamlash;
- mustaqil oliy matematika o'rganishni shakllantirish;

#### **O'quv faoliyati natijalari:**

- kurs mavzulari bo'yicha bilimlarni sistemalashtirish va mustahkamlashtirish;
- o'rgangan tushunchalar bilan amaliy mashg'ulotlarda ishlay olish;
- misol va masalalarni echishda, hamda teoremlar isbotlashda matematik terminalogiyalarni va tushunchalarni qo'llashni mustaqil o'rganish mahorati;
- mustaqil misol va masalalarni echa olish mahoratini oshirish;
- tajriba natijalarini analiz qila olish;

### **1.2 Amaliy mashg'ulotning xronologik xaritasi.**

#### **1 bosqich. O'quv mashg'ulotlarga kirish (10 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati*: tayyorgarlikni tekshirish (konspektning mavjudligi; tayyorgarlik, qatiyatlik va aniqlik, davomat); zarur materillarni tarqatish (metodik qo'llanmalar, kartochkalar); amaliy darsning maqsadi va mavzuni aytish ; o'quv darsining rejasi bilan tanishtirish, tushuncha va jumlar; adabiyotlar ruyxati; Reyting-kontrol sistemasi bilan tanishtirish; joriy nazorat baholash mezonlari; o'quv ishlari yakunlarining rejalarini taqdimlash;
- *talaba faoliyati*: o'quv joyini tayyorlash (o'quvchilarning borligi; tashqi ko'rinish; uquv va tarqatma materiallar); mavzu bilan tanishuv va o'quv dars maqsadi; o'quv materialni qabul qilishga tayyorgarlik;
- *qabul qilish shakli metodlari*: og'zaki nazorat, individual savol-javob; ob'yektlar bilan ishlash; konspektlash;

#### **2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa);**

- *o'qituvchi faoliyati*: mavzuni kiritish, Matematik fizika tenglamalarini o'rganish bilan bog'liq oldingi mavzuni eslashni taklif etish; amaliy mashg'ulotlar matnini tarqatish; qo'shimcha adabiyotlarda tushunchalar berish; ish usullari bilan tanishtirish; mashg'ulotlar tarqatish; tushunarsiz savollarni aniqlab, ularni echimi topishga yordamlash; gruppalarda ishlashni tashkillash; natijalarni muhokamalashtirish;
- *talaba faoliyati*: oldingi mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash; quloq solish, yozib olish; tushunchalar va terminlarni aytish; savol berishadi va muhokamalashishadi, aniqlashtirishadi; gruppalarda ishlashadi, misol va masalalar ishlashadi; olingan natijalar muhokamasiga qatnashishadi

- *qabul qilish shakli metodlari:* og'zaki nazorat, grupalarda individual savol-javob; misol va masalalar echimlarini daftarga yozib olish

### 3 bosqich. Yakuniy qism(10 daqiqa)

- *o'qituvchi faoliyati:* mavzu bo'yicha xulosa chiqarish; talabalarni fikrini bir joyga jamlash; qilingan ishlarning muhimligini aytib o'tish; javob bergan talabalarni ishini baholash; o'quv darsning maqsadiga erishish darajasini baholash va analizlashtirish; mustaqil ishlar topshiriqlari

- *talaba faoliyati:* ish analizi; misol va masalalar asosida malaka oshirish; o'zaro baholash o'tkazish; yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va analizlash; berilgan mustaqil ishlarni yozib olishadi;

- *qabul qilish shakli metodlari:* guruhda va individual ishlash; mustaqil ishlar uchun daftar tutish.

### 1.3 O'quv-uslubiy qo'llanma

O'quv mashg'ulotlar rejasi:

- metodik qullanmalar va topshiriqlar bilan ishlash
- Amaliy darslar uchun daftar tutish
- o'quv topshiriqlar
- amaliy ishlarni topshirish

### Misol va mashqlar namoishi

#### Laplas va Puasson tenglamasi uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli

a) X bo'yicha bir jinsli bo'lmagan chegaraviy masala

Chegaraviy masalaning  $u(x, t)$  echimini toping.

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in (0, l), y \in (0, s), \\ u(0, y) = 0, u(l, y) = Ty, & y \in (0, s), \\ u(x, 0) = 0, u(x, s) = \frac{sx}{l}, & x \in (0, l). \end{cases} \quad (13.1)$$

Chegaraviy masalalarni  $x = 0, x = l$  bo'lganda birjinsliga keltirish.

Birjinsli bo'gan chegaraviy shartlar bilan berilgan parabolic va inerbolik tenglamalar uchun,

$$w(x, y) = (a_1x + b_1)\mu(y) + (a_2x + b_2)\nu(y).$$

Funksiyani topish mumkin

$$w(0, y) = \mu(y), \quad w(l, y) = \nu(y).$$

bo'lsin

$\mu(y) = 0, \nu(y) = Ty$  bolganda  $w(x, y)$  funksiya quydagi ko'rinishni oladi.

$$w(x, y) = \frac{Txy}{l}. \quad (13.2)$$

$w(x, y)$  berilgan funksiya quydagi tengliklarni qanoatlantiradi.

$$\begin{cases} w_{xx} + w_{yy} = 0, & x \in (0, l), y \in (0, s), \\ w(0, y) = 0, w(l, y) = Ty, & y \in (0, s), \\ w(x, 0) = 0, w(x, s) = \frac{Txs}{l}, & x \in (0, l). \end{cases} \quad (13.3)$$

Shuning uchun

$$v(x, y) = u(x, y) - w(x, y)$$

Quyidagi masalani hosil qilamiz :

$$\begin{cases} v_{xx} + v_{yy} = 0, & x \in (0, l), y \in (0, s), \\ v(0, y) = 0, v(l, y) = 0, & y \in (0, s), \\ v(x, 0) = 0, v(x, s) = 0, & x \in (0, l). \end{cases} \quad (13.4)$$

2. (13.4) msalani echimini. Berilgan holda masala echimi bu usul bilan izlash zaruriyati yo'q (13.4) masala quydagi echimga ega.

$$v(x, t) \equiv 0, \quad x \in (0, l), y \in (0, s).$$

Chegaraviy masalalar nazariyasidan ma'lumki, bunday masalalarning echimi yagonadir ( bu chegaraviy shartlar ikkinchi tartibli bo'lgan h0l uchun). Shuning uchun

Jovobni yozish qoldi.

$$v(x, t) \equiv 0, \quad x \in (0, l), y \in (0, s).$$

Chegaraviy masalaning  $u(x, t)$  echimini toping.

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in (0, +\infty), y \in (0, l), \\ u(0, y) = f(y), u(\infty, y) = 0, & y \in (0, l), \\ u(x, 0) = u_y(x, l) = 0, & x \in (0, +\infty). \end{cases} \quad (13.5)$$

Berilgan hol uchun masala yarimqatlamda qo'yilgan, ikkita o'zgarimaslardan faqat kesmaning oxirlarida biz faqat  $Y(y)$ . Shturm-Liuwill masalasini hosil qilamiz.

**Iy(x,t)=0 chegaraviy shartlar bilan berilgan  $u_{xx} + u_{yy} = 0$**

**Tenglamaning echimi  $U(x, y) = X(x)Y(y)$ . ko'rinishda izlaymiz.**

**Shuning ta'kitlaymizki, chegaraviy shartlar  $y = 0, y = l$  bo'lganda**

$Y(y)$  funksiya uchun quydagilarni ifodalaydi

$$Y(0) = Y'(l) = 0. \quad (13.6)$$

$U(x, y)$  ni tenglamaga qo'yamiz:

$$X''(x)Y(y) = -X(x)Y''(y)$$

$X(x)Y(y) \neq 0$ , deb ,bu tenglikni  $X(x)Y(y) \neq 0$ :ga bo'lamiz::

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda.$$

$Y(y)$  funksiya uchun quydagi masalaga ega bo'lamiz.

$$Y''(y) + \lambda Y(y) = 0, \quad (13.7)$$

$$Y(0) = Y'(l) = 0, \quad (13.8)$$

$X(x)$  funksiya uchun tenglama quydagicha bo'ladi:

$$X''(x) - \lambda X(x) = 0, \quad x \in (0, \infty). \quad (13.9)$$

(13.8)-(13.9) lar Shturm-Liuuill masala deyiladi. Uning echimini biz № 71 masalaga ko'rdik va bu masala cheksiz nexrival echimlar to'plamiga ega:

$$\lambda_n = \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} \right)^2, \quad Y_n(y) = \sin \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} y \right), \quad n \in \mathbb{N} \quad (13.10)$$

masala faqat  $\lambda = \lambda_n$  bo'lganda ma'noga ega va bu quydagi masalani hosil qilamiz:

$$X''_n(x) - \lambda_n X_n(x) = 0, \quad x \in (0, \infty), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (13.11)$$

Bu birjinsli birinchi birinchi tartibli tenglamaning echimi quydagicha:

$$X_n(x) = A_n e^{\frac{\pi(2n-1)}{2l} x} + B_n e^{-\frac{\pi(2n-1)}{2l} x}, \quad y \in (0, s), \quad n \in \mathbb{N} \quad (13.12)$$

bu erda  $A_n, B_n$ - ixtiyoriy o'zgarmaslar.

2.Qadam.

(13.6) masalani echamiz:

(13.6) masalaning echimini  $u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) Y_n(y)$  ko'rinishda izlaymiz.

Ya'ni,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} y \right) \left( A_n e^{\frac{\pi(2n-1)}{2l} x} + B_n e^{-\frac{\pi(2n-1)}{2l} x} \right) \quad (13.13)$$

Masala shartlardan, hali  $x$  bo'yicha chegaraviy shartdan foydalanmadik:

$$u(0, y) = f(y), \quad u(\infty, y) = 0, \quad y \in (0, l).$$

$u(x, y)$ -ni echimi birinchi shartdan :

$$f(y) = u(0, y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(0) Y_n(y) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n + B_n) Y_n(y), \quad (13.14)$$

$u(x, y) = 0$  shart, faqat

$$A_n = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

bo'lganda bajarilishi mumkin, shunday qilib echim.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \left( \frac{\pi(2n-1)}{2l} y \right) e^{-\frac{\pi(2n-1)}{2l} x}. \quad (13.15)$$

ko'rinishda bo'ladi.

$$f(y) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n Y_n(y), \quad (13.16)$$

№-717 masaladagi kabi  $f_n$  koeffitsientlarining ko'rinishlari quydagicha:

$$f_n = \frac{2}{l}(f, Y_n) = \frac{2}{l} \int_0^l f(y) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}y\right) dx. \quad (13.17)$$

$B_n$  koeffitsientlari uchun (13.14)-(13.17) laridan:

$$B_n = f_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(y) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}y\right) dx. \quad (13.18)$$

Endi (13.18) dan topilgan koeffitsientlarni (13.15) formulaga qo'yish qoldi:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}y\right) e^{-\frac{\pi(2n-1)}{2l}x}, \quad (13.19)$$

(13.17) tenglik bilan aniqlangan.

b) Chegaraviy masalaning  $u(x, t)$  echimini toping.

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in (0, l), \quad y \in (0, s), \\ u(0, y) = 0, \quad u_x(l, y) = q, & y \in (0, s), \\ u(x, 0) = 0, \quad u(x, s) = U, & x \in (0, l). \end{cases}$$

Chegaraviy masalaning  $u(x, t)$  yechimini toping:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in (0, +\infty), \quad y \in (0, l), \\ u(0, y) = f(y), \quad u(\infty, y) = 0, & y \in (0, l), \\ u_y(x, 0) = u_y(x, l) + hu(x, l) = 0, & x \in (0, +\infty), \quad h > 0. \end{cases}$$

b) Cheg/m  $u(x, t)$

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in (0, +\infty), \quad y \in (0, l), \\ u(0, y) = f(y), \quad u(\infty, y) = 0, & y \in (0, l), \\ u_y(x, 0) = u_y(x, l) + hu(x, l) = 0, & x \in (0, +\infty), \quad h > 0. \end{cases}$$

Cheg/m  $u(x, t)$  toping.

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in (0, +\infty), \quad y \in (0, l), \\ u(0, y) = y(l-y), \quad u(\infty, y) = 0, & y \in (0, l), \\ u(x, 0) = u(x, l) = 0, & x \in (0, +\infty). \end{cases}$$

### O'quv mashqlar

- misol va masalalarni eching
- teoremani isbotlang
- shu mavzuni nazariyasini o'qib oling

**Tavsiya etiladigan adabiyotlar**  
**Asosiy**

1. *Saloxiddinov M.S. Matematik fizika tenglamolari. T., «O'zbekistan», 2002, 448 b.*
2. *Mixlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki. M, 1968,*
3. *Sobolev S.L. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1966.*
4. *Bisadze L.V. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1976.*
5. *Bisadze A.V., Kalinichenko D.F. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1977.*

**Qo'shimcha**

1. *Tixonov A.P., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1968.*
2. *Koshlyakov B.C., Glipsr E.B., Smirnov M.M. Osnovnyye differentsialnyye uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1962.*
3. *Vladimirov B.C. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1981.*
4. *Polojii G.II. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M. 1964.*
5. *Petrovskiy I.G. Leksii ob uravneniyax s chastnymi proizvodnymi. M., 1961.*
6. *Mixlin S.G. Leksii po lineynym integralnym uravneniyam. M. 1959.*
7. *Smirnov M.M. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki.*
8. *Budak B.M., Samarskiy A.A., Tixonov A.N. Sbornik zadach po matematicheskoy fizike. M. 1972.*
9. *Vladimirov I.S., Mixaylov V.P. i dr. Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoy fiziki. M. 1974.*

**Mavzu bo'yicha yangi tushunchalar uchun savollar.**

1. Laplas tenglamasi.
2. Puasson tenglamasi.
3. Laplas tenglamasining fundamental yechimi.

**Matematik fizika tenglamalari fanidan  
amaliy matematika va informatika  
yoʻnalishi talabalari uchun  
seminar mashgʻulotlari ishlanmasi**

**Samarqand 2010**

## Seminar ishlarini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar

Seminar mashg'ulotlardan maqsad hozirgi zamonaviy komp'yuterlar yordamida ba'zi bir fizik jarayonlarni talabaniing ko'z o'ngida sodir bo'lishini, ushbu masalalarning differentsial tenglamalarini tuzish, ularni integrallash, analitik, sonli echimlarini olish, harakat traektoriyalari grafiklarini ilmiy tahlil qilish ko'zda tutilgan.

Seminar mashg'ulotlariga 10 soat ajratilgan.

№	Mavzu	soat	Adabiyot
6.	Korrekt (to'g'ri) va nokorrekt qo'yilgan masala tushunchasi.	2	[1-5; 8;14; 16;18]
7.	Giperbolik tipdagi tenglamaga olib kelinadigan oddiy masalalar. To'lqin tarqalish usuli.	2	[1-5; 8;14; 16;18]
8.	Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi.	2	[1-5;8;14; 16;18]
9.	Aralash masalalar.	2	[1-5; 8;14; 16;18]
10.	Maxsus funksiyalar.	2	[1-5; 8;14; 16;18]
	<b>Jami</b>	<b>10</b>	

### Dasturning informatsion-uslubiy ta'minoti

EHM yordamida matematik fizika tenglamalarining ba'zi masalalarini yechish, chegaraviy masalalarni sonli integrallashda, chekli ayirmalar usuli, variatsion usullar, Dirixle printsipi. Ritts usullarini o'rganishda dasturlar to'plami (Maple, MathCad, Matlab va h.k.) laridan foydalanish.

### № 1 seminar

#### Korrekt (to'g'ri) va nokorrekt qo'yilgan masala tushunchasi.

##### Maqsad va vazifalar:

Seminarda korrekt va nokorrekt qo'yilgan masalalar qaraladi, ya'ni quyidagilar:

1. **Adamar misoli.** Ushbu

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Laplas tenglamasining  $y > 0$  yarim tekislikda

$$u(x,0) = 0, \quad u_y(x,0) = e^{-\sqrt{k}} \cos kx$$

boshlang'ich shartlarni qanoatlantruvchi regulyar yechimi topilsin.

2. Ushbu  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$  tenglamaning  $u|_{y=0} = \varphi_0(x)$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0} = \varphi_1(x)$

boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

3.  $C^2(t > 0) \cap C^1(t \geq 0)$  sinfdan shunday  $u(x,t)$  funksiya topilsinki, bu funksiya  $t > 0$  da

$$u_{tt} = a^2 \Delta u + f(x,t)$$



tenglamani va quyidagi boshlang'ich shartlani qanoatlantirsin:

$$u|_{t=0} = u_0(x), u_t|_{t=0} = u_1(x),$$

Bu yerda  $f, u_0, u_1$  - berilgan funksiyalar.

Seminar masalaning yechimi boshlang'ich berilganlarga qanchalik bog'liqligini aniqlashga bag'ishlanadi.

**Nazariy qism:**

1. Korrekt va no korrekt masalalar tushunchasi haqida ma'lumot berish.
2. Ixtiyoriy funksiyalar bilan berilgan yechimni yozish.
3. MathCad, MathLab va h.z. dasturlar yordamida masala yechimining grafigini qurish.
4. Korrekt va nokorrekt masalalar ta'riflarini berish. Masala yechimiga boshlang'ich berilganlar qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash

**Amaliy qism:**

1. Yuqoridagi 3 ta masalani qarab chiqish. Laplas tenglamasiga Koshi masalasi qo'yilganda qanday xatolikka yo'l qo'yilganini aniqlash. Xarakteristikalarda qaysi hollardaboshlang'ich shartlar qo'yilishi mumkinligini aniqlash.
2. Koshi masalasini yechish. Bu holda masala korrekt qo'yilganini aniqlash.

**Seminar mashg'ulotiga kirishning zaruriy sharti:**

Nazariy va amaliy topshiriqlarning yozma bajarilganligi.

**Seminar mashg'ulotini bajarishning zaruriy sharti:**

Amaliy topshiriqlarning va qo'shimcha savollarga javobning kompyuterda bajarilishi.

**Seminar mashg'ulotini bajarishning yetarli sharti:**

1. Nazariy, amaliy topshiriqlarning bajarilishini va sonli eksperiment natijalarining hisobotini taqdim etish.
2. Hisobot bo'yicha Seminar ishini himoya qilish.

**Topshiriq:**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>№</b>	$\varphi_0(x)$	$\varphi_1(x)$	$u_0(x)$	$u_1(x)$	$f(x, t)$	$a$
<b>1</b>	$nx$	$x^n$	$\sin nx$	$\cos nx$	$nxt$	$n$

3. Bu yerda  $\varphi_0(x), \varphi_1(x), u_0(x), u_1(x), f(x, t), a$  – parametrlar, mos masalalarni yechishda inobatga olinishi kerak, n-talabning jurnaldagi tartib raqami

**Adabiyotlar:**

[1] Салоҳиддинов М. Математик физика тенгламалари. Т. “Ўзбекистон”. 2002.  
 [2] В.Я.Арсенин «Методы математической физики и специальные функции»  
 [3] И.Г.Арманович, В.И.Левин «Уравнения математической физики»

[4] Б.М.Будак, А.А.Самарский, А.Н.Тихонов «Сборник задач по математической физике»

[5] В.С.Владимиров «Уравнения математической физики»

[6] Н.С.Кошляков, Э.Б.Глинер, М.М.Смирнов «Уравнения в частных производных математической физики»

[7] А.Н.Тихонов, А.А.Самарский «Уравнения математической физики»

[8] Т.Жураев, С.Абдиназаров. Математик физика тенгламалари. Т.2003. 332б.

[9] Merajova Sh. Matematik fizika tenglamalari fanidan mashqlar to`plami. Buxoro 2007

**Internet resurslari:** [WWW.INTUIT.RU](http://WWW.INTUIT.RU); <http://www.mcmee.ru>;

<http://lib.mexmat.ru>; <http://www.exponenta.ru>.; [www.lib.homelinux.org/math/](http://www.lib.homelinux.org/math/);

[www.eknigu.com/lib/Mathematics/](http://www.eknigu.com/lib/Mathematics/); [www.eknigu.com/info/M\\_Mathematics/MC](http://www.eknigu.com/info/M_Mathematics/MC);

[www.allmath.ru/highermath/](http://www.allmath.ru/highermath/)

## № 2 seminar

### **Giperbolik tipdagi tenglamaga olib kelinadigan oddiy masalalar. To`lqin tarqalish usuli.**

#### ***Maqsad va vazifalar:***

Ushbu Seminar mashgʻulotida giperbolik tipdagi tenglamaga olib keladigan oddiy masalalar qaraladi. To`lqin tarqalish tenglamalariga qo`yilgan Koshi masalasi qaraladi:

$C^2(t > 0) \cap C^1(t \geq 0)$  sinfdan shunday  $u(x, t)$  funksiya topilsinki, bu funksiya  $t > 0$  da

$$u_{tt} = a^2 \Delta u + f(x, t)$$

tenglamani va quyidagi boshlang`ich shartlani qanoatlantirsin:

$$u|_{t=0} = u_0(x), \quad u_t|_{t=0} = u_1(x),$$

Bu yerda  $f, u_0, u_1$  - berilgan funksiyalar.

Bu masalaga **Koshining klassik masalasi** deyiladi.

Agar quyidagi shartlar bajarilsa,

$$f \in C^1(t \geq 0), \quad u_0 \in C^2(R^1), \quad u_1 \in C^1(R^1), \quad n=1;$$

$$f \in C^2(t \geq 0), \quad u_0 \in C^3(R^n), \quad u_1 \in C^2(R^n), \quad n=2,3;$$

u vaqtda Koshining klassik masalasining yechimi mavjud, yagona va quyidagi formulalar orqali topiladi:

Dalamber formulasi bilan, agar  $n=1$  bo`lsa:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [u_0(x + at) + u_0(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} u_1(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

(1)

Puasson formulasi bilan, agar  $n=2$  bo`lsa:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi a} \int_0^t \int_{|\xi-x| < a(t-\tau)} \frac{f(\xi, \tau) d\xi d\tau}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |\xi-x|^2}} + \frac{1}{2\pi a} \int_{|\xi-x| < at} \frac{u_1(\xi) d\xi}{\sqrt{a^2 t^2 - |\xi-x|^2}} + \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \int_{|\xi-x| < at} \frac{u_0(\xi) d\xi}{\sqrt{a^2 t^2 - |\xi-x|^2}}. \quad (2)$$

Kirxgof formulasi bilan, agar  $n=3$  bo'lsa:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi a^2} \int_{|\xi-x| < at} \frac{1}{|\xi-x|} f\left(\xi, t - \frac{|\xi-x|}{a}\right) d\xi + \frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{|\xi-x|=at} u_1(\xi) dS + \frac{1}{4\pi a^2} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{t} \int_{|\xi-x|=at} u_0(\xi) dS \right] \quad (3)$$

$n \geq 2$  bo'lganda ushbu formulalarning o'rniga quyidagi formuladan ham foydalansa bo'ladi:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[ \frac{t^{2k}}{(2k)!} a^{2k} \Delta^k u_0(x_1, \dots, x_n) + \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} a^{2k} \Delta^k u_1(x_1, \dots, x_n) + \frac{a^{2k}}{(2k+1)!} \int_0^t (t-\tau)^{2k+1} \Delta^k f(x_1, \dots, x_n, \tau) d\tau \right], \quad (4)$$

bu yerda  $\Delta$  - Laplas operatori bo'lib,  $k = 0, 1, 2, \dots$  marta mos ravishda  $u_0, u_1, f$  - funksiyalarga qo'llanilgan.

Laboratoriya ishi Koshi masalalarini yechib, to'liqin tarqalishini aniqlashga bag'ishlanadi.

**Nazariy qism:**

1. To'liqin tenglamasi uchun Koshi masalasi haqida ma'lumot berish.
2. Berilgan masalani yechish.
3. MathCad, MathLab va h.z. dasturlar yordamida masala yechimining grafigini qurish.

**Amaliy qism:**

1. Koshi masalasini yechish.
2. Grafigini chizish

**Seminar mashg'ulotiga kirishning zaruriy sharti:**

Nazariy va amaliy topshiriqlarning yozma bajarilganligi.

**Seminar mashg'ulotini bajarishning zaruriy sharti:**

Amaliy topshiriqlarning va qo'shimcha savollarga javobning komputerda bajarilishi.

**Seminar mashg'ulotini bajarishning yetarli sharti:**

4. Nazariy, amaliy topshiriqlarning bajarilishini va sonli eksperiment natijalarining hisobotini taqdim etish.
5. Hisobot bo'yicha Seminar mashg'ulotini himoya qilish.

**Topshiriq:**

Quyidagi Koshi masalasi berilgan:

$$u_{tt} = \Delta u + x^3 - 3xy^2; \quad u|_{t=0} = e^{nx} \cos ny; \quad u_t|_{t=0} = e^{ny} \sin nx$$

n-talabani jurnalidagi tartib raqami

### **Adabiyotlar:**

- [1] Салоҳиддинов М. Математик физика тенгламалари. Т. “Ўзбекистон”. 2002.  
[2] В.Я. Арсенин «Методы математической физики и специальные функции»  
[3] И.Г. Арманович, В.И. Левин «Уравнения математической физики»  
[4] Б.М. Будақ, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов «Сборник задач по математической физике»  
[5] В.С. Владимиров «Уравнения математической физики»  
[6] Н.С. Кошляков, Э.Б. Глинер, М.М. Смирнов «Уравнения в частных производных математической физики»  
[7] А.Н. Тихонов, А.А. Самарский «Уравнения математической физики»  
[8] Т. Жураев, С. Абдиназаров. Математик физика тенгламалари. Т. 2003. 332б.

[9] Merajova Sh. Matematik fizika tenglamalari fanidan mashqlar to`plami. Buxoro 2007

**Internet resurslari:** [WWW.INTUIT.RU](http://WWW.INTUIT.RU); <http://www.mcmee.ru>;

<http://lib.mexmat.ru>; <http://www.exponenta.ru>; [www.lib.homelinux.org/math/](http://www.lib.homelinux.org/math/);

[www.eknigu.com/lib/Mathematics/](http://www.eknigu.com/lib/Mathematics/); [www.eknigu.com/info/M\\_Mathematics/MC](http://www.eknigu.com/info/M_Mathematics/MC);

[www.allmath.ru/highermath/](http://www.allmath.ru/highermath/)

### **№ 3 seminar**

#### **Issiqlik o`tkazuvchanlik tenglamasi.**

##### **Maqsad va vazifalar:**

Ushbu Seminar mashg`ulotida issiqlik o`tkazuvchanlik tenglamasi uchun Koshi masalasi qaraladi,

$C^2(t > 0) \cap C(t \geq 0)$  sinfdan shunday  $u(x, t)$  funksiya topilsinki, bu funksiya  $x \in R^n$ ,  $t > 0$  da

$$u_t = a^2 \Delta u + f(x, t)$$

tenglamani va quyidagi boshlang`ich shartni qanoatlantirsin:

$$u|_{t=0} = u_0(x),$$

bu yerda  $f, u_0$  - berilgan funksiyalar.

Bu masalaga issiqlik o`tkazuvchanlik tenglamasi uchun **Koshining klassik masalasi** deyiladi.

Agar  $f \in C^2(t \geq 0)$  funksiya va uning barcha ikkinchi tartibigacha hosilalari har bir  $0 \leq t \leq T$  sohada chegaralangan,  $u_0 \in C(R^n)$  funksiya chegaralangan bo`lsa, u vaqtda Koshining klassik masalasining yechimi mavjud, yagona va quyidagi Puasson formulasi orqali topiladi:

$$u(x, t) = \frac{1}{(2a\sqrt{\pi t})^n} \int_{R^n} u_0(\xi) e^{-\frac{|x-\xi|^2}{4a^2 t}} d\xi + \int_0^t \int_{R^n} \frac{f(\xi, \tau)}{[2a\sqrt{\pi(t-\tau)}]^n} e^{-\frac{|x-\xi|^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi d\tau.$$

(1)

Quyidagi formuladan ham foydalansa bo‘ladi:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[ \frac{t^k}{(k)!} \Delta^k u_0(x_1, \dots, x_n) + \frac{1}{(2k+1)!} \int_0^t (t-\tau)^{2k+1} \Delta^k f(x_1, \dots, x_n, \tau) d\tau \right]. \quad (2)$$

Laboratoriya ishi Koshi masalalarini yechib, issiqlik tarqalishini o‘rganishga bag‘ishlanadi.

**Nazariy qism:**

1. Issiqlik o‘tkazuvchanlik tenglamasi uchun Koshi masalasi haqida ma’lumot berish.
2. Berilgan masalani yechish.
3. MathCad, MathLab va h.z. dasturlar yordamida masala yechimining grafigini qurish.

**Amaliy qism:**

1. Koshi masalasini yechish.
2. Grafigini chizish

**Seminar mashg‘ulotiga kirishning zaruriy sharti:**

Nazariy va amaliy topshiriqlarning yozma bajarilganligi.

**Seminar mashg‘ulotini bajarishning zaruriy sharti:**

Amaliy topshiriqlarning va qo‘shimcha savollarga javobning komputerda bajarilishi.

**Seminar mashg‘ulotini bajarishning yetarli sharti:**

6. Nazariy, amaliy topshiriqlarning bajarilishini va sonli eksperiment natijalarining hisobotini taqdim etish.
7. Hisobot bo‘yicha Seminar mashg‘ulotini himoya qilish.

**Topshiriq:**

Quyidagi Koshi masalasi berilgan:

$$u_t = \Delta u, \quad u|_{t=0} = u_0(x), \quad x \in R^n$$

bu yerda  $u_0$  quyidagicha aniqlanadi:

$$u_0 = \cos \sum_{k=1}^n x_k$$

n-talabani jurnalidagi tartib raqami

**Adabiyotlar:**

- [1] Салоҳиддинов М. Математик физика тенгламалари. Т. “Ўзбекистон”. 2002.
- [2] В.Я. Арсенин «Методы математической физики и специальные функции»
- [3] И.Г. Арманович, В.И. Левин «Уравнения математической физики»
- [4] Б.М. Будақ, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов «Сборник задач по математической физике»
- [5] В.С. Владимиров «Уравнения математической физики»
- [6] Н.С. Кошляков, Э.Б. Глинер, М.М. Смирнов «Уравнения в частных производных математической физики»

- [7] А.Н.Тихонов, А.А.Самарский «Уравнения математической физики»  
[8] Т.Жураев, С.Абдиназаров. Математик физика тенгламалари. Т.2003. 332б.

[9] Merajova Sh. Matematik fizika tenglamalari fanidan mashqlar to`plami. Buxoro 2007

**Internet resurslari:** [WWW.INTUIT.RU](http://WWW.INTUIT.RU); <http://www.mcmee.ru>;

<http://lib.mexmat.ru>; <http://www.exponenta.ru>.; [www.lib.homelinux.org/math/](http://www.lib.homelinux.org/math/);

[www.eknigu.com/lib/Mathematics/](http://www.eknigu.com/lib/Mathematics/); [www.eknigu.com/info/M\\_Mathematics/MC](http://www.eknigu.com/info/M_Mathematics/MC);

[www.allmath.ru/highermath/](http://www.allmath.ru/highermath/)

## *№ 4 seminar*

### **Aralash masalalar.**

#### ***Maqsad va vazifalar:***

Ushbu Seminar mashg'ulotida giperbolik va parabolik tipdagi tenglamalar uchun aralash masalalar qaraladi:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} - bu + f(x, t)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

$$\alpha u(0, t) - \beta u_x(0, t) = \mu(t), \quad \alpha > 0, \beta > 0, \alpha + \beta \geq 0$$

$$\gamma u(l, t) + \delta u_x(l, t) = \nu(t), \quad \gamma > 0, \delta > 0, \gamma + \delta \geq 0$$

$$u_t = a^2 u_{xx} - bu + f(x, t)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x)$$

$$\alpha u(0, t) - \beta u_x(0, t) = \mu(t), \quad \alpha > 0, \beta > 0, \alpha + \beta \geq 0$$

$$\gamma u(l, t) + \delta u_x(l, t) = \nu(t), \quad \gamma > 0, \delta > 0, \gamma + \delta \geq 0$$

Laboratotiya ishi aralash masalalarni yechishga bag'ishlanadi.

#### ***Nazariy qism:***

1. Giperbolik va parabolik tipdagi tenglamalar uchun aralash masalalarning qo'yilishi va ularning yechish usullari haqida ma'lumot berish.
2. Berilgan masalalarni yechish.
3. MathCad, MathLab va h.z. dasturlar yordamida masala yechimining grafigini qurish.

#### ***Amaliy qism:***

1. Aralash masalalarni yechish.
2. Grafigini chizish

#### ***Seminar mashg'ulotiga kirishning zaruriy sharti:***

Nazariy va amaliy topshiriqlarning yozma bajarilganligi.

#### ***Seminar mashg'ulotini bajarishning zaruriy sharti:***

Amaliy topshiriqlarning va qo'shimcha savollarga javobning komputerdagi bajarilishi.

#### ***Seminar mashg'ulotini bajarishning yetarli sharti:***

1. Nazariy, amaliy topshiriqlarning bajarilishini va sonli eksperiment natijalarining hisobotini taqdim etish.
2. Hisobot bo'yicha Seminar mashg'ulotini himoya qilish.

#### ***Topshiriq:***

1.  $u_{tt} - u_{xx} + 2u_t = 4x + 8e^t \cos nx$  ( $0 < x < \pi/2$ );  $u_x|_{x=0} = nt$ ,  $u|_{x=\pi/2} = \pi \cdot t$ ;  $u|_{t=0} = \cos x$ ,

$$u_t|_{t=0} = 2x.$$

2.  $u_t = u_{xx} + 6u + x^2(1-6t) - 2(t+3x) + \sin nx$ ,  $0 < x < \pi$   $u_x|_{x=0} = n$ ,  $u_x|_{x=\pi} = 2\pi t + 1$ ,  $u|_{t=0} = x$ .  
n-talabani jurnalidagi tartib raqami

### ***Adabiyotlar:***

- [1] Салоҳиддинов М. Математик физика тенгламалари. Т. “Ўзбекистон”. 2002.  
[2] В.Я.Арсенин «Методы математической физики и специальные функции»  
[3] И.Г.Арманович, В.И.Левин «Уравнения математической физики»  
[4] Б.М.Будак, А.А.Самарский, А.Н.Тихонов «Сборник задач по математической физике»  
[5] В.С.Владимиров «Уравнения математической физики»  
[6] Н.С.Кошляков, Э.Б.Глинер, М.М.Смирнов «Уравнения в частных производных математической физики»  
[7] А.Н.Тихонов, А.А.Самарский «Уравнения математической физики»  
[8] Т.Жураев, С.Абдиназаров. Математик физика тенгламалари. Т.2003. 332б.

[9] Merajova Sh. Matematik fizika tenglamalari fanidan mashqlar to`plami. Buxoro 2007

**Internet resurslari:** [WWW.INTUIT.RU](http://WWW.INTUIT.RU); <http://www.mcmee.ru>;

<http://lib.mexmat.ru>; <http://www.exponenta.ru>.; [www.lib.homelinux.org/math/](http://www.lib.homelinux.org/math/);

[www.eknigu.com/lib/Mathematics/](http://www.eknigu.com/lib/Mathematics/); [www.eknigu.com/info/M\\_Mathematics/MC](http://www.eknigu.com/info/M_Mathematics/MC);

[www.allmath.ru/highermath/](http://www.allmath.ru/highermath/)

### ***№ 5 seminar***

#### **Maxsus funksiyalar.**

##### ***Maqsad va vazifalar:***

Ushbu Seminar mashg'ulotida Eyler integrallari, gipergeometrik funksiya, Bessel funksiyalari haqida ma'lumot berib, gipergeometrik (Gauss) va Bessel tenglamalarini yechishdan iborat

##### ***Nazariy qism:***

1. Eyler integrallari, gipergeometrik funksiya, Bessel funksiyalari haqida ma'lumot berish.
2. Berilgan masalalarni yechish.
3. MathCad, MathLab va h.z. dasturlar yordamida masala yechimining grafigini qurish.

##### ***Amaliy qism:***

1. Gipergeometrik (Gauss) va Bessel tenglamalarini yechish
2. Grafigini chizish



**Seminar mashg'ulotiga kirishning zaruriy sharti:**

Nazariy va amaliy topshiriqlarning yozma bajarilganligi.

**Seminar mashg'ulotini bajarishning zaruriy sharti:**

Amaliy topshiriqlarning va qo'shimcha savollarga javobning komputerdagi bajarilishi.

**Seminar mashg'ulotini bajarishning yetarli sharti:**

1. Nazariy, amaliy topshiriqlarning bajarilishini va sonli eksperiment natijalarining hisobotini taqdim etish.
2. Hisobot bo'yicha Seminar mashg'ulotini himoya qilish.

**Topshiriq:**

Quyidagi tenglamalar o'rganilsin:

1.  $x(1-x)y'' + [c - (a+b+1)x]y' - aby = 0$

2.  $y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{v^2}{x^2}\right)y = 0$

**Adabiyotlar:**

[1] Салоҳиддинов М. Математик физика тенгламалари. Т. "Ўзбекистон". 2002.

[2] В.Я.Арсенин «Методы математической физики и специальные функции»

[3] И.Г.Арманович, В.И.Левин «Уравнения математической физики»

[4] Б.М.Будак, А.А.Самарский, А.Н.Тихонов «Сборник задач по математической физике»

[5] В.С.Владимиров «Уравнения математической физики»

[6] Н.С.Кошляков, Э.Б.Глинер, М.М.Смирнов «Уравнения в частных производных математической физики»

[7] А.Н.Тихонов, А.А.Самарский «Уравнения математической физики»

[8] Т.Жураев, С.Абдиназаров. Математик физика тенгламалари. Т.2003. 332б.

[9] Merajova Sh. Matematik fizika tenglamalari fanidan mashqlar to'plami. Buxoro 2007

**Internet resurslari:** [WWW.INTUIT.RU](http://WWW.INTUIT.RU); <http://www.mcme.ru>;

<http://lib.mexmat.ru>; <http://www.exponenta.ru>.; [www.lib.homelinux.org/math/](http://www.lib.homelinux.org/math/);

[www.eknigu.com/lib/Mathematics/](http://www.eknigu.com/lib/Mathematics/); [www.eknigu.com/info/M\\_Mathematics/MC](http://www.eknigu.com/info/M_Mathematics/MC);

[www.allmath.ru/highermath/](http://www.allmath.ru/highermath/)

**Фойдаланиладиган асосий дарсликлар ва  
ўқув қўлланмалар рўйхати**

**Асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар**

- 1.Тихонов А.Н.,Самарский А.А. Уравнения математической физики. М. “Наука”.1972.
- 2.Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М. “Наука”.1988.
- 3.Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными. М. “Наука”.1961.
- 4.Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. М. “Наука”.1982.
- 5.Салоҳиддинов М. Математик физика тенгламалари.Т. “Ўзбекистон”.2002.

### **Қўшимча адабиётлар**

- 6.Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической физики. М. “Наука”.1977.
- 7.Владимиров В.С., Михайлов В.П., Вашарин А.А., Каримова Х.Х., Сидоров Ю.В., Шабунин М.И. Сборник задач по уравнениям математической физики. М. “Наука”.1982.
- 8.Бицадзе А.В. Некоторые классы уравнений в частных производных. М. “Наука”.1981.
- 9.Владимиров В.С. Обобщенные функции в математической физике. М. “Наука”.1979.
- 10.Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа. М.1985.
- 11.Смирнов М.М. Задачи по уравнениям математической физики. М. “Наука”.1975.
- 12.Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. М. “Наука”.1980.
- 13.Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений. М. Из-во МГУ.1984.
- 14.Тешабоева Н.Х. Математик физика усуллари.Т.1966.
- 15.Годунов С.К. Уравнения математической физики. М. “Наука”.1971.
16. Рид М., Саймон Б. Методы современной математической физики, Т. 1-4. 1977- 1982, <http://www.mcme.ru>, <http://lib.mexmat.ru>
17. Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. М. 1970. <http://www.mcme.ru>, <http://lib.mexmat.ru>
18. Т.Жураев, С.Абдиназаров. Математик физика тенгламалари. Т.2003. 332b.
19. Merajova SH. Matematik fizika tenglamalari fanidan mashqlar to`plami. Vuxoro 2007

**Internet resurslari:** [WWW.INTUIT.RU](http://WWW.INTUIT.RU); <http://www.mcme.ru>;

<http://lib.mexmat.ru>; <http://www.exponenta.ru>.; [www.lib.homelinux.org/math/](http://www.lib.homelinux.org/math/);

[www.eknigu.com/lib/Mathematics/](http://www.eknigu.com/lib/Mathematics/); [www.eknigu.com/info/M\\_Mathematics/MC](http://www.eknigu.com/info/M_Mathematics/MC);

[www.allmath.ru/highermath/](http://www.allmath.ru/highermath/)

O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi  
Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti

Mexanika – matematika fakulteti  
Amaliy matematika va informatika yo'nalishi  
uchinchi kurs talabalari uchun  
“**Matematik fizika tenglamalari**” fanidan

## **MUSTAQIL ISH**

Differensial tenglamalar kafedrasining 2010  
yil 29 avgustdagi bo'lib o'tgan yig'ilishi №1  
qarori bilan tasdiqlangan

**Samarqand-2010**

## 2-chi tartibli chiziqli tenglamalar. 2-chi tartibli xususiy xosilali differensial tenglamalar. klassifikasiya (giperbolik tip)

1. Xususiy hosilali tenglamaning umumiy yechimi haqida tushincha.

$n$ -chi tartibli oddiy differensial tenglamani qarab chiqamiz  $f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ . Uning umumiy integrali  $n$ -ta ixtiyoriy o'zgarmas funksialar oilasini tashkil etadi

$$F(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0. \text{ Ixtiyoriy xususiy yechimlarni } - C_1, C_2, \dots, C_n$$

parametrlarini aniq qiymati berilgan holda hosil qilish mumkin.

1.1 Misol Faraz qilaylik  $u_x = 0$  tenglama berilgan bo'lsin. Bu tenglama shuni anglatadiki,  $u(x, y)$ -funksiya  $x$ -dan bog'liq emas. Ya'ni echimlar

$$u(x, y) = y^2 + 2y, \quad u(x, y) = e^y + \sin y \text{ funksialardan iborat. Umumiy yechim:}$$

$$u(x, y) = C(y), \text{ bo'lsa bu yerda } C, y\text{-o'zgaruvchiga bog'liq bo'lgan funksiya.}$$

1.2 Misol  $u_x = f(x, y)$  tenglamani qaraymiz. Bu tenglama yechimini topish uchun, uni

$$x\text{-bo'yicha integrallaymiz } \int u_x dx = \int f(x, y) dx + C. \quad (1.2)$$

$x$ -bo'yicha integrallashda, biz  $y$ -ni o'zgarmas deb olamiz va shuning uchun (1.2) dan  $C$ -ixtiyoriy o'zgarmas  $y$ -dan bog'liq bo'lishi mumkin. Xuddi shunday umumiy yechim quyidagicha.

$$u(x, y) = \int f(x, y) dx + C(y).$$

1.3 Misol faraz qilaylik  $u_{xy} = 0$  tenglama berilgan 1.1 Misoldan shu narsa kelib chiqadiki  $u_y = C(y)$ . Bu tenglama (1.2) misol kabi quyidagiga ega bo'lamiz.

$$u(x, y) = \int C(y) dy + C_1(x).$$

$$C_2(y) = \int C(y) dy \quad \text{deb olamiz. U holda umumiy yechim quyidagicha}$$

$$u(x, y) = C_1(x) + C_2(y).$$

Shuni takidlaymizki, ixtiyoriy o'zgarmasga bog'liq bo'lgan oddiy differensial tenglamalarning umumiy yechimidan farqli xususiy hosilali tenglamalarning umumiy yechimi ixtiyoriy funksiyadan bog'liq bo'ladi

Xususiy hosilali differensial tenglamalarning umumiy yechimida ixtiyoriy funksiya bor, ularning soni tenglamaning tartibiga teng

$$\text{Faraz qilaylik } \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0. \quad (1.1)$$

tenglama berilgan bo'lsin.

Buning uchun tenglamani  $\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$ . ko'rinishga yozamiz. X-bo'yicha hosila nolga

tengligidan uni y-ixtiyoriy funksiyaga bog'liq diyish mumkin  $\frac{\partial u}{\partial y} = f(y)$ . Shuning uchun

$u(x, y) = \int f(y) dy$ . Lekin ixtiyoriy  $f(y)$ , funksiyani integrallab, ixtiyoriy yangi  $F(y)$ , funksiyani,

plyus ixtiyoriy  $\phi(x)$ , -ni hosil qilamiz. Xuddi shunday (1.1) tenglamaning umumiy integrali

$$u(x, y) = \phi(x) + F(y)$$

Ikkita ixtiyoriy funksiyaga ega. Endi  $u(x, y)$  -ng umumiy yechimidan xususiy yechimini topish uchun  $\phi(x)$  va  $F(y)$  konkret ko'rinishini topish kerak. Biroq shu yerda oddiy differensial tenglamalar va xususiy hosilali differensial tenglamalarning umumiy yechimini topish farqi shundan iboratki xususiy hosilali differensial tenglamalarning umumiy yechimini umumiylikni tufayli konkret yechimni topish qiyinlashadi.

1. Xususiy hosilali differensial tenglamaning umumiy yechimini toping:

$$\frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} = 0 \text{ bu yerda } u(x, y) \text{ -ikki o'zgaruvchili noma'lum funksiya}$$

$$\text{Echish: Tenglamani } \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0 \text{ ko'rinishga yozamiz. Bu yerda } \frac{\partial u}{\partial x},$$

x dan bog'liq emas, ya'ni undan x bo'yicha xususiy hosila nolga teng

Shuning uchun,  $\frac{\partial u}{\partial x} = C_1(y)$ , bu yerda  $C_1(y)$  -y-ga bog'liq ixtiyoriy funksiya

$$\frac{\partial u}{\partial x} = C_1(y) \text{ tenglamada } \frac{\partial u}{\partial x} \text{ -xususiy hosila x bo'yicha olinib, y-o'zgarmas sanaladi. Chap}$$

va O'ng tomonni integrallab, qo'yilgan masalaning yechimini qo'lga kiritamiz.

$$u(x, y) = \int C_1(y) dx = xC_1(y) + C_2(y), \text{ Bu yerda } C_1(y) \text{ va } C_2(y) \text{ -ga}$$

bog'liq ixtiyoriy funksiya. Agar topilgan  $u(x, y)$  funksiyani ikki marta x-bo'yicha

differensiallasak, u xolda  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ , bo'ladi, demak topilgan funksiya tenglamani umumiy

yechimi ekan.

2. Tenglamani umumiy yechimini toping  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 - y$ .

Echish: Tenglamani  $\frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = x^2 - y$  ko'rinishga yozib uning chap va o'ng

tomonlarini y-bo'yicha integrallasak, (x-o'zgarmas sanaladi), u holda;

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \int (x^2 - y) dy = x^2 y - \frac{y^2}{2} + C_1(x).$$

Endi x-bo'yicha integrallaymiz (y-o'zgarmas sanaladi), ya'ni

$$u(x, y) = \int \left( x^2 y - \frac{y^2}{2} + C_1(x) \right) dx = \frac{x^3 y}{3} - \frac{y^2 x}{2} + C_1^*(x) + C_2(y). \text{ Bu yerda}$$

$C_1^*(x) = \int C_1(x) dx$ . Xuddi shunday, qaralayotgan tenglamani umumiy yechimi quyidagicha:

$$u(x, y) = \int \left( x^2 y - \frac{y^2}{2} + C_1(x) \right) dx = \frac{x^3 y}{3} - \frac{y^2 x}{2} + C_1^*(x) + C_2(y).$$

Bu yerda  $C_1^*(x) = \int C_1(x) dx$ . Ixtiyoriy funksiyalar bo'lib,  $C_1^*(x)$  - defferensiallanuvchi.

3. Xususiy hosilali defferensial tenglamani yeching:  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 2 \frac{\partial u}{\partial x}$ .

Echish: Tenglamani  $\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial y} - 2u \right) = 0$  ko'rinishda yozib chap va o'ng

tomonlarini x-bo'yicha integrallaymiz. U holda  $\frac{\partial u}{\partial y} - 2u = C_1(y)$ . Bu tenglamada  $\frac{\partial u}{\partial y}$  ni

y-bo'yicha oddiy hosila kabi qarab, x-ni parametr deb sanaymiz. U holda tenglama

$$\frac{du}{dy} - 2u = C_1(y). \text{ ko'rinishda bo'ladi. Biz birjinsli bo'lmagan birinchi tartibli chiziqli}$$

tenglamaga ega bo'ldik. Uni yechsak:

$$u(x, y) = e^{\int 2 dy} \left( C_2(x) + \int C_1(y) e^{-\int 2 dy} dy \right) = C_2(x) e^{2y} + C_1^*(y).$$

Shunday qilib,  $u(x, y) = C_2(x) e^{2y} + C_1^*(y)$ , bu yerda  $C_2(x)$  va  $C_1^*(y)$  - ixtiyoriy funksiyalar.

2. Xuddi hosilali ikkinchi tartibli tenglamalar klassifikatsiyasi.

O'zgaruvchilarni almashtirish yordamida

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (2.1)$$

Tenglamani soddaroq ko'rinishga keltiramiz  $c \neq 0$ , deb yangi

$\xi = x + \lambda_1 y$ ,  $\eta = x + \lambda_2 y$ , o'zgaruvchilarni kiritamiz, bu yerda  $\lambda_1$  va  $\lambda_2$  hozircha o'zgarmaslar bo'lib turli xil (aks holda  $\xi$  va  $\eta$  bir biriga erkli funksiyaga bo'lmaydi) son shunday qilib,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \quad \text{va}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \lambda_1 \frac{\partial u}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial u}{\partial \eta},$$

U holda quyidagi munosabat o'rinni.  $\frac{\partial}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}$ ,  $\frac{\partial}{\partial y} \rightarrow \lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta}$ .

Shuning uchun

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \left( \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \left( \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \left( \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \left( \lambda_1 \frac{\partial u}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \lambda_1 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (\lambda_1 + \lambda_2) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \lambda_2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left( \lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \left( \lambda_1 \frac{\partial u}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \lambda_1^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2\lambda_1 \lambda_2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \lambda_2^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.$$

Bu ikkinchi tartibli hosilalarni a, 2b va c- ga ko'paytirib qo'shamiz. U holda (2.1)

tenglamani chap tomoni quyidagicha bo'ladi.

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + C \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \quad \text{Bu yerda}$$

$$A = a + 2b\lambda_1 + c\lambda_1^2, \quad B = a + b(\lambda_1 + \lambda_2) + c\lambda_1\lambda_2, \quad C = a + 2b\lambda_2 + c\lambda_2^2.$$

Endi yordamchi kvadrat tenglamani qaraymiz.

$$c\lambda^2 + 2b\lambda + a = 0. \quad \text{Uning ildizlari } \lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{c}.$$

$D = b^2 - ac$  diskriminantning qiymatiga qarab uch hol bo'ladi:

Agar qaralayotgan sohada  $b^2 - ac > 0$ , bo'lsa u holda tenglama gepirbolik tipli, agar  $b^2 - ac = 0$ , bo'lsa u holda (2.1) tenglama parabolic tipli, agar  $b^2 - ac < 0$ , bo'lsa, tenglama elliptic tipli bo'ladi.

U holda gepirbolik tipli tenglamaning kanonik ko'rinishi quyidagicha

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f(x, y, z, z'_x, z'_y), \text{ (yoki } \frac{\partial^2 z}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial \beta^2} = \Phi\left(\alpha, \beta, z, \frac{\partial z}{\partial \alpha}, \frac{\partial z}{\partial \beta}\right),)$$

Bu yerda  $\alpha = \frac{x-y}{2}, \beta = \frac{x+y}{2}$ );

Parabolik tipli uchun:  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f(x, y, z, z'_x, z'_y)$ ;

Elliptik tipli uchun:  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f(x, y, z, z'_x, z'_y)$

Umumiy holda yangi  $\xi = \xi(x, y), \eta = \eta(x, y)$ .-o'zgaruvchilar kiritiladi,  $\xi(x, y)$  va

$\eta(x, y)$ -ikki marta uzliksiz defferensialanuvchi funksiyalar va  $\begin{vmatrix} \xi'_x & \xi'_y \\ \eta'_x & \eta'_y \end{vmatrix} \neq 0$ .

$a dy^2 - 2b dx dy + c dx^2 = 0$  defferensiyal tenglama

$$a \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}).$$

tenglamasi diyiladi.

### Misollar

1.  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \sin x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \cos^2 x \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \cos x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ . tenglamani qaraymiz. Bu

tenglamani gepirbolik tipli, Yani  $b^2 - ac = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$ .Xarakteristik



tenglamani tuzamiz  $dy^2 + 2 \sin x dx dy - \cos^2 x dx^2 = 0$  yoki tenglamaning chap qismida  $dx dy - dx dy + \sin x dx^2 - \sin x dx^2$  yozib va uni guruxlasak, u holda  $(dy + (1 + \sin x) dx)(dy - (1 - \sin x) dx) = 0$ . Tenglamani integrallasak  $dy + (1 + \sin x) dx = 0$  va  $dy - (1 - \sin x) dx = 0$  u holda

$x + y - \cos x = C_1$ ,  $x - y + \cos x = C_2$ . Yangi o'zgaruvchilarni

$\xi = x + y - \cos x$ ,  $\eta = x - y + \cos x$ . formulalar buyicha kiritamiz. U holda yangi

o'zgaruvchili tenglama  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ . ko'rinishda bo'ladi.  $\xi = \alpha + \beta$ ,  $\eta = \alpha - \beta$ ,

deb, kanonik ko'rinishdagi tenglamaga kelimiz  $\frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \beta^2} = 0$ .

Javob: Berilgan gepirbolik tipli tenglamaning kanonik ko'rinishi:  $\frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \beta^2} = 0$ .

2. Tenglamani kanonik ko'rinishga keltiring

$$u_{xx} + 3u_{xy} + 2u_{yy} = 0.$$

2) Karakteristik tenglamani yozamiz

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0.$$

Bu yerda  $\lambda_1 = 1$ ,  $\lambda_2 = 2$  Tenglama gepirbolik tipli, shuning uchun  $\xi = y - x$ ,  $\eta = y - 2x$

yoki  $\xi = y - \frac{3}{2}x$ ,  $\eta = x$ . almashtirish olamiz. O'zgaruvchilarni almashtirishdan keyin

tenglama  $u_{\xi\eta} = 0$  yoki  $u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} = 0$ . ko'rinishni oladi. Shuni ta'kidlaymizki  $u_{\xi\eta} = 0$

tenglamani yechimi 1.3 misolda qaralgan edi. Xuddi shunday, biz (r) tenglamaning umumiy yechimini quyidagicha yozamiz.

$$u = \varphi(\xi) + \psi(\eta) = \varphi(y - x) + \psi(y - 2x).$$

## 2-chi tartibli xususiy hosilali d.t. klassifikasiya (parabolic tip)

2-chi tartibli hosilali differensial tenglamalar klassifikasiya (parabolic tip)

Faraz qilaylik  $U=U(x,y)$ -ikkita  $x$  va  $y$  o'zgaruvchili noma'lum funktsiya bo'lsin.

U holda 2-chi tartibli tenglama deb quyidagicha aytamiz.

$$a(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} + c(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + f(x,y,u,\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}) = 0$$

Tenglamani tepa  $\Delta = b^2 - ac$  ga qarab aniqlanadi.

Agar  $\Delta > 0$  bo'lsa, tenglama giperbolik tipli

Agar  $\Delta = 0$  bo'lsa, tenglama parabolic tipli

Agar  $\Delta < 0$  bo'lsa, elliptik tipli

(4)ni kanonik ko'rinishga keltirish uchun uning xarakteristik tenglamasini yozish kerak.

$$\begin{cases} ady - (b + \sqrt{b^2 - ac})dx = 0, \\ ady - (b - \sqrt{b^2 - ac})dx = 0. \end{cases} \quad (5)$$

So'ngra uning umumiy yechimini topish kerak

$b^2 - ac > 0$  Bo'lganda, tenglama giperbolik tipli (5)-tenglama sistemasi umumiy integrallarini  $\varphi(x,y) = c_1; \psi(x,y) = c_2,$

Bilan ifodalab, yangi  $\xi, \eta$  o'zgaruvchilarni  $\xi = \varphi(x,y); \eta = \psi(x,y).$

formula bilan kiritamiz. U holda (4) tenglama  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = F(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta})$  kurinishini

oladi. Bu giperbolik tipdagi tenglamaning kanonik ko'rinishidir.

$b^2 - ac = 0$  Bo'lganda, tenglama parabolic tipli. (5) tenglamalar sistemasi umumiy integrallari  $\varphi(x,y) = \tilde{c}$  bilan ustma-ust tushadi. Yani  $\xi, \eta$  o'zgaruvchilarni

$\xi = \varphi(x,y); \eta = \eta(x,y),$  formula bilan kiritamiz, bu yerda  $\eta(x,y)$  - funktsiya quyidagi

shartni qanoatlantiradi  $\begin{vmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{vmatrix} \neq 0,$  masalan  $\eta = x.$

U holda (4) tenglama  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + F(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}) = 0$  ko'rinishni oladi

bu parabolic tipdagi tenglamaning kanonik ko'rinishidir.

$b^2 - ac < 0$ . Bo'lganda, tenglama elliptic tipli (5) tenglamalar sestimasining umumiy integrallari quyidagicha  $\varphi(x, y) \pm i\psi(x, y) = \tilde{c}$

Yangi  $\xi$  va  $\eta$ . -o'zgaruvchilarni  $\xi = \varphi(x, y); \eta = \psi(x, y)$ . orqali kiritamiz. U holda (4)

tenglama  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + F(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}) = 0$  ko'rinishni oladiki, bu elliptic tipdagi

tenglamalarni kanonik ko'rinishidir.

1. Tenglamani kanonik ko'rinishiga keltiring  $x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ .

Echish: Buyerda  $a = x^2, b = xy, c = y^2, b^2 - ac = x^2 y^2 - x^2 y^2 = 0$ ; ya'ni tenglama parabolic tipli. Xarakteristik tenglamani tuzamiz

$x^2 dy^2 - 2xy dx dy + y^2 dx^2 = 0$ . Bu xolda ikkita xarakteristikalar oilasi ustma-ust

tushadi  $x dy = y dx$ . tenglamani qaraymiz. O'zgaruvchilarni ajratib uni integrallaymiz

$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$  yoki  $\ln|y| - \ln|x| = \ln|C|, \frac{y}{x} = C$ . Yangi uzgaruvchilarni

kiritamiz.  $\eta$ . ni shunday tanlaymizki  $\frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial \xi}{\partial y} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \neq 0$ . shart bajarilsin

.Yani  $\xi$  va  $\eta$ . uzgaruvchi olib, u holda berilgan tenglamani kanonik ko'rinishi quyidagicha

$\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2} = 0$ .

2. misol; 2.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + 9u_x + 9u_y = 0$

Xarakteristik tenglamani tuzamiz:

$$a_{11} = 1 \quad a_{12} = -1 \quad a_{22} = 1$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$(\lambda + 1)^2 = 0$$

Bu yerda  $\lambda_{1,2} = -1$  bulganligi uchun bu parabolik tipdagi tenglama. U xolda quyidagi

almashtirish kiritamiz:

$$\begin{cases} \xi = y - \lambda x \\ \eta = x \end{cases} \quad \begin{cases} \xi = y + x \\ \eta = x \end{cases}$$

$$u_x = u_\xi + u_\eta$$

$$u_y = u_\xi$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi}$$

Tenglama urniga kuyamiz:

$$u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} - 2u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\xi\xi} + 9u_\xi + 9u_\eta + 9u_\xi = u_{\eta\eta} + 18u_\xi + 9u_\eta$$

Demak, parabolik tipdagi tenglamamiz kanonik shakli kuyidagicha:

$$u_{\eta\eta} + 18u_\xi + 9u_\eta = 0$$

3.misol:Tenglamani kanonik ko'rinishga keltiring  $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y = 0$ .

(8,4)

Xarakteristik tenglamani yechib  $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ ,  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$  ga ega

bulamiz. Yani, (8,4) tenglama parabolic tipli.

$\xi = y - x, \eta = x$  Almashtirish kiritamiz, uholda

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = u_\eta - u_\xi,$$

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = u_\xi,$$

$$u_{xx} = (u_\eta - u_\xi)_\xi \xi_x + (u_\eta - u_\xi)_\eta \eta_x = -(u_{\eta\xi} - u_{\xi\xi}) + (u_{\eta\eta} - u_{\xi\eta}) = u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

$$u_{yy} = (u_\xi)_\xi \xi_y + (u_\xi)_\eta \eta_y = u_{\xi\xi},$$

$$u_{xy} = (u_\eta - u_\xi)_\xi \xi_y + (u_\eta - u_\xi)_\eta \eta_y = u_{\xi\eta} - u_{\xi\xi}.$$

Hosil bo'lgan ifodani (8,4) tenglamaga quyib, o'xshash hadlarini ixchamlasak,

$$u_{\eta\eta} + u_\eta = 0.$$

Hosil bo'ladi. Shuni takidlaymizki, biz bu tenglamani parametriga bog'liq bo'lgan oddiy defrensial tenglamadik qarash mumkin. Uniyechsak:

$$u = C_1(\xi) + C_2(\xi)e^{-\eta} = C_1(y-x) + C_2(y-x)e^{-x}.$$

Teorema: Agar  $z = \varphi(x, y)$  funksia quyidagitenglamaning

$$a_{11}z_x^2 + 2a_{12}z_x z_y + a_{22}z_y^2 = 0, \quad (1.7)$$

Yechim bo'lsa, uholda  $\varphi(x, y) = C$  (C-ixtiyoriy konstanta)

$$a_{11}(y')^2 - 2a_{12}y' + a_{22} = 0 \quad (1.8)$$

Umimiy integrali hisoblanadi. (bu yerda  $u = y = y(x), y' = dy/dx$ ).

Teskarisi, agar  $\varphi(x, y) = C$  (1,8) tenglamaning umumiy integrali bo'lsa, u holda  $u = \varphi(x, y)$ , (1,7) tenglamaning yechimi bo'ladi. Ikki o'zgaruvchili 2-chi tartibli xususiy xosilali chiziqli tenglama  $u = u(x, y)$  funksiani ko'rinishi quyidagicha

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu + f = 0 \quad (1.1)$$

Bu yerda  $a_{11}, a_{12}, a_{22}, b_1, b_2, c, f$   $x$  va  $y$  o'zgaruvchili funkcia, bundan tashqari  $a_{11}, a_{12}, a_{22}, b_1, b_2, c, f$  larning koefitsientlari orasida noldan farqli bor.  $X$  va  $y$  o'zgaruvchili (1.1) tenglamada, ya'ni  $\xi, \eta$  o'zgaruvchiga  $\xi = \varphi(x, y), \eta = \psi(x, y)$ , formula orqali o'tamiz. Faraz qilaylik  $\varphi(x, y), \psi(x, y)$ , funksialar,  $D$  sohaning  $x$  O  $y$  tekisligida ikki marta differensialanuvchi va o'tish yakobiani noldan farqli bo'lsin

Sohaning har bir nuqtasida

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{U holda quydagilar}$$

o'rinli:

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \cdot \xi_x + u_\eta \cdot \eta_x, & u_y &= u_\xi \cdot \xi_y + u_\eta \cdot \eta_y, \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} \cdot \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \cdot \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \cdot \eta_x^2 + u_\xi \cdot \xi_{xx} + u_\eta \cdot \eta_{xx}, \\ u_{xy} &= u_{\xi\xi} \cdot \xi_x \cdot \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \cdot \xi_{xy} + u_\eta \cdot \eta_{xy}, \\ u_{xy} &= u_{\xi\xi} \cdot \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \cdot \xi_{xy} + u_\eta \cdot \eta_{xy}, \end{aligned} \quad (1.2)$$

$$\overline{a_{11}}u_{\xi\xi} + 2\overline{a_{12}}u_{\xi\eta} + \overline{a_{22}}u_{\eta\eta} + F = 0, \quad (1.3)$$

$$\overline{a_{11}} = a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{22}\xi_y^2, \quad (1.4)$$

$$\overline{a_{12}} = a_{11}\xi_x\eta_x + a_{12}(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + a_{22}\xi_y\eta_y, \quad (1.5)$$

$$\overline{a_{22}} = a_{11}\eta_x^2 + 2a_{12}\eta_x\eta_y + a_{22}\eta_y^2, \quad (1.6)$$

Bu holda  $F$  bilan  $U$ -funktianing ikkinchi tartibli hosilasiga bog'liq bo'lmagan ifoda belgilangan

3.31 Masala. Tenglamani umumiy yechimini toping va uni kanonib ko'rinishga keltiring.

$$\text{Yechish } a_{11} = 2, a_{12} = \frac{5}{2}, a_{22} = -3, a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = \frac{49}{4} > 0.$$

gaega bo'lamiz. Demak butun  $x$  O  $y$  tekislikida gipirbolik tipli tenglama. (1.8) tenglamaning karakteristik tenglamasi quyidagicha  $2(y')^2 - 5y' - 3 = 0$ .  $t = y'$ , deb,

$$2t^2 - 5t - 3 = 0 \quad \text{kvadrat tenglamaga kelamiz. Uning yecimlari} \quad t_1 = 3, t_2 = -\frac{1}{2}$$

(turli haqiqiy yechimlar),  $y'$  ga qaytib, ikkita 1-chi tartibli oddiy defglamaga ega bo'lamiz:

$$y' = 3 \quad \text{va} \quad y' = -1/2 \quad \text{Bularni ehamiz}$$

$$y' = 3 \Leftrightarrow y = 3x + C \Leftrightarrow y - 3x = C,$$

$$y' = -0,5 \Leftrightarrow t = -0,5x + C \Leftrightarrow y + 0,5x = C.$$

Xarakteristik metodga asosan yani  $\xi, \eta$  - o'zgaruvchilarni  $\xi = y - 3x, \eta = y + 0,5x$  . formula orqali kirirtamiz xususiy hosilalarni

$$\text{hisoblaymiz} \quad \xi_x = -3, \xi_y = 1, \xi_{xx} = 0, \xi_{xy} = 0, \xi_{yy} = 0,$$

$$\eta_x = 0,5, \eta_y = 1, \eta_{xx} = 0, \eta_{xy} = 0, \eta_{yy} = 0. \quad \text{hosilalarni (1.2)ga quysak:}$$

$$u_x = -3u_\xi + u_\eta \cdot 0,5, u_x = u_\xi + u_\eta, u_{xx} = 9u_{\xi\xi} - 3u_{\xi\eta} + 0,25u_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = -3u_{\xi\xi} - 2,5u_{\xi\eta} + 0,5u_{\eta\eta}, u_{yy} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}.$$

(1.13)ga  $u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}$  larni qo'ysak, u holda

$$2(9u_{\xi\xi} - 3u_{\xi\eta} + 0,25u_{\eta\eta}) + 5(-3u_{\xi\xi} - 2,5u_{\xi\eta} + 0,5u_{\eta\eta}) - 3(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) = 0.$$

O'xshash hadlarni ixchamlab, tenglamaning kanonik shaklini hosil qilamiz

$$: -24,5u_{\xi\eta} = 0 \quad \text{yoki} \quad u_{\xi\eta} = 0$$

Bu tenglamani yechish uchun uni  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$  yoki  $\frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0$  ko'rinishga yozamiz. Bu

yerda ,bu yerda  $\frac{\partial u}{\partial \eta} = h(\eta)$  -ixtiyoriy faqat  $\eta$  bog'liq funksia  $\eta$  -o'zgaruvchi

$$\text{bo'yicha integrallab} \quad u = u(\xi, \eta) = \int h(\eta) d\eta = f(\eta) + g(\xi)$$

Bu yerda  $f'(\eta) = h(\eta)$  g-funksia bo'lsa, faqat  $\xi$  dan bog'liq. Ya'ni (1.13) tenglamani umumiy yechimi  $u(x, y) = f(y + 0,5x) + g(y - 3x)$  Bu yerda f va g ixtiyoriy ikki marta defferensialanuvchi funksia

2. Faraz qilamizki sohada  $D: a_{12}^2 - a_{11} \cdot a_{22} = 0$  ya'ni (1.1) tenglama, parabolic tipli

bo'lsin Xarakteristik tenglama faqat bitta  $y' = \frac{a_{12}}{a_{11}}$  faraz kilaylik  $\varphi(x, y) = C$

uning umumiy integrali  $\xi = \varphi(x, y)$  deb olamiz  $\eta = \psi(x, y)$  funksia sifatida ixtiyoriy

shunday funksiani olamizki

$$J(x, y) = \xi_x \cdot \eta_y - \xi_y \cdot \eta_x \neq 0.$$

bo'lsa. U holda (1.1) tenglama  $u_{\eta\eta} = \Phi$ . ko'rinishga ega

2.31 Masala Tenglamaning umumiy yechimini toping

$$49u_{xx} - 14u_{xy} + u_{yy} + 14u_x - 2u_y = 0. \quad (1.14)$$

Yechish: Bu yerda  $a_{11} = 49, a_{12} = -7, a_{22} = 1, b_1 = 14, b_2 = -2, c = f = 0$ ,

Tenglama parabolic tipli. Xarakteristik tenglamasi:  $49(y')^2 + 14y' + 1 = 0$ .

Bu tenglamaning diskriminanti nolga teng.  $y' = \frac{1}{7}, y = -\frac{x}{7} + C, y + \frac{x}{7} = C$

Faqat bir guruh xarakteristikalar.  $\xi = y + \frac{x}{7}$ .

Deb olamiz  $\eta$  funksiani ixtiyoriy tanlaymiz  $\eta = x$  (biroq

$$J(x, y) = \xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x = \frac{1}{7} \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 \neq 0). \text{ shartni tekshiramiz ). xususiyy hosilalarni}$$

topamiz

$$\xi_x = \frac{1}{7}, \xi_y = 1, \xi_{xx} = 0, \xi_{yy} = 0, \xi_{xy} = 0, \eta_x = 1, \eta_y = 0, \eta_{xy} = 0, \eta_{yy} =$$

Va bularni (1.2) formulaga quyamiz, u holda

$$u_{xx} = \frac{1}{49} u_{\xi\xi} + \frac{2}{7} u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, u_{xy} = \frac{1}{7} u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}, u_{yy} = u_{\xi\xi}, u_x = \frac{1}{7} u_{\xi} + u_{\eta}, u_y = u_{\xi}.$$

$u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$  larni (1.14) tenglamaga quysak

$$49 \left( \frac{1}{49} u_{\xi\xi} + \frac{2}{7} u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \right) - 14 \left( \frac{1}{7} u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} \right) + u_{\xi\xi} + 14 \left( \frac{1}{7} u_{\xi} + u_{\eta} \right) - 2u_{\xi} = 0.$$

Qavslarni ochib, o'xshash hadlarni ixchamlasak, kanonik shakldagi tenglamaga kelamiz

$$49u_{\eta\eta} + 14u_{\eta} = 0 \text{ yoki } 7u_{\eta\eta} + 2u_{\eta} = 0$$

Xar bir  $\xi$  uchun, bu 2-chi tartibli o'zgarmas koefsentli chiziqli bir jinsli tenglamadir: uning

xarakteristik tenglamalari esa  $7r^2 + 2r = 0$  yoki  $r_1 = 0, r_2 = -\frac{2}{7}$ ;

Shuning uchun umumiy yechim quydagicha  $u = u(\xi, \eta)C_1(\xi) + C_2(\xi)e^{-2\eta/7}$  bu yerda

$C_1(\xi)$  va  $C_2(\xi)$  O'zgaruvchiga bog'liq ixtiyoriy funksia. Eski o'zgaruvchilarga qaytib,

$$u(x, y)C_1\left(y + \frac{x}{7}\right) + C_2\left(y + \frac{x}{7}\right)e^{-2x/7} \text{ Bu yerda}$$

$C_1C_2$  - Ikki marta differensialanuvchi funksiada

Faraz qilaylik  $D: a_{12}^2 - a_{11} \cdot a_{22} < 0$  (1.1)tenglama elliptic tipli bo'lsin, uning xarakteristik tenglamasi 2-ta turli kompleks tenglamalardan iborat. Bulardan faqat bittasini qaraymiz, faraz qilamiz

$$\varphi(x, y) = C \text{ uning umumiy integrali}$$

$\xi = \operatorname{Re} \varphi(x, y)$ ,  $\eta = \operatorname{Im} \varphi(x, y)$  deb olamiz ( $\eta$ -haqiqiy qism,  $\eta$ -esa  $\varphi(x, y)$ )

funksiyaning mavhum qismi) U holda (1.1)tenglama  $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \Phi$  ko'rinishi oladi.

- 1.1 Misol. Tenglamani kanonik ko'rinishga keltiring

$$u_{xx} - 2u_{xy} + 2u_{yy} = 0. \quad (1.15)$$

Yechish. Xarakteristik tenglamasi  $(y')^2 + 2y' + 2 = 0$   $t = y'$  belgilash olib,  $t^2 + 2t + 2 = 0$  kvadrat tenglamani hosil qilamiz. Uning yechimi  $t_{12} = -1 \pm \sqrt{-1} = -1 \pm i$  - kompleks sonlar. U holda  $y' = -1 \pm i$  Faqat bitta tenglamani qaraymiz  $y' = -1 + i$  uning umumiy yechimi  $y = (-1 + i)x + C$  yoki  $y + x - ix = C$

Buyerda  $\varphi(x, y) = y + x - ix$

$\xi = \operatorname{Re} \varphi(x, y) = y + x$ ,  $\eta = \operatorname{Im} \varphi(x, y) = -x$  Deb olamiz hosilalarni topamiz  $\xi_x = \xi_y = 1$ ,  $\eta_x = -1$ ,  $\eta_y = 0$ , ikkinchi tartibli hosilalar nolga teng (1.2) formulaga asosan

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, u_{xy} = u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta}, u_{yy} = u_{\xi\xi}.$$

$$(1.15) \text{quysak } (u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) - 2(u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta}) + 2u_{\xi\xi}$$



### Umumiy yechimni toping.

1.  $ctgx \frac{\partial U}{\partial x} + (y + 2 \cos^2 xctgx) \frac{\partial u}{\partial x} = 0$
2.  $x \frac{\partial U}{\partial x} + y \ln \frac{y}{x} \frac{\partial U}{\partial y} = 0$
3.  $x \frac{\partial U}{\partial x} + (2y - x^2) \frac{\partial U}{\partial y} = 0$
4.  $(x^2 - 1) \frac{\partial U}{\partial x} + (xy + x^4 - 1) \frac{\partial U}{\partial y} = 0$
5.  $(2x - y) \frac{\partial U}{\partial x} + (x + y) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
6.  $x^2 \frac{\partial U}{\partial x} + (2xy + 3) \frac{\partial U}{\partial x} = 0.$
7.  $(2x + y + 1) \frac{\partial U}{\partial x} + (x - y) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
8.  $(x - y + 2) \frac{\partial U}{\partial x} + (2x + 3y - 1) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
9.  $(x + 2y + 1) \frac{\partial U}{\partial x} + (x - 2y) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
10.  $(x + y + 2) \frac{\partial U}{\partial x} + (2x + 3y + 1) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
11.  $2y \frac{\partial U}{\partial x} + (\sin x - y^2) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
12.  $2y \frac{\partial U}{\partial x} + (y^2 tgx + \sin 2x) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
13.  $(x^2 + y^2) \frac{\partial U}{\partial x} + xy \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
14.  $(x^2 + y^2) \frac{\partial U}{\partial x} + (x^2 - 3y^2) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
15.  $(x + y + 3) \frac{\partial U}{\partial x} + (x - y + 1) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
16.  $\frac{\partial U}{\partial x} + (x - ytgx) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
17.  $x \frac{\partial U}{\partial x} + (xy + xe^x) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
18.  $x \frac{\partial U}{\partial x} + (x^2 \sqrt{y} - yx) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
19.  $(x^2 - y^2) \frac{\partial U}{\partial x} + 2xy \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
20.  $(x^2 - 1) \frac{\partial U}{\partial x} + (-x + yx) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$
21.  $x \frac{\partial U}{\partial x} + (2y - x^2) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$

$$22. 2y \frac{\partial U}{\partial x} + (y^2 \operatorname{tg} x + \sin 2x) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$$

$$23. (x-y) \frac{\partial U}{\partial x} + (x+2y) \frac{\partial U}{\partial y} = 0.$$

### Kanonik shaklga keltiring.

$$1. u_{xx} + 4u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y - x^2y = 0.$$

$$2. u_{xx} + 2u_{xy} + 5u_{yy} - 32u_y = 0.$$

$$3. u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + 9u_x + 9u_y = 0.$$

$$4. 2u_{xx} + 3u_{xy} + u_{yy} + 7u_x + 4u_y = 0.$$

$$5. u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} - 3u_x - 15u_y + 27x = 0.$$

$$6. 9u_{xx} - 6u_{xy} + u_{yy} + 10u_x - 15u_y + x - 2y = 0.$$

$$7. u_{xx} + 2u_{xy} + 10u_{yy} - 24u_x + 42u_y + 2(x+y) = 0.$$

$$8. u_{xx} + 4u_{xy} + 13u_{yy} + 3u_x + 24u_y + 9(x+y) = 0.$$

$$9. u_{xx} - 4u_{xy} + 5u_{yy} - 3u_x + u_y = 0.$$

$$10. u_{xx} - 6u_{xy} + 9u_{yy} - u_x + 2u_y = 0.$$

$$11. 2u_{xy} - 4u_{yy} + u_x - 2u_y + x = 0.$$

$$12. u_{xy} + 2u_{yy} - u_x + 4u_y = 0.$$

$$13. 2u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + 4u_x + 4u_y = 0.$$

$$14. u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + 3u_x - 5u_y = 0.$$

15.  $u_{xx} - u_{yy} + u_x + u_y = 0.$
16.  $u_{xx} + u_{xy} - u_y + 4x = 0.$
17.  $3u_{xx} + u_{xy} + 3u_x + u_y + y = 0.$
18.  $u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} - 2u_x - 2u_y = 0.$
19.  $5u_{xx} + 16u_{xy} + 16u_{yy} + 24u_x + 32u_y = 0.$
20.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} - 3u_x + 12u_y = 0.$
21.  $2u_{xx} - 5u_{xy} + 3u_{yy} - u_x + u_y + 2x = 0.$
22.  $2u_{xx} + 6u_{xy} + 4u_{yy} + u_x + u_y = 0.$
23.  $3u_{xx} - 10u_{xy} + 3u_{yy} - 2u_x + 4u_y + 2y = 0.$
24.  $3u_{xx} + 10u_{xy} + 3u_{yy} + u_x + u_y + 2x + y = 0.$
25.  $u_{yy} - 2u_{xy} + 2u_x - u_y - 4e^x = 0.$
26.  $u_{xx} - 6u_{xy} + 8u_{yy} + u_x - 2u_y + x = 0.$
27.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_x + 4e^y = 0.$
28.  $3u_{xx} - 4u_{xy} + u_{yy} - 3u_x + u_y = 0.$
29.  $(1 + x^2)^2 u_{xx} + u_{yy} + 2x(1 + x^2)u_x = 0.$
30.  $y^2 u_{xx} + 2xyu_{xy} + x^2 u_{yy} = 0.$
31.  $u_{xx} - (1 + y^2)^2 u_{yy} - 2y(1 + y^2)u_y = 0.$
32.  $(1 + x^2)u_{xx} + (1 + y^2)u_{yy} + xu_x + yu_y = 0.$
33.  $x^2 u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2 u_{yy} - 2yu_x = 0.$
34.  $u_{xx} - 2\sin x \cdot u_{xy} - \cos^2 x \cdot u_{yy} - \cos x \cdot u_y = 0.$
35.  $e^{2x} u_{xx} + 2e^{x+y} u_{xy} + e^{2y} u_{yy} - xu = 0.$
36.  $u_{xx} - 2xu_{xy} = 0.$
37.  $u_{xx} + 2\sin x \cdot u_{xy} - (\cos^2 x - \sin^2 x)u_{yy} + \cos x \cdot u_y = 0.$
38.  $u_{xx} - 2\cos x \cdot u_{xy} - (3 + \sin^2 x)u_{yy} + u_x + (\sin x - \cos x - 2)u_y = 0.$
39.  $e^{-2x} u_{xx} - e^{-2y} u_{yy} - e^{-2x} u_x + e^{-2y} u_y + 8e^y = 0.$
40.  $4y^2 u_{xx} + 2(1 - y^2)u_{xy} - u_{yy} - \frac{2y}{1+y^2}(2u_x - u_y) = 0.$
41.  $u_{xx} + 2\cos x \cdot u_{xy} - \sin^2 x \cdot u_{yy} - \sin x \cdot u_y = 0.$
42.  $U_{xx} - 9U_{yy} = 0$
43.  $U_{xx} - 6U_{xy} + 2U_y = 0$
44.  $U_{xx} + 8U_{xy} + 3U_x = 0$

45.  $U_{xx} - 4U_{yy} + 10U_x = 0.$
46.  $2U_{xx} - 6U_{xy} + 4U_{yy} = 0.$
47.  $4U_{xy} - U_{yy} + U_x - 2U_y = 0.$
48.  $2U_{xx} + 2U_{xy} + 5U_{yy} = 0.$
49.  $U_{xx} - 9U_{yy} + 3U_y = 0.$
50.  $U_{xx} - 2U_{xy} - 8U_{yy} + U_x - U_y = 0.$
51.  $2U_{xx} - 10U_{xy} + 12U_{yy} + U_y = 0.$
52.  $U_{xx} - 10U_{yy} + 5U_x - U_y = 0.$
53.  $U_{xx} + 6U_{xy} + 8U_{yy} = 0.$
54.  $U_{xx} + 10U_{xy} + 25U_{yy} = 0.$
55.  $U_{xy} - 2U_{yy} + 3U_y = 0.$
56.  $U_{xx} - 9U_{yy} + 2U_x = 0.$
57.  $U_{xx} - U_{xy} + U_{yy} + 2U_y = 0.$
58.  $U_{xx} + 2U_{xy} + 10U_{yy} = 0.$
59.  $U_{xy} - U_{yy} + 2U_x - U_y = 0.$
60.  $U_{xx} - 4U_{xy} - 1 = 0.$
61.  $3U_{xx} + U_{xy} + U_y = 0.$
62.  $U_{xx} - 8U_{xy} + U_y - U_x = 0.$
63.  $U_{xx} - 4U_{yy} + U_x = 0.$
64.  $U_{xx} - 2U_{xy} + U_{yy} + U_y = 0.$

### Dalamber formulasi

To'liqin tenglamasi uchun Koshi masasalasi

$$u_{tt} = a^2 \Delta u + f(x, t)$$

Boshlang'ich shartlarda

$$u|_{t=0} = u_0(x), \quad u_t|_{t=0} = u_1(x),$$

Bu yerda  $f$ ,  $u_0$ ,  $u_1$  berilgan funksiyalar bo'lib, Dalamber formulasi orqali topiladi

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [u_0(x + at) + u_0(x - at)] + \\ + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} u_1(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

4.1 Misol.  $u_{tt} = 4u_{xx}$  tenglamaning yeching. Tenglamada

$$u|_{t=0} = x^2, \quad u_t|_{t=0} = x, \\ a = 2, \quad u_0(x) = x^2, \quad u_1(x) = x,$$

U holda  $u_1(\xi) = \xi$ .

Dalamber formulasini qo'llasak

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[(x + 2t)^2 + (x - 2t)^2] + \frac{1}{4} \int_{x-2t}^{x+2t} \xi d\xi = \\ = \frac{1}{2}(2t^2 + 8t^2) + \frac{1}{4} \xi^2 \Big|_{x-2t}^{x+2t} = x^2 + 4t^2 + 4xt = (x + 2t)^2.$$

4.2 Misol.  $u_{tt} = 4u_{xx} + e^x + t$  при  $u|_{t=0} = x, u_t|_{t=0} = \frac{\ln x}{x}$ . tenglamani yeching

Dalamber formulasidan:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[(x + 2t) + (x - 2t)] + \frac{1}{4} \int_{x-2t}^{x+2t} \frac{\ln \xi}{\xi} d\xi + \frac{1}{4} \int_0^t \int_{x-2(t-\tau)}^{x+2(t-\tau)} (e^\xi + \tau) d\xi d\tau = \\ = x + \frac{1}{8} \ln^2 \xi \Big|_{x-2t}^{x+2t} + \frac{1}{4} \int_0^t (e^\xi + \xi\tau) \Big|_{x-2(t-\tau)}^{x+2(t-\tau)} d\tau = x + \frac{1}{8} [\ln^2(x + 2t) - \ln^2(x - 2t)] + \\ + \frac{1}{4} \int_0^t [e^{x+2(t-\tau)} + (x + 2(t - \tau))\tau - e^{x-2(t-\tau)} - (x - 2(t - \tau))\tau] dt = \\ = x + \frac{1}{8} [\ln^2(x + 2t) + \ln^2(x - 2t)] - \frac{1}{4} e^x + \frac{1}{6} t^3 + \frac{1}{8} (e^{x+2t} + e^{x-2t}).$$

ya'ni, torni erkin tebranishi uchun biz qo'yidagi bir jinsli tenglamani

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{4.1}$$

$$u|_{t=0} = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = F(x), \tag{4.2}$$

boshlang'ich shartlarda yechish kerak, bu yerda  $f(x)$  va  $F(x)$  butun sonli o'qda berilgan funksiyalardir. Bunday masala boshlang'ich shartli masala'ki Koshi masalasi deyiladi. Bu

masalani to`lqin yugirishi metodi bilan yechish mumkin. (4.1) tenglama umumiy yechimining ko`rinishi qo`yidagicha:

$$u(x, t) = \varphi(x - at) + \psi(x + at), \quad (4.3)$$

bu yerda  $\varphi$  va  $\psi$  ikki marta differensiallanuvchi sanaladi.  $\varphi$  va  $\psi$  ni shunday tanlaymizki  $u = u(x, t)$  funksiya (4.2) boshlang`ich shartlarni qanoatlantirsak, u holda differensial tenglamaning yechishini keltirib chiqamiz.

$$u = \frac{f(x - at) + f(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} F(z) dz.$$

Uyga vazfa

4.3 tenglamaning yechimini toping.  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$

Agar  $u|_{t=0} = x, \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0.$  bo`lsa

Yechish. Ya`ni  $a=1, F(x)=0,$  u holda

$$u = \frac{f(x - at) + f(x + at)}{2} \text{ Bu yerda } u = \frac{x - t + x + t}{2}$$

va  $u=x$

Javob:  $u=x$

4.4 Tenglamaning yechimini toping  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$  agar  $u|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = x^3.$

Yechish. Bu yerda  $f(x) = 0, F(x) = x^3.$

$$\begin{aligned}
u &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} z^3 dz = \frac{1}{8a} z^4 \Big|_{x-at}^{x+at} = \frac{1}{8a} ((x+at)^4 - (x-at)^4) = \\
&= \frac{1}{8a} (x^2 + 2axt + a^2t^2 + x^2 - 2axt + a^2t^2)(x^2 + 2axt + a^2t^2 - x^2 + 2axt - a^2t^2) = \\
&= \frac{1}{8a} (2x^2 + 2a^2t^2) \cdot 2 \cdot 2axt = \frac{1}{a} (x^3at + xa^3t^3) = x^3t + xt^3a^2.
\end{aligned}$$

Javob:  $u = x^3t + xt^3a^2$ .

2.3  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ , tenglama bilan aniqlanadigan torning formasini toping  $t = \pi$ ,

momentda

Agar  $u|_{t=0} = \cos x$ ,  $\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = x$ .

Yechish

$$\begin{aligned}
u &= \frac{\cos(x+at) + \cos(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} z dz = \\
&= \cos x \cos at + \frac{1}{2a} \cdot \frac{z^2}{2} \Big|_{x-at}^{x+at} = \cos x \cos at + \frac{1}{4a} \cdot 4atx = \cos x \cos at + xt.
\end{aligned}$$

Agar  $t = \pi$ , bo'lsa, u holda  $u = \cos a\pi \cdot \cos x + \pi x$ .

Javob:  $u = \cos a\pi \cdot \cos x + \pi x$ .

Bir jinsli tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masala

$u_{tt} = a^2 u_{xx}$ , birjinsli to'liq tenglamasi  $u(0, x) = \varphi(x)$ ,  $\frac{\partial u(0, x)}{\partial t} = \psi(x)$  boshlang'ich

shartlar va  $U(t, 0) = U(t, l) = 0$ . va chegaraviy shartlar bilan berilgan bo'lsin

Berilgan masala Fure metodi bilan yechiladi agarda yechim  $U(t, x) = X(x)T(t)$ . ko`rinishda ifodalansa  $U(t, x)$  berilgan tenglamaga qo`yib  $X(x)$  va  $T(t)$  funksiyhala uchun tenglamaga ega bo`lamiz.  $X'' = -\lambda^2 X$  tenglamani  $X(x)$  ga  $X(0) = X(l) = 0$  chegaraviy shartlarga nisbatan yechnak

$$X(x) = X_n(x) = A_n \sin \frac{\pi n}{l} x, \lambda = \lambda_n = \frac{\pi n}{l}.$$

$T'' = -\lambda^2 a^2 T$  tenglamani  $T(t)$  nisbatan yechnak,

$$T(t) = T_n(t) = C_n \sin \frac{a\pi n}{l} t + D_n \cos \frac{a\pi n}{l} t,$$

bu yerda,  $A_n, C_n, D_n$  konstantalar. Tenglamani birjinsligidan  $A_n = 1$ . deb olish mumkin.

Demak, berilgan tenglamani umumiy yechni qo`yidagicha:

$$U(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \sin \frac{a\pi n}{l} t + D_n \cos \frac{a\pi n}{l} t) \sin \frac{\pi n}{l} x.$$

$C_n, D_n$  Konstantalarni topish uchun boshlang`ich shartlardan foydalanamiz.

$$U(0, x) = \varphi(x), \frac{\partial U(0, x)}{\partial x} = \psi(x).$$

U holda qo`yidagi tenglamalarga ega bo`lamiz

$$\sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{\pi n}{l} x = \varphi(x),$$

$$D_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \frac{a\pi n}{l} \sin \frac{\pi n}{l} x = \psi(x),$$

$$C_n = \frac{2}{a\pi n} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx.$$

1.Misol. Bir jinsli to`lqin tenglamasi uchun chegaraviy masalani yechni



$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1,5$$

$$U(0, x) = x(l - x), \frac{\partial U(0, x)}{\partial t} = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

Yechim qo`yidagi ko`rinishga yoziladi.

$$U(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \sin \frac{a\pi n}{l} t + D_n \cos \frac{a\pi n}{l} t) \sin \frac{\pi n}{l} x, \text{ bu yerda}$$

$$C_n = 0, \psi(x) = 0, D_n = \frac{2}{l} \int_0^l x(l - x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx, \varphi(x) = x(l - x), D_n$$

Hisoblashlarni ikki marta qismlarga integrallashlardan boshlaymiz

$$\begin{aligned} D_n &= \frac{2}{l} \int_0^l x(l - x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx = -\frac{2}{\pi n} \int_0^l x(l - x) d \cos \frac{\pi n}{l} x = -\frac{2}{\pi n} x(l - x) \cos \frac{\pi n}{l} x \Big|_0^l + \\ &+ \frac{2}{\pi n} \int_0^l \cos \frac{\pi n}{l} x (l - 2x) dx = \frac{2l}{(\pi n)^2} \int_0^l (l - 2x) d \sin \frac{\pi n}{l} x = \frac{2l}{(\pi n)^2} (l - 2x) \sin \frac{\pi n}{l} x \Big|_0^l + \\ &+ \frac{4l}{(\pi n)^2} \int_0^l \sin \frac{\pi n}{l} x dx = -\frac{4l^2}{(\pi n)^3} \cos \frac{\pi n}{l} x \Big|_0^l = -\frac{4l^2}{(\pi n)^3} \cos \pi n + \frac{4l^2}{(\pi n)^3} = \frac{4l^2}{(\pi n)^3} [1 - \cos \pi n] = \\ &= \frac{4l^2}{(\pi n)^3} [1 + (-1)^{n+1}] \end{aligned}$$

$$\text{Jabob: } U(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4l^2}{(\pi n)^3} [1 + (-1)^{n+1}] \cos \frac{1,5\pi n}{l} t \sin \frac{\pi n}{l} x.$$

## Shturm-Liuvil masalasi

1. Misol Shturm-Liuvil masalasini yeching

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, \\ y(3/2) = y'(1/2) = 0. \end{cases}$$

Faraz qilaylik  $\lambda = \omega^2$  ( $\omega > 0$ ). U holda tenglamaning umumiy yechimi quyidagicha bo'ladi

$$y = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x \quad \text{va}$$

$$y' = -\omega C_1 \sin \omega x + \omega C_2 \cos \omega x.$$

Quyidagi sistemani hosil qilamiz

$$\begin{cases} C_1 \cos \frac{3}{2}\omega + C_2 \sin \frac{3}{2}\omega = 0, \\ -\omega C_1 \sin \frac{\omega}{2} + \omega C_2 \cos \frac{\omega}{2} = 0. \end{cases}$$

Quyidagi tenglamani yechamiz

$$\begin{vmatrix} -\sin \frac{\omega}{2} & \cos \frac{\omega}{2} \\ \cos \frac{3}{2}\omega & \sin \frac{3}{2}\omega \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \cos \omega = 0 \Leftrightarrow \omega = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

U holda xos qiymat quyidagiga teng

$$\lambda = \omega^2 = \pi^2 \left( \frac{1}{2} + n \right)^2.$$

Kiyinchalik:

$$\begin{aligned} -C_1 \sin \frac{\omega_n}{2} + C_2 \cos \omega_n 2 &= 0, \\ \frac{C_2}{C_1} &= \operatorname{tg} \frac{\omega_n}{2} = \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2} \right) = (-1)^n = \frac{\sin(\omega_n/2)}{\cos(\omega_n/2)}. \end{aligned}$$

Xos funksialarni quyidagi shartdan topamiz

$$y = y_n = C_1 \cos \omega_n x + C_2 \sin \omega_n x.$$

$C_1$  : Va  $C_2$ : ni topamiz

$$C_1 = C \cos \frac{\omega_n}{2}, \quad C_2 = C \sin \frac{\omega_n}{2}, \quad C = 1.$$

U holda

$$y = y_n = \cos \frac{\omega_n}{2} \cos \omega_n x + \sin \frac{\omega_n}{2} \sin \omega_n x = \cos \left[ \omega_n \left( x - \frac{1}{2} \right) \right].$$

Shturm-Liuvil masalasi ,xosfunksiali qatorlar

Quyidagi bir jinsli chiziqli defferensial tenglamani qaraymiz

$$-y''(x) + q(x)y'(x) - \lambda y(x) = 0 \quad (1.15)$$

$$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0, \quad \beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0. \quad (1.16)$$

Chegaraviy shartlar

Bu yerda  $q(x)$  -  $[a, b]$  da uzluksiz  $q(x) \geq 0$ ;

$$\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \neq 0, \quad \beta_1^2 + \beta_2^2 \neq 0.$$

Shunday  $\lambda$  -ni qiymatini kerakli (1.15)tenglamani noldan farqli (interval)yechimlari mavjud bo'lsin va (1016)shartni qanoatlantirsin.

Shunday  $\lambda$  -ni qiymatiki,bu holda(1.15)-(1.16)tenglamaning notrival yechimlari mavjud, chegaraviy masalaning xos qiymatlari deyiladi unga mos notrival yechimlar esa –xos funksialar deyiladi. Quyidagi tasdiq urinli:

1)Xos qiymatlar ketmaketliklardan iborat

$\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_n < \dots, < \lambda_n \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty.$  ,xar bir  $\lambda_n$  songa, yagona  $y_n(x)$ . -xos funksia mos keladi.

2)Barcha  $n \neq m$  uchun

3)Faraz qilaylik shartlar bajarilsin.U holda

$$\int_a^b y_n(x)y_m(x)dx = 0.$$

chegaraviy masalaning barcha xos sonlarni musbat

1.3.Teorima Har qanday  $f(x)$  funksiya (1.16) tenglamaning chegaraviy shartlarini qanoatlantruvchi ,birinchi tartibli uzluksiz hosilaga ega va  $[a, b]$  da ikkinchi tartibli qism uzluksiz hosilaga ega funksiya ,xos funksialar buyicha absalyut va tekis yaqinlashuvchi qatorga yoyiladi.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n y_n(x), \quad C_n = \int_a^b f(x)y_n(x)dx / \int_a^b y_n^2(x)dx. \quad (1.17)$$

1.1Misol.Chegaraviy masalani barcha yechimlarini toping.

Yechim:Bu yerda  $q(x) = 0, \alpha_1 = \beta_1 = 0.$  3 xossaga asosan  $\lambda \geq 0.$  Ikki holni qaraymiz.

c)  $\lambda = 0$ .  $y'' = 0$  Tenglama quyidagi umumiy yechimga ega  
 ixtiyoriy  $y = C_1x + C_2$ ;  $C_1, C_2$  -ixtiyoriy o'zgarmas Chegaraviy  
 shartdan  $C_1 = 0$   $y = C_2 = const$

d)  $\lambda > 0$ . Tenglamaning umumiy yechimi quyidagicha :

$$y = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x;$$

$$y' = -A\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}x + B\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}x,$$

,bu yerda  $A, B$  -ixtiyoriy o'zgarmas.

Chegaraviy shartlardan :

$$-A \sin \sqrt{\lambda} + B \cos \sqrt{\lambda} = 0, \quad -A \sin 3\sqrt{\lambda} + B \cos 3\sqrt{\lambda} = 0. \quad (1.18)$$

Bu yerdan va o'zgarmaslardan nisbatan bir jinsli chiziqli tenglamalar  
 sestimasining qulga kiritdik Ya'ni (1.18) nolga teng bo'lmagan yechimga ega  
 bo'lish kerak, uning detirminanti  $\Delta$  nolga teng bo'lishi kerak

$$\Delta = -\sin \sqrt{\lambda} \cos 3\sqrt{\lambda} + \sin 3\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin(3\sqrt{\lambda} - \sqrt{\lambda}) = 0 \Leftrightarrow \sin 2\sqrt{\lambda} = 0.$$

Buyerdan  $\lambda = \frac{\pi^2 n^2}{4}, n = 1, 2, \dots, y = A \cos \frac{\pi n x}{2} + B \sin \frac{\pi n x}{2}.$

Kiyinchalik (1.18) –ni birinchi tenglamasidan  $B = A \operatorname{tg} \sqrt{\lambda} = A \operatorname{tg} \frac{\pi n}{2},$

shuning uchun  $y = A \cos \frac{\pi n x}{2} + A \operatorname{tg} \frac{\pi n}{2} \sin \frac{\pi n x}{2}.$

$$y = A \cos \frac{\pi n x}{2} + A \operatorname{tg} \frac{\pi n}{2} \sin \frac{\pi n x}{2}.$$

Quyidagiga ega bo'lamiz  $y = C_n y_n = C_n \cos \frac{\pi n}{2} (x-1), n = 1, 2, \dots$

1.2 Misol  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$  funksiyani 1.1 Misolning chegaraviy  
 shartlaridan foydalanib xos funksiyalar bo'yicha qator yig'indisi shaklida  
 ifodalang.

Echish  $f(x)$  funksiya  $f'(1) = f'(3) = 0$ , shartlarni qanoatlantradi uning hosilalari  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$  va  $f''(x) = 6x - 12$  uzluksizdirlar.

(1.17)dagi integrallarni hisoblaymiz (3,5,7 formuladan foydalanamiz).

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x) y_n(x) dx &= \int_1^3 (x^3 - 6x^2 + 9x) \cos \frac{\pi n}{2} (x-1) dx = \\ &= \int_1^3 x^3 \cos \frac{\pi n}{2} (x-1) dx - 6 \int_1^3 x^2 \cos \frac{\pi n}{2} (x-1) dx + 9 \int_1^3 x \cos \frac{\pi n}{2} (x-1) dx = \\ &= \left( \frac{3x^2}{\alpha_n^2} - \frac{6}{\alpha_n^4} - \frac{12x}{\alpha_n^2} + \frac{9}{\alpha_n^2} \right) \cos \alpha_n (x-1) \Big|_1^3 = \frac{6}{\alpha_n^4} (1 - \cos \pi n) = \\ &= \begin{cases} 0, & n - \text{четное} \\ \frac{12}{\alpha_n^4}, & n - \text{нечетное} \end{cases} \end{aligned}$$

Bu yerda  $\alpha_n = \frac{\pi n}{2}$ . Kiyinchalik  $n=0$  bo'lganda

$$\int_1^3 f(x) y_0(x) dx = \int_1^3 (x^3 - 6x^2 + 9x) dx = 4, \quad \int_1^3 y_0^2(x) dx = 2$$

Bundan tashqari

$$\begin{aligned} \int_1^3 y_n^2(x) dx &= \int_1^3 \cos^2 \frac{\pi n}{2} (x-1) dx = \frac{1}{2} \int_1^3 [1 + \cos \pi n (x-1)] dx = \\ &= \frac{1}{2} \left[ x + \frac{1}{\pi n} \sin \pi n (x-1) \right]_1^3 = 1, \quad n \neq 0. \end{aligned}$$

(1.17) formula qo'ysak, u holda  $C_0 = \frac{4}{2} = 2$ ; bo'lganda

$$C_n = \frac{12}{\alpha_n^4} = 12 \left( \frac{2}{\pi n} \right)^4 = \frac{192}{\pi^4 n^4}. \text{ xuddi shunday,}$$

$$f(x) = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{192}{\pi^4 n^4} \cos \frac{\pi n}{2} (x-1) =$$

***n*-нечетное**

$$= 2 + \frac{192}{\pi^4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)} \cos \pi \left( k - \frac{1}{2} \right) (x-1), \quad 1 \leq x \leq 3$$

Berilgan qator [1;3] kesmada tekis va absolyut yaqinlashuvchidir.

### Uyga vazifa

2. Shturm-Liuvill masalasi.

A operatorning  $D(A) = C_0^2[0, l]$  da  $X_1(x), \dots, X_k(x), \dots$  vektorlarni topamiz.

$$\begin{cases} AX_k = \lambda_k X_k; \\ X_k \in D(A), \quad X_k \neq 0. \end{cases} \quad (3.1)$$

To'laroq (3.1) shuni anglatadiki

$$\begin{cases} X_k''(x) = \lambda_k X_k(x), \quad 0 < x < l, \\ X_k(0) = X_k(l) = 0, \quad X_k(x) \neq 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

A operator bu  $\frac{d^2}{dx^2}$ ,  $D(A) = C_0^2[0, l]$  soha

2 (3.1) Shturm-Liuvill masalasining yechimi (3.2) tenglamadan,

$$X_k(x) = A_k e^{\sqrt{\lambda_k} x} + B_k e^{-\sqrt{\lambda_k} x}. \quad (3.13) \quad 3.13)$$

(3.2) chegaraviy shartlarni qo'ysak

$$\begin{cases} A_k + B_k = 0, \\ A_k e^{\sqrt{\lambda_k} l} + B_k e^{-\sqrt{\lambda_k} l} = 0. \end{cases} \quad (3.14)$$

Bu sistemaning matrisasi tug'ma bo'lishi kerak, bo'lmasa  $A_k = B_k = 0$  va  $X_k(x) \equiv 0$ ,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{\sqrt{\lambda_k} l} & e^{-\sqrt{\lambda_k} l} \end{vmatrix} = e^{-\sqrt{\lambda_k} l} - e^{\sqrt{\lambda_k} l} = 0. \quad (3.15)$$

bu (3.2) ga zid. Ya'ni,  $\lambda_k$  xarakteristik tenglamani

qanoatlantiradi.

Bu yerdan

$$e^{-\sqrt{\lambda_k}l} = e^{\sqrt{\lambda_k}l} \Rightarrow e^{2\sqrt{\lambda_k}l} = 1. \quad (3.16)$$

Ya'ni  $2\sqrt{\lambda_k}l = 2k\pi i, \quad k \in \mathbf{Z} \Rightarrow$

$$\sqrt{\lambda_k} = \frac{k\pi i}{l} \Rightarrow \lambda_k = -\left(\frac{k\pi}{l}\right)^2; \quad (3.17)$$

Bu yerda deb o'tamiz. Shu narsa kutilgan edi,  $\lambda_k \leq 0$ .

Demak,  $\lambda_k$  xos sonlarni topdik.

Endi  $X_k(x)$  xos funksiyani topamiz. Buning uchun (3.14) sistemani tug'ma deb faraz qilamiz

Ya'ni tenglamada faqat ularning bittasini hisobga olish etarli:  $B_k = -A_k$ . shuning uchun (3.13) dan (3.17) ko'rinishiga ega bo'lamiz

$$X_k(x) = A_k(e^{\frac{k\pi i}{l}x} - e^{-\frac{k\pi i}{l}x}) = A_k 2i \sin \frac{k\pi x}{l}. \quad (3.18)$$

Bu yerda biz Eyler formulasini qo'lladik:

$$e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} = 2i \sin \varphi. \quad \text{Biroq } X_k \text{ xos funksiya to'sonly ko'paytuvchilar aniqlik bilan}$$

topilgan, u holda

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{l}; \quad k = 1, 2, \dots \quad (3.19)$$

Bu yerda  $k > 0$ , deb  $k = 0$  da  $X_0(x) \equiv 0$ .

Masala: Shturm-Liuuill masalasini yeching, xos funksiyalarni toping

$$X_k(0) = X'_k(l) = 0, \quad (3.23)$$

$$X'_k(0) = X_k(l) = 0, \quad (3.24)$$


$$X'_k(0) = X'_k(l) = 0. \quad (3.25) \quad (3.23)$$

Shartlar (3.24) (3.25)

Masala: har bir (3.23)-(3.25) chegarabiy shart uchun mashqlarni bajaring.


Javob ⊗ (3.23) uchun 65 – rasmga qarang

$$\lambda_k = -\left(\frac{k + \frac{1}{2}}{l}\right)^2, \\ X_k(x) = \sin \frac{(k + \frac{1}{2})\pi x}{l}, \\ k = 0, 1, 2, \dots$$



(3.24)

uchun 66 – rasmga qarang.



313

$$\lambda_k = -\left(\frac{k\pi}{l}\right)^2, \\ X_k(x) = \cos \frac{k\pi x}{l}, \\ k = 0, 1, 2, \dots$$




Рис. 67

(3.25) 67 – rasmga qarang.

$$\lambda_k = -\left(\frac{k\pi}{l}\right)^2,$$

$$X_k(x) = \cos \frac{k\pi x}{l},$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

Shuningdek qo`yidagi ixtiyoriy chegaraviy shartlarni qarashi mumkin (3.26)

- haqiqiy sonlar



**Bir jinsli chegaraviy shartlar bilan berilgan giperbolik tipli tenglama uchun  
chegaraviy masala .Fure usuli**

$U(x, t)$  –boshlang'ich chegaraviy masalaning yechimini toping

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x), \\ u(0, t) = u(l, t) = 0. \end{cases} \quad (1.1)$$

1.Qadam  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$  tenglama  $U(0, t) = U(l, t) = 0$  chegaraviy shartlar bilan berilgan bo'lib, uning yechimini  $U(x, t) = X(x)T(t)$  ko'rinishda yozamiz .Chegaraviy shartlar  $X(x)$  funksiya uchun quyidagini aniqlaydi

$$X(0) = X(l) \quad (1.2)$$

$U(x, t)$  ni tenglamaga quysak, u holda

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

$X(x)T(t) \neq 0$  deb, butenglikni  $X''(x)T(t) \neq 0$  ga bo'lamiz :

$$-\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \lambda.$$

Bu yerdan  $X(x)$  funksiya uchun quyidagi masalaga ega bo'lamiz

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \quad (1.3)$$

$$X(0) = X(l) = 0 \quad (1.4)$$

$T(t)$  funksiya uchun tenglama quyidagicha :

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad t > 0. \quad (1.5)$$

(1.3)-(1.4) masala, Shturm Liuvill masalasi deyiladi (1.3) tenglamaning umumiy yechimini ko'rinishi quyidagicha .

$$X(x) = c_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + c_2 \cos(\sqrt{\lambda}x) \quad \text{при } \lambda > 0 \quad (1.6)$$

$$X(x) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x} \quad \text{при } \lambda < 0 \quad (1.7)$$

$$X(x) = c_1 x + c_2 \quad \text{при } \lambda = 0 \quad (1.8)$$

$\lambda > 0$  bo'lganda  $X(0) = 0$ , chegaraviy shartdan

$$c_2 = 0, \Rightarrow X(x) = c_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) \text{ shuning uchun ikkinchi chegaraviy haddan}$$

$X(l)=0$ ,  $\sqrt{\lambda}l = \pi n$  -ni hosil qilamizki, Shturm Liuvill masalasining

cheksiz xos qiymatlar to'plamiga ega bo'lamiz.

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{l^2}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (1.9) \text{ Bunga}$$

Cheksiz xos funksiyalar to'plami mos keladi.

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (1.10)$$

$\lambda < 0$  bo'lganda chegaraviy shartdan  $c_2 = -c_1$ ,  $\Rightarrow X(x) = 2c_1 \operatorname{sh} \sqrt{-\lambda} x$ . Shuning uchun ikkinchi chegaraviy shartdan  $c_1 = 0$ , ni hosil qilamiz, ya'ni, Shturm Liuvill masalasi manfiy xos qiymatlarga ega emas.

$\lambda = 0$  bo'lganda chegaraviy shartdan  $c_2 = 0$ ,  $\Rightarrow X(x) = c_1 x$ . Shuning uchun ikkinchi chegaraviy shartdan  $c_1 = 0$ , ya'ni, Shturm Liuvill masalasi nolga teng bo'lgan xos qiymatga ega emas.

Shunday qilib biz (1.3) (1.4) masalalarning cheksiz netrivial yechimlari to'plamiga ega bo'ldik

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{l^2}, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right), \quad n \in \mathbb{N}$$

(1.5) masalani qarab chiqish qoldiki, u faqat  $\lambda = \lambda_n$ , bo'lganda ma'noga ega va biz :

$$T_n''(t) + \lambda_n a^2 T_n(t) = 0, \quad t > 0. \quad (1.11)$$

Masalalar oilasini hosil qilamiz

Bu bir jinsli ikkinchi tartibli chiziqli tenglamaning umumiy yeichimi quyidagicha :

$$T_n(t) = A_n \cos\left(\frac{\pi n a}{l} t\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi n a}{l} t\right), \quad t > 0, \quad (1.12)$$

Bu yerda  $A_n, B_n$  -ixtiyoriy o'zgarmaslar

2.Qadam (1.1) masalani yechamiz

(1.1) masalani yechimini  $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t)$ , t.e. ko'rinishda izlaymiz,

$$\text{Ya'ni } u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) \left( A_n \cos\left(\frac{\pi n a}{l} t\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi n a}{l} t\right) \right) \quad (1.13)$$

Masala shartlaridan biz hali boshlang'ich shartlaridan foydalanmadik

$u(x, 0) = \varphi(x)$ ,  $u_t(x, 0) = \psi(x)$ . . . funksiya uchun bular quyidagilarni ifodalaydi.

$$\varphi(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x), \quad (1.14)$$

$$\psi(x) = u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T'_n(0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n a \sqrt{\lambda_n} X_n(x). \quad (1.15)$$

Faraz qilamiz boshlang'ich shartlarga kiruvchi  $\varphi(x)$  va  $\psi(x)$ , funksiyalar

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n X_n(x), \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n X_n(x), \quad (1.16)$$

Qatorga yoyilsin .

Aniqlaymizki  $\alpha_n$ ,  $\beta_n$ . koefitsentlar qanday bo'lishi kerak. Bu uchun (1.16)

$X_m = \sin\left(\frac{\pi m x}{l}\right)$  ga  $L_2[0, l]$  ma'nosiga skalyar ko'paytramiz.

$$(\varphi, X_m) = \alpha_m \int_0^l \sin^2\left(\frac{\pi m x}{l}\right) dx = \frac{\alpha_m}{2} \int_0^l \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi m x}{l}\right)\right) dx = \frac{\alpha_m}{2} \int_0^l dx = \frac{l\alpha_m}{2},$$

Bu yerdan

$$\alpha_n = \frac{2}{l}(\varphi, X_n) = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx. \quad (1.17)$$

Xuddi shunday  $\beta_n$  uchun:

$$\beta_n = \frac{2}{l}(\psi, X_n) = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx. \quad (1.18)$$

Shunday qilib  $A_n$ ,  $B_n$  koefitsentlari uchun (1.13) tasvirdan yechimni

(1.14)-(1.16) ga quysak

$$A_n = \alpha_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx; \quad (1.19)$$

$$B_n = \frac{\beta_n}{a\sqrt{\lambda_n}} = \frac{2}{a\pi n} \int_0^l \psi(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx. \quad (1.20)$$

Endi qolgan narsa (1.19) (1.20) dagi topilgan  $A_n$ ,  $B_n$  larni (1.13) formulaga quyish qoldi

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, \\ u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (1.21)$$

Tenglamaning yechimini toping

3. Qadam  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$  tenglama  $u(0, t) = u_x(l, t) = 0$  chegaraviy shartlar bilan berilgan bo'lsin, u holda uning yechimi  $U(x, t) = X(x)T(t)$ . ko'rinishda izlaymiz. Shuni ta'kidlaymiz –funksiya uchun chegaraviy masala quyidagini ifodalaydi.

$$X(0) = X'(l) = 0. \quad (1.22) \quad \text{ni tenglamaga quysak, u holda}$$

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

$X(x)T(t) \neq 0$ , deb, bu tenglamani  $a^2 X(x)T(t) \neq 0$ : ga bo'lamiz.

$$-\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \lambda.$$

Bu yerda funksiya uchun

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad (1.23) \quad X(0) = X'(l) = 0, \quad (1.24)$$

Masalalarga ega bo'lamiz

$$\text{funksiya uchun esa, } T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad t > 0. \quad (1.25)$$

$$X(x) = c_1 \sin(\sqrt{\lambda} x) + c_2 \cos(\sqrt{\lambda} x) \quad \text{при } \lambda > 0; \quad (1.26)$$

$$X(x) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda} x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda} x} \quad \text{при } \lambda < 0; \quad (1.27)$$

$$X(x) = c_1 x + c_2 \quad \text{при } \lambda = 0; \quad (1.28)$$

$\lambda > 0$  bo'lganda, chegaraviy shartdan

$$c_2 = 0, \quad \Rightarrow \quad X(x) =$$

$$c_1 \sin(\sqrt{\lambda} x) \quad \Rightarrow \quad X'(x) = c_1 \sqrt{\lambda} \cos(\sqrt{\lambda} x) \quad \text{Shuning uchun ikkinchi}$$

chegaraviy shartdan  $X'(l) = 0$ ,  $\sqrt{\lambda} l = \pi \left(\frac{1}{2} + k\right)$ -ni hosil qilamizki, u

Shturm-Liuwill masalasining cheksiz xos qiymatlari to'plamlaridan iborat bo'lad.

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}\right)^2, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (1.29)$$

Bunga cheksiz xos funksiyalar to'plami mos keladi:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (1.30)$$

$\lambda < 0$  chegaraviy shartdan  
 $c_2 = -c_1, \Rightarrow X(x) = 2c_1 \operatorname{sh} \sqrt{-\lambda}x \Rightarrow X'(x) = 2c_1 \sqrt{-\lambda} \operatorname{ch}(\sqrt{-\lambda}x)$

Shuning uchun ikkinchi chegaraviy shartdan  $X'(l) = 0$   $c_1 = 0$ - Ya'ni, Shturm-Liuvill masalasi manfiy xos qiymatlarga ega emas .

$\lambda = 0$  bo'lganda chegaraviy shartdan

$c_2 = 0, \Rightarrow X(x) = c_1x \Rightarrow X'(x) = c_1$ . Shuning uchun ikkinchi chegaraviy shartdan  $X'(l) = 0$   $c_1 = 0$  ni hosil qilamiz ,ya'ni Shturm-Liuvill masalasinolga teng bo'lgan xos qiymatga ega emas

Shunday qilib ,biz (1.23) ,(1.24) masalalarining cheksiz netrivial yechimlar to'plamiga ega bo'ldik

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right), \quad n \in \mathbb{N}$$

(1.25)masalani qarab chiqish qoldi ,u faqat \_\_\_\_\_ bo'lganda ma'noga ega va biz

$$T_n''(t) + \lambda_n a^2 T_n(t) = 0, \quad t > 0. \quad (1.31)$$

Masalalar oilasini hosil qilamiz. Bu bir jinsli ikkinchi tartibli chiziqli tenglamaning yechimi quyidagicha bo'ladi.

$$T_n(t) = A_n \cos\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right), \quad t > 0, \quad (1.32)$$

Bu yerda  $A_n, B_n$  -lar ixtiyoriy o'zgarmaslar .

4. Qadam (1.21) maslani yechamiz (1.21) masalaning yechimini

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(t), \text{ ko'rinishda izlaymiz}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right) \left( A_n \cos\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) \right). \quad (1.33)$$

Masala shartlaridan biz faqat  $u(x, 0) = \varphi(x)$ ,  $u_t(x, 0) = \psi(x)$  boshlang'ich shartlardan foydalanmadik

funksiya uchun u quyidagini ifodalaydi.

$$\varphi(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x), \quad (1.34)$$

$$\psi(x) = u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T'_n(0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n a \sqrt{\lambda_n} X_n(x). \quad (1.35)$$

Faraz qilamiz  $\varphi(x)$ ,  $\psi(x)$ -boshlang'ich shartlarga kiruvchilar

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n X_n(x), \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n X_n(x), \quad (1.36)$$

Qatorga yoyilsin  $\alpha_n$ ,  $\beta_n$  koefsentlarining qanday ekanligini aniqlaymiz

.Buning uchun (1.36) ni  $X_m = \sin\left(\frac{\pi(2m-1)}{2l}x\right)$ -ga  $L_2[0, l]$  ga skalyar ko'paytramiz.

$$(\varphi, X_m) = \alpha_m \int_0^l \sin^2\left(\frac{\pi(2m-1)}{2l}x\right) dx = \frac{\alpha_m}{2} \int_0^l \left(1 - \cos\left(\frac{\pi(2m-1)}{l}x\right)\right) dx =$$

$$= \frac{\alpha_m}{2} \int_0^l dx = \frac{l\alpha_m}{2},$$

---

Bu yerdan  $\alpha_n = \frac{2}{l}(\varphi, X_n) = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right) dx. \quad (1.37)$

Xuddi shunday  $\beta_n$  uchun

$$\beta_n = \frac{2}{l}(\psi, X_n) = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right) dx. \quad (1.38)$$

Shu yul bilan (1.33) dan  $A_n$ ,  $B_n$  koefsentlari uchun yechim uchun quyidagilarni hosil qilamiz

$$A_n = \alpha_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right) dx; \quad (1.39)$$

$$B_n = \frac{\beta_n}{a\sqrt{\lambda_n}} = \frac{4}{a\pi(2n-1)} \int_0^l \psi(x) \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right) dx. \quad (1.40)$$

Qolgan narsa ,(1.39),(1.40) dan topilga  $A_n, B_n$  koefsentlari (1.33) ga qo'yish qoldi.

645

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, \\ u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = x, \quad u_t(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{2l} + \sin \frac{3\pi x}{2l}. \end{cases} \quad (1.41)$$

Tenglamaning  $U(x, t)$  yechimni toping

Berilgan masala №649<sup>m</sup>. masalaning xususiy holidir .Shuning uchunbiz birdan (1.33) (1.39) (1.44) masalani javobini chiqarish uchun foydlanamiz (1.31) bo'yicha  $A_n$ :- koefsentlarini topamiz

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l x \sin\left(\frac{\pi(2n-1)}{2l}x\right) dx =$$

$$= \frac{2}{l} \left[ -\frac{2l}{(2n-1)\pi} x \cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}x\right) \Big|_{x=0}^{x=l} + \frac{2l}{(2n-1)\pi} \int_0^l \cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}x\right) dx \right] =$$

$$= \frac{2}{l} \left[ \frac{4l^2}{(2n-1)^2\pi^2} \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}x\right) \Big|_{x=0}^{x=l} \right] = \frac{2}{l} \left[ \frac{4l^2}{(2n-1)^2\pi^2} (-1)^{n+1} \right] = \frac{8l}{(2n-1)^2\pi^2} (-1)^n \quad (1.42)$$

$B_n$ , -ni topishda  $\psi(x)$ -funksiya  $X_n(x) = \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}x\right)$ funksiya bo'yicha

qatorga yoyilgandeb aytamiz

$$\psi(x) = \sin \frac{\pi x}{2l} + \sin \frac{3\pi x}{2l}. \quad (1.43)$$

Shunday qilib  $\beta_1 = \beta_2 = 1, \beta_3 = \beta_4 = \dots = 0$ bu yerdan ,yani

$$B_n = \beta_n \frac{2l}{\pi(2n-1)a}$$

$$B_1 = \frac{2l}{\pi a}, \quad B_2 = \frac{2l}{3\pi a}, \quad B_3 = B_4 = \dots = 0. \quad (1.44)$$

Topilgan  $A_n$  va  $B_n$  larni

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right) \left( A_n \cos\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) \right).$$

Ga quyamiz.

Javobni hosil qilamiz.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi(2n-1)x}{2l}\right) \left( \frac{8l}{(2n-1)^2\pi^2} (-1)^{n+1} \cos\left(\frac{\pi(2n-1)a}{2l}t\right) \right) + \frac{2l}{a\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2l}x\right) \sin\left(\frac{\pi a}{2l}t\right) + \frac{2l}{3a\pi} \sin\left(\frac{3\pi}{2l}x\right) \sin\left(\frac{3\pi a}{2l}t\right).$$

1 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l$ ,  $t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \sin\frac{\pi}{7}x, \quad u_t(x, 0) = \sin\frac{\pi}{7}x + \sin\frac{3\pi}{7}x.$$

Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l$ ,  $t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + (Ax + B)\sin t + Cx + D, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u(0, t) = U_1(t), \quad u(l, t) = U_2(t),$$

$$u(x, 0) = l^{-1}(U_2(0) - U_1(0))x + U_1(0), \quad u_t(x, 0) = V,$$

$$\text{r) } A = 1, B = 0, C = 2, D = 1, U_1 = \sin t, U_2 = 2,$$

$$\text{d) } A = 0, B = -1, C = 1, D = 0, U_1 = \cos t, U_2 = l \sin t.$$

2 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l$ ,  $t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_x(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \cos\frac{\pi}{2l}x + \cos\frac{3\pi}{2l}x, \quad u_t(x, 0) = \cos\frac{3\pi}{2l}x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 2x + 1, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = 1, \quad u_x(1, t) = 2,$$

$$u(x, 0) = 2x + 1.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + x + 1, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 1,$$

$$u(x, 0) = x.$$

3 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l$ ,  $t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u(0, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \sin\frac{\pi}{2l}x, \quad u_t(x, 0) = \sin\frac{\pi}{2l}x + \sin\frac{3\pi}{2l}x.$$



$$\begin{aligned}
u_t &= a^2 u_{xx} + 2x + 1, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\
u_x(0, t) &= 2, u(1, t) = 1, \\
u(x, 0) &= 2x - 1.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_t &= a^2 u_{xx} + x + 2, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\
u(0, t) &= 0, u_x(1, t) = 1, \\
u(x, 0) &= x.
\end{aligned}$$

4 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$\begin{aligned}
u_x(0, t) &= u_x(l, t) = 0, \\
u(x, 0) &= 2 + \cos \frac{\pi}{l} x, u_t(x, 0) = 1 + \cos \frac{2\pi}{l} x.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_t &= a^2 u_{xx} + t, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\
u(0, t) &= 2t, u(1, t) = 1, \\
u(x, 0) &= x - 3 \sin 2\pi x.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_t &= a^2 u_{xx} + 2xt, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\
u_x(0, t) &= -1, u(1, t) = t, \\
u(x, 0) &= 1 - x - \cos \frac{7\pi}{2} x.
\end{aligned}$$

5 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$\begin{aligned}
u(0, t) &= u(l, t) = 0, \\
u(x, 0) &= \sin \frac{2\pi}{l} x, u_t(x, 0) = x.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_t &= a^2 u_{xx} + 2t^3, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\
u(0, t) &= 1, u_x(1, t) = 2t, \\
u(x, 0) &= 1 + \sin \frac{5\pi}{2} x.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_t &= u_{xx} + t^2 - 1, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\
u_x(0, t) &= 5, u_x(1, t) = -1, \\
u(x, 0) &= 2 + 5x - 3x^2.
\end{aligned}$$

6 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$\begin{aligned}
u_x(0, t) &= u(l, t) = 0, \\
u(x, 0) &= 0, u_t(x, 0) = \cos \frac{3\pi}{2l} x + \cos \frac{5\pi}{2l} x.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_t &= a^2 u_{xx} + 2t^2, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\
u(0, t) &= t, u(1, t) = 2t, \\
u(x, 0) &= 2 \sin \pi x - \sin 3\pi x.
\end{aligned}$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + t, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 2t, u(1, t) = 1,$$

$$u(x, 0) = 1 + 2\cos\frac{5\pi}{2}x.$$

7 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = 1 + \cos\frac{2\pi}{l}x, u_t(x, 0) = \cos\frac{\pi}{l}x + \cos\frac{2\pi}{l}x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 2xt, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = 2t, u_x(1, t) = 1,$$

$$u(x, 0) = x - 2\sin\frac{3\pi}{2}x.$$

$$u_t = u_{xx} + 3t - 1, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 2, u_x(1, t) = 2,$$

$$u(x, 0) = 1 + 2x - 2\cos 3\pi x.$$

8 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \sin\frac{2\pi}{l}x + \sin\frac{3\pi}{l}x, u_t(x, 0) = \sin\frac{2\pi}{l}x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 2x + 1, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = 1, u(1, t) = 2,$$

$$u(x, 0) = x + 1.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + x + 2, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 1, u(1, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = x - 1.$$

9 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \sin\frac{\pi}{l}x, u_t(x, 0) = \sin\frac{\pi}{l}x + \sin\frac{3\pi}{l}x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 3t, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = 1, u(1, t) = t,$$

$$u(x, 0) = 1 - x + \sin 4\pi x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 2xt, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 2t, u(1, t) = t,$$

$$u(x, 0) = 4\cos\frac{3\pi}{2}x.$$

10 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_x(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \cos \frac{\pi}{2l}x + \cos \frac{3\pi}{2l}x, u_t(x, 0) = \cos \frac{3\pi}{2l}x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + t^2, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = t, u_x(1, t) = 2t,$$

$$u(x, 0) = 4 \sin \frac{9\pi}{2}x.$$

$$u_t = u_{xx} + 2t, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 3, u_x(1, t) = 1,$$

$$u(x, 0) = 1 + 3x - x^2.$$

11 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u(0, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \sin \frac{\pi}{2l}x, u_t(x, 0) = \sin \frac{\pi}{2l}x + \sin \frac{3\pi}{2l}x.$$

12 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = 2 + \cos \frac{\pi}{l}x, u_t(x, 0) = 1 + \cos \frac{2\pi}{l}x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 2t, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = t^2, u(1, t) = 1,$$

$$u(x, 0) = x - \sin \pi x + 2 \sin 5\pi x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + t, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 2, u(1, t) = t^2,$$

$$u(x, 0) = 2x - 2 + \cos \frac{5\pi}{2}x.$$

13 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \sin \frac{2\pi}{l}x, u_t(x, 0) = x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + x + t, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = 2t^2, u_x(1, t) = t,$$

$$u(x, 0) = \sin \frac{\pi}{2}x - 3 \sin \frac{3\pi}{2}x.$$

$$u_t = u_{xx} + t - 2, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 0, u_x(1, t) = 2,$$

$$u(x, 0) = 1 + x^2 - \cos 3\pi x + 2 \cos 4\pi x.$$

14 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_x(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \cos \frac{3\pi}{2l}x + \cos \frac{5\pi}{2l}x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} - 2x + 2, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = 2t, u(1, t) = t^2,$$

$$u(x, 0) = \sin 2\pi x - 2\sin 3\pi x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + tx - 1, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = t^2, u(1, t) = 1,$$

$$u(x, 0) = 1 - \cos \frac{\pi}{2}x.$$

15 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = 1 + \cos \frac{2\pi}{l}x, u_t(x, 0) = \cos \frac{\pi}{l}x + \cos \frac{2\pi}{l}x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 5xt, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = 1, u_x(1, t) = 2t^2,$$

$$u(x, 0) = 1 + \sin \frac{5\pi}{9}x.$$

$$u_t = u_{xx} + 2t^2 + 3, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 2, u_x(1, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = 2 + 2x - x^2 - 4\cos 2\pi x.$$

16 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \sin \frac{2\pi}{l}x + \sin \frac{3\pi}{l}x, u_t(x, 0) = \sin \frac{2\pi}{l}x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 4xt, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u(0, t) = 3, u(1, t) = t^2,$$

$$u(x, 0) = 3 - 3x + 2\sin \pi x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 4xt + 1, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 2t^2, u(1, t) = t,$$

$$u(x, 0) = \cos \frac{5\pi}{2}x - \cos \frac{7\pi}{2}x.$$

17 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + Ax + B, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u(0, t) = U_1, u(l, t) = U_2,$$

$$u(x, 0) = U_1(1 - l^{-1}x) + U_2 l^{-1}x, u_t(x, 0) = 0,$$

a)  $A = 2, B = 1, U_1 = 1, U_2 = 0,$

б)  $A = 1, B = 2, U_1 = 0, U_2 = 1,$

в)  $A = 1, B = 0.$

18 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + Ax + B, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = U,$$

$$u(x, 0) = U, u_t(x, 0) = V,$$

a)  $A = 2, B = 1, U = 1, V = 0$

б)  $A = 3, B = 1, U = 2, V = 1$

в)  $A = 1, B = 0, U = 1, V = 2.$

19 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + Ax + B, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u(0, t) = U, u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = U, u_t(x, 0) = V,$$

a)  $A = 2, B = 1, U = 1, V = 0$

б)  $A = 4, B = 1, U = 2, V = 1$

в)  $A = 1, B = 0, U = 1, V = 2.$

20 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + A \sin x + B, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u(0, t) = U_1, u(l, t) = U_2,$$

$$u(x, 0) = U_1(1 - l^{-1}x) + U_2 l^{-1}x, u_t(x, 0) = V,$$

a)  $A = 2, B = 1, U_1 = 1, U_2 = 0,$

б)  $A = 1, B = 2, U_1 = 0, U_2 = 1,$

в)  $A = 1, B = 0.$

21 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + A \cos x + B, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 0, u(l, t) = U,$$

$$u(x, 0) = U, u_t(x, 0) = V,$$

- a)  $A = 3, B = 1, U = 1, V = 0$   
 б)  $A = 1, B = 2, U = 2, V = 3$   
 в)  $A = 1, B = 0, U = 1, V = 2.$

22 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + A \sin x + B, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u(0, t) = U, u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = U, u_t(x, 0) = V,$$

- a)  $A = 1, B = 3, U = 1, V = 0$   
 б)  $A = 2, B = 1, U = 2, V = 1$   
 в)  $A = 1, B = 0, U = 1, V = 2.$

23 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + A \cos x + B, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = U, u_t(x, 0) = V,$$

- a)  $A = 3, B = 1, U = 1, V = 0$   
 б)  $A = 1, B = 2, U = 2, V = 3$   
 в)  $A = 1, B = 0, U = 1, V = 2.$

24 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + (Ax + B) \sin t + Cx + D, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u(0, t) = U_1(t), u(l, t) = U_2(t),$$

$$u(x, 0) = l^{-1}(U_2(0) - U_1(0))x + U_1(0), u_t(x, 0) = V,$$

- a)  $A = 2, B = 1, C = 4, D = 3, U_1, U_2 = const,$   
 б)  $A = 0, B = 2, C = 2, D = 1, U_1 = \sin t, U_2 = 1,$   
 в)  $A = 0, B = 0, C = 0, D = 1, U_1 = \sin t, U_2 = cost,$

25 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + (Ax + B) \sin t + Cx + D, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 0, u(l, t) = U(t),$$

$$u(x, 0) = U(0), u_t(x, 0) = V,$$

- a)  $A = 2, B = 1, C = 4, D = 0, U = \text{const},$   
 б)  $A = 1, B = 0, C = 2, D = 1, U = \sin t,$   
 в)  $A = 2, B = 0, C = 1, D = 0, U = \sin t + 1,$

26 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + (Ax + B) \sin t + Cx + D, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u(0, t) = U(t), u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = U(0), u_t(x, 0) = V,$$

- a)  $A = 2, B = 1, C = 3, D = 1, U = \text{const},$   
 б)  $A = 1, B = 1, C = 0, D = 1, U = 2 \sin t,$   
 в)  $A = 4, B = 0, C = 1, D = 0, U = 2 \sin t + 1,$

27 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + (Ax + B) \sin t + (Cx + D) \cos 2t, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = V,$$

- a)  $A = 2, B = 1, C = 0, D = 1,$   
 б)  $A = 1, B = 2, C = 1, D = 0,$   
 в)  $A = 1, B = 0, C = 0, D = 2,$

28 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + (Ax + B) \cos t + C \sin x + D, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u(0, t) = U_1(t), u(l, t) = U_2(t),$$

$$u(x, 0) = l^{-1}(U_2(0) - U_1(0))x + U_1(0), u_t(x, 0) = 0,$$

- a)  $A = 2, B = 1, C = 3, D = 0, U_1, U_2 = \text{const},$   
 б)  $A = 0, B = 1, C = 4, D = 1, U_1 = \cos t, U_2 = 2,$   
 в)  $A = 0, B = 0, C = 0, D = 1, U_1 = \sin t, U_2 = \cos t,$

29 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + (Ax + B)\cos t + C\sin x + D, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 0, u(l, t) = U(t),$$

$$u(x, 0) = U(0), u_t(x, 0) = 0,$$

- a)  $A = 2, B = 1, C = 3, D = 1, U = \text{const},$   
 б)  $A = 1, B = 0, C = 4, D = 1, U = \cos t,$   
 в)  $A = 3, B = 0, C = 1, D = 0, U = 2\cos t + 1,$

30 Qo'yidagi chegaraviy va boshlang'ich shartlarda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$  bir jinsli bo'lmagan tebranish tenglamasi uchun chegaraviy masalani yeching

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + (Ax + B)\cos t + C\cos x + D, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u(0, t) = U(t), u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = U(0), u_t(x, 0) = 0,$$

- a)  $A = 1, B = 1, C = 4, D = 0, U = \text{const},$   
 б)  $A = 1, B = 2, C = 2, D = 1, U = \cos t,$   
 в)  $A = 1, B = 0, C = 1, D = 0, U = 2\cos t - 1,$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = (l - x) \sin \frac{\pi x}{l}, \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + t \sin \frac{\pi x}{2}, a = 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$3) U_t = U_{xx} + \cos \frac{\pi x}{2}, U(x, 0) = x^2 \sin \pi x, U(0, t) = 0, U(l, t) = 0, x \in [0, 1], t \in [0; 0.4]$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x \sin(l - x), \frac{\partial y}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t + 5)x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$3) U_t = U_{xx} + \sin \frac{\pi x}{2}, U(x, 0) = 1, 2x^2 \sin \pi x, U(0, t) = 0, U(l, t) = e^{-0.1} \sin \frac{\pi t}{4}, x \in [0, 2], t \in [0; 0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 4, U(0, x) = 2(l - x) \sin x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t^2 - 1)x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$3) U_t = U_{xx} + \sin \frac{\pi x}{2}, U(0, x) = 4x \sin \pi x, U(0, t) = 1, U(l, t) = 2, x \in [0, 1], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 10, U(0, x) = 10x, U(t, 0) = U(t, l) = 0, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + 10(t - 1) \cos 2x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$3) U_t = U_{xx} + 2x + t, U(x, 0) = 0, 5x^4 + 1, U(0, t) = t, U(l, t) = \sin 2t, x \in [0, 1], t \in [0, 2].$$



- 1)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1, 5, U(0, x) = 2(x + 3), \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = \sin x, U(t, 0) = U(t, l) = 1.$
- 2)  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + tx^2, a = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 3)  $U_t = U_{xx} + t \sin x, U(x, 0) = x(1 - x), U(0, t) = \sqrt{t}, U(l, t) = t, x \in [0; 0, 5], t \in [0, 1]$
- 1)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = \cos 2x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = x, U(t, 0) = U(t, l) = t.$
- 2)  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2 x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 3)  $U_t = U_{xx} + e^{-0,3x} \sin x, U(x, 0) = x^2, U(0, t) = 1, U(l, t) = 5t, x \in [0; 1], t \in [0, 3]$
- 1)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x^2, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = \frac{1}{x}, U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 2)  $U_{tt} = a^2 U_{xx} - 50(l - x) \sin 4t, a = 1, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 3)  $U_t = U_{xx} + \sin \frac{\pi x}{12}, U(x, 0) = x \sin \pi x, U(0, t) = 0, 5, U(l, t) = e^{-t}, x \in [0; 1], t \in [0, 2].$
- 1)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1, U(0, x) = \frac{x}{2}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0,$
- 2)  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2 x^2, a = 3, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 3)  $U_t = U_{xx} + t \sin 2x, U(x, 0) = 3x(2 - x), U(0, t) = t^2, U(l, t) = \cos t, x \in [0; 1], t \in [0, 2].$
- 1)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = 2 \cos 2, 5x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 2)  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + t, a = 1, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 3)  $U_t = U_{xx} + \sin \frac{\pi x}{6}, U(x, 0) = 4x^2, U(0, t) = t + 1, U(l, t) = \sin t, x \in [0; 1], t \in [0, 2].$
- 1)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1.5, U(0, x) = x \sin \frac{\pi x}{l}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 2)  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t^2 + 1) \sin 2x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 3)  $U_t = U_{xx} + e^{-x}, U(x, 0) = \sqrt{x}, U(0, t) = 2t - 1, U(l, t) = 2 \sin t, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$
- 1)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = 2(l - x) \sin x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 2)  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + 2x \cos t, a = 1, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 3)  $U_t = U_{xx} + t \sin 3x, U(x, 0) = 2x, U(0, t) = -1, U(l, t) = t + 1, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$
- 1)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2.5, U(0, x) = x \cos \frac{\pi x}{2l}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 2)  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + (x + 2) \sin t, a = 2, l = \pi, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
- 3)  $U_t = U_{xx} + (t + 1) \sin x, U(x, 0) = x(1 - x), U(0, t) = t, U(l, t) = \cos \sqrt{t}, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x + 2, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2 x, a = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$3) U_t = U_{xx} + t \sin 3x, U(x, 0) = x^4, U(0, t) = 0, l = 1, U(l, t) = e^{-0.3t}, x \in [0; 2], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = e^x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + \sin t, a = 1, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi.$$

$$3) U_t = U_{xx} + t + x, U(x, 0) = \sqrt{x}, U(0, t) = t, U(l, t) = 4, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = e^{x+1}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 1, U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + (x + 4) \cos 3t, a = 1, l = \frac{\pi}{2}, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$3) U_t = U_{xx} + xt, U(x, 0) = x^2, U(0, t) = t, U(l, t) = 1, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = x^2, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$3) U_t = U_{xx} + tx, U(x, 0) = 3x, U(0, t) = t - 1, U(l, t) = \sin 2t, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 4, U(0, x) = x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \frac{\pi}{2}.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + x \sin 2t, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = 1.$$

$$3) U_t = U_{xx} + 2x(t + 1), U(x, 0) = x, U(0, t) = t, U(l, t) = \sin t, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = 2x + 1, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + te^x, a = 1, l = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$3) U_t = U_{xx} + t\sqrt{x}, U(x, 0) = x^2, U(0, t) = t + 1, U(l, t) = e^{-t}, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = 2.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + e^x \sin t, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$3) U_t = U_{xx} + t^2 x, U(x, 0) = x, U(0, t) = t - 1, U(l, t) = \sqrt{t}, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + e^x \cos 2t, a = 4, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi.$$

$$3) U_t = U_{xx} - x^3 t, U(x, 0) = t, U(0, t) = 1, U(l, t) = 2x, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = \sin 2x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \frac{\pi}{2}.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + 2x \cos t, a = 1, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi.$$

$$3) U_t = U_{xx} + t \sin x, U(x, 0) = x^4, U(0, t) = t, U(l, t) = t^2, \\ x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 4, U(0, x) = x \cos \frac{\pi x}{l}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + x \cos 2t, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi.$$

$$3) U_t = U_{xx} + t^2 \sin x, U(x, 0) = 3x, U(0, t) = 2t, U(l, t) = \sqrt{t}, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$1) U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x(l - x), \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = 1.$$

$$2) U_{tt} = a^2 U_{xx} + e^x \sin t, a = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = 1.$$

$$3) U_t = U_{xx} + tx, U(x, 0) = x, U(0, t) = 3t, U(l, t) = t/2, x \in [0; 1], t \in [0, 1].$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 6t, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = 4t^2, u_x(1, t) = 1, \\ u(x, 0) = x + 4 \sin \frac{3\pi}{2} x.$$

$$u_t = u_{xx} + t - 2, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\ u_x(0, t) = 1, u_x(1, t) = 3, \\ u(x, 0) = 3 + x + x^2 - 2 \cos 4\pi x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} - 2x(t - 2), \quad 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = t^2, u(1, t) = 4t, \\ u(x, 0) = 4 \sin 3\pi x - 3 \sin 5\pi x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 1, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = t, u_x(1, t) = t^2, \\ u(x, 0) = 3 \sin \frac{\pi}{2} x - \sin \frac{11\pi}{2} x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + xt^2, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = 2, u(1, t) = t^3, \\ u(x, 0) = 2 - 2x - \sin 5\pi x.$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + 2, \quad 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = 2t, u_x(1, t) = t^3, \\ u(x, 0) = \sin \frac{3\pi}{2} x - 2 \sin \frac{7\pi}{2} x.$$

$$u_t = u_{xx} + t + 1, \quad 0 < x < 1, t > 0,$$

$$u_x(0, t) = -1, u_x(1, t) = 1,$$

$$u(x, 0) = 2 - x + x^2 - 3\cos 4\pi x.$$

### Oraliq nazorat savollari.

1. Xususiy xosilali differensial tenglamalar. Asosiy ta'riflar.
2. Birinchi tartibli kvazichizqli tenglamalar (Bir jinsli, bir jinsli bulmagan, umumiy yechim)
3. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (giperbolik tenglamalar).
4. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (elliptik tenglamalar).
5. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (parabolik tenglamalar).
6. Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi (umumiy, kvazichizqli, chizikli, bir jinsli, bir jinsli bulmagan tenglamalarning ta'riflari, tenglamalarning tiplari).
7. Tebranish tenglamalar uchun masalalarning qo'yilishi (Ideal tor tebranish tenglamasi, elastik membrana tebranish tenglamasi, boshlang'ich shartlar, chegaraviy shartlar, birinchi chegaraviy masala, yarim to'g'ri chiziq, Koshi masalasi).
8. Tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasi yechimining mafjudligi, yagonaligi va turg'unligi. Dalamber formulasi.
9. Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglamalarning xarakteristikasi (xarakteristik tenglama, xarakteristik uchburchak, Dalamber formulasi, issiqlikni o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun Koshi masalasi)
10. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chizqdagi masala. Davom ettirish usuli. Birinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, Dalamber formulasi).
11. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chizqdagi masala. Davom ettirish usuli. Ikkinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, Dalamber formulasi).
12. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Yechimini mavjudligini isbotlash uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli.
13. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Mavjudlik teoremasi.
14. Energiya integrali. Tebranish tenglamasi uchun umumiy birinchi chegaraviy masalalarning yechimini mavjudligi.
15. Chizikli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi. Integral tenglamalarning ekvivalent sistemasi (Gursa masalasi, chizikli bulmagan giperbolik tenglama)
16. Chizikli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining mavjudligi.
17. Chizikli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining yagonaligi.

18. Qo'shma differensial operator (differensial operator, qo'shma operator, o'z-o'ziga qo'shma operator)
19. Chizikli algebrada berilgan qo'shma operator va qo'shma differensial operatorlarnin bog'lanishi.
20. Riman usuli.
21. Umumlashgan yechim. Limitga o'tish ko'rinishdagi umumlashgan yechim.
22. Umumlashgan yechim. Integral ayniyat manosida berilgan umumlashgan yechim.
23. Parabolik tipdagi tenglamalar. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasining chiqarilishi.
24. Parabolik tipdagi tenglamalar. Bir fazoviy o'zgaruvchili issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi.
25. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masala. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining mavjudligi.
26. Parabolik tipdagi tenglamalar. O'zgaruvchilarning ajratish usuli.
27. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun maksimal qiymat prinsipi.
28. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining yagonaligi.
29. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining turg'unligi.
30. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun umumiy chegaraviy masalani yechimining yagonaligi (bir jinsli bulmagan tenglama)
31. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun bir jinsli Koshi masalasi
32. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) ( $u(x, t)$  funksiya va uning xususiy xosilalari  $\Pi_{L, t_0, T}$  sohada uzluksiligini isbotlash.)
33. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) ( $\forall x_0 \in \mathbb{R} \lim_{\substack{t \rightarrow 0+ \\ x \rightarrow x_0}} u(x, t) = \phi(x_0)$ .)
34. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) (teoremani keltirib natijalarni isbotlash)
35. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining yagonaligi
36. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi
37. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun ikkinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi
38. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 1 va 2 xossalar
39. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 3 va 4 xossalar
40. Laplas va Puasson tenglamalari. Garmonik funksiya
41. Chegaraviy masalalar qo'yilishi.  $E^3$  va  $E^2$  fazolarda Dirixle va Neyman masalalari.
42. Laplas teglamasining fundamental yechimi
43. Birinchi va ikkinchi Grin formulalar.
44. Uchinchi Grin formulasi. Ikki ulchovli fazoda Grin formulalar.

45. Garmonik funksiyalarning xossalari 1 i 2 (o'rtta qymat hakidagi teorema) xossalar
46. Garmonik funksiyalar. Uchinchi xossa. Garmonik funksiyalar uchun ekstremum prinsipi
47. Dirixle ichki masalani yechimining yagonaligi.
48. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligini isbotlash uchun zarur bulgan Lemma
49. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligi
50. Fazoda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi
51. Tekislikda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi
52. Neyman ichki masalasi. Yechiluvchanlikning zaruriy sharti
53. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi.
54. Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasi va uning xossalari. Dirixle ichki masalasi uchun Grin funksiyasi

55. Grin funksiyaning xossalari. 1.  $G(M, P) > 0, M, P \in \Omega, P \neq M.$
56. Grin funksiyaning xossalari. 2.

$$G(M, P) = G(P, M) \quad \forall M, P \in \Omega, M \neq P.$$

57. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichlik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali
58. Tekislikdagi ikkilangan qatlam potentsiali:

$$u(M) = - \int_L f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) dl_P.$$

59. Tekis yaqinlashuvchi integralning ta'rifi va qo'yidagi  $\int F(P, M) dl_P$  integral uzluksuzligi haqidagi teorema

60. Potensial xossalari. ( $u(M) - f(M_0)u_e(M)$  funksiya  $M_0$  nuqtada usluksizligi haqidagi teorema)

61. Dirixle ichki masalani 2-chi tur Fredgolm integral tenglamaga keltirish.

62.  $x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} - 3y^2 u_{yy} - 2xu_x + 4yu_y + 16x^2 u = 0.$

63.  $tg^2 x u_{xx} - 2y tg x u_{xy} + y^2 u_{yy} + tg^3 x u_x = 0.$

64.  $u_{xx} - 2 \sin x \cdot u_{xy} - (3 + \cos^2 x) u_{yy} - \cos x \cdot u_y = 0.$

65.  $e^y u_{xy} - u_{yy} + u_y = 0.$

66.  $u_{xx} + 2 \cos x \cdot u_{xy} - \sin^2 x \cdot u_{yy} - \sin x \cdot u_y = 0.$

67.  $4y^2 u_{xx} + 2(1 - y^2) u_{xy} - u_{yy} - \frac{2y}{1+y^2} (2u_x - u_y) = 0.$

68.  $U_{xy} - U_{yy} + 2U_x - U_y = 0.$

69.  $3U_{xx} + U_{xy} + U_y = 0.$

70.  $U_{xx} - 8U_{xy} + U_y - U_x = 0.$

71.  $U_{xx} - 4U_{yy} + U_x = 0.$

72.  $U_{xx} - 2U_{xy} + U_{yy} + U_y = 0.$
73.  $2U_{xx} + 2U_{xy} + 5U_{yy} = 0.$
74.  $x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} - 2yu_x = 0.$
75.  $(1 + x^2)u_{xx} + (1 + y^2)u_{yy} + xu_x + yu_y = 0.$
76.  $u_{xx} - (1 + y^2)^2u_{yy} - 2y(1 + y^2)u_y = 0.$
77.  $y^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + x^2u_{yy} = 0.$
78.  $(1 + x^2)^2u_{xx} + u_{yy} + 2x(1 + x^2)u_x = 0.$
79.  $3u_{xx} - 4u_{xy} + u_{yy} - 3u_x + u_y = 0.$
80.  $e^{-2x}u_{xx} - e^{-2y}u_{yy} - e^{-2x}u_x + e^{-2y}u_y + 8e^y = 0.$
81.  $u_{xx} - 2\cos x \cdot u_{xy} - (3 + \sin^2 x)u_{yy} + u_x + (\sin x - \cos x - 2)u_y = 0.$
82.  $u_{xx} + 2\sin x \cdot u_{xy} - (\cos^2 x - \sin^2 x)u_{yy} + \cos x \cdot u_y = 0.$
83.  $e^{2x}u_{xx} + 2e^{x+y}u_{xy} + e^{2y}u_{yy} - xu = 0.$
84.  $u_{xx} - 2\sin x \cdot u_{xy} - \cos^2 x \cdot u_{yy} - \cos x \cdot u_y = 0.$
85.  $u_{xx} - 2xu_{xy} = 0.$
86.  $2u_{xx} - 5u_{xy} + 3u_{yy} - u_x + u_y + 2x = 0.$
87.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} - 3u_x + 12u_y = 0.$
88.  $5u_{xx} + 16u_{xy} + 16u_{yy} + 24u_x + 32u_y = 0.$
89.  $u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} - 2u_x - 2u_y = 0.$
90.  $3u_{xx} + u_{xy} + 3u_x + u_y + y = 0.$
91.  $u_{xx} + u_{xy} - u_y + 4x = 0.$
92.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_x + 4e^y = 0.$
93.  $u_{xx} - 6u_{xy} + 8u_{yy} + u_x - 2u_y + x = 0.$
94.  $u_{yy} - 2u_{xy} + 2u_x - u_y - 4e^x = 0.$
95.  $3u_{xx} + 10u_{xy} + 3u_{yy} + u_x + u_y + 2x + y = 0.$
96.  $3u_{xx} - 10u_{xy} + 3u_{yy} - 2u_x + 4u_y + 2y = 0.$
97.  $2u_{xx} + 6u_{xy} + 4u_{yy} + u_x + u_y = 0.$
98.  $2u_{xy} - 4u_{yy} + u_x - 2u_y + x = 0.$
99.  $u_{xx} - 6u_{xy} + 9u_{yy} - u_x + 2u_y = 0.$
100.  $u_{xx} - 4u_{xy} + 5u_{yy} - 3u_x + u_y = 0.$
101.  $u_{xx} + 4u_{xy} + 13u_{yy} + 3u_x + 24u_y + 9(x + y) = 0.$
102.  $u_{xx} - u_{yy} + u_x + u_y = 0.$
103.  $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + 3u_x - 5u_y = 0.$
104.  $2u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + 4u_x + 4u_y = 0.$

105.  $u_{xy} + 2u_{yy} - u_x + 4u_y = 0.$   
 106.  $u_{xx} + 2u_{xy} + 10u_{yy} - 24u_x + 42u_y + 2(x + y) = 0.$   
 107.  $9u_{xx} - 6u_{xy} + u_{yy} + 10u_x - 15u_y + x - 2y = 0.$   
 108.  $u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} - 3u_x - 15u_y + 27x = 0.$   
 109.  $2u_{xx} + 3u_{xy} + u_{yy} + 7u_x + 4u_y = 0.$   
 110.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + 9u_x + 9u_y = 0.$   
 111.  $u_{xx} + 2u_{xy} + 5u_{yy} - 32u_y = 0.$   
 112.  $u_{xx} + 4u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y - x^2y = 0.$

113. 
$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, \\ \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}, \\ y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = y'\left(\frac{5\pi}{2}\right) = 0. \end{cases}$$

114.  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$  bu tenglamani qo'iydagi ko'rinishga keltiring:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = F_2(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}).$$

115. 
$$x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

116.  $4u_{xx} + 3u_{xy} - u_{yy} = 0,$

117.  $36u_{xx} - 12u_{xy} + u_{yy} + 18u_x - 3u_y = 0,$

118. 
$$y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

119.  $(1 + x^2) u_{xx} + (1 + y^2) u_{yy} + yu_y = 0;$

120.  $x^2 u_{xx} - 2xu_{xy} + u_{yy} = 0;$

121.  $y^2 u_{xx} + 2yu_{xy} + u_{yy} = 0;$

122.  $4y^2 u_{xx} - e^{2x} u_{yy} = 0;$

123.  $x^2 u_{xx} + y^2 u_{yy} = 0;$

124.  $xu_{xx} - yu_{yy} = 0;$

125.  $u_{xx} - yu_{yy} = 0;$

126.  $u_{xx} + 2u_{xy} + 2u_{yy} + u_x = 0$

127. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) ( $u(x, t)$  funksiya va uning xususiy xosilalari  $\Pi_{L, t_0, T}$  sohada uzluksiligini isbotlash.)



128. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) ( $\forall x_0 \in \mathbb{R} \lim_{\substack{t \rightarrow 0+ \\ x \rightarrow x_0}} u(x, t) = \phi(x_0)$ )
129. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) (teoremani keltirib natijalarni isbotlash)
130. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining yagonaligi
131. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi
132. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun ikkinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi
133. Parabolik tipdagi tenglamalar. O'zgaruvchilarning ajratish usuli.
134. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun maksimal qiymat prinsipi.
135. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining yagonaligi.
136. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining turg'unligi.
137. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun umumiy chegaraviy masalani yechimining yagonaligi (bir jinsli bulmagan tenglama)
138. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun bir jinsli Koshi masalasi.
139. Uchinchi Grin formulasi. Ikki ulchovli fazoda Grin formulalar.
140. Garmonik funksiyalarning xossalari 1 i 2 (o'rta qymat hakidagi teorema) xossalar
141. Garmonik funksiyalar. Uchinchi xossa. Garmonik funksiyalar uchun ekstremum prinsipi
142. Dirixle ichki masalani yechimining yagonaligi.
143. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligini isbotlash uchun zarur bulgan Lemma
144. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligi
145. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 1 va 2 xossalar
146. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 3 va 4 xossalar
147. Laplas va Puasson tenglamalari. Garmonik funksiya
148. Chegaraviy masalalar qo'yilishi.  $E^3$  va  $E^2$  fazolarda Dirixle va Neyman masalalari.
149. Laplas teglamasining fundamental yechimi
150. Birinchi va ikkinchi Grin formulalar.
151. Grin funksiyaning xossalari. 2.

$$G(M, P) = G(P, M) \quad \forall M, P \in \Omega, M \neq P.$$

152. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichklik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali
153. Tekislikdagi ikkilangan qatlam potentsiali:

$$u(M) = - \int_L f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) dl_P.$$

154. Tekis yaqinlashuvchi integralning ta'rifi va qo'yidagi  $\int_l F(P, M) dl_P$  integral uzluksuzligi haqidagi teorema
155. Potensial xossalari. ( $u(M) - f(M_0)u_e(M)$  funksiya  $M_0$ -nuqtada uzluksizligi haqidagi teorema)
156. Dirixle ichki masalani 2-chi tur Fredgolm integral tenglamaga keltirish
157. Fazoda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi
158. Tekislikda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi
159. Neyman ichki masalasi. Yechiluvchanlikning zaruriy sharti.
160. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi
161. Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasi va uning xossalari. Dirixle ichki masalasi uchun Grin funksiyasi
162. Grin funksiyaning xossalari.  $G(M, P) > 0, M, P \in \Omega, P \neq M.$
163. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (parabolik tenglamalar).
164. Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi (umumiy, kvazichizikli, chizikli, bir jinsli, bir jinsli bulmagan tenglamalarning ta'riflari, tenglamalarning tiplari).
165. Tebranish tenglamalar uchun masalalarning qo'yilishi (Ideal tor tebranish tenglamasi, elastik membrana tebranish tenglamasi, boshlang'ich shartlar, chegaraviy shartlar, birinchi chegaraviy masala, yarim to'g'ri chiziq, Koshi masalasi).
166. Tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasi yechimining mafjudligi, yagonaligi va turg'unligi. Dalamber formulasi.
167. Xususiy xosilali differensial tenglamalar. Asosiy ta'riflar.
168. Birinchi tartibli kvazichizikli tenglamalar (Bir jinsli, bir jinsli bulmagan, umumiy yechim)
169. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (giperbolik tenglamalar).
170. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (elliptik tenglamalar).
171. Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglamalarning xarakteristikasi (xarakteristik tenglama, xarakteristik uchburchak, Dalamber formulasi, issiqlikni o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun Koshi masalasi)
172. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chizqdagi masala. Davom ettirish usuli.
173. Birinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, Dalamber formulasi).
174. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chizqdagi masala. Davom ettirish usuli.
175. Ikkinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, Dalamber formulasi).
176. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Yechimini mavjudligini isbotlash uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli.
177. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Mavjudlik teoremasi.

178. Energiya integrali. Tebranish tenglamasi uchun umumiy birinchi chegaraviy masalalarning yechimini mavjudligi.
179. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi. Integral tenglamalarning ekvivalent sistemasi (Gursa masalasi, chizikli bulmagan giperbolik tenglama)
180. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining mavjudligi.
181. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining yagonaligi.
182. Qo'shma differensial operator (differensial operator, qo'shma operator, o'z-o'ziga qo'shma operator)
183. Chizikli algebrada berilgan qo'shma operator va qo'shma differensial operatorlarnin bog'lanishi.
184. Umumlashgan yechim. Limitga o'tish ko'rinishdagi umumlashgan yechim.
185. Umumlashgan yechim. Integral ayniyat manosida berilgan umumlashgan yechim.
186. Parabolik tipdagi tenglamalar. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasining chiqarilishi.
187. Parabolik tipdagi tenglamalar. Bir fazoviy o'zgaruvchili issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi.
188. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masala. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining mavjudligi.
189. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligi
190. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi
191. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichklik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali
192. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi

$$193. \begin{cases} u_t = u_{xx} + 4u + 2 \cos^2 x, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

$$194. \begin{cases} u_t = u_{xx} - u + \left(x - \frac{\pi}{2}\right) e^{-t} \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

$$195. \begin{cases} u_t = u_{xx} + u + \cos t, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = \cos 2x; \end{cases}$$

$$196. \begin{cases} u_t = u_{xx} + u + \sin x, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = \cos x. \end{cases}$$

$$197. \begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=1} = 0, \\ u|_{t=0} = x^2 - x, \\ u_t|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

$$198. \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + 4u + 4\sin^2 x, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

$$199. \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + x - \pi, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = \cos \frac{x}{2}, \\ u_t|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

$$200. \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - 3u + 4\sin x \sin 2t, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = \sin 3x. \end{cases}$$

201. bir jinsli chegaraviy martlarga keltiring

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - u + t(x^2 - 2) + \sin x, & 0 < x < \pi, \quad 0 < t < \infty, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi} = 2\pi t, \\ u|_{t=0} = \cos x, \\ u_t|_{t=0} = \sin x + x^2. \end{cases}$$

$$202. \begin{cases} u_{tt} + 2u_t = u_{xx} + 4x + 8e^t \cos x \\ u_x|_{x=0} = 2t, \\ u|_{x=\pi/2} = \pi t, \\ u|_{t=0} = \cos x, \\ u_t|_{t=0} = 2x; \end{cases}$$

$$203. \begin{cases} u_{tt} + u_t = u_{xx}, \\ u|_{x=0} = t, \\ u|_{x=1} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = 1 - x; \end{cases}$$

$$204. \begin{cases} u_{tt} - 2u_t = u_{xx} + 4t(\sin x - x) \\ u|_{x=0} = 3, \\ u_x|_{x=\pi/2} = t^2 + t, \\ u|_{t=0} = 3, \\ u_t|_{t=0} = x + \sin x; \end{cases}$$

205. 
$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi} = t, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = \frac{x}{\pi}. \end{cases}$$
- $$u_{tt} = 4u_{xx} + 3t \sin\left(\frac{7\pi x}{2l}\right), \quad (0 < x < l)$$
- $$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0,$$
- $$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 2 \sin\left(\frac{\pi x}{2l}\right) + 7 \sin\left(\frac{5\pi x}{2l}\right).$$
206. 
$$u_{tt} = 16u_{xx} + xt, \quad (0 < x < 2)$$
- $$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=2} = 0,$$
- $$u|_{t=0} = \sin(\pi x) + 2 \sin\left(\frac{5\pi x}{2}\right), \quad u_t|_{t=0} = 0.$$
207. 
$$u_{tt} = 25u_{xx} + \cos(17x) \operatorname{ch}(3t), \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$$
- $$u_x|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=\pi/2} = 0,$$
- $$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \cos(x) + 4 \cos(9x).$$
208. 
$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + 2e^{3t} \sin\left(\frac{5\pi x}{4}\right), \quad (0 < x < 2)$$
- $$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=2} = 0,$$
- $$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = v_0, \quad (v_0 = \text{const}).$$
209. 
$$u_{tt} = 9u_{xx} + A \cos\left(\frac{5\pi x}{2l}\right) \sin(2t), \quad (0 < x < l, A = \text{const})$$
- $$u_x|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0,$$
- $$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 3 \cos\left(\frac{\pi x}{2l}\right).$$
210. 
$$u_{tt} = 49u_{xx} + B, \quad (0 < x < \pi, B = \text{const})$$
- $$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi} = 0,$$
- $$u|_{t=0} = 2 \cos(40x), \quad u_t|_{t=0} = \cos(40x) + 6 \cos(50x).$$
211. 
$$u_{tt} = 4u_{xx} + t \sin(3x), \quad (0 < x < \pi)$$
- $$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=\pi} = 0,$$
- $$u|_{t=0} = \begin{cases} \frac{hx}{c}, & x \in [0, c] \\ \frac{h(\pi-x)}{\pi-c}, & x \in [c, \pi] \end{cases}, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$
- $$(h = \text{const}, c = \text{const}, 0 < c < \pi)$$
212. 
$$u_{tt} = u_{xx} + 5 \cos(4x) e^{4t}, \quad (0 < x < \pi)$$
- $$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi} = 0,$$
- $$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 2 \cos(3x) + 4 \cos(10x).$$
213. 
$$u_{tt} = u_{xx} + u, \quad (0 < x < 2)$$
- $$u|_{x=0} = 2t, \quad u|_{x=2} = 0,$$
- $$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$
214. 
$$u_{tt} = u_{xx}, \quad (0 < x < 1)$$
- $$u|_{x=0} = t + 1, \quad u|_{x=1} = t^3 + 2,$$
- $$u|_{t=0} = x + 1, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$
- 215.

216. 
$$u_{tt} = u_{xx} + 4u + 2\sin^2(x), \quad (0 < x < \pi)$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi} = 0,$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$
217. 
$$u_{tt} = u_{xx} + Ae^{-t}\sin\left(\frac{\pi x}{l}\right), \quad (0 < x < l)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0,$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \sin\left(\frac{3\pi x}{l}\right).$$
218. 
$$u_{tt} = u_{xx}, \quad (0 < x < \pi)$$

$$u|_{x=0} = t, \quad u|_{x=\pi} = 0,$$

$$u|_{t=0} = \sin(x)\cos(x), \quad u_t|_{t=0} = 1.$$
219. 
$$u_{tt} = u_{xx}, \quad (0 < x < l)$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = e^{-t},$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$
220. 
$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad (0 < x < l)$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0,$$

$$u|_{t=0} = x(l-x).$$
221. 
$$u_t = u_{xx} + 3\sin(2x), \quad (0 < x < \pi)$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=\pi} = 0,$$

$$u|_{t=0} = 10\sin(x) + \sin(7x).$$
222. 
$$4)U_{tt} = a^2 U_{xx} + t \sin \frac{\pi x}{2}, a = 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$
223. 
$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x \sin(l-x), \frac{\partial y}{\partial t}(0, x) = 0,$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$
224. 
$$4)U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t+5)x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$
225. 
$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = (l-x)\sin \frac{\pi x}{l}, \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = 0$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$
226. 
$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x \sin(l-x), \frac{\partial y}{\partial t}(0, x) = 0,$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$
227. 
$$4)U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t+5)x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$
228. 
$$U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t^2 - 1)x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0$$
229. 
$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 4, U(0, x) = 2(l-x)\sin x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

230.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 10, U(0, x) = 10x, U(t, 0) = U(t, l) = 0, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0.$
231.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + 10(t-1) \cos 2x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$
232.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1, 5, U(0, x) = 2(x+3), \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = \sin x,$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = 1.$
233.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + tx^2, a = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$
234.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = \cos 2x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = x,$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = t.$
235.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2 x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$
236.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x^2, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = \frac{1}{x},$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
237.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1, U(0, x) = \frac{x}{2}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0,$
238.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2 x^2, a = 3, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$
239.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = 2 \cos 2, 5x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$
240.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + t, a = 1, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
241.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1.5, U(0, x) = x \sin \frac{\pi x}{l}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
242.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t^2 + 1) \sin 2x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$
243.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = 2(l-x) \sin x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$
244.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + 2x \cos t, a = 1, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
245.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2.5, U(0, x) = x \cos \frac{\pi x}{2l}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
246.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + (x+2) \sin t, a = 2, l = \pi,$   
 $U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$
247.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x+2, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$
248.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2 x, a = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$

$$249. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = e^x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$250. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx} + \sin t, a = 1,5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi$$

$$251. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = e^{x+1}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 1, U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$252. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx} + (x+4) \cos 3t, a = 1, l = \frac{\pi}{2}, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

$$253. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = x^2, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = \pi$$

$$254. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

$$255. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx} + x \sin 2t, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = 1.$$

$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1,5$$

$$256. \quad U(0, x) = x(l-x), \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$



**Mexanika – matematika fakulteti amaliy matematika va informatika  
bo'limi 3-kurs talabalari uchun matematik fizika tenglamalari  
fanidan oraliq nazorat ishi namunaviy variantlari**

Variant 1

1. Xususiy xosilali differensial tenglamalar. Asosiy ta'riflar.
2. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) ( $u(x, t)$  funksiya va uning xususiy xosilalari  $\Pi_{L, t_0, T}$  sohada uzluksiligini isbotlash.)

3. 
$$x^2 u_{xx} + 2xyu_{xy} - 3y^2 u_{yy} - 2xu_x + 4yu_y + 16x^2 u = 0.$$

4. 
$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = \pi x - x^2; \end{cases}$$

Variant 2

1. Birinchi tartibli kvazichizqli tenglamalar (Bir jinsli, bir jinsli bulmagan, umumiy yechim)
1. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) (

$$\forall x_0 \in \mathbb{R} \lim_{\substack{t \rightarrow 0^+ \\ x \rightarrow x_0}} u(x, t) = \phi(x_0).$$

2. 
$$tg^2 x u_{xx} - 2y t g x u_{xy} + y^2 u_{yy} + tg^3 x u_x = 0.$$

3. 
$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 4u + 2 \cos^2 x, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

Variant 3

1. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rif va kanonik shakliga keltirish (giperbolik tenglamalar).
2. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) (teoremani keltirib natijalarni isbotlash)

3. 
$$u_{xx} - 2 \sin x \cdot u_{xy} - (3 + \cos^2 x) u_{yy} - \cos x \cdot u_y = 0.$$

4. 
$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - u + \left(x - \frac{\pi}{2}\right) e^{-t} \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

Variant 4

1. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rif va kanonik shakliga keltirish (elliptik tenglamalar).

2. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining yagonaligi

3.  $e^y u_{xy} - u_{yy} + u_y = 0.$

4. 
$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + u + \cos t, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = \cos 2x; \end{cases}$$

#### Variant 5

1. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (parabolik tenglamalar).

2. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi

3.  $u_{xx} + 2\cos x \cdot u_{xy} - \sin^2 x \cdot u_{yy} - \sin x \cdot u_y = 0.$

4. 
$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + u + \sin x, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = \cos x. \end{cases}$$

#### Variant 6

1. Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi (umumiy, kvazichizikli, chizikli, bir jinsli, bir jinsli bulmagan tenglamalarning ta'riflari, tenglamalarning tiplari).

2. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun ikkinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi

3.  $4y^2 u_{xx} + 2(1 - y^2) u_{xy} - u_{yy} - \frac{2y}{1+y^2} (2u_x - u_y) = 0.$

4. 
$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=1} = 0, \\ u|_{t=0} = x^2 - x, \\ u_t|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

#### Variant 7

1. Tebranish tenglamalar uchun masalalarning qo'yilishi (Ideal tor tebranish tenglamasi, elastik membrana tebranish tenglamasi, boshlang'ich shartlar, chegaraviy shartlar, birinchi chegaraviy masala, yarim to'g'ri chiziq, Koshi masalasi).

2. Parabolik tipdagi tenglamalar. O'zgaruvchilarning ajratish usuli.

3.  $U_{xy} - U_{yy} + 2U_x - U_y = 0.$

$$4. \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + 4u + 4 \sin^2 x, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

#### Variant 8

1. Tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasi yechimining mafjudligi, yagonaligi va turg'unligi. Dalamber formulasi.
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun maksimal qiymat prinsipi.
3.  $3U_{xx} + U_{xy} + U_y = 0$ .

$$4. \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + x - \pi, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = \cos \frac{x}{2}, \\ u_t|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

#### Variant 9

1. Ikkinchi taribli xususiy xosilali tenglamalarning xarakteristikasi (xarakteristik tenglama, xarakteristik uchburchak, Dalamber formulasi, issiqlikni o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun Koshi masalasi)
2. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining yagonaligi.
3.  $U_{xx} - 8U_{xy} + U_y - U_x = 0$ .

$$4. \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - 3u + 4 \sin x \sin 2t, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = \sin 3x. \end{cases}$$

#### Variant 10

1. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chizqdagi masala. Davom ettirish usuli. Birinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, Dalamber formulasi).
2. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining turg'unligi.
3.  $U_{xx} - 4U_{yy} + U_x = 0$ .
4. bir jinsli chegaraviy martlarga keltiring

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - u + t(x^2 - 2) + \sin x, & 0 < x < \pi, & 0 < t < \infty, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi} = 2\pi t, \\ u|_{t=0} = \cos x, \\ u_t|_{t=0} = \sin x + x^2. \end{cases}$$

### Variant 11

1. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chiziqdagi masala. Davom ettirish usuli. Ikkinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, D'alamber formulasi).
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun umumiy chegaraviy masalani yechimining yagonaligi (bir jinsli bulmagan tenglama)
3.  $U_{xx} - 2U_{xy} + U_{yy} + U_y = 0$ .

$$4. \begin{cases} u_{tt} + 2u_t = u_{xx} + 4x + 8e^t \cos x \\ u_x|_{x=0} = 2t, \\ u|_{x=\pi/2} = \pi t, \\ u|_{t=0} = \cos x, \\ u_t|_{t=0} = 2x; \end{cases}$$

### Variant 12

1. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Yechimini mavjudligini isbotlash uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli.
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun bir jinsli Koshi masalasi
3.  $2U_{xx} + 2U_{xy} + 5U_{yy} = 0$ .

$$4. \begin{cases} u_{tt} + u_t = u_{xx}, \\ u|_{x=0} = t, \\ u|_{x=1} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = 1 - x; \end{cases}$$

### Variant 13

1. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Mavjudlik teoremasi.
2. Uchinchi Grin formulasi. Ikki ulchovli fazoda Grin formulalar.

$$3. x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} - 2yu_x = 0.$$

$$4. \begin{cases} u_{tt} - 2u_t = u_{xx} + 4t(\sin x - x) \\ u|_{x=0} = 3, \\ u_x|_{x=\pi/2} = t^2 + t, \\ u|_{t=0} = 3, \\ u_t|_{t=0} = x + \sin x; \end{cases}$$

### Variant 14

1. Energiya integrali. Tebranish tenglamasi uchun umumiy birinchi chegaraviy masalalarning yechimini mavjudligi.
2. Garmonik funksiyalarning xossalari 1 i 2 (o'rta qymat hakidagi teorema) xossalar

$$3. (1 + x^2)u_{xx} + (1 + y^2)u_{yy} + xu_x + yu_y = 0.$$

$$4. \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi} = t, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = \frac{x}{\pi}. \end{cases}$$

### Variant 15

1. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi. Integral tenglamalarning ekvivalent sistemasi (Gursa masalasi, chizikli bulmagan giperbolik tenglama)
2. Garmonik funksiyalar. Uchinchi xossa. Garmonik funksiyalar uchun ekstremum prinsipi

$$3. \quad u_{xx} - (1 + y^2)^2 u_{yy} - 2y(1 + y^2)u_y = 0.$$

$$u_{tt} = 4u_{xx} + 3t \sin\left(\frac{7\pi x}{2l}\right), \quad (0 < x < l)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0,$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 2 \sin\left(\frac{\pi x}{2l}\right) + 7 \sin\left(\frac{5\pi x}{2l}\right).$$

4.

### Variant 16

1. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining mavjudligi.
2. Dirixle ichki masalani yechimining yagonaligi.

$$3. \quad y^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + x^2 u_{yy} = 0.$$

$$u_{tt} = 16u_{xx} + xt, \quad (0 < x < 2)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=2} = 0,$$

$$u|_{t=0} = \sin(\pi x) + 2 \sin\left(\frac{5\pi x}{2}\right), \quad u_t|_{t=0} = 0.$$

4.

### Variant 17

1. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining yagonaligi.
2. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligini isbotlash uchun zarur bulgan Lemma

$$3. \quad (1 + x^2)^2 u_{xx} + u_{yy} + 2x(1 + x^2)u_x = 0.$$

$$u_{tt} = 25u_{xx} + \cos(17x) \operatorname{ch}(3t), \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi/2} = 0,$$

$$4. \quad u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \cos(x) + 4 \cos(9x).$$

### Variant 18

1. Qo'shma differensial operator (differensial operator, qo'shma operator, o'z-o'ziga qo'shma operator)
2. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligi

$$3. \quad 3u_{xx} - 4u_{xy} + u_{yy} - 3u_x + u_y = 0.$$

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + 2e^{3t} \sin\left(\frac{5\pi x}{4}\right), \quad (0 < x < 2)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=2} = 0,$$

$$4. \quad u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = v_0, \quad (v_0 = \text{const}).$$

### Variant 19

1. Chizikli algebrada berilgan qo'shma operator va qo'shma differensial operatorlarnin bog'lanishi.
2. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 1 va 2 xossalar

$$3. \quad e^{-2x} u_{xx} - e^{-2y} u_{yy} - e^{-2x} u_x + e^{-2y} u_y + 8e^y = 0.$$

$$u_{tt} = 9u_{xx} + A \cos\left(\frac{5\pi x}{2l}\right) \sin(2t), \quad (0 < x < l, A = \text{const})$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0,$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 3 \cos\left(\frac{\pi x}{2l}\right).$$

4.

#### Variant 20

1. Rimani usuli.
2. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 3 va 4 xossalari
3.  $u_{xx} - 2\cos x \cdot u_{xy} - (3 + \sin^2 x)u_{yy} + u_x + (\sin x - \cos x - 2)u_y = 0.$
4.  $u_{tt} = 49u_{xx} + B, \quad (0 < x < \pi, B = \text{const})$   
 $u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi} = 0,$   
 $u|_{t=0} = 2 \cos(40x), \quad u_t|_{t=0} = \cos(40x) + 6 \cos(50x).$

#### Variant 21

1. Umumlashgan yechim. Limitga o'tish ko'rinishdagi umumlashgan yechim.
2. Laplas va Puasson tenglamalari. Garmonik funksiya
3.  $u_{xx} + 2\sin x \cdot u_{xy} - (\cos^2 x - \sin^2 x)u_{yy} + \cos x \cdot u_y = 0.$
4.  $u_{tt} = 4u_{xx} + t \sin(3x), \quad (0 < x < \pi)$   
 $u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=\pi} = 0,$   
 $u|_{t=0} = \begin{cases} \frac{hx}{c}, & x \in [0, c] \\ \frac{h(\pi-x)}{\pi-c}, & x \in [c, \pi] \end{cases}, \quad u_t|_{t=0} = 0.$   
 $(h = \text{const}, c = \text{const}, 0 < c < \pi)$

#### Variant 22

1. Umumlashgan yechim. Integral ayniyat manosida berilgan umumlashgan yechim.
2. Chegaraviy masalalar qo'yilishi.  $E^3$  va  $E^2$  fazolarda Dirixle va Neyman masalalari.
3.  $e^{2x}u_{xx} + 2e^{x+y}u_{xy} + e^{2y}u_{yy} - xu = 0.$
4.  $u_{tt} = u_{xx} + 5 \cos(4x)e^{4t}, \quad (0 < x < \pi)$   
 $u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi} = 0,$   
 $u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 2 \cos(3x) + 4 \cos(10x).$

#### Variant 23

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasining chiqarilishi.
2. Laplas tenglamasining fundamental yechimi
3.  $u_{xx} - 2\sin x \cdot u_{xy} - \cos^2 x \cdot u_{yy} - \cos x \cdot u_y = 0.$
4.  $u_{tt} = u_{xx} + u, \quad (0 < x < 2)$   
 $u|_{x=0} = 2t, \quad u|_{x=2} = 0,$   
 $u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0.$

Variant 24

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Bir fazoviy o'zgaruvchili issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi.
2. Birinchi va ikkinchi Grin formulalar.
3.  $u_{xx} - 2xu_{xy} = 0.$   
 $u_{tt} = u_{xx}, (0 < x < 1)$   
 $u|_{x=0} = t + 1, u|_{x=1} = t^3 + 2,$
4.  $u|_{t=0} = x + 1, u_t|_{t=0} = 0.$

Variant 25

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masala. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining mavjudligi.
2. Grin funksiyaning xossalari. 2.

$$G(M, P) = G(P, M) \quad \forall M, P \in \Omega, M \neq P.$$

3.  $2u_{xx} - 5u_{xy} + 3u_{yy} - u_x + u_y + 2x = 0.$   
 $u_{tt} = u_{xx} + 4u + 2\sin^2(x), (0 < x < \pi)$   
 $u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=\pi} = 0,$   
 $u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0.$
- 4.

Mexanika – matematika fakulteti amaliy matematika va informatika

Variant 26

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. O'zgaruvchilarning ajratish usuli.
2. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichlik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali
3.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} - 3u_x + 12u_y = 0.$   
 $u_{tt} = u_{xx} + Ae^{-t} \sin\left(\frac{\pi x}{l}\right), (0 < x < l)$   
 $u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0,$   
 $u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = \sin\left(\frac{3\pi x}{l}\right).$
- 4.

Variant 27

1. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun maksimal qiymat prinsipi.
2. Tekislikdagi ikkilangan qatlam potentsiali:

$$u(M) = - \int_L f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) dl_P.$$

3.  $5u_{xx} + 16u_{xy} + 16u_{yy} + 24u_x + 32u_y = 0.$   
 $u_{tt} = u_{xx}, (0 < x < \pi)$   
 $u|_{x=0} = t, u|_{x=\pi} = 0,$   
 $u|_{t=0} = \sin(x) \cos(x), u_t|_{t=0} = 1.$
- 4.

Variant 28

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining yagonaligi.

2. Tekis yaqinlashuvchi integralning ta'rifi va qo'yidagi  $\int_{\Gamma} F(P, M) dl_P$  integral uzluksizligi haqidagi teorema

3.  $u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} - 2u_x - 2u_y = 0.$

$$u_{tt} = u_{xx}, \quad (0 < x < l)$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = e^{-t},$$

4.  $u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0.$

#### Variant 29

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining turg'unligi.

3. Potensial xossalari. ( $u(M) - f(M_0)u_e(M)$  funksiya  $M_0$ - nuqtada uzluksizligi haqidagi teorema)

4.  $3u_{xx} + u_{xy} + 3u_x + u_y + y = 0.$

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad (0 < x < l)$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0,$$

$$u|_{t=0} = x(l-x).$$

#### Variant 30

1. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun umumiy chegaraviy masalani yechimining yagonaligi (bir jinsli bulmagan tenglama)
2. Dirixle ichki masalani 2-chi tur Fredgolm integral tenglamaga keltirish

3.  $u_{xx} + u_{xy} - u_y + 4x = 0.$

$$u_t = u_{xx} + 3 \sin(2x), \quad (0 < x < \pi)$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=\pi} = 0,$$

4.  $u|_{t=0} = 10 \sin(x) + \sin(7x).$

#### Variant 31

1. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun bir jinsli Koshi masalasi
2. Fazoda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi

3.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_x + 4e^y = 0.$

4.  $4) U_{tt} = a^2 U_{xx} + t \sin \frac{\pi x}{2}, a = 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

#### Variant 32

1. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) ( $u(x, t)$  funksiya va uning xususiy xossalari  $\Pi_{L, t_0, T}$  sohada uzluksiligini isbotlash.)

2. Tekislikda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi

3.  $u_{xx} - 6u_{xy} + 8u_{yy} + u_x - 2u_y + x = 0.$



$$4. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x \sin(l - x), \frac{\partial y}{\partial t}(0, x) = 0,$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

#### Variant 33

1. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) (teoremani keltirib natijalarni isbotlash)
2. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi
3.  $3u_{xx} + 10u_{xy} + 3u_{yy} + u_x + u_y + 2x + y = 0.$
4.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = (l - x) \sin \frac{\pi x}{l}, \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = 0$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = 0.$

#### Variant 34

1. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining yagonaligi
2. Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasi va uning xossalari. Dirixle ichki masalasi uchun Grin funksiyasi
3.  $3u_{xx} - 10u_{xy} + 3u_{yy} - 2u_x + 4u_y + 2y = 0.$
4.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x \sin(l - x), \frac{\partial y}{\partial t}(0, x) = 0,$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### Variant 35

1. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi
2. Grin funksiyaning xossalari.  $G(M, P) > 0, \quad M, P \in \Omega, \quad P \neq M.$
3.  $2u_{xx} + 6u_{xy} + 4u_{yy} + u_x + u_y = 0.$
4.  $4)U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t + 5)x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### Variant 36

1. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun ikkinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi
2. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (parabolik tenglamalar).
3.  $2u_{xy} - 4u_{yy} + u_x - 2u_y + x = 0.$
4.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t^2 - 1)x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### Variant 37

1. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 1 va 2 xossalar

- Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi (umumiy, kvazichizikli, chizikli, bir jinsli, bir jinsli bulmagan tenglamalarning ta'riflari, tenglamalarning tiplari).

- $u_{xx} - 6u_{xy} + 9u_{yy} - u_x + 2u_y = 0.$

- $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 4, U(0, x) = 2(l - x) \sin x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### Variant 38

- Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 3 va 4 xossalar
- Tebranish tenglamalar uchun masalalarning qo'yilishi (Ideal tor tebranish tenglamasi, elastik membrana tebranish tenglamasi, boshlang'ich shartlar, chegaraviy shartlar, birinchi chegaraviy masala, yarim to'g'ri chiziq, Koshi masalasi).

- $u_{xx} - 4u_{xy} + 5u_{yy} - 3u_x + u_y = 0.$

- $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 10, U(0, x) = 10x, U(t, 0) = U(t, l) = 0, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0.$

#### Variant 39

- Laplas va Puasson tenglamalari. Garmonik funksiya
- Tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasi yechimining mafjudligi, yagonaligi va turg'unligi. Dalamber formulasi.

- $u_{xx} + 4u_{xy} + 13u_{yy} + 3u_x + 24u_y + 9(x + y) = 0.$

- $U_{tt} = a^2 U_{xx} + 10(t - 1) \cos 2x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### Variant 40

- Chegaraviy masalalar qo'yilishi.  $E^3$  va  $E^2$  fazalarda Dirixle va Neyman masalalari.
- Xususiy xosilali differensial tenglamalar. Asosiy ta'riflar.

- $u_{xx} - u_{yy} + u_x + u_y = 0.$

- $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1, 5, U(0, x) = 2(x + 3), \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = \sin x,$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 1.$$

#### Variant 41

- Laplas tenglamasining fundamental yechimi
- Birinchi tartibli kvazichizikli tenglamalar (Bir jinsli, bir jinsli bulmagan, umumiy yechim)

- $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + 3u_x - 5u_y = 0.$

- $U_{tt} = a^2 U_{xx} + tx^2, a = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### Variant 42

- Birinchi va ikkinchi Grin formulalar.
- Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (giperbolik tenglamalar).

- $2u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + 4u_x + 4u_y = 0.$

$$4. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = \cos 2x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = x, \\ U(t, 0) = U(t, l) = t.$$

Variant 43

1. Uchinchi Grin formulasi. Ikki ulchovli fazoda Grin formulalar.
2. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (elliptik tenglamalar).
3.  $u_{xy} + 2u_{yy} - u_x + 4u_y = 0.$
4.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2 x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$

Variant 44

1. Garmonik funksiyalarning xossalari 1 i 2 (o'rta qymat hakidagi teorema) xossalar
2. Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglamalarning xarakteristikasi (xarakteristik tenglama, xarakteristik uchburchak, Dalamber formulasi, issiqlikni o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun Koshi masalasi)
3.  $u_{xx} + 2u_{xy} + 10u_{yy} - 24u_x + 42u_y + 2(x + y) = 0.$
4.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x^2, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = \frac{1}{x}, \\ U(t, 0) = U(t, l) = 0.$

Variant 45

1. Garmonik funksiyalar. Uchinchi xossa. Garmonik funksiyalar uchun ekstremum prinsipi
2. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chizqdagi masala. Davom ettirish usuli. Birinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, Dalamber formulasi).
3.  $9u_{xx} - 6u_{xy} + u_{yy} + 10u_x - 15u_y + x - 2y = 0.$
4.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1, U(0, x) = \frac{x}{2}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0,$

Variant 46

1. Dirixle ichki masalani yechimining yagonaligi.
2. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chizqdagi masala. Davom ettirish usuli. Ikkinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, Dalamber formulasi).
3.  $u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} - 3u_x - 15u_y + 27x = 0.$
4.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2 x^2, a = 3, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$

Variant 47

1. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligini isbotlash uchun zarur bulgan Lemma
2. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Yechimini mavjudgini isbotlash uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli.
3.  $2u_{xx} + 3u_{xy} + u_{yy} + 7u_x + 4u_y = 0.$

$$4. U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = 2 \cos 2, 5x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

Variant 48

1. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligi
2. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Mavjudlik teoremasi.

$$3. u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + 9u_x + 9u_y = 0.$$

$$4. U_{tt} = a^2 U_{xx} + t, a = 1, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

Variant 49

1. Fazoda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi
2. Energiya integrali. Tebranish tenglamasi uchun umumiy birinchi chegaraviy masalalarning yechimini mavjudligi.

$$3. u_{xx} + 2u_{xy} + 5u_{yy} - 32u_y = 0.$$

$$4. U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1.5, U(0, x) = x \sin \frac{\pi x}{l}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

Variant 50

1. Tekislikda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi
2. Chizikli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi. Integral tenglamalarning ekvivalent sistemasi (Gursa masalasi, chizikli bulmagan giperbolik tenglama)

$$3. u_{xx} + 4u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y - x^2 y = 0.$$

$$4. U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t^2 + 1) \sin 2x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

Variant 51

1. Neyman ichki masalasi. Yechiluvchanlikning zaruriy sharti.
2. Chizikli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining mavjudligi.

$$3. \begin{cases} y'' + \lambda y = 0, \\ \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}, \\ y' \left( \frac{\pi}{2} \right) = y \left( \frac{5\pi}{2} \right) = 0. \end{cases}$$

$$4. U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = 2(l - x) \sin x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

Variant 52

1. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi
2. Chizikli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining yagonaligi.

$$3. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad \text{bu tenglamani} \quad \text{qo'yidagi} \quad \text{ko'rinishga} \quad \text{keltiring:}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = F_2 \left( x, y, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right).$$

$$4. U_{tt} = a^2 U_{xx} + 2x \cos t, a = 1, 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

Variant 53

1. Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasi va uning xossalari. Dirixle ichki masalasi uchun Grin funksiyasi
2. Qo'shma differensial operator (differensial operator, qo'shma operator, o'z-o'ziga qo'shma operator)

$$3. \quad x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$4. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2.5, U(0, x) = x \cos \frac{\pi x}{2l}, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0, \\ U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

Variant 54

1. Grin funksiyaning xossalari. 1.

$$\mathbf{G(M, P) > 0, \quad M, P \in \Omega, \quad P \neq M.}$$

2. Chizikli algebrada berilgan qo'shma operator va qo'shma differensial operatorlarnin bog'lanishi.

$$3. \quad 4u_{xx} + 3u_{xy} - u_{yy} = 0,$$

$$U_{tt} = a^2 U_{xx} + (x+2) \sin t, a = 2, l = \pi,$$

$$4. \quad U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

Variant 55

1. Grin funksiyaning xossalari. 2.

$$\mathbf{G(M, P) = G(P, M) \quad \forall M, P \in \Omega, \quad M \neq P.}$$

2. Riman usuli.

$$3. \quad 36u_{xx} - 12u_{xy} + u_{yy} + 18u_x - 3u_y = 0,$$

$$4. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x + 2, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

Variant 56

1. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichlik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali
2. Umumlashgan yechim. Limitga o'tish ko'rinishdagi umumlashgan yechim.

$$3. \quad y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$4. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2 x, a = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

Variant 57

1. Tekislikdagi ikkilangan qatlam potentsiali:

$$u(M) = - \int_L f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) d\mathbf{l}_P.$$

2. Umumlashgan yechim. Integral ayniyat manosida berilgan umumlashgan yechim.

3.  $(1+x^2)u_{xx} + (1+y^2)u_{yy} + yu_y = 0;$

4.  $U_{tt} = a^2U_{xx}, a=3, U(0,x) = e^x, \frac{\partial U}{\partial t}(0,x) = U(t,0) = U(t,l) = 0.$

#### Variant 58

1. Tekis yaqinlashuvchi integralning ta'rifi va qo'yidagi  $\int_l F(P, M) dl_P$  integral uzluksizligi haqidagi teorema

2. Parabolik tipdagi tenglamalar. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasining chiqarilishi.

3.  $x^2u_{xx} - 2xu_{xy} + u_{yy} = 0;$

4.  $U_{tt} = a^2U_{xx} + \sin t, a=1,5, U(0,x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0,x) = U(t,0) = U(t,l) = 0, l = \pi$

#### Variant 59

1. Potensial xossalari. ( $u(M) - f(M_0)u_e(M)$  funksiya  $M_0$ - nuqtada uzluksizligi haqidagi teorema)

2. Parabolik tipdagi tenglamalar. Bir fazoviy o'zgaruvchili issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi.

3.  $y^2u_{xx} + 2yu_{xy} + u_{yy} = 0;$

4.  $U_{tt} = a^2U_{xx}, a=2, U(0,x) = e^{x+1}, \frac{\partial U}{\partial t}(0,x) = 1, U(t,0) = U(t,l) = 0.$

#### Variant 60

1. Dirixle ichki masalani 2-chi tur Fredholm integral tenglamaga keltirish

2. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masala. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining mavjudligi.

3.  $4y^2u_{xx} - e^{2x}u_{yy} = 0;$

4.  $U_{tt} = a^2U_{xx} + (x+4)\cos 3t, a=1, l = \frac{\pi}{2}, U(0,x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0,x) = U(t,0) = U(t,l) = 0$

#### Variant 61

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasining chiqarilishi.

2. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligi

3.  $x^2u_{xx} + y^2u_{yy} = 0;$

4.  $U_{tt} = a^2U_{xx}, a=2, U(0,x) = x^2, \frac{\partial U}{\partial t}(0,x) = U(t,0) = U(t,l) = 0, l = \pi$

#### Variant 62

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Bir fazoviy o'zgaruvchili issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi.

2. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi

3.  $xu_{xx} - yu_{yy} = 0;$

$$4. U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

Variant 63

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masala. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining mavjudligi.
2. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichlik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali
3.  $u_{xx} - yu_{yy} = 0$ ;
4.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + x \sin 2t, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0, l = 1.$

Variant 64

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masala. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining mavjudligi.
2. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi
3.  $u_{xx} + 2u_{xy} + 2u_{yy} + u_x = 0$   
 $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1,5$
4.  $U(0, x) = x(l - x), \frac{\partial U(0, x)}{\partial t} = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0.$

**Mexanika – matematika fakulteti amaliy matematika va informatika  
bo'limi 3-kurs talabalari uchun matematik fizika tenglamalari  
fanidan yakuniy nazorat ishi namunaviy variantlari**

VARIANT 1

1. Xususiy xosilali differensial tenglamalar. Asosiy ta'riflar.
2. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) ( $u(x, t)$  funksiya va uning xususiy xosilalari  $\Pi_{L, t_0, T}$  soxada uzluksiligini isbotlash.)
3. Garmonik funksiyalarning xossalari 1 va 2 (o'rta qymat haqidagi teorema) xossalar

4.  $x^2 u_{xx} + 2xyu_{xy} - 3y^2 u_{yy} - 2xu_x + 4yu_y + 16x^2 u = 0.$

5. 
$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = \pi x - x^2; \end{cases}$$

VARIANT 2

1. Birinchi tartibli kvazichizqli tenglamalar (Bir jinsli, bir jinsli bo'lmagan, umumiy yechim)
2. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) ( $\forall x_0 \in \mathbb{R} \lim_{\substack{t \rightarrow 0^+ \\ x \rightarrow x_0}} u(x, t) = \phi(x_0).$ )
3. Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglamalarning xarakteristikasi (xarakteristik tenglama, xarakteristik uchburchak, Dalamber formulasi, issiqlikni o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun Koshi masalasi)

4.  $tg^2 x u_{xx} - 2y t g x u_{xy} + y^2 u_{yy} + tg^3 x u_x = 0.$

5. 
$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 4u + 2 \cos^2 x, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

VARIANT 3

1. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rif va kanonik shakliga keltirish (giperbolik tenglamalar).
2. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) (teoremani keltirib natijalarni isbotlash)
3. Garmonik funksiyalar. Uchinchi xossa. Garmonik funksiyalar uchun ekstremum prinsipi.

4.  $u_{xx} - 2 \sin x \cdot u_{xy} - (3 + \cos^2 x) u_{yy} - \cos x \cdot u_y = 0.$

5. 
$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - u + \left(x - \frac{\pi}{2}\right) e^{-t} \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0; \end{cases}$$



#### VARIANT 4

1. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (elliptik tenglamalar).
2. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining yagonaligi
3. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chizqdagi masala. Davom ettirish usuli. Birinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, D'alamber formulasi).

$$4. \quad e^y u_{xy} - u_{yy} + u_y = 0,$$

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + u + \cos t, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = \cos 2x; \end{cases}$$

#### VARIANT 5

1. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (parabolik tenglamalar).
2. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi
3. Dirixle ichki masalani yechimining yagonaligi.

$$4. \quad u_{xx} + 2\cos x \cdot u_{xy} - \sin^2 x \cdot u_{yy} - \sin x \cdot u_y = 0.$$

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + u + \sin x, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = \cos x. \end{cases}$$

#### VARIANT 6

1. Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi (umumiy, kvazichiziqli, chizikli, bir jinsli, bir jinsli bulmagan tenglamalarning ta'riflari, tenglamalarning tiplari).
2. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun ikkinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi
3. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chizqdagi masala. Davom ettirish usuli. Ikkinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, D'alamber formulasi).

$$4. \quad 4y^2 u_{xx} + 2(1 - y^2) u_{xy} - u_{yy} - \frac{2y}{1+y^2} (2u_x - u_y) = 0.$$

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=1} = 0, \\ u|_{t=0} = x^2 - x, \\ u_t|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

#### VARIANT 7

1. Tebranish tenglamalar uchun masalalarning qo'yilishi (Ideal tor tebranish tenglamasi, elastik membrana tebranish tenglamasi, boshlang'ich shartlar, chegaraviy shartlar, birinchi chegaraviy masala, yarim to'g'ri chiziq, Koshi masalasi).
2. Parabolik tipdagi tenglamalar. O'zgaruvchilarning ajratish usuli.
3. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligini isbotlash uchun zarur bulgan Lemma.

4.  $U_{xy} - U_{yy} + 2U_x - U_y = 0.$

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{tt} = u_{xx} + 4u + 4 \sin^2 x, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = 0; \end{array} \right.$$

5.

#### VARIANT 8

1. Tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasi yechimining mafjudligi, yagonaligi va turg'unligi. Dalamber formulasi.
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun maksimal qiymat prinsipi.
3. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligi.
4.  $3U_{xx} + U_{xy} + U_y = 0.$

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{tt} = u_{xx} + x - \pi, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = \cos \frac{x}{2}, \\ u_t|_{t=0} = 0; \end{array} \right.$$

5.

#### VARIANT 9

1. Ikkinchi taribli xususiy xosilali tenglamalarning xarakteristikasi (xarakteristik tenglama, xarakteristik uchburchak, Dalamber formulasi, issiqlikni o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun Koshi masalasi)
2. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining yagonaligi.
3. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Yechimini mavjudligini isbotlash uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli.

4.  $U_{xx} - 8U_{xy} + U_y - U_x = 0.$

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{tt} = u_{xx} - 3u + 4 \sin x \sin 2t, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi/2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = \sin 3x. \end{array} \right.$$

5.

#### VARIANT 10

1. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chizqdagi masala. Davom ettirish usuli. Birinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, Dalamber formulasi).
2. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining turg'unligi.
3. Fazoda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi

4.  $U_{xx} - 4U_{yy} + U_x = 0.$

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{tt} = u_{xx} - u + t(x^2 - 2) + \sin x, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < t < \infty, \\ u_x|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=\pi} = 2\pi t, \\ u|_{t=0} = \cos x, \\ u_t|_{t=0} = \sin x + x^2. \end{array} \right.$$

5.

### VARIANT 11

1. Tebranish tenglamasi uchun yarim to'g'ri chiziqdagi masala. Davom ettirish usuli. Ikkinchi chegaraviy masala (tebranish tenglamasi, Koshi masalasi, D'alamber formulasi).
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun umumiy chegaraviy masalani yechimining yagonaligi (bir jinsli bulmagan tenglama)
3. Tekislikda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi.
4.  $U_{xx} - 2U_{xy} + U_{yy} + U_y = 0.$

$$5. \begin{cases} u_{tt} + 2u_t = u_{xx} + 4x + 8e^t \cos x \\ u_x|_{x=0} = 2t, \\ u|_{x=\pi/2} = \pi t, \\ u|_{t=0} = \cos x, \\ u_t|_{t=0} = 2x; \end{cases}$$

### VARIANT 12

1. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Yechimini mavjudligini isbotlash uchun o'zgaruvchilarni ajratish usuli.
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun bir jinsli Koshi masalasi.
3. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Karakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi. Integral tenglamalarning ekvivalent sistemasi (Gursa masalasi, chizikli bulmagan giperbolik tenglama)
4.  $2U_{xx} + 2U_{xy} + 5U_{yy} = 0.$

$$5. \begin{cases} u_{tt} + u_t = u_{xx}, \\ u|_{x=0} = t, \\ u|_{x=1} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = 1 - x; \end{cases}$$

### VARIANT 13

1. Tebranish tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masala. Mavjudlik teoremasi.
2. Uchinchi Grin formulasi. Ikki ulchovli fazoda Grin formulalar.
3. Neyman ichki masalasi. Yechiluvchanlikning zaruriy sharti.

$$4. \begin{cases} x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} - 2y u_x = 0. \\ \begin{cases} u_{tt} - 2u_t = u_{xx} + 4t(\sin x - x) \\ u|_{x=0} = 3, \\ u_x|_{x=\pi/2} = t^2 + t, \\ u|_{t=0} = 3, \\ u_t|_{t=0} = x + \sin x; \end{cases} \end{cases}$$

### VARIANT 14

1. Energiya integrali. Tebranish tenglamasi uchun umumiy birinchi chegaraviy masalalarning yechimini mavjudligi.
2. Garmonik funksiyalarning xossalari 1 i 2 (o'rta qymat hakidagi teorema) xossalar.

3. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining mavjudligi.

4.  $(1 + x^2)u_{xx} + (1 + y^2)u_{yy} + xu_x + yu_y = 0.$

5. 
$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=\pi} = t, \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = \frac{x}{\pi}. \end{cases}$$

#### VARIANT 15

1. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi. Integral tenglamalarning ekvivalent sistemasi (Gursa masalasi, chizikli bulmagan giperbolik tenglama)

2. Garmonik funksiyalar. Uchinchi xossa. Garmonik funksiyalar uchun ekstremum prinsipi.

3. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi.

4.  $u_{xx} - (1 + y^2)^2 u_{yy} - 2y(1 + y^2)u_y = 0.$

$$u_{tt} = 4u_{xx} + 3t \sin\left(\frac{7\pi x}{2l}\right), \quad (0 < x < l)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0,$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 2 \sin\left(\frac{\pi x}{2l}\right) + 7 \sin\left(\frac{5\pi x}{2l}\right).$$

5.

#### VARIANT 16

1. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining mavjudligi.

2. Dirixle ichki masalani yechimining yagonaligi.

3. Energiya integrali. Tebranish tenglamasi uchun umumiy birinchi chegaraviy masalalarning yechimini mavjudligi.

4.  $y^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + x^2 u_{yy} = 0.$

$$u_{tt} = 16u_{xx} + xt, \quad (0 < x < 2)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=2} = 0,$$

$$u|_{t=0} = \sin(\pi x) + 2 \sin\left(\frac{5\pi x}{2}\right), \quad u_t|_{t=0} = 0.$$

5.

#### VARIANT 17

1. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining yagonaligi.

2. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligini isbotlash uchun zarur bulgan Lemma.

3. Energiya integrali. Tebranish tenglamasi uchun umumiy birinchi chegaraviy masalalarning yechimini mavjudligi

$$4. \quad (1 + x^2)^2 u_{xx} + u_{yy} + 2x(1 + x^2)u_x = 0.$$

$$u_{tt} = 25u_{xx} + \cos(17x) \operatorname{ch}(3t), \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi/2} = 0,$$

$$5. \quad u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \cos(x) + 4 \cos(9x).$$

#### VARIANT 18

1. Qo'shma differensial operator (differensial operator, qo'shma operator, o'z-o'ziga qo'shma operator)

2. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligi.

3. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining yagonaligi.

$$4. \quad 3u_{xx} - 4u_{xy} + u_{yy} - 3u_x + u_y = 0.$$

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + 2e^{3t} \sin\left(\frac{5\pi x}{4}\right), \quad (0 < x < 2)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=2} = 0,$$

$$5. \quad u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = v_0, \quad (v_0 = \text{const}).$$

#### VARIANT 19

1. Chizikli algebrada berilgan qo'shma operator va qo'shma differensial operatorlarnin bog'lanishi.

2. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 1 va 2 xossalar.

3. Chiziqli bo'lmagan giperbolik tenglama. Xarakteristikalarda berilgan ma'lumotlar masalasi yechimining yagonaligi.

$$4. \quad e^{-2x} u_{xx} - e^{-2y} u_{yy} - e^{-2x} u_x + e^{-2y} u_y + 8e^y = 0.$$

$$u_{tt} = 9u_{xx} + A \cos\left(\frac{5\pi x}{2l}\right) \sin(2t), \quad (0 < x < l, A = \text{const})$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0,$$

$$5. \quad u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 3 \cos\left(\frac{\pi x}{2l}\right).$$

#### VARIANT 20

1. Riman usuli.

2. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 3 va 4 xossalar.

3. Qo'shma differensial operator (differensial operator, qo'shma operator, o'z-o'ziga qo'shma operator).

$$4. \quad u_{xx} - 2\cos x \cdot u_{xy} - (3 + \sin^2 x)u_{yy} + u_x + (\sin x - \cos x - 2)u_y = 0.$$

$$u_{tt} = 49u_{xx} + B, \quad (0 < x < \pi, B = \text{const})$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi} = 0,$$

$$5. \quad u|_{t=0} = 2 \cos(40x), \quad u_t|_{t=0} = \cos(40x) + 6 \cos(50x).$$

## VARIANT 21

1. Umumlashgan yechim. Limitga o'tish ko'rinishdagi umumlashgan yechim.
2. Laplas va Puasson tenglamalari. Garmonik funksiya.
3. Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasi va uning xossalari. Dirixle ichki masalasi uchun Grin funksiyasi

4. 
$$u_{xx} + 2\sin x \cdot u_{xy} - (\cos^2 x - \sin^2 x)u_{yy} + \cos x \cdot u_y = 0.$$

$$u_{tt} = 4u_{xx} + t \sin(3x), \quad (0 < x < \pi)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=\pi} = 0,$$

$$u|_{t=0} = \begin{cases} \frac{hx}{c}, & x \in [0, c] \\ \frac{h(\pi-x)}{\pi-c}, & x \in [c, \pi] \end{cases}, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$

$$(h = \text{const}, c = \text{const}, 0 < c < \pi)$$

5.

## VARIANT 22

1. Umumlashgan yechim. Integral ayniyat manosida berilgan umumlashgan yechim.
2. Chegaraviy masalalar qo'yilishi.  $E^3$  va  $E^2$  fazolarda Dirixle va Neyman masalalari.
3. Grin funksiyaning xossalari.

4. 
$$G(M, P) > 0, \quad M, P \in \Omega, \quad P \neq M.$$

5. 
$$e^{2x}u_{xx} + 2e^{x+y}u_{xy} + e^{2y}u_{yy} - xu = 0.$$

$$u_{tt} = u_{xx} + 5 \cos(4x)e^{4t}, \quad (0 < x < \pi)$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi} = 0,$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 2 \cos(3x) + 4 \cos(10x).$$

## VARIANT 23

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasining chiqarilishi.
2. Laplas tenglamasining fundamental yechimi
3. Chizikli algebrada berilgan qo'shma operator va qo'shma differensial operatorlarning bog'lanishi.

4. 
$$u_{xx} - 2\sin x \cdot u_{xy} - \cos^2 x \cdot u_{yy} - \cos x \cdot u_y = 0.$$

$$u_{tt} = u_{xx} + u, \quad (0 < x < 2)$$

$$u|_{x=0} = 2t, \quad u|_{x=2} = 0,$$

5. 
$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$

## VARIANT 24

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Bir fazoviy o'zgaruvchili issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi.
2. Birinchi va ikkinchi Grin formulalar.
3. Grin funksiyaning xossalari.

$$G(M, P) = G(P, M) \quad \forall M, P \in \Omega, \quad M \neq P.$$

4. 
$$u_{xx} - 2xu_{xy} = 0.$$

- $$u_{tt} = u_{xx}, \quad (0 < x < 1)$$
- $$u|_{x=0} = t + 1, \quad u|_{x=1} = t^3 + 2,$$
- $$u|_{t=0} = x + 1, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$
- 5.

#### VARIANT 25

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masala. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining mavjudligi.
2. Grin funksiyaning xossalari. 2.

$$G(M, P) = G(P, M) \quad \forall M, P \in \Omega, M \neq P.$$

3. Riman usuli.

$$4. \quad 2u_{xx} - 5u_{xy} + 3u_{yy} - u_x + u_y + 2x = 0.$$

- $$u_{tt} = u_{xx} + 4u + 2\sin^2(x), \quad (0 < x < \pi)$$
- $$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi} = 0,$$
- $$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$
- 5.

#### VARIANT 26

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. O'zgaruvchilarning ajratish usuli.
2. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichlik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali.
3. Umumlashgan yechim. Limitga o'tish ko'rinishdagi umumlashgan yechim.
4.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} - 3u_x + 12u_y = 0.$   
 $u_{tt} = u_{xx} + Ae^{-t} \sin\left(\frac{\pi x}{l}\right), \quad (0 < x < l)$   
 $u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0,$   
 $u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \sin\left(\frac{3\pi x}{l}\right).$
- 5.

#### VARIANT 27

1. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun maksimal qiymat prinsipi.
2. Tekislikdagi ikkilangan qatlam potentsiali:
3. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birlik zichlik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali

- $$u(M) = - \int_L f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) dl_P.$$
- 4.
  5.  $5u_{xx} + 16u_{xy} + 16u_{yy} + 24u_x + 32u_y = 0.$   
 $u_{tt} = u_{xx}, \quad (0 < x < \pi)$   
 $u|_{x=0} = t, \quad u|_{x=\pi} = 0,$   
 $u|_{t=0} = \sin(x) \cos(x), \quad u_t|_{t=0} = 1.$

#### VARIANT 28

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining yagonaligi.

2. Tekis yaqinlashuvchi integralning ta'rifi va qo'yidagi  $\int_L F(P, M) dl_P$  integral uzluksuzligi haqidagi teorema

3. Tekislikdagi ikkilangan qatlam potentsiali:

$$u(M) = - \int_L f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) dl_P.$$

4.  $u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} - 2u_x - 2u_y = 0.$

$$u_{tt} = u_{xx}, \quad (0 < x < l)$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = e^{-t},$$

5.  $u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0.$

#### VARIANT 29

1. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining turg'unligi.

2. Potensial xossalari. ( $u(M) - f(M_0)u_e(M)$  funksiya  $M_0$ -nuqtada uzluksizligi haqidagi teorema).

3. Umumlashgan yechim. Integral ayniyat manosida berilgan umumlashgan yechim.

4.  $3u_{xx} + u_{xy} + 3u_x + u_y + y = 0.$

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad (0 < x < l)$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0,$$

5.  $u|_{t=0} = x(l-x).$

#### VARIANT 30

1. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun umumiy chegaraviy masalani yechimining yagonaligi (bir jinsli bulmagan tenglama)

2. Dirixle ichki masalani 2-chi tur Fredgolm integral tenglamaga keltirish.

3. Tekis yaqinlashuvchi integralning ta'rifi va qo'yidagi  $\int_L F(P, M) dl_P$  integral uzluksuzligi haqidagi teorema

4.  $u_{xx} + u_{xy} - u_y + 4x = 0.$

$$u_t = u_{xx} + 3 \sin(2x), \quad (0 < x < \pi)$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=\pi} = 0,$$

5.  $u|_{t=0} = 10 \sin(x) + \sin(7x).$

#### VARIANT 31

1. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun bir jinsli Koshi masalasi

2. Fazoda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi.



3. Potensial xossalari. ( $u(M) - f(M_0)u_e(M)$  funksiya  $M_0$ - nuqtada uzluksizligi haqidagi teorema)
4.  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_x + 4e^y = 0.$
5.  $4)U_{tt} = a^2U_{xx} + t \sin \frac{\pi x}{2}, a = 5, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### VARIANT 32

1. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) ( $u(x, t)$  funksiya va uning xususiy xosilalari  $\Pi_{L, t_0, T}$  sohada uzluksiligini isbotlash.)
2. Tekislikda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi.
3. Parabolik tipdagi tenglamalar. Bir fazoviy o'zgaruvchili issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi.
4.  $u_{xx} - 6u_{xy} + 8u_{yy} + u_x - 2u_y + x = 0.$
5.  $U_{tt} = a^2U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x \sin(l - x), \frac{\partial y}{\partial t}(0, x) = 0,$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### VARIANT 33

1. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) ( $\forall x_0 \in \mathbb{R} \lim_{\substack{t \rightarrow 0+ \\ x \rightarrow x_0}} u(x, t) = \phi(x_0).$ )
2. Neyman ichki masalasi. Yechiluvchanlikning zaruriy sharti.
3. Dirixle ichki masalani 2-chi tur Fredholm integral tenglamaga keltirish
4.  $u_{yy} - 2u_{xy} + 2u_x - u_y - 4e^x = 0.$
5.  $4)U_{tt} = a^2U_{xx} + (t + 5)x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### VARIANT 34

1. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining mavjudligi (Bir jinsli issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi) (teoremani keltirib natijalarni isbotlash)
2. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi.
3. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masala. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining mavjudligi
4.  $3u_{xx} + 10u_{xy} + 3u_{yy} + u_x + u_y + 2x + y = 0.$

$$5. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = (l - x) \sin \frac{\pi x}{l}, \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = 0$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0.$$

#### VARIANT 35

1. Chegaralangan va uzluksiz boshlang'ich shartlar uchun Koshi masalaning yechimining yagonaligi
2. Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasi va uning xossalari. Dirixle ichki masalasi uchun Grin funksiyasi.
3. Parabolik tipdagi tenglamalar. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasining chiqarilishi.

$$4. \quad 3u_{xx} - 10u_{xy} + 3u_{yy} - 2u_x + 4u_y + 2y = 0.$$

$$5. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 3, U(0, x) = x \sin(l - x), \frac{\partial y}{\partial t}(0, x) = 0,$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

#### VARIANT 36

1. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi
2. Grin funksiyaning xossalari.  $G(M, P) > 0, \quad M, P \in \Omega, \quad P \neq M.$
3. Parabolik tipdagi tenglamalar. Fazoda issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasining chiqarilishi.

$$4. \quad 2u_{xx} + 6u_{xy} + 4u_{yy} + u_x + u_y = 0.$$

$$5. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t + 5)x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0,$$

$$U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

#### VARIANT 37

1. Yarim to'g'ri chiziqdagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun ikkinchi chegaraviy masalani yechimining mavjudligi
2. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (parabolik tenglamalar).

3. Dirixle ichki masalani yechimining turg'unligi.

$$4. \quad 2u_{xy} - 4u_{yy} + u_x - 2u_y + x = 0.$$

$$5. \quad U_{tt} = a^2 U_{xx} + (t^2 - 1)x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0, U(t, 0) = U(t, l) = 0$$

#### VARIANT 38

1. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 1 va 2 xossalar

2. Ikkinchi taribli xususiy xosilali tenglamalarning klassifikatsiyasi (umumiy, kvazichizikli, chizikli, bir jinsli, bir jinsli bulmagan tenglamalarning ta'riflari, tenglamalarning tiplari).

3. Parabolik tipdagi tenglamalar. Bir fazoviy o'zgaruvchili issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi. Asosiy masalalarning qo'yilishi.

4.  $u_{xx} - 6u_{xy} + 9u_{yy} - u_x + 2u_y = 0.$

5.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 4, U(0, x) = 2(l - x) \sin x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### VARIANT 39

1. Birinchi chegaraviy masalasi uchun Grina funksiyasi. 3 va 4 xossalar

2. Tebranish tenglamalar uchun masalalarning qo'yilishi (Ideal tor tebranish tenglamasi, elastik membrana tebranish tenglamasi, boshlang'ich shartlar, chegaraviy shartlar, birinchi chegaraviy masala, yarim to'g'ri chiziq, Koshi masalasi).

3. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi.

4.  $u_{xx} - 4u_{xy} + 5u_{yy} - 3u_x + u_y = 0.$

5.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 10, U(0, x) = 10x, U(t, 0) = U(t, l) = 0, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = 0.$

#### VARIANT 40

1. Laplas va Puasson tenglamalari. Garmonik funksiya

2. Tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasi yechimining mavjudligi, yagonaligi va turg'unligi. D'alamber formulasi.

3. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masala. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining mavjudligi.

4.  $u_{xx} + 4u_{xy} + 13u_{yy} + 3u_x + 24u_y + 9(x + y) = 0.$

5.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + 10(t - 1) \cos 2x, a = 1, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### VARIANT 41

1. Chegaraviy masalalar qo'yilishi.  $E^3$  va  $E^2$  fazolarda Dirixle va Neyman masalalari.

2. Xususiy xosilali differensial tenglamalar. Asosiy ta'riflar.

3. Oddiy va ikkilangan qatlam potentsiali. Birluk zichlik bilan berilgan ikkilangan qatlam potentsiali.

4.  $u_{xx} - u_{yy} + u_x + u_y = 0.$

5.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 1,5, U(0, x) = 2(x + 3), \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = \sin x,$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = 1.$

#### VARIANT 42

1. Laplas tenglamasining fundamental yechimi

2. Birinchi tartibli kvazichizqli tenglamalar (Bir jinsli, bir jinsli bulmagan, umumiy yechim)
3. Parabolik tipdagi tenglamalar. Birinchi chegaraviy masala. Birinchi chegaraviy masalasi yechimining mavjudligi.
4.  $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + 3u_x - 5u_y = 0.$
5.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + tx^2, a = 2, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$

#### VARIANT 43

1. Birinchi va ikkinchi Grin formulalar.
2. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (giperbolik tenglamalar).
3. Neyman ichki masalasi. Yechimning yagonaligi.
4.  $2u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + 4u_x + 4u_y = 0.$
5.  $U_{tt} = a^2 U_{xx}, a = 2, U(0, x) = \cos 2x, \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = x,$   
 $U(t, 0) = U(t, l) = t.$

#### VARIANT 44

1. Uchinchi Grin formulasi. Ikki ulchovli fazoda Grin formulalar.
2. Ikkinchi tartibli ikki o'zgaruvchili differensial tenglamalarni ta'rifi va kanonik shakliga keltirish (elliptik tenglamalar).
3. Fazoda Dirixle tashqi masalasi. Yagonalik teoremasi.
4.  $u_{xy} + 2u_{yy} - u_x + 4u_y = 0.$
5.  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + t^2 x, a = 3, U(0, x) = \frac{\partial U}{\partial t}(0, x) = U(t, 0) = U(t, l) = 0$

### Matematik fizika tenglamalari fanidan testlar.

1. Tenglamani tartibini aniqlang.  $\ln|U_{xx}U_{yy}| - \ln|U_{xx}| - \ln|U_{yy}| + U_y + U_x = 0$   
2; 4; 3; 5
2. Tenglamani tartibini aniqlang.  $2U_{xx}U_{xy} - \frac{\partial}{\partial y}U_{xx} - 2U_yU_{xy} + U_x = 0$   
3; 2; 4; 1;
3. Tenglamani tipini aniqlang.  $U_{xx} + 4U_{xy} + U_{yy} + 2U_x + 2U_y - U = 0$   
Giperbolik tipli; Parabolik tipli; Elliptik tipli; Tipini aniqlab bo'lmaydi.
4. Tenglamani tipini aniqlang.  $2U_{xx} + 2U_{xy} + U_{yy} + 2U_y - U = 0$   
Elliptik tipli; Parabolik tipli; Giperbolik tipli; Tipini aniqlab bo'lmaydi.
- 5) Ushbu tenglamani xarakteristik tenglamasini ko'rsating:  $xU_{xx} + yU_{yy} - U = 0.$

$$xdy^2 + ydx^2 = 0; ydy^2 + xdx^2 = 0; ydy^2 - xdx^2 = 0; xdy^2 - ydx^2 = 0$$

6) Ushbu tenglamaning xarakteristik tenglamasini ko'rsating:

$$U_{xx} - 2\sin x U_{xy} - \cos^2 x U_{yy} - \cos x U_y = 0.$$

$$dy^2 + 2\sin x dx dy - \cos^2 x dx^2 = 0; dy^2 - 2\sin x dx dy - \cos^2 x dx^2 = 0;$$

$$dy^2 + 2\sin x dx dy + \cos^2 x dx^2 = 0; dx^2 + 2\sin x dx dy - \cos^2 x dy^2 = 0$$

7) Qaysi differensial tenglamalar uch ulchovli?

$$1) xU_{xx} + yU_{yy} + 2U_x + 2U_y = 0.$$

$$2) U_{xx} + xyU_{yy} = 0$$

$$3) U_{xy} - U_{xz} + 2U_x + 2U_y = 0.$$

$$4) U_{xy} - U_{zz} + U_x - 2U_{yy} = 0.$$

$$3, 4; \quad 1, 2; \quad 2, 3; \quad 1, 4$$

8) Qaysi differensial tenglamalar uch ulchovli?

$$1) U_{xx} + 2U_{xy} - 4U_{yz} = 0$$

$$2) U_{xy} - 2U_{xz} + 4U_{yz} + U_x = 0$$

$$3) 2U_{xy} - 4U_{yy} + U_x - 2U_y + U + x = 0$$

$$4) U_{xx} + U_{yy} - U_x + U_y - U_z = 0$$

$$1, 2, 4; \quad 1, 2; \quad 1, 3; \quad 1, 4.$$

9) Chiziqli differensial tenglamalarni ko'rsating

$$1) 2U_{xx}^2 + (U_{xx} - 2)U_{xy} - U_{yy}^2 = 0$$

$$2) U_{xx} + U_x U_{yy} - 3U_{yy} = 0$$

$$3) U_{xx} + 2U_{xy} + U_{zz} - 8U = 0$$

$$4) U_{xy} - x \sin x U_{yy} + 3U_y = 0$$

$$3, 4; \quad 1, 2; \quad 2, 3; \quad 1, 4;$$

10)  $U_{xx} + 2U_{xy} - 3U_{yy} - 9U = 0$  tenglamaning xarakteristik chiziqlarini ko'rsating

$$y + 3x = c_1; \quad y - x = c_2; \quad y + 3x = c_1; \quad y + 2x = c_2.$$

$$y - 3x = c_1; \quad y + x = c_2; \quad 2y - 3x = c_1; \quad 2y + 3x = c_2.$$

11)  $U_{xx} - 2\sin x U_{xy} - \cos^2 x U_{yy} - \cos x U_y = 0$  tenglamaning xarakteristik chiziqlarini ko'rsating

$$y + \cos x + x = c_1, \quad y + \cos x - x = c_2; \quad y - \cos x - x = c_1, \quad y - \cos x + x = c_2$$

$$y - \sin x + x = c_1, \quad y - \sin x - x = c_2; \quad y + \sin x + x = c_1, \quad y + \sin x - x = c_2.$$

12)  $k$  ning qanday qiymatlarida  $U(x, y) = x^3 + ky^2$  funksiya garmonik bo'ladi.

$$-3; \quad 2; \quad 4; \quad -4.$$

13)  $k$  ning qanday qiymatlarida  $U(x, y) = x^2 + y^2 + kz^2$  funksiya garmonik bo'ladi.

$$-2; \quad 2; \quad 4; \quad -4.$$

14) Gelmgolts tenglamasini ko'rsating.

$$U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} - \lambda U = 0; U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} = 0; U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} = x^2; U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} = y^2$$

15) Bigarmonik tenglamani ko'rsating.

$$\Delta\Delta U = 0; \quad \nabla\nabla U = 0; \quad \nabla\Delta U = 0; \quad 2\Delta U = 0.$$

16) Silindrik koordinatalarni ko'rsating.

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad z = z; \quad x = \rho \sin \varphi, \quad y = \rho \cos \varphi, \quad z = z; \\ x = \rho^2 \cos^2 \varphi, \quad y = \rho^2 \sin^2 \varphi, \quad z = z; \quad x = \cos \varphi, \quad y = \sin \varphi, \quad z = z ..$$

17) Sferik koordinatalarni ko'rsating.

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta .; \\ x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \cos \theta \cos \varphi, \quad z = r \cos \theta; \\ x = r \cos \theta \cos \varphi, \quad y = r \cos \theta \sin \varphi, \quad z = r \sin \theta .$$

18)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}$ ,  $U(0,t) = U(l,t) = 0$ ,  $U(x,0) = \varphi(x)$ ,  $U_t(x,0) = \psi(x)$  masalaning xos qiymatlarini ko'rsating.

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{l}, \quad n = 1,2,3,\dots .; \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{l}, \quad n = 1,2,3,\dots .; \\ \lambda_n = \frac{(2n+1)\pi}{2l}, \quad n = 1,2,3,\dots .; \quad \lambda_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l}, \quad n = 1,2,3,\dots .$$

19)  $xU_x + yU_y + zU_z = 0$  tenglamaning xarakteristik sistemasini tuzing.

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}; \quad dx = dy = dz; \quad \frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{z}; \quad \frac{dx}{z} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{y}$$

20)  $U_x + U_y + U_z = U$  tenglamaning xarakteristik sistemasini tuzing.

$$dx = dy = dz = \frac{dU}{U}; \quad \frac{dx}{U} = dy = dz = dU; \quad dx = \frac{dy}{U} = \frac{dz}{z} = \frac{dU}{1}; \quad \frac{dx}{z} = \frac{dy}{U} = \frac{dz}{x} = dU$$

21)  $x^2U_x + y^2U_y = U + 1$  tenglamaning xarakteristik sistemasini tuzing.

$$\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{U+1}; \quad \frac{dx}{U+1} = \frac{dy}{y^2} = \frac{dU}{x^2}; \quad \frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} = \frac{dU}{U+1}; \quad \frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} = dU$$

22)  $U_x + U_y = 0$  tenglamaning xarakteristik chizig'ini ko'rsating.

$$x - y = c; \quad x + y = c; \quad xy = c; \quad \frac{x}{y} = c.$$

23)  $xU_x + yU_y = 0$  tenglamaning xarakteristik chizig'ini ko'rsating.

$$\frac{x}{y} = c; \quad x + y = c; \quad xy = c; \quad x^2 y = c$$

24)  $x^2U_x + y^2U_y = 0$  tenglamaning xarakteristik chizig'ini ko'rsating.

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = c; \quad x + y = c; \quad x - y = c; \quad xy = c.$$

25)  $yU_x + xU_y = 0$  tenglamaning xarakteristik chizig'ini ko'rsating.

$$x^2 - y^2 = c; \frac{x^2}{y^2} = c; x + y = c; x - y = c.$$

26)  $U_{xx} + 4U_{xy} + 13U_{yy} + 3U_x + 24U_y - 9U + 9(x + y) = 0$  tenglamaning xarakteristik ciziqclarini toping.

$$2x - y = c_1, \quad 3x = c_2; \quad 2x + y = c_1, \quad 3x = c_2; \quad x - 2y = c_1, \quad 3x = c_2; \\ x + 2y = c_1, \quad 3x = c_2.$$

27)  $U_{xx} - 2\sin x U_{xy} - \cos^2 x U_{yy} - \cos x U_y = 0$  tenglamaning xarakteristik ciziqclarini toping.

$$x + y - \cos x = c_1, \quad -x + y - \cos x = c_2; \quad x + 2y - \cos x = c_1, \quad -x + y - \cos x = c_2; \\ 2x + y - \cos x = c_1, \quad -x + 2y - \cos x = c_2; \quad x + y + \cos x = c_1, \quad 2y - 3x + \cos x = c_2.$$

28)  $x^2 + y^2 = r^2 < R^2$  doira uchun Dirixlening ichki masalasi qanday ko'rinishga ega.

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = 0, \quad 0 \leq r < R \\ U(x, y) = g(x, y), \quad r = R \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = 0, \quad 0 \leq r < R \\ \frac{\partial U(x, y)}{\partial \nu} = g(x, y), \quad r = R \end{array} \right\};$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = 0, \quad R < r < \infty \\ U(x, y) = g(x, y), \quad r = R \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = 0, \quad R < r < \infty \\ \frac{\partial U(x, y)}{\partial \nu} = g(x, y), \quad r = R \end{array} \right\}$$

29)  $x^2 + y^2 = r^2 \leq R^2$  doira uchun Dirixlening tashqi masalasi qanday ko'rinishga ega.

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = 0, \quad R < r < \infty \\ U(x, y) = g(x, y), \quad r = R, \quad |U(x, y)| < \infty \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = 0, \quad 0 \leq r < R \\ U(x, y) = g(x, y), \quad r = R \end{array} \right\};$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = 0, \quad R < r < \infty \\ \frac{\partial U(x, y)}{\partial \nu} = g(x, y), \quad r = R \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = 0, \quad R < r < \infty \\ \frac{\partial U(x, y)}{\partial \nu} = g(x, y), \quad r = R, \quad |U(x, y)| < \infty \end{array} \right\}.$$

30)  $x^2 + y^2 = r^2 < R^2$  doira uchun  $\Delta U(x, y) = 0, \quad 0 \leq r < R, \quad \frac{\partial U(x, y)}{\partial \nu} = f(x, y), \quad r = R$

Neyman ichki masalasining to'g'ri qo'yilish shartini aniqlang

$$\int_0^{2\pi} f(x, y) ds = 0; \quad \int_0^{\infty} f(x, y) ds = 0; \quad \int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial \nu} ds = 0; \quad \int_0^{2\pi} f(x, y) ds < 0$$

31)  $x^2 + y^2 = r^2 < R^2$  doirada Puasson tenglamasi uchun Dirixle masalasini ko'rsating.

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = f(x, y), \quad 0 \leq r < R \\ U(x, y) = g(x, y), \quad r = R \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = 0, \quad 0 \leq r < R \\ U(x, y) = g(x, y), \quad r = R \end{array} \right\};$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = f(x, y), \quad 0 \leq r < R \\ \frac{\partial U(x, y)}{\partial \nu} = g(x, y), \quad r = R \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} \Delta U(x, y) = U(x, y), \quad 0 \leq r < R \\ U(x, y) = g(x, y), \quad r = R \end{array} \right\}$$

32)  $x^2 + y^2 = r^2 < R^2$  doirada Puasson tenglamasi uchun Dirixle tashqi masalasi qanday qo'yiladi?

$$\begin{cases} \Delta U(x, y) = f(x, y), & R < r < \infty \\ U(x, y) = g(x, y), & r = R, \quad |U(x, y)| < \infty. \end{cases}; \begin{cases} \Delta U(x, y) = 0, & R < r < \infty \\ U(x, y) = g(x, y), & r = R. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta U(x, y) = f(x, y), & R < r < \infty \\ \frac{\partial U(x, y)}{\partial \nu} = g(x, y), & r = R. \end{cases}; \begin{cases} \Delta U(x, y) = U(x, y), & 0 \leq r < R \\ U(x, y) = g(x, y), & r = R. \end{cases}$$

33) Tekislikda aniqlangan Laplas operatorini aniqlang:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}; \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}; \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial x\partial y} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}; \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

34) Uc o'lchovli fazoda berilgan Laplas operatorini aniqlang:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}; \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2};$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial x\partial y} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}; \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial x\partial y} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial x\partial z} + 2\frac{\partial^2}{\partial y\partial z} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

35) Tekislikda aniqlangan Laplas tenglamasini aniqlang:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0; \quad \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0; \quad \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0;$$

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = xy$$

36) Uch o'lchovli fazoda berilgan Laplas tenglamasini aniqlang:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0; \quad \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0; \quad \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0;$$

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = xy$$

37) Tekislikda aniqlangan Puasson tenglamasini aniqlang:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y); \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = y.$$

38) Uc o'lchovli fazoda berilgan Puasson tenglamasini aniqlang:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 1; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 1; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = xy$$

39) Qaysi javobda chekli torning erkin tebranish tenglamasi keltirilgan

$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, \quad U(0, t) = U(l, t) = 0, \quad U(x, 0) = \varphi(x), \quad U_t(x, 0) = \psi(x);$$

$$U_t = a^2 U_{xx}, \quad U(0, t) = U(l, t) = 0, \quad U(x, 0) = 0, \quad U_t(x, 0) = \psi(x);$$



$$U_t = a^2 U_{xx} + f(x), \quad U(0,t) = U(l,t) = 0, \quad U(x,0) = \varphi(x), \quad U_t(x,0) = \psi(x);$$

$$\Delta U(x,y) = 0, \quad 0 \leq r < R, \quad \frac{\partial U(x,y)}{\partial \nu} = f(x,y), \quad r = R, \quad x^2 + y^2 = r^2 < R^2.$$

40) Qaysi tenglama gaz tarqalish va diffuziya tenglamasi bo'ladi

$$\Delta U(x,y) = 0, \quad 0 \leq r < R, \quad U(x,y) = f(x,y), \quad r = R, \quad x^2 + y^2 = r^2 < R^2;$$

$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, \quad U(0,t) = U(l,t) = 0, \quad U(x,0) = \varphi(x), \quad U_t(x,0) = \psi(x);$$

$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, \quad U(0,t) = U(l,t) = 0, \quad U(x,0) = x^2, \quad U_t(x,0) = x;$$

$$U_t = a^2 U_{xx}, \quad U(0,t) = U(l,t) = 0, \quad U(x,0) = 0, \quad U_t(x,0) = \psi(x)$$

41) Qaysi tenglama issiqlik tarqalish tenglamasi bo'ladi

$$U_t = a^2 U_{xx}, \quad U(0,t) = U(l,t) = 0, \quad U(x,0) = 0, \quad U_t(x,0) = \psi(x);$$

$$\Delta U(x,y) = 0, \quad 0 \leq r < R, \quad U(x,y) = f(x,y), \quad r = R, \quad x^2 + y^2 = r^2 < R^2;$$

$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, \quad U(0,t) = U(l,t) = 0, \quad U(x,0) = \varphi(x), \quad U_t(x,0) = \psi(x);$$

$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, \quad U(0,t) = U(l,t) = 0, \quad U(x,0) = x^2, \quad U_t(x,0) = x$$

42)  $U_{xy} = x + y$  tenglamaning umumiy yechimini toping.

$$U = \frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} + \varphi_1(x) + \psi(y); \quad U = \frac{x^2 y}{2} + \varphi_1(x) + \psi(y);$$

$$U = \frac{x^2 y}{2} - \frac{xy^2}{2} + \varphi_1(x) + \psi(y); \quad U = \frac{xy^2}{2} + \varphi_1(x) + \psi(y).$$

43)  $U_{xy} - U_{yy} = 0$  tenglamaning umumiy yechimini toping.

$$U = \varphi(x+y) + \psi(y-x); \quad U = \varphi(x+y) + \psi(2y-x);$$

$$U = \varphi(x+e^y) + \psi(y-e^x); \quad U = \varphi(x+2y) + \psi(x-2y).$$

44)  $3U_{xy} + 10U_{xy} + 3U_{yy} = 0$  tenglamaning umumiy yechimini toping.

$$U = \varphi(3y-x) + \psi(y-x); \quad U = \varphi(x+y) + \psi(x-y);$$

$$U = \varphi(y-3x) + \psi(y+3x); \quad U = \varphi\left(\frac{1}{3}y-x\right) + \psi\left(\frac{1}{3}y+3x\right).$$

45)  $U_{xx} - 6U_{xy} + 5U_{yy} = 0$  tenglamaning umumiy yechimini toping.

$$U = \varphi(y+5x) + \psi(y+x); \quad U = \varphi(x+5y) + \psi(y+x);$$

$$U = \varphi(y+5x) + \psi(y-x); \quad U = \varphi(5y+4x) + \psi(4y+x).$$

46) Koshi masalasini yeching:

$$\begin{cases} U_{tt} = U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} \\ U(x,y,z,0) = xyz, \quad U_t(x,y,z,0) = x^2 y^2 z^2 \end{cases}$$

$$U = xyz + (xyz)^2 t + \frac{1}{3}(x^2 y^2 + x^2 z^2 + y^2 z^2)t^3 + \frac{1}{15}(x^2 + y^2 + z^2)t^5 + \frac{1}{105}t^7; \quad U = xyz.$$

$$U = xyz + (xyz)^3 t; \quad U = xyz + \frac{t^7}{105}.$$

47) Ushbu 
$$\begin{cases} U_{tt} = U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} \\ U(x, y, z, 0) = x^2 + y^2 + z^2, \quad U_t(x, y, z, 0) = xy \end{cases}$$
 Koshi masalasi yechimini

ko'rsating

$$U = x^2 + y^2 + z^2 + 3t^2 + xyt; \quad U = x^2 + y^2 + z^2; \quad U = x^2 + y^2 + z^2 + 3t^2;$$

$$U = x^2 + y^2 + z^2 - 5t^2.$$

48) Ushbu 
$$\begin{cases} U_{tt} = U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} \\ U(x, y, z, 0) = x^2 + y^2, \quad U_t(x, y, z, 0) = 1 \end{cases}$$
 Koshi masalasi yechimini ko'rsating

$$U = x^2 + y^2 + t + 2t^2; \quad U = x^2 + z^2 + t + 2t^2; \quad U = x^2 + z^2 + t - 3t^2; \quad U = y^2 + z^2 + t + 2t^2.$$

49) Berilgan Koshi masalasi yechimini aniqlang: 
$$\begin{cases} U_{tt} = U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} \\ U(x, y, z, 0) = x + y, \quad U_t(x, y, z, 0) = 1 \end{cases}$$

$$U = x + y + t; \quad U = x + y - t; \quad U = x + y + t^2; \quad U = x - y + t.$$

50) Berilgan Koshi masalasini yechimini aniqlang:

$$\begin{cases} U_{tt} = U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} \\ U(x, y, z, 0) = x + y + z, \quad U_t(x, y, z, 0) = z \end{cases}$$

$$U = x + y + z + tz; \quad U = (x + y + z)t^2 + tz; \quad U = x + y + z + tx; \quad U = x + y + z + ty.$$

51)  $U_x + U_y = 0$  tenglamani yechimini ko'rsating.

$$U = x - y.$$

$$U = xy.$$

$$U = \frac{x}{y}.$$

$$U = x^2 - y^2.$$

52)  $xU_x + yU_y = 0$  tenglamani yechimini ko'rsating.

$$U = \frac{x}{y}.$$

$$U = x + y.$$

$$U = xy.$$

$$U = x^2 - y^2.$$

53)  $x^2U_x + y^2U_y = 0$  tenglamani yechimini ko'rsating.

$$U = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}.$$

$$U = x + y.$$

$$U = \frac{x}{y}.$$

$$U = x^2 + y^2.$$

54)  $yU_x + xU_y = 0$  tenglamani yechimini ko'rsating.

$$U = x^2 - y^2.$$

$$U = x - y.$$

$$U = \frac{x}{y}.$$

$$U = \frac{y}{x}.$$

55)  $U_x + U_y = 0$  tenglamani umumiy yechimini ko'rsating.

$$U = \Phi(x - y).$$

$$U = \Phi\left(\frac{x}{y}\right).$$

$$U = \Phi(xy).$$

$$U = \Phi(x^2 - y^2).$$

56)  $xU_x + yU_y = 0$  tenglamani umumiy yechimini ko'rsating.

$$U = \Phi\left(\frac{x}{y}\right) ..$$

$$U = \Phi(x + y).$$

$$U = \Phi(xy).$$

$$U = \Phi(x^2 y).$$

57)  $x^2U_x + y^2U_y = 0$  tenglamani umumiy yechimini ko'rsating.

$$U = \Phi\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right) ..$$

$$U = \Phi(x + y).$$

$$U = \Phi(x^2 + y^2).$$

$$U = \Phi(x^2 - y^2).$$

58)  $yU_x + xU_y = 0$  tenglamani umumiy yechimini ko'rsating.

$$U = \Phi(x^2 - y^2) ..$$

$$U = \Phi(x + y).$$

$$U = \Phi\left(\frac{x}{y}\right).$$

$$U = \Phi(xy).$$

59)  $xU_x - yU_y = 0$  tenglamaning birinchi integralini aniqlang.

$$xy = c ..$$

$$\frac{x}{y} = c.$$

$$x - y = c.$$

$$x + y = c.$$

60) 
$$\begin{cases} U_{tt} = U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, & t > 0 \\ U(x,0) = x, & U_t(x,0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$
 Koshi masalasi yechimini aniqlang

$$U(x,t) = x.$$

$$U(x,t) = x + t.$$

$$U(x,t) = xt.$$

$$U(x,t) = x - t.$$

$$61) \begin{cases} U_{tt} = U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0 \\ U(x,0) = \sin x, \quad U_t(x,0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad \text{Koshi masalasi yechimini aniqlang}$$

$$U(x,t) = \sin x \cos t.$$

$$U(x,t) = \sin x - \cos x.$$

$$U(x,t) = \sin x \cos t.$$

$$U(x,t) = \sin x + \sin t.$$

$$62) \begin{cases} U_{tt} = U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0 \\ U(x,0) = 0, \quad U_t(x,0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad \text{Koshi masalasi yechimini aniqlang}$$

$$U(x,t) = xt.$$

$$U(x,t) = \frac{x}{t}.$$

$$U(x,t) = x^2 - t^2.$$

$$U(x,t) = x + t.$$

$$63) \begin{cases} U_{tt} = U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0 \\ U(x,0) = x, \quad U_t(x,0) = 1, & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad \text{Koshi masalasi yechimini aniqlang}$$

$$U(x,t) = x + t.$$

$$U(x,t) = \sin(x+t).$$

$$U(x,t) = x - 2t.$$

$$U(x,t) = 2xt.$$

$$64) \begin{cases} U_{tt} = U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0 \\ U(x,0) = \cos x, \quad U_t(x,0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad \text{Koshi masalasi yechimini aniqlang}$$

$$U(x,t) = \cos x \cos t.$$

$$U(x,t) = \cos x - \cos t.$$

$$U(x,t) = \cos x \sin t.$$

$$U(x,t) = \sin x \sin t.$$

$$65) \begin{cases} U_{tt} = U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0 \\ U(x,0) = x^2, \quad U_t(x,0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad \text{Koshi masalasi yechimini aniqlang}$$

$$U(x,t) = x^2 + t^2.$$

$$U(x,t) = xt.$$

$$U(x,t) = \frac{x}{t}.$$

$$U(x,t) = \frac{x^2}{t^2}.$$

$$66) \begin{cases} U_{tt} = U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0 \\ U(x,0) = 0, \quad U_t(x,0) = -\sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad \text{Koshi masalasi yechimini aniqlang}$$

$$U(x,t) = -\sin x \sin t.$$

$$U(x,t) = \frac{\sin x \sin t}{2}.$$

$$U(x,t) = \sin x - \sin t.$$

$$U(x,t) = \sin x - \cos t.$$

$$67) \begin{cases} U_{tt} = U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0 \\ U(x,0) = 0, \quad U_t(x,0) = \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad \text{Koshi masalasi yechimini aniqlang}$$

$$U(x,t) = \cos x \sin t.$$

$$U(x,t) = \sin x \cos t.$$

$$U(x,t) = \cos x - \sin t.$$

$$U(x,t) = \cos x + \sin t.$$

68) Quyidagi tenglamalardan qaysi birini  $V_{xy} + aV = 0$  kurinishga keltirish mumkin.

$$U_{xy} + U_x - U_y = 0$$

$$U_{xy} + x^2 U_x - 2y^2 U_y = 0$$

$$U_{xy} + \frac{1}{x} U_x - \frac{1}{y} U_y = 0$$

$$U_{xy} + \sin x U_x + \cos y U_y = 0$$

69)  $U_{xy} + 2U_x - 3U_y = U$  tenglama qanday turdagi tenglamaning sodda kurinishidan iborat.

Giperbolik turdagi.

Elliptik turdagi.

Parabolik turdagi.

Elleptiko-Parabolik turdagi.

70)  $U_{xx} - U_{yy} = 0$  tenglama qanday turdagi tenglamaning sodda ko'rinishidan iborat

Elliptik turdagi.

Giperbolik turdagi.

Parabolik turdagi.

Giberbolo-Parabolik turdagi.

71)  $U_{xx} + U_x - U_y = U$  tenglama qanday turdagi tenglamaning sodda ko'rinishidan iborat

Parabolik turdagi.

Giperbolik turdagi.

Elliptik turdagi.

Elliptiko-Giperbolik turdagi.

72) Nyuton potensialini aniqlang

$$u(x) = \int_D \frac{1}{|x-y|} \mu(y) dy_1 dy_2 dy_3$$

$$u(x) = \int_{\Gamma} \frac{1}{|x-y|} \mu(y) d\Gamma$$

$$u(x) = \int_D \ln \frac{1}{x-y} \mu(y) dy_1 dy_2$$

$$u(x) = \int_D \mu(y) \ln \frac{x}{x-y} dy_1 dy_2$$

73) Logarifmik potensialini aniqlang

$$u(x) = \int_D \ln \frac{1}{x-y} \mu(y) dy_1 dy_2$$

$$u(x) = \int_{\Gamma} \frac{1}{|x-y|} \mu(y) d\Gamma$$

$$u(x) = \int_D \frac{1}{|x-y|} \mu(y) dy_1 dy_2 dy_3$$

$$u(x) = \int_D \mu(y) \ln \frac{x}{x-y} dy_1 dy_2$$

74) Quyidagi funksiyaning qaysi biri  $u(x) = \int_D (y_1^2 + y_2^2) \ln \frac{1}{|x-y|} dy_1 dy_2$  logarifmik

potensialning zichligi bo'ladi.

$$\mu(y) = y_1^2 + y_2^2$$

$$\mu(y) = \frac{1}{y_1^2 + y_2^2}$$

$$\mu(y) = \frac{1}{y_1^2 + y_2^2}$$

$$\mu(y) = 1$$

75)  $u(x) = \int_D \frac{y_1}{y_1 + y_2} \frac{1}{|x-y|} dy_1 dy_2 dy_3$  Nyuton potentsiali zichligini aniqlang

$$\mu(y) = \frac{y_1}{y_1 + y_2}$$

$$\mu(y) = \frac{1}{y_1 + y_2}$$

$$\mu(y) = \frac{y_1 + y_2}{y_1}$$

$$\mu(y) = 1$$

76)  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ,  $u(x,0) = \varphi(x)$ ,  $u_t(x,0) = \psi(x)$  masala yechimi uchun Dalamber formulasini kursating.

$$u(x,t) = \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

$$u(x,t) = \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2}$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

$$u(x, t) = \frac{\psi(x+at) + \psi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi$$

77)  $U_{xx} + 2U_{xy} + 2U_{yy} - 5U_{zz} = 0$  kurinishdagi elliptic tipli tenglamaning sodda ko'rinishini aniqlang.

$$V_{\xi\xi} + V_{\eta\eta} + V_{\zeta\zeta} = 0 .$$

$$V_{\xi\xi} - V_{\eta\eta} - V_{\zeta\zeta} = 0$$

$$V_{\xi\xi} - V_{\eta\eta} + V_{\zeta\zeta} = 0 .$$

$$V_{\xi\xi} - V_{\eta\eta} - V_{\zeta\zeta} + V_{\eta} = 0 .$$

78) Quyidagi giperbolik tipli tenglamaning sodda kurinishini aniqlang:

$$3U_{xy} - 2U_{xz} - 2U_{yz} - U = 0$$

$$V_{\xi\xi} - V_{\eta\eta} - V_{\zeta\zeta} + V = 0 .$$

$$V_{\xi\xi} + V_{\eta\eta} + V_{\zeta\zeta} = 0$$

$$V_{\xi\xi} + V_{\eta\eta} + V_{\zeta\zeta} + V_{\xi} = 0 .$$

$$V_{\xi\xi} - V_{\eta\eta} - V_{\zeta\zeta} + V_{\xi} + V_{\eta} = 0 .$$

79) Ikkinchi tartibli ko'p o'zgaruvchili parabolic tipli tenglamalarning sodda kurinishini ko'rsating

$$U_{xx} + 4U_{yy} + U_{zz} + 4U_{xy} + 2U_{xz} + 4U_{yz} + 2U = 0 .$$

$$V_{\xi\xi} + 2V = 0 .$$

$$V_{\xi\xi} + V_{\eta\eta} + V_{\zeta\zeta} = 0$$

$$V_{\xi\xi} - V_{\eta\eta} - V_{\zeta\zeta} = 0 .$$

$$V_{\xi\xi} + V_{\eta\eta} - V_{\zeta\zeta} = 0 .$$

80) Fazoda Laplas tenglamasining fundamental yechimini aniqlang.

$$U = \frac{1}{|x-y|} .$$

$$U = \ln \frac{1}{|x-y|} .$$

$$U = |x-y| .$$

$$U = |x+y| .$$

81) Tekislikda Laplas tenglamasining fundamental yechimini aniqlang.

$$U = \ln \frac{1}{|x-y|} .$$

$$U = |x-y| .$$

$$U = |x + y|.$$

$$U = \frac{1}{|x - y|}.$$

82)  $U_{xx} + U_{yy} = 0$  tenglama uchun  $\begin{cases} x^2 + y^2 = r^2, & 0 \leq r < R \\ U(x, y) = g(x, y), & r = R \end{cases}$  Dirixle masalasi yechimini

kursating.

$$U = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar \cos(\varphi - \psi) + r^2} d\psi$$

$$U = \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar \cos(\varphi - \psi) + r^2} d\psi$$

$$U = \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\varphi - \psi) + r^2} d\psi$$

$$U = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar \cos(\varphi - \psi) + r^2} d\psi$$

83)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}$ ,  $U(x, 0) = \varphi(x)$ ,  $U_t(x, 0) = \psi(x)$ ,  $U(0, t) = 0$ ,  $U_t(l, t) = 0$

masalaga mos keluvchi Shturm-Liuivill masalasini kursating

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

$$X'' + a^2 \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

$$X'' - a^2 X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

$$X'' - \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

84)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}$ ,  $U(x, 0) = \varphi(x)$ ,  $U_t(x, 0) = \psi(x)$ ,  $U(0, t) = 0$ ,  $U_x(l, t) = 0$

masalaga mos keluvchi Shturm-Liuivill masalasini kursating

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X'(l) = 0$$

$$X'' + a^2 \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

$$X'' - a^2 X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

$$X'' - \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0.$$

85)  $U_{tt} = a^2 U_{xx} + f(x, t)$ ,  $U(x, 0) = \varphi(x)$ ,  $U_t(x, 0) = \psi(x)$ ,  $U_x(0, t) = 0$ ,  $U_x(l, t) = 0$

masalaga mos keluvchi Shturm-Liuivill masalasini kursating

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) = X'(l) = 0$$

$$X'' + a^2 \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X'(l) = 0$$

$$X'' - a^2 X = 0, \quad X'(0) = X(l) = 0$$

$$X'' - \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) = X(l) = 0$$

86) Quyidagi aralash masalaga mos keluvchi Shturm-Liuivill masalasini kursating

$U_{tt} = a^2 U_{xx} + f(x, t)$ ,  $U(x, 0) = \varphi(x)$ ,  $U_t(x, 0) = \psi(x)$ ,  $U_x(0, t) - HU(0, t) = 0$ ,  $U(l, t) = 0$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) - HX(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X'(l) = 0$$



$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) - HX'(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) = X'(l) = 0$$

87) Quyidagi aralash masalaga mos keluvchi Shturm-Liuivill masalasini kursating

$$U_{tt} = a^2 U_{xx} + f(x,t), \quad U(x,0) = 0, \quad U_t(x,0) = 1, \quad U(0,t) = 0, \quad U_x(l,t) + HU(l,t) = 0$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) + HX(l) = 0.$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X'(l) = 0$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) - HX'(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) = X'(l) = 0$$

88) Chegaraviy sharti uchunchi tur bulgan quyidagi aralash masalaga mos Shturm-Liuivill masalasini kursating:

$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, \quad U(x,0) = \varphi(x), \quad U_t(x,0) = \psi(x), \quad U_x(0,t) - HU(0,t) = 0, \quad U_x(l,t) + HU(l,t) = 0$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) - HX(0) = 0, \quad X'(l) - HX(l) = 0.$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) = X(l) = 0$$

89)  $U_{tt} = a^2 U_{xx}$ ,  $U(x,0) = 0$ ,  $U_t(x,0) = x$ ,  $U(0,t) = 0$ ,  $U(l,t) = 0$  masalaning xos qiymatlarini kursating.

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda_n = \frac{2n\pi}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda_n = \frac{l}{n\pi}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

90) Quyidagi chegaraviy sharti ikkinchi turdan iborat bo'lgan aralash masalaning xos qiymatlarini kursating:

$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, \quad U(x,0) = x, \quad U_t(x,0) = 1+x, \quad U_x(0,t) = 0, \quad U_x(l,t) = 0$$

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda_n = \frac{(2n-1)\pi}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda_n = \frac{l}{n\pi}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda_n = \frac{l}{2n-1}\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

91) Quyidagi aralash masalaning xos qiymatlarini kursating:

$$U_{tt} = a^2 U_{xx}, \quad U(x,0) = \sin x, \quad U_t(x,0) = \cos x, \quad U(0,t) = 0, \quad U_x(l,t) = 0$$

$$\lambda_n = \frac{(2n+1)\pi}{2l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{l}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda_n = \frac{l\pi}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda_n = \frac{2n+1}{l}\pi, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

92)  $U_{tt} = U_{xx}$  tenglama uchun Gursa masalasi shartlarini ko'rsating.

$$\begin{cases} U(x, t) = \varphi(x), & \text{agar } t+x=0 \text{ bo'lsa,} \\ U(x, t) = \varphi(x), & \text{agar } t-x=0 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

$$U(x, 0) = \varphi(x), \quad U_t(x, 0) = \psi(x).$$

$$U_x(x, 0) = \varphi(x), \quad U_t(x, 0) = \psi(x).$$

$$U_x(x, 0) = \varphi(x), \quad U_x(x, 0) = \psi(x).$$

93) Bir ulchovli to'liq tenglamasi uchun qo'yilga Koshi masalasi yechimi qanday formula orqali beriladi?

Dalamber formulasi.

Grin formulasi.

Puasson integrali.

Krixgorf formulasi.

94) Ikki ulchovli to'liq tenglamasi uchun qo'yilga Koshi masalasi yechimi qanday formula orqali beriladi?

Puasson formulasi.

Grin formulasi.

Dalamber formulasi.

Krixgorf formulasi.

95) Uch ulchovli to'liq tenglamasi uchun qo'yilga Koshi masalasi yechimi qanday formula orqali beriladi?

Krixgorf formulasi.

Grin formulasi.

Puasson integrali.

Dalamber formulasi.

96) Fazoda Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasining kurinishi qanday buladi?

$$G(x, y) = \frac{1}{|x-y|} + g(x, y).$$

$$G(x, y) = \ln \frac{1}{|x-y|} + g(x, y).$$

$$G(x, y) = \frac{1}{|x-y|}.$$

$$G(x, y) = \ln \frac{1}{|x-y|}.$$

97) Tekislikda Laplas tenglamasi uchun Grin funksiyasining kurinishi qanday buladi?

$$G(x, y) = \ln \frac{1}{|x - y|} + g(x, y), \quad g(x, y) - \text{garmonik funksiya}.$$

$$G(x, y) = \frac{1}{|x - y|} + g(x, y).$$

$$G(x, y) = \frac{1}{|x - y|}.$$

$$G(x, y) = \ln \frac{1}{|x - y|}.$$

98) Fazoda Laplas tenglamasi uchun qo'yilgan Dirixle masalasi yechimi qanday ko'rinishda?

Puasson integrali ko'rinishida.

Kirxgorf formulasi ko'rinishida.

Grin formulasi ko'rinishida.

Dalamber formulasi ko'rinishida.

99) Tekislikda Laplas tenglamasi uchun qo'yilgan Dirixle masalasi yechimi qanday ko'rinishda?

Puasson integrali ko'rinishida.

Kirxgorf formulasi ko'rinishida.

Grin formulasi ko'rinishida.

Dalamber formulasi ko'rinishida.

100) Gel'mgol'ts tenglamasini ko'rsating.

$$U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} + k^2 U = 0.$$

$$U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} = 0.$$

$$U_{xx} + U_{yy} = 0.$$

$$U_{tt} - U_{xx} - U_{yy} - U_{zz} = 0.$$

# MATEMATIK FIZIKA TENGLAMALARI

## MA'RUZANING TAQDIMOT SLAYDLARI

## Математик физика тенгламалари маърузалар

Акрам Хасанович Бегматов,  
профессор, ф.-м.ф.д  
Дифференциал ва математик физика  
тенгламалари кафедраси

### Маъруза № 1 Ўзгармас коэффициентли 2-чи тартибли чизикли тенгламалари

#### Режа:

1. Асосий таърифлар
2. 1-тартибли квазичизикли тенгламалар
3. Мисоллар
4. Таъриф
5. Каноник кўринишга келтириш

#### Таянч иборалар

*Хусусий хосилали дифференциал тенглама, тенгламанинг тарбиби, квазичизикли тенгламалар, ечим, Коши масаласи, иккинчи тартибли хусусий хосилали тенглама*

#### Асосий таърифлар

- Хусусий хосилали дифференциал тенглама деб бир нечта ўзгарувчили номаълум функцияга, унинг аргументлари ва турли тартибли хусусий хосилаларига нисбатан тенгламаларга айтилади.

## Асосий таърифлар

Агар номаълум функция ўзгарувчига боғлиқ бўлса, яъни  $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$  бўлса у ҳолда, хусусий хосилали дифференциал тенглама

$$F\left(x_1, x_2, \dots, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \dots, \frac{\partial^n u}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}}\right) = 0$$

кўринишга эга, бу ерда  $k_1 + \dots + k_n = m$ ,

$F$  – берилган функциялар. Хусусий хосилали дифференциал тенгламанинг **тартиби** деб бу тенгламага кирувчи хосилаларнинг энг юқори тартибига айтилади

## Асосий таърифлар

$n$ -тартибли тенглама тартиби  $n$  дан катта бўлмаган хусусий хосилаларга эга бўлади. Хусусий хосилали чизикли тенглама

$$a_1(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + a_n(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_n} + b_1(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dots + b_n(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = f(x_1, \dots, x_n, u)$$

кўринишга эга. Масалан

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} + xyz = 1,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0,$$

$$\left(x + \frac{\partial z}{\partial y}\right) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$$

тенгламалар чизикли булади.

### 1-тартибли квазичизикли тенгламалар

Квазичизикли тенгламалар

$$a_1(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + a_n(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_n} = f(x_1, \dots, x_n, u) \quad (1.1)$$

қуришига эга. Агар  $f(x_1, \dots, x_n, u) \neq 0$  бўлса у ҳолда тенглама бир жинсли тенглама бўлмайди, акс ҳолда,  $f(x_1, \dots, x_n, u) = 0$  бўлса, тенглама бир жинсли тенглама бўлади.

(1.1) тенглама ечиш учун

$$\frac{dx_1}{a_1} = \frac{dx_2}{a_2} = \dots = \frac{dx_n}{a_n} = \frac{du}{f} \quad (1.2)$$

системани тузамиз. (1.2) системани ечиш жараёнида  $n$ -та биринчи интеграллар хосил қиламиз:

$$\varphi_i(x_1, \dots, x_n, u) = C_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Тенгламани ечимини қуйидаги  $F(\varphi_1, \dots, \varphi_n) = 0$  функция беради, бу ерда  $F(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$  ихтиёрий уз аргументлари бўйича дифференциалланувчи функция.

7

### 1-тартибли квазичизикли тенгламалар

**Теорема 1.1.** (1.1) тенглама ечими (1.2) оддий дифференциал тенгламалар системасининг ечимга тенг кучли, унинг  $n$ -та биринчи интеграллари ҳар биттаси алоҳида берилган тенгламани ечимини беради. Шунда  $F(\varphi_1, \dots, \varphi_n) = 0$  умумий ечим бўлади.

**Теорема 1.2.**  $a_1(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + a_n(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_n} = 0$

бир жинсли тенглама ечиш учун оддий дифференциал тенгламалар системаси тузилади.

Бу системанинг ечимлари  $(n-1)$ -та биринчи интеграллардан иборат бўлади.

Қуйидаги тасдиқ уринли: агар  $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = l$

бўлса, шунда ихтиёрий  $k$ -лар учун

$$\frac{k_1 a_1 + \dots + k_n a_n}{k_1 b_1 + \dots + k_n b_n} = l \quad (1.3) \text{ ўринли.}$$

8

### Мисоллар

1-Мисол.

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

тегламани ечим.

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{x}$$

системани тузамиз. Сўнгра

$$x dx + y dy = 0, \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} y^2 = C, x^2 + y^2 = C$$

Умумий ечимни

$$z = F(x^2 + y^2)$$

булади.

9

### Мисоллар

2-Мисол.

$$xz \frac{\partial x}{\partial x} + yz \frac{\partial z}{\partial y} = -xy$$

тегламани ечим.

$$\frac{dx}{xz} = \frac{dy}{yz} = -\frac{dz}{xy}$$

системани тузамиз.

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}, \ln|x| = \ln|y| + \ln C_1$$

тегламани ечимиз,  
ушдан

$$C_1 = \frac{x}{y}$$

ни топамиз.  
(3) айлангудай фойдаланиб

$$\frac{k_1 dx + k_2 dy + k_3 dz}{k_1 xz + k_2 yz - k_3 xy} = \frac{dz}{-xy}$$

ни оламиз.

10

### Мисоллар

Фараз қилайлик, масалан,  
 $k_1 = y, k_2 = x, k_3 = 0$

булсин, бу ҳолда

$$\frac{y dx + x dy}{yz + xyz} = \frac{dz}{-xy} \Rightarrow \frac{d(xy)}{2xyz} = -\frac{dz}{xy}$$

Сўнгра

$$d(xy) = -2z dz, xy = -z^2 + C, C = xy + z^2$$

$$F(x^2 + y^2, xy + z^2) = 0 \text{ умумий ечимни ҳосил қиламиз.}$$

11

### Мисоллар

Ҳисобию тегламалар узун. Қопи масаласини ечимни қараймиз

$$\begin{cases} x = x_0(t), \\ y = y_0(t), \\ z = z_0(t). \end{cases}$$

Фараз қилайлик,

$$\varphi_1(x, y, z) = C_1,$$

$$\varphi_2(x, y, z) = C_2$$

иккита биринчи интеграл топилган булсин. У ҳолда

$$\begin{cases} \Phi_1(t) = C_1, \\ \Phi_2(t) = C_2; \end{cases} \Leftrightarrow \Phi(C_1, C_2) = 0$$

ва исхавастган ечим

$$\Phi(\varphi_1, \varphi_2) = 0 \text{ булади.}$$

12

### Мисоллар

3-Мисал.  $x = 2$  да  $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy, z = y^2 + 1$

Копи масалани ечинг.

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z - xy} \quad \text{системани тузамиз.}$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \quad \text{тенгламани ечимини изласак, кўйидагиларни ҳосил қиламиз:}$$

$$\ln|x| = \ln|y| + \ln C_1, \quad C_1 = \frac{x}{y}$$

14

### Мисоллар

$$\frac{dx}{x} = \frac{dz}{z - xy} \quad \text{тенгламани қараймиз.} \quad \frac{k_1 dx + k_2 dy + k_3 dz}{k_1 xz + k_2 yz - k_3(z - xy)} = \frac{dz}{z - xy}$$

айниқлини тузамиз.

$$k_1 = y, k_2 = x, k_3 = 0 \quad \text{булсин, у ҳолда}$$

$$\frac{ydx + xdy}{2xy} = \frac{dz}{z - xy}, \quad \frac{d(xy)}{2xy} = \frac{dz}{z - xy}, \quad \frac{1}{2} \ln|xy| = \frac{dz}{z - xy}$$

$$xy = t, dt = xdy + ydx \quad \text{алмағдирий қиламиз.}$$

$$\frac{1}{2} \ln|t| = \frac{dz}{z - t}, \quad \frac{1}{2} \ln|t| = \ln|z - t| + \ln C_2 \quad \text{ни ҳосил қиламиз, булдан}$$

$$C_2 = \frac{t^2}{z - t} = \frac{x^2 y^2}{z - xy} \quad \text{ни тонамиз.}$$

$$F\left(\frac{x}{y}, \frac{x^2 y^2}{z - xy}\right) = 0 \quad \text{умумий ечимини ҳосил бўлади.}$$

16

### Мисоллар

$x = 2$  да  $z = y^2 + 1$  Копи масалани қараймиз

$$\begin{cases} 2y = C_1, \\ \frac{4y^2}{y^2 - 2y + 1} = C_2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2y = C_1, \\ \frac{4y^2}{(y-1)^2} = C_2. \end{cases}$$

16

## 2 – тартибли ўзгармас коэффицентли чизикли тенгламалар

Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенглама юқори тартибли ҳосилаларга нисбатан чизикли дейилади, агар бу тенглама фақат биринчи тартибли ҳосилаларни ўз ичига сақласа.

$u = u(x, y)$  функцияга нисбатан иккинчи тартибли хусусий ҳосилали дифференциал тенглама кўйидаги умумий қурилишга эга:

$$a(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + F(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}) = 0. \quad (1)$$

Агар  $b^2 - ac > 0$  бўлса, (1) тенглама **гиперболик типдаги**

**тенглама** (гўлқин тенглама),  $b^2 - ac = 0$  бўлса,

**параболик типдаги тенглама** (иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси),  $b^2 - ac < 0$  бўлса, **эллиптик типдаги**

**тенглама** (старционар тенглама)

17



## 2 – тартибли ўзгармас коэффициентли чизикли тенгламалар

(1) тенглamani янги  $\xi$  ва  $\eta$  ўзгарувчиларга формулалар бўйича ўтиш йўли билан каноник кўринишга келтириш мумкин.

$x$  ва  $y$  ўзгарувчилари бўйича берилган хосилаларни,  $\xi$  ва  $\eta$  ўзгарувчилар бўйича хосилаларга алмаштирамиз.

Математик физик тенгламалар курси учун характерли белгилашларни киритамиз:

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, u_y = \frac{\partial u}{\partial y}, u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, u_{yy} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, u_{xy} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$$

У холда

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x,$$

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y,$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx},$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy}$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy}$$

## 2 – тартибли ўзгармас коэффициентли чизикли тенгламалар

$\xi(x, y)$  ва  $\eta(x, y)$  функцияларни топиш учун

$$a(dy)^2 - 2bdxdy + c(dx)^2 = 0, \quad (2)$$

характеристик тенглама қаралади, у иккита тенгламалар системага тенг кучли:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{b + \sqrt{b^2 - ac}}{a} \\ \frac{dy}{dx} = \frac{b - \sqrt{b^2 - ac}}{a} \end{cases} \quad (3)$$

(2) эгри чизикли интеграл тенгламалар (1) тенгламанинг характеристик тенгламалари деб аталади. Гиперболик, параболик ва эллиптик тигдаги тенгламаларни каноник кўринишга келтиришни қараймиз.

19

## Гиперболик тигдаги тенгламаларнинг каноник шакли

1. Агар (1) тенглама гиперболик тигда бўлса, (3)-чи тенгламаларнинг биринчи интеграллари

$$\varphi_1(x, y) = C_1, \varphi_2(x, y) = C_2 \quad \text{хақиқий ва ҳар хил.}$$

Улар (1) тенгламанинг хақиқий характеристикалари иккита турли оиласини аниқлайди.

Ўзгарувчиларни  $\xi = \varphi_1(x, y), \eta = \varphi_2(x, y)$  алмаштириш ёрдамида, (1) тенглама гиперболик тигдаги тенглamani қўйидаги **каноник** кўринишга келтирилади:

$$u_{\xi\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$$

$\xi = \mu + \nu, \eta = \mu - \nu$  ўзгарувчиларни алмаштириш ёрдамида бошқа

$$u_{\mu\nu} - u_{\nu\nu} = \Phi(\mu, \nu, u, u_\mu, u_\nu)$$

каноник кўринишга келтирилади.

20

## Мисоллар

1 мисол.

$$a^2 u_{xx} - y^2 u_{yy} = 0 \quad \text{тенгламани каноник кўринишга келтириш.$$

$$b^2 - ac = 0 + x^2 y^2 = x^2 y^2 > 0 \quad \text{Бўлгани учун, бу гиперболик тигдаги тенглама эканлигини аниқлаймиз.}$$

Характеристик тенглама тузамиз:

$$x^2 (dy)^2 y (dx)^2 = 0 \Leftrightarrow (x dy + y dx)(x dy - y dx) = 0$$

Иккита

$$(x dy + y dx) = 0, (x dy - y dx) = 0$$

дифференциал тенглама хосия қиламиз.

Ўзгарувчиларни ажратиб ва интеграллаб қўйидаги кўринишга келамиз:

$$\frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0, \ln|y| + \ln|x| = \ln C_1$$

$$\frac{dy}{y} - \frac{dx}{x} = 0, \ln|y| - \ln|x| = \ln C_2$$

21

### Мисоллар

Потенциаллаштирилгандан кейин, икки оила  
характеристикалар учун тенгламаларни топамиз:

$$xy = C_1, \frac{y}{x} = C_2$$

Энди янги ўзгарувчиларни киритамиз.

$$\xi = xy, \eta = \frac{y}{x}$$

Юқорида келтирилган формулалардан фойдаланиб, эски ўзгарувчилар буйича  
хусусий ҳосилаларни янги ўзгарувчилар буйича хусусий ҳосилалар  
орқали ифодалаймиз:

22

### Мисоллар

$$u_x = u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = u_{\xi} + \frac{y^2}{x^2} u_{\eta}$$

$$u_y = u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = x u_{\xi} + \frac{1}{x} u_{\eta}$$

$$u_{xx} = (u_{\xi\xi\xi} + u_{\xi\xi\eta})y - (u_{\eta\xi\xi} + u_{\eta\xi\eta})\frac{y}{x^2} + \frac{2y}{x^3} u_{\eta} = (u_{\xi\xi\xi} - \frac{y}{x^2} u_{\xi\xi\eta})y -$$

$$- (u_{\xi\xi\eta} - \frac{y}{x^2} u_{\eta\xi\xi})\frac{y}{x^2} + \frac{2y}{x^3} u_{\eta} = y^2 u_{\xi\xi\xi} - 2\frac{y^2}{x^2} u_{\xi\xi\eta} + \frac{y^2}{x^4} u_{\eta\xi\xi} + 2\frac{y}{x^3} u_{\eta}$$

$$u_{yy} = x(u_{\xi\xi\xi} + u_{\xi\xi\eta}) + \frac{1}{x}(u_{\eta\xi\xi} + u_{\eta\xi\eta}) = x(xu_{\xi\xi\xi} + \frac{1}{x}u_{\xi\xi\eta}) +$$

$$+ \frac{1}{x}(xu_{\eta\xi\xi} + \frac{1}{x}u_{\eta\xi\eta}) = x^2 u_{\xi\xi\xi} + 2u_{\xi\xi\eta} + \frac{1}{x^2} u_{\eta\xi\xi}$$

23

### Мисоллар

Берилган тенгламага иккинчи ҳосил учун тошган ифодаларни қўйиб

$$x^2(y^2 u_{\xi\xi} - 2\frac{y^2}{x^2} u_{\xi\xi\eta} + \frac{y^2}{x^4} u_{\eta\xi\xi} + 2\frac{y}{x^3} u_{\eta}) - y^2(x^2 u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\xi\eta} + \frac{1}{x^2} u_{\eta\xi\xi}) = 0$$

ни оламиз. Охириги ифодани соддалаштириб,

$$u_{\xi\xi\eta} - \frac{1}{2\xi} u_{\eta} = 0$$

каноник кўринишга келамиз.

24

### Параболик типдаги тенгламаларнинг каноник шакли

Агар (1) параболик типдаги тенглама бўлса, у ҳолда (3)  
тенгламалар ўста-ўст тушади. Бу ҳолда (3) система учун

битта  $\varphi(x, y) = C$  биринчи интегрални ҳосил

қиламиз. У ҳолда ўзгарувчиларни

$$\xi = \varphi(x, y), \eta = \psi(x, y)$$

формула буйича амаллаштириб оламиз, бу ерда  $\psi(x, y)$  -ни

$$\begin{vmatrix} \varphi_x & \varphi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{vmatrix} \neq 0$$

шартни қаноатлантирувчи ихтиерий функция, яъни  
функционал детерминант -якобиан-нолга  
тенг бўлмаслиги лозим.

25

### Мисоллар

2-мисол. Тенгламани каноник кўринишга келтиринг.

$$z_{xx} \sin^2 x - z_{yy} 2y \sin x + z_{yy} y^2 = 0$$

$b^2 - ac = y^2 \sin^2 x - y^2 \sin^2 x = 0$  бўлгани учун тенглама гиперболоик типга  
қарашли.

Характеристик тенгламаси қуйидагича

$$\sin^2 x (dy)^2 + 2y \sin x dx dy + y^2 (dx)^2 = 0 \quad \text{эски}$$

$$(\sin x dy + y dx)^2 = 0 \quad \text{кўринишга эга. Янги}$$

$xdy + ydx = 0$  тенгламани ўзгарувчиларни ажратиб ва интеграллаб

$$\frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0, \ln|x| + \ln|y| = \ln C, \ln \frac{x}{y} = C. \quad \text{тенгламани оламиз.}$$

26

### Мисоллар

$\xi = y \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \eta = y$  ўзгаришларини алмаштириб, бу ерда  $y$  - ихтиёр

$\begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0$  шартин каноатлантирувчи функция. Бу функция учун хусусий ҳосилаларни янги ўзгаришлар орқали ифодалаймиз.

$$z_x = z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x = \frac{1}{2} z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2},$$

$$z_y = z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y = z_\xi \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_\eta,$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= \frac{1}{2} (z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\xi\eta} \eta_x) y \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = \\ &= \frac{1}{4} z_{\xi\xi} y^2 \sec^4 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} y z_\xi \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \end{aligned}$$

27

### Мисоллар

$$z_{yy} = (z_{\xi\xi} \xi_y + z_{\xi\eta} \eta_y) \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\eta\xi} \xi_y + z_{\eta\eta} \eta_y = z_{\xi\xi} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 2z_{\xi\eta} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\eta\eta}$$

$$z_{xy} = \frac{1}{2} (z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\xi\eta} \eta_x) y \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} z_\xi \sec^2 \frac{x}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} (z_{\xi\xi} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\xi\eta}) y \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} z_\xi \sec^2 \frac{x}{2}$$

ни оламиз. Олинган хусусий ҳосилаларни берилган дифференциал тенгламага қўямиз.

$$\begin{aligned} &\frac{1}{4} z_{\xi\xi} y^2 \sec^4 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} y z_\xi \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} - (z_{\xi\xi} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\xi\eta}) y^2 \sec^2 \frac{x}{2} \sin x - \\ &- \frac{1}{2} z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2} \sin x + y^2 (z_{\xi\xi} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 2z_{\xi\eta} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + z_{\eta\eta}) = 0 \end{aligned}$$

28

### Мисоллар

Соддалаштириб 
$$\frac{1}{2} z_{\xi\xi} y \sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} \sin^2 x + y^2 z_{\eta\eta} - z_\xi y \sec^2 \frac{x}{2} \sin x = 0$$

ёки 
$$y z_{\eta\eta} = z_\xi \sin x$$
 ни оламиз.

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}$$
 бўлгани учун у ҳолда

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{\xi}{\eta}, \sin x = \frac{2\xi}{\xi^2 + \eta^2}$$

натijaда 
$$z_{\eta\eta} = \frac{2\xi}{\xi^2 + \eta^2} z_\xi$$
 ни ҳосил қиламиз

29

### Эллиптик типдаги тенгламаларнинг каноник шакли

Агар (1) тенглама эллиптик типда бўлса, системанинг биринчи интеграллари қўшма комплекс кўринишда бўлади:

$$\varphi(x, y) + i\psi(x, y) = C_1, \varphi(x, y) - i\psi(x, y) = C_2$$

$\xi = \varphi(x, y), \eta = \psi(x, y)$  формула буйича алмаштириш ердамида (1) тенглама

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$$

кўринишга келтирилади.

30

### Мисоллар

3-мисол.

$$z_{xx} - 2z_{xy} + 2z_{yy} = 0 \quad \text{тенгламани каноник кўринишга келтириш:}$$

$$b^2 - ac = 1 - 2 = -1 < 0 \quad \text{булгани учун эллиптик типдаги тенглама экан.}$$

Демак, характеристик тенглама

$$(dy)^2 + 2dxdy + 2(dx)^2 = 0, \quad y'^2 + 2y' + 2 = 0$$

кўринишга эга. Уни ечиб

$$y + x - ix = C_1, \quad y + x + ix = C_2$$

ни топамиз. Иккита маъхум характеристикалар оилаларини ҳосил қиламиз:

$$\xi = y + x, \quad \eta = x \quad \text{ўзгарувчиларни алмаштириб}$$

$$z_x = z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x = z_\xi + z_\eta,$$

31

### Мисоллар

$$z_y = z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y = z_\xi,$$

$$z_{xx} = (z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\xi\eta} \eta_x) + (z_{\eta\xi} \xi_x + z_{\eta\eta} \eta_x) = z_{\xi\xi} + 2z_{\xi\eta} + z_{\eta\eta},$$

$$z_{xy} = z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\xi\eta} \eta_x = z_{\xi\xi} + z_{\xi\eta}$$

$$z_{yy} = z_{\xi\xi} \xi_y + z_{\xi\eta} \eta_y = z_{\xi\xi}.$$

ларга эга бўламиз. Топилган ифодаларни беришган дифференциал тенгламага қуйиб

$$z_{\xi\xi} + 2z_{\xi\eta} + z_{\eta\eta} - 2z_{\xi\xi} - 2z_{\xi\eta} + 2z_{\xi\xi} = 0 \quad \text{ни ёки}$$

$$z_{\xi\xi} + z_{\eta\eta} = 0 \quad \text{ифодани оламиз.}$$

32

### Саволлар

1. Хусусий ҳосилли дифференциал тенглама таъриф беринг.
2. Хусусий ҳосилли дифференциал тенглама тартиби деб нима айтилади.
3. Квазичизикли дифференциал тенглама қандай кўринишга эга?
4. Квазичизикли дифференциал тенглама умумий ечими тўғрисидаги теоремани келтиринг.
5. Бир жинсли тенгламанинг ечими тўғрисидаги теоремани келтиринг.
6. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилли тенглама қачон чизикли дейилади?
7. Хусусий ҳосилли дифференциал тенглама қачон гиперболлик типдаги тенглама дейилади?
8. Хусусий ҳосилли дифференциал тенглама қачон параболлик типдаги тенглама дейилади?
9. Хусусий ҳосилли дифференциал тенглама қачон эллиптик типдаги тенглама дейилади?
10. Математик физик тенгламалар курси учун характери белгилашларни келтиринг.
11. 2-чи тартибли ўзгармас коэффициентли гиперболлик типдаги тенгламани каноник шаклига келтириш йўлини айтинг.
12. 2-чи тартибли ўзгармас коэффициентли параболлик типдаги тенгламани каноник шаклига келтириш йўлини айтинг.
13. 2-чи тартибли ўзгармас коэффициентли эллиптик типдаги тенгламани каноник шаклига келтириш йўлини айтинг.

## Математик физика тенгламалари маърузалар

### Маъруза № 2.

#### Мавзу:

### ГИПЕРБОЛИК ТИПДАГИ ТЕНГЛАМАЛАР.

### Маъруза № 2

### ГИПЕРБОЛИК ТИПДАГИ ТЕНГЛАМАЛАР.

#### Режа:

1. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенгламаларнинг классификацияси.
2. Тебраниш тенграмаси учун масаланинг қуйилиши.
3. Даламбер формуласи. Коши масаласи ечимининг мавжудлиги турғунлиги ва ягоналиги.
4. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенгламаларнинг характеристикаси.
5. Ярим тўғри чизикдаги масала. Давом эттириш методи.

### Таянч иборалар

*хусусий ҳосилали теглама,  
классификация,  
тебраниш тенграмаси, Даламбер  
формуласи,  
Коши масаласи, характеристика,  
давом эттириш.*

### 1. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенгламаларнинг классификацияси

Ўтган маърузада берилган таърифларни эслаймиз.

**Таъриф:**  $E^2$  фазода иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларга эга бўлган бирор бир функция  $U(x, y)$  берилган (бунда  $U_x = U_y$ ) бўлсин.

Шунда хусусий ҳосилали умумий тенглама деб

$$F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy}) = 0$$

тенгламага айтилади. Бунда  $F$  қандайдир функция. Квазичизиқли тенглама унинг хусусий ҳолидан иборат

$$a_{11}(x, y, u, u_x, u_y)u_{xx} + 2a_{12}(x, y, u, u_x, u_y)u_{xy} + a_{22}(x, y, u, u_x, u_y)u_{yy} + F_1(x, y, u, u_x, u_y) = 0$$



### 1. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенгламаларнинг классификацияси

**Таъриф:** Агар  $f \equiv 0$  бўлса шунда (2.1) тенглама бир жинсли тенглама акс ҳолда бир жинсли бўлмаган тенглама деб айтылади.

**Таъриф:**  $(x_0, y_0)$  нуктада (2.1) тенглама куйидагича аниқланади.

1. Агар  $a_{12}^2(x_0, y_0) - a_{11}(x_0, y_0)a_{22}(x_0, y_0) > 0$   
бўлса **гиперболик** тидаги бўлади.
2. Агар  $a_{12}^2(x_0, y_0) - a_{11}(x_0, y_0)a_{22}(x_0, y_0) < 0$   
бўлса **эллиптик** тидаги бўлади.
3. Агар  $a_{12}^2(x_0, y_0) - a_{11}(x_0, y_0)a_{22}(x_0, y_0) = 0$   
бўлса **параболик** тидаги бўлади.

5

### 1. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенгламаларнинг классификацияси

Тенгламанинг тиби маълум бир соҳа учун ҳам худди шундай аниқланади: (2.1) тенглама соҳада (гиперболик), (эллиптик), [параболик] тидаги деб аталади, агар шу соҳа барча нукталарда

$$a_{12}^2(x_0, y_0) - a_{11}(x_0, y_0)a_{22}(x_0, y_0) > 0 (< 0) [= 0]$$

бўлса.

Агар тенглама соҳанинг ҳар хил нукталарида ҳар хил тишга эга бўлса, бунда у шу соҳада аралаш тидаги тенглама тейилади.

6

### 2. Тебраниш тенгламаси учун масаланинг қуйилиши.

Бизлар гиперболик тидаги тенгламани кўриб чиқамиз. Фараз қилайлик  $u(x, t) \in C^2((x, t): 0 < x < l, t > 0)$  бўлсин, шунда

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad ((x, t): 0 < x < l, t > 0) \quad (2.1)$$

Тенглама *идеал торнинг тебраниш тенгламаси* дейилади.

Икки фазовий ўзгаришчиларнинг функцияси  $u(x, y, t)$  ҳолида:

$$u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad (x, y) \in D, t > 0 \text{ бу эластик мембрананинг тебраниш тенгламаси.}$$

(2.1) тенгламани қараймиз. Биз куйидаги бошланғич шартларни беришимиз мумкин:

$$\begin{cases} u(x, 0) = \phi(x), & 0 < x < l; & \text{— торнинг мувозанат ҳолатидан четланишини} \\ u_t(x, 0) = \varphi(x), & 0 < x < l, & \text{изоҳлайди;} \\ \text{ва чегаравий шартларни:} \\ \begin{cases} u(l, t) = \mu(t), & t > 0; & \text{(маҳкамланган ҳолда } \mu = 0) \\ u_x(l, t) = \nu(t), & t > 0; \\ u(l, t) + \alpha u_x(l, t) = \theta(t), & t > 0 \end{cases} \end{cases}$$

одагда бизлар улардан баъзиларини оламиз.

### 2. Тебраниш тенгламаси учун масаланинг қуйилиши.

Гиперболик ёки тебраниш тенгламалар учун чегаравий масалалар тузамиз. **Биринчи чегаравий масала.**

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad 0 < t \leq T; \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l; \\ u_t(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l; \\ u(0, t) = \mu_1(t), & 0 \leq t \leq T; \\ u(l, t) = \mu_2(t), & 0 \leq t \leq T; \end{cases}$$

8

## 2. Тебраниш тенгласи учун масаланинг куйилиши.

Худди шуни ўзи ярим тўғри чизиқ учун:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, \quad 0 < t \leq T; \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0; \\ u_t(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0; \\ u(0, t) = \mu(t), & 0 \leq t \leq T; \end{cases}$$

Шунингдек оддий Коши масаласини қарайш мумкин:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad 0 < t \leq T; \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty; \\ u_t(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

## 3. Даламбер формуласи. Коши масаласи ечимининг мавжудлиги турғунлиги ва ягоналиги.

Бизлар тебраниш тенгласи учун Коши масаласини қараймиз.

$$[1.1] \begin{cases} (1) \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad 0 < t \leq T; \\ (2) \quad u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty; \\ (3) \quad u_t(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Фараз қилайлик,  $u \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$  функция бўлиб, у [1.1]

Коши масаласининг ечими бўлсин. Янги  $\xi, \eta$  ўзгарувчиларни куйидагича аниқлаймиз:

$$\begin{cases} \xi = x + at; \\ \eta = x - at; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\xi + \eta}{2}; \\ t = \frac{\xi - \eta}{2a}. \end{cases}$$

## 3. Даламбер формуласи. Коши масаласи ечимининг мавжудлиги турғунлиги ва ягоналиги.

Янги функцияни аниқлаймиз:  $v(\xi, \eta) = u\left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right)$

Бу функциянинг хусусий ҳосилаларини топамиз.

$$\begin{aligned} v_{\xi} &= u_x \left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right) \frac{1}{2} + u_t \left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right) \frac{1}{2a}; \\ v_{\xi\eta} &= u_{xx} \left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right) \frac{1}{4} + u_{xt} \left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right) \left(-\frac{1}{4a}\right) \\ &+ u_{tx} \left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right) \frac{1}{4a} + u_{tt} \left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right) \left(-\frac{1}{4a}\right) = \\ &= u_{xx} \left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right) \frac{1}{4} - \frac{1}{4a} u_{tx} \left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2a}\right) = \\ &\{тебраниш тенгласи\} = 0; \end{aligned}$$

## 3. Даламбер формуласи. Коши масаласи ечимининг мавжудлиги турғунлиги ва ягоналиги.

Энди тескари интеграллашни амалга оширамиз:

$$v_{\xi\eta}(\xi, \eta) = 0, \quad \xRightarrow{\xi \text{ бўйича интеграллаш}} v_{\eta}(\xi, \eta) = \tilde{f}_1(\eta) \Rightarrow$$

$$\xRightarrow{\eta \text{ бўйича интеграллаш}} v(\xi, \eta) = \int \tilde{f}_1(\eta) d\eta + f_2(\xi)$$

$$\Rightarrow v(\xi, \eta) = f_1(\eta) + f_2(\xi) \Rightarrow \{u(x, t) = v(x + at, x - at)\} \Rightarrow$$

$$u(x, t) = f_1(x - at) + f_2(x + at), \quad (2.2)$$

бу ерда  $\tilde{f}_1, f_1, f_2$  -лар интеграллаш давомида ҳосил бўладиган функциялар.

Шундай қилиб биз тебраниш тенгласи ечими бўлган  $u$  функциянинг умумий кўринишини ҳосил қилдик.

**3. Даламбер формуласи. Коши масаласи ечимининг мавжудлиги тургунлиги ва ягоналиги.**

Бошлангич шартлардан фойдаланиб  $f_1, f_2$  -ларни аниқлаймиз:

$$\begin{cases} u(x, 0) = f_1(x) + f_2(x) = \phi(x); \\ u_t(x, 0) = -af_1'(x) + af_2'(x) = \varphi(x); \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -f_1(x) + f_2(x) = \frac{1}{a} \int_{x_0}^x \varphi(\xi) d\xi + C \\ f_1(x) + f_2(x) = \phi(x). \end{cases}$$

Системадаги тенгламаларни қўшиб ва биридан бирини айлантириб қўйидагини ҳосил қиламиз.

13

**3. Даламбер формуласи. Коши масаласи ечимининг мавжудлиги тургунлиги ва ягоналиги.**

$$\begin{cases} f_2(x) = \frac{\phi(x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \varphi(\xi) d\xi + \frac{c}{2}; \\ f_1(x) = \frac{\phi(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \varphi(\xi) d\xi - \frac{c}{2}. \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{u(x, t) = f_1(x - at) + f_2(x + at)\} \Rightarrow$$

$$u(x, t) = \frac{\phi(x - at) + \phi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x - at}^{x + at} \varphi(\xi) d\xi \quad (2.3)$$

(2.3) формула Даламбер формуласи дейилади.

14

**3. Даламбер формуласи. Коши масаласи ечимининг мавжудлиги тургунлиги ва ягоналиги.**

**Теорема 2.1** (Коши масаласи ечимининг мавжудлиги ва ягоналиги). *Фараз қилайлик*  $\phi(x) \in C^2(R), \varphi(x) \in C^1(R)$

[1.1] Коши масаласининг ечимидан иборат шундай  $u(x, y)$  функция мавжуд ва ягонадирки, бунда  $u \in C^2(R \times \bar{R}^+)$  Бу ерда  $\phi(x), \varphi(x)$  функциялар бошлангич шартларни аниқлайди.

**Исбот:** Ечимнинг *мавжудлиги* (1)-(3) шартлардан фойдаланиб ва теорема шартларидан фойдаланган ҳолда бевосита ўрнига қўйиш билан текширилиб кўрилади. *Ягоналиги* қўйидаги

мулохазалардан келиб чиқади: (1)-(3) шартларни қаноатлантирувчи ихтиёрий функция учун Даламбер формуласи бўйича ифодаси ҳаққонийдир, бу ифода эса фақат битта функцияни кўзда тутди. □

**3. Даламбер формуласи. Коши масаласи ечимининг мавжудлиги тургунлиги ва ягоналиги.**

**Теорема 2.2** (Тургунлик теоремаси). *Фараз қилайлик*

$$\phi_1, \phi_2(x) \in C^2(R), \varphi_1, \varphi_2(x) \in C^1(R)$$

ва улар  $R$  фазода чеаграланган бўлсин. Агар  $u_1, u_2(x, t)$

функциялар [1.1] типдаги масаланинг ечимлари вამ мос равишда  $\phi_1, \phi_2, \varphi_1, \varphi_2$  бошлангич шартлар билан берилган ечимлари бўлса, шунда

$$\sup_{x \in R, 0 \leq t \leq T} |u_1(x, t) - u_2(x, t)| \leq \sup_{x \in R} |\phi_1(x) - \phi_2(x)| + T \sup_{x \in R} |\varphi_1(x) - \varphi_2(x)|$$

бўлади. **Исбот.**

$u_1, u_2$  учун (2.3) Даламбер формуларидан келиб чиқадики:

16




### 3. Даламбер формуласи. Коши масаласи ечимининг мавжудлиги турғунлиги ва ягоналиги.

$$u_{xx} = a^2 u_{tt}, \quad ((x, t): 0 < x < l, t > 0)$$

$$|u_1 - u_2| \leq \left| \frac{\phi_1(x+at) - \phi_2(x+at)}{2} \right| + \left| \frac{\phi_1(x-at) - \phi_2(x-at)}{2} \right| + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} |\varphi_1(\xi) - \varphi_2(\xi)| d\xi \leq \sup_{x \in R} |\phi_1(x) - \phi_2(x)| + \sup_{x \in R} |\varphi_1(x) - \varphi_2(x)| \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} d\xi \leq \sup_{x \in R} |\phi_1(x) - \phi_2(x)| + \sup_{x \in R} |\varphi_1(x) - \varphi_2(x)| T$$

Теорема исботланди.  $\square$



17

### 4. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенгламаларнинг характеристикалари.

Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали классик тенглама қуйидаги кўринишга эга:

$$a_{11}(x, y)U_{xx} + 2a_{12}(x, y)U_{xy} + a_{22}(x, y)U_{yy} = F(x, y, u, u_x, u_y) \quad (2.4)$$

Унга бир қийматли мослик билан қуйидаги оддий дифференциал тенгламани қўямиз:

$$a_{11} (dy)^2 - 2a_{12} dx dy + a_{22} (dx)^2 = 0 \quad (2.5)$$

Шунда (2.5)нинг ечимлари бўлган функциялар (эгри чизиклар) (2.4) тенгламанинг **характеристикалари** дейилади. Масалан

$$a^2 U_{xx} - U_{tt} = 0 \quad \text{тебраиш тенгламаси учун}$$

характеристикалар ҳосил қилинадиган тенглама

$$a^2 (dt)^2 - (dx)^2 = 0 \quad \text{кўринишга эга.}$$

### 4. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенгламаларнинг характеристикалари.

Ундан қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} a dt + dx = 0; \\ a dt - dx = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + at = const; \\ x - at = const. \end{cases}$$

Булар гипербولىк типдаги тенгламаларнинг характеристикаларидан иборат икки тўғри чизикдир.

Фараз қилайлик  $u(x, t)$  функция маълум бир Коши масаласининг ечими бўлсин. ОХТ текислигининг биринчи чорагида ихтиёрый  $(x_0, y_0)$  нуқта оламиз. Бу нуқтадан фақат иккита характеристика ўтади:

$$x - at = x_0 - at_0, \quad x + at = x_0 + at_0$$

Улар ОХ ўқини  $(x_0 + at_0, 0)$ ,  $(x_0 - at_0, 0)$  нуқталар орқали кесиб ўтиб, бунда характеристик учбурчакни ҳосил қилади.

### 4. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенгламаларнинг характеристикалари

$u(x, t)$  функция учун  $u(x_0, t_0)$

нуқтада (2.3) Даламбер формуласини ёзиб

$$u(x_0, t_0) = \frac{\phi(x_0 - t_0) + \phi(x_0 + t_0)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \varphi(\xi) d\xi$$

ҳосил қиламизки,  $u(x, t)$  функциянинг қиймати фақат характеристик учбурчакнинг асосидаги  $\phi(x)$ ,  $\varphi(x)$  қийматлари билан аниқланади.


Бу гипербولىк типдаги тенгламаларнинг муҳим ўзига хос хусусият. Уни қуйидаги мисолда тушиниб олиш мумкин.



20

#### 4. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенгламаларнинг характеристикалари

Фараз қилайлик  $\phi(x)$ ,  $\varphi(x)$  функциялар бирор  $[a, b]$  кесманинг ташқарисида 0 га тенг бўлсин. Шунда II, III соҳаларда  $u(x, t)$  функция ҳам 0 га айнан тенг бўлади. Бу Даламбер формуласидан осонгина кўриш мумкин. Ушбу факт (далил) гиперболик тенгламадаги  $u(x, t)$  сигнал (хабар)ни тарқалишининг ( $x$  ўқи бўйича) ( $t$  вақт мобайнидаги) охиридаги тезлигини кўрсатади.



#### 4. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилали тенгламаларнинг характеристикалари

Аксинча иссоқлик ўтказувчанлик тенгламаси учун берилган Коши масаласида

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) & -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

счим, кейинчилик кўрсатадиганидек, куйидаги кўринишга эга бўлади:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left(-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right) \phi(s) ds$$

Кўришиб типибдики, агар  $\phi(s)$  функция узлуксиз, манфий бўлмаган ва бирор нуқтада 0 дан фарқли бўлса, унда  $u(x, t) > 0, \forall t > 0$  бўлади.

Яъни биз шуни ҳосил қилдикки иссоқлик ўтказувчанлик тенгламаси ҳолида сигнал (хабар) амалда дарҳол (мгновенно) тарқалади.

22

#### 5. Ярим тўғри чизикдаги масалалар. Давом эттириш усули.

**Биринчи чегаравий масала.** Ярим тўғри чизикдаги бир жинсли шартга эга бўлган тебраниш тенгламаси учун биринчи чегаравий масала куйидаги кўринишга эга:

$$\begin{cases} (1) & u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t < 0; \\ (2) & u(x, t) = 0, & t < 0; \\ (3) & u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0; \\ (4) & u_t(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0; \end{cases}$$

$u(x, t)$  ва  $u_t(x, t)$  функцияларнинг 0 да узлуксизлигини таъминлаш учун  $\begin{cases} \phi(0) = 0; \\ \varphi(0) = 0. \end{cases}$

боғланиш шартларини қўшамиз (условия сопряжения).

#### 5. Ярим тўғри чизикдаги масалалар. Давом эттириш усули.

Модификацияланган Коши масаласини қараймиз.

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0; \\ u(x, 0) = \Phi(x), \\ u(x, 0) = \Psi(x). \end{cases}$$

Бу ҳолда  $U(x, t)$  ни топиш учун биз Даламбер формуласидан фойдаланамиз.

$$U(x, t) = \frac{\Phi(x - at) + \Phi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi.$$

$x, t \geq 0$  да бизга керакли  $u(x, t)$  функция сифатида

$U(x, t)$  функцияни оламиз. Кўришиб типибдики (1), (3) ва (4) шартлар  $x, t \geq 0$  бўлганда бирданига бажарилади.

### 5. Ярим тўғри чизикдаги масалалар. Давом эттириш усули.

бу  $\Psi(x), \Phi(x)$  ларни тарифидан келиб чиқади. (2) шартнинг бажарилиши қуйидаги алмаштиришлардан келиб чиқади.

$$u(0, t) \stackrel{\text{def}}{=} U(0, t) = \frac{\Phi(-at) + \Phi(at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \Psi(\xi) d\xi.$$

1-чи ва 2-чи қўшилувчилар тегишли функцияларнинг тоқлиги сабаби нольга айланади. Бу эса 2-чи шартнинг бажарилишини кўрсатади. Шундай қилиб бизлар тузган  $u(x, t)$  функция **биринчи чегаравий** масалаларнинг ечими эканлигини исботладик.

$\Psi(x), \Phi(x)$  функцияларни мос равишда исходные функциялар

$\phi(x), \varphi(x)$  орқали ифодалаймиз:

26

### 5. Ярим тўғри чизикдаги масалалар. Давом эттириш усули.

$$\text{Агар } x \geq at \text{ бўлса } \begin{cases} \Phi(x+at) = \phi(x+at); \\ \Phi(x-at) = \phi(x-at); \\ \Psi(\xi) = \varphi(\xi), \text{ агар } \xi \in [x-at; x+at] \text{ бўлса} \end{cases}$$

$$\text{Агар } x < at \text{ бўлса } \begin{cases} \Phi(x+at) = \phi(x+at); \\ \Phi(x-at) = -\phi(x-at); \end{cases}$$

Биринчи чегаравий масалани ечиш учун қуйидаги ёрдамчи формулани ёзамиз.

$$\begin{aligned} \text{Агар } x < at \text{ бўлса унда } \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi &= \int_{x-at}^0 \Psi(\xi) d\xi + \int_0^{x+at} \Psi(\xi) d\xi = \\ &= \int_{x-at}^0 -\varphi(-\xi) d\xi + \int_0^{x+at} \varphi(\xi) d\xi = \\ &= \{-\xi = \xi \text{ деб оламиз}\} = \int_{at-x}^0 \varphi(\xi) d\xi + \int_0^{x+at} \varphi(\xi) d\xi = \int_{at-x}^{at+x} \varphi(\xi) d\xi \end{aligned}$$

### 5. Ярим тўғри чизикдаги масалалар. Давом эттириш усули.

Шунда умумий формула қуйидагича бўлади:

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{\phi(x+at) + \phi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi, & x \geq at; \\ \frac{\phi(at+x) - \phi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{at+x} \varphi(\xi) d\xi, & x < at; \end{cases}$$

28

Саволлар.

1. Хусусий ҳосилани умумий тенглама деб нимага айтади?
2. Хусусий ҳосилани чизикли тенгламага таъриф беринг.
3. Бир жинсли хусусий ҳосилани тенглама таърифини беринг.
4. Хусусий ҳосилани тенгламага учун классификацияни келтиринг.
5. Тебраниш тенгламаси учун масаланинг қуйилиши.
6. Идеал торнинг тебраниш тенгламасини келтиринг.
7. Биринчи чегаравий масала.
8. Тебраниш тенгламаси учун Коши масаласи.
9. Даламбер формуласини ёзинг.
10. Коши масаласи ечимининг мавжудлиги турғунлиги ва ягоналиги турғунлиги теорема.
11. Турғунлик теоремаси.
12. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилани тенгламаларнинг характеристикалари.
13. Ярим тўғри чизикдаги бир жинсли биринчи чегаравий шартга эга бўлган тебраниш тенгламаси учун чегаравий масаланинг кўриниши.
14. Биринчи чегаравий масалани ечимини келтиринг.

29

## Математик физика тенгламалари маърузалар

### Маъруза № 3.

#### Мавзу:

Биринчи чегаравий масала  
ечимининг мавжудгини исботлаш  
учун ўзгарувчиларни ажратиш усули

### Маъруза № 3

Биринчи чегаравий масала ечимининг  
мавжудгини исботлаш учун  
ўзгарувчиларни ажратиш усули

#### Режа:

1. Иккинчи чегаравий масала
2. Ўзгарувчиларни ажратиш усули
3. Штурм-Лиувилл масаласининг тривиал бўлмаган ечимлари
4. Биринчи чегаравий масала ечимининг мавжудлиги ҳақида теорема
5. 1-чи чегаравий масала ягоналиги

### Таянч иборалар

чегаравий масала,  
ўзгарувчиларни ажратиш,  
усул,  
Штурм-Лиувилл масаласи,  
мавжудлик теоремаси,  
ягоналик теоремаси



## 1. Иккинчи чегаравий масала

Ярим тўғри чизикдаги бир жинсли чегаравий шарт билан берилган иккинчи чегаравий масала қуйидаги кўринишга эга:

$$\begin{cases} (1) & u_{tt} = a^2 U_{xx}, x > 0, t > 0 \\ (2) & u_x(0, t) = 0, t \geq 0; \\ (3) & u(x, 0) = \phi(x), x \geq 0; \\ (4) & u_t(x, 0) = \psi(x), x \geq 0. \end{cases}$$

Олдинги ҳолдагидай ҳаракат қиламиз. Лекин бизларни фақат жуфт давом эттириш қаноатлантиради:

$$\Phi(x) = \begin{cases} \phi(x), x \geq 0; \\ \phi(-x), x < 0. \end{cases} \quad \Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), x \geq 0; \\ \psi(-x), x < 0. \end{cases}$$

## 1. Иккинчи чегаравий масала

Янги Коши масаласи ва унинг учун Даламбер формуласи бўйича счими 2-чи маърузада кўрсатганимиздек бўлади:

$$U(x, t) = \frac{\Phi(x - at) + \Phi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi.$$

Олдинги ҳолдагидек,

$u(x, t) = U(x, t)$ ,  $x, y > 0$  бўлсин. У ҳолда (1), (3), (4) шартларнинг бажарилиши аён. (2) шартни текшираемиз.

Даламбер формуласини дифференциалласак ва  $\Psi(t)$  жуфт функциянинг ҳосиласи тоқ функция бўлишини инобатга олиб, қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз:

$$u_x(0, t) = U_x(0, t) = \frac{\Phi'(at) + \Phi'(-at)}{2} + \frac{1}{2a} [\Psi(at) - \Psi(-at)]$$

$\Phi'(t)$  тоқлигидан ва  $\Psi(t)$  жуфтлигидан кўринадики иккисини ҳам нолга тен:

$u(x, t)$  учун умумий формула шунга ўхшаш олинади.

## 2. Ўзгарувчиларни алмаштириш усули

$[0, l]$  кесмада ортрнормаллашган функциялар системаларини қараймиз.

$$\left\{ \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \right\}, n = 1, 2, 3, \dots \quad \left\{ \frac{1}{\sqrt{l}} \sqrt{\frac{2}{l}} \cos\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \right\}, n = 1, 2, 3, \dots$$

Фурье коэффициентларини қуйидагича аниқланади:

$$\phi_n = \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds; \quad \bar{\phi}_n = \int_0^l \phi(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds.$$

У ҳолда, математик анализ курсидан маълумки, агар  $\phi(x) \in C[a; b]$  бўлса  $\sum_{n=1}^{\infty} \phi_n^2$  ва  $\sum_{n=1}^{\infty} \bar{\phi}_n^2$  қаторлар яқинлашади.

## 2. Ўзгарувчиларни алмаштириш усули

Буни эслаб қоламиз ва бир жинсли чегаравий шартлар билан берилган бир жинсли тебраниш тенгламаси учун биринчи чегаравий масалага ўтамиз:

$$[1.2] \begin{cases} (1) & u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0; \\ (2) & u(0, t) = u(l, t) = 0, t \geq 0; \\ (3) & u(x, 0) = \phi(x), 0 \leq x \leq l; \\ (4) & u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Унинг счимини қуйидаги усул билан топамиз: бирор  $u(x, t)$  функцияга келтирувчи алмаштиришларни бажарамиз, сўнгра маълум бир шартларни қаноатлантирувчи  $\phi(x)$  ва  $\psi(x)$  функциялар учун бу функция мавжуд бўлишини ва берилган масала счими эканлигини исботлаймиз.

## 2. Үзгарувчиларни алмаштириш усули

Ечимни  $v(x,t) = X(x)T(t)$  кўринишда излаймиз. Бу нолга айнан тенг бўлмаган функция бўлсин.

$v(x,t)$  ни тебраниш тенгласига қўйиб, қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$T''(t)X(x) = a^2 X''(x)T(t) \Rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda$$

бу ерда  $\lambda$  қандайдир ўзгармас сон. Бу айниятлардан иккита

$$\text{тенглама келиб чиқади: } \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l; \\ T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, t > 0. \end{cases}$$

$X(0) = X(l) = 0$  да

$v(x,t)$  функция (2) шартни қаноатлантиради.

8

## 3. Штурм – Лиувилл масаласи

Қуйидаги 
$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 \leq x \leq l; \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

Штурм – Лиувилл масаласининг тривиал бўлмаган ечимларни топамиз.

Иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси учун ечимни чиқаришда, қуйидаги хос қийматлар ва уларга мос хос функциялар тўғри келади (буни бизлар кейинчалик кўрсатамиз):

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2; \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{\pi n}{l}x\right), n = 1, 2, \dots$$

Топилган  $\lambda_n$  ларни  $T(t)$  учун тузилган тенгламага қўямиз:

$$T_n''(t) + \left(\frac{\pi n}{l}a\right)^2 T_n(t) = 0 \Rightarrow T_n(t) = a_n \cos\left(\frac{\pi n}{l}at\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n}{l}at\right),$$

бу ерда  $a_n$  ва  $b_n$  лар қандайдир ўзгармаслар.

9

## 3. Штурм – Лиувилл масаласи

Шундай қилиб (1), (2) шартлар қаноатлантирадиган  $X_n(x), T_n(t)$  функцияларни топдик.  $v_n(x,t) = X_n(x)T_n(t)$  деб оламиз. Равшанки, бу функция учун ҳам (1), (2) шартлар бажарилади. (3), (4) шартлардан  $a_n, b_n$  константаларни

$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x,t)$  деб оламиз;

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{l}x\right) [a_n \cos\left(\frac{\pi n}{l}at\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n}{l}at\right)];$$

$$\phi(x) = u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\pi n}{l}x\right) \Rightarrow a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l}s\right) ds;$$

10

## 3. Штурм – Лиувилл масаласи

$$\psi(x) = u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} (b_n \frac{\pi n a}{l}) \sin\left(\frac{\pi n}{l}x\right) \Rightarrow \frac{\pi n a}{l} b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l}s\right) ds \Rightarrow$$

$$b_n = \frac{2}{\pi n a} \int_0^l \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l}s\right) ds.$$

Натижада, константаларни топдик, энди тўла формулани ёзамиз;

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{2}{l} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi m}{l}s\right) ds \right] \cos\left(\frac{\pi m}{l}at\right) \sin\left(\frac{\pi m}{l}x\right) + \\ &+ \frac{2}{\pi m a} \int_0^l \sin\left(\frac{\pi m}{l}at\right) \psi(s) \sin\left(\frac{\pi m}{l}s\right) ds \sin\left(\frac{\pi m}{l}x\right). \end{aligned} \quad (1.6)$$

Энди бу формула коррект бўладиган шартларни ифодалаймиз.

11

#### 4. Мавжудлик теоремаси

**Теорема 1.3. (мавжудлик)**

$$\phi(x) \in C^3[0; l], \phi(0) = \phi(l) = \phi'(0) = \phi'(l) = 0;$$

$$\psi(x) \in C^2[0; l], \psi(0) = \psi(l) = 0.$$

бўлсин. У ҳолда (1.6) формула билан аниқланадиган  $u(x, t)$

функция қуйидаги хоссаларга эга:

$$u(x, t) \in C^2\{[0; l] \times [0; t]\} (T - \text{ихтиёрий} > 0)$$

ва (1)-(4) шартларни қаноатлантиради ([1.2] чегаравий масала ечими бўлади).

**Исбот:**  $u(x, t) \in C^2\{[0; l] \times [0; T]\}$

эканлигини исботлаймиз;

12

#### 4. Мавжудлик теоремаси

$$\phi_n = \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = \{ \text{бўлаклаб интеграллаймиз} \} =$$

$$= -\phi(s) \frac{l}{\pi n} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l + \frac{l}{\pi n} \int_0^l \phi'(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds =$$

$$= \{ \text{яна бир марта бўлаклаб интеграллаймиз} \} =$$

$$= \left(\frac{l}{\pi n}\right)^2 \phi'(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l - \left(\frac{l}{\pi n}\right)^2 \int_0^l \phi''(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds =$$

$$= \left(\frac{l}{\pi n}\right)^3 \phi''(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l - \left(\frac{l}{\pi n}\right)^3 \int_0^l \phi'''(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds.$$

$$\phi_n = \int_0^l \phi'''(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds. \quad n^3 |\phi_n| = \left(\frac{l}{\pi}\right)^3 |\phi_n'|.$$

13

#### 4. Мавжудлик теоремаси

Юқорида айтиб ўтилган хоссага кўра

$$\sum_{n=1}^{\infty} \phi_n^2 \quad \text{қатор яқинлашади. Бундан} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\phi_n|$$

қаторнинг яқинлашувчилиги келиб чиқишини кўрсатамиз:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\phi_n| = \left(\frac{l}{\pi}\right)^3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} |\phi_n'| \leq \left\{ ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \right\} \leq \left(\frac{l}{\pi}\right)^3 \left[ \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n'^2 \right]$$

Шундай қилиб, бизда иккани қатор ҳам яқинлашувчи қаторлар, шунинг учун

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\phi_n| \quad \text{қатор мажорант аломатига кўра яқинлашади. Шунга ўхшаш}$$

$$\psi_n = \int_0^l \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = \{ \text{бўлаклаб интеграллаймиз} \} =$$

14

#### 4. Мавжудлик теоремаси

$$= -\psi(s) \frac{l}{\pi n} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l + \frac{l}{\pi n} \int_0^l \psi'(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds =$$

$$= \{ \text{яна бир марта бўлаклаб интеграллаймиз} \} =$$

$$= \left(\frac{l}{\pi n}\right)^2 \psi'(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l - \left(\frac{l}{\pi n}\right)^2 \int_0^l \psi''(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds$$

Шунга ўхшаш,  $\sum_{n=1}^{\infty} n |\psi_n|$  қаторнинг яқинлашувчилиги кўрсатиш мумкин.

$$\left| \cos\left(\frac{\pi n}{l} st\right) \right| \quad \text{ни бир билан чегаралаб,} \quad u(x, t) \quad \text{учун (1.6)}$$

қатор Вейерштрасс аломатига кўра текис яқинлашади

$$\left( \text{мажорант бўлиб} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{2}{l} |\phi_n| + \frac{2}{\pi a} |\psi_n| \right] \right)$$

яқинлашувчи қатор ҳисобланади).

#### 4. Мавжудлик теоремаси

Бундан ташқари  $u(x, t)$  бу ҳолда  $[0; l] \times [0; T]$

да узлуксиз. Шунга ўхшаш  $X$  бўйича биринчи ва иккинчи ҳосилалар мавжудлиги ва узлуксизлиги учун (1.6) формуладаги мос ҳосилалардан иборат қаторнинг текис яқинлашишини кўрсатиш етарли.  $X$  бўйича дифференциаллаб, қуйидагиларни оламиз.

$$u_x(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi n}{l} \left[ \frac{2}{l} \int_0^l \cos\left(\frac{\pi n}{l} at\right) \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds + \frac{2}{\pi na} \int_0^l \cos\left(\frac{\pi n}{l} at\right) \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right] \cos\left(\frac{\pi n}{l} x\right).$$

$$u_{xx}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 \left[ \frac{2}{l} \int_0^l \cos\left(\frac{\pi n}{l} at\right) \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds + \frac{2}{\pi na} \int_0^l \cos\left(\frac{\pi n}{l} at\right) \psi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right] \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right).$$

#### 4. Мавжудлик теоремаси

У ҳолда (Вейерштрасс аломатига кўра)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{m}{l} \left( \frac{2}{l} |\phi_n| - \frac{2}{\pi na} |\psi_n| \right), \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{m}{l} \right)^2 \left( \frac{2}{l} |\phi_n| - \frac{2}{\pi na} |\psi_n| \right)$$

қаторлар яқинлашишини кўрсатиш етарли. У  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\phi_n|$  ва  $\sum_{n=1}^{\infty} n |\psi_n|$  қаторлар учун ҳозир исбот қилинган хоссалардан келиб чиқади.

Шунинг учун ўша мулоҳазаларни  $t$  бўйича ҳосилалар

учун утказиб, натижада  $u(x, t) \in C^2 \{[0; l] \times [0; T]\}$

ни ҳосил қиламиз. Бу ҳолда осон текшириш мумкинки (1.6)

формула билан белгиланадиган  $u(x, t)$  функция тебраниш

тенгламасини қаноатлантиради (яъни (1) шартни).

17

#### 4. Мавжудлик теоремаси

Бундай  $u(x, t)$  функция (2)-(4) шартларни қаноатлантириши

уни кўришдан қурилади – чегаравий ва бошланғич шартлар ҳисобга олинган.

Теорема исботланди.

Шундай қилиб, счим қурилди. Баъзи шартларда бу счим ягона эканлигини исботлаймиз.

18

#### 1-чи чегаравий масала ягоналиги

Қўйидаги умумий 1-чи чегаравий масалани қараймиз:

$$[1.3] \begin{cases} U_u = a^2 U_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, \quad 0 < t < T \\ U(0, t) = \mu_1(t), & 0 \leq t \leq T; \\ U(l, t) = \mu_2(t), & 0 \leq t \leq T; \\ U(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l; \\ U_t(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

Бу чегаравий масаланинг счими ягоналигини исботлаймиз.

19



### 1-чи чегаравий масала ягоналиги

**Теорема 1.4 (ягоналик).** Фраз қилайлик

$$u_1, u_2(x, t) \in C^2\{0; l] \times [0; T\} \quad \text{ва} \quad u_1, u_2$$

функциялар бир ҳил [1.3] чегаравий масаланинг ечими бўлсин, у ҳолда  $\{0; l] \times [0; T\}$  соҳада  $u_1(x, t) \equiv u_2(x, t)$

**Исбот:** кўришиб турибдики функция  $v(x, t) = u_1 - u_2$

бизнинг чегаравий масаланинг  $f, \varphi, \psi, \mu_1, \mu_2$

функциялар айнан 0 га тенг булгадаги ечим бўлади. Шундай қилиб

$v(x, t) \in C^2\{0; l] \times [0; T\}$  ва

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx}, & 0 < x < l, 0 < t < T; \\ v(0, t) \equiv v(l, t) \equiv v(x, 0) \equiv v_t(x, 0) \equiv 0 \end{cases}$$

20

### 1-чи чегаравий масала ягоналиги

$v(x, t) \equiv 0$  исботлаш талаб этилади.

$$E(t) = \int_0^l \left[ (v_t(x, t))^2 + a^2 (v_x(x, t))^2 \right] dx$$

функцияни аниқлаймиз ва уни энергия интеграл деб атаёмиз.

Мисол учун бизнинг тебранувчи торимизнинг ўзгармасгача аниқлик билан олинган тўла энергия деб физикавий интерпретация ўйлиш мумкин. Кўришиб турибдики, бизнинг  $v$  функция шартларида  $E(t)$  дифференциаланувчи функциядир.

Демак унинг ҳосиласи қуйидагича ҳисобланади:

$$E'(t) = \int_0^l \left[ 2v_t(x, t)v_{tt}(x, t) + 2a^2 v_x(x, t)v_{xx}(x, t) \right] dx$$

21

### 1-чи чегаравий масала ягоналиги

Бу интегралда иккинчи қўшилувчини  $x$  бўйича бўлақлаб интеграллаб қуйидаги ифодага келамиз:

$$E'(t) = \int_0^l \left[ 2v_t(x, t)v_{tt}(x, t) - 2a^2 v_{xx}(x, t)v_{xx}(x, t) \right] dx + 2a^2 v_x(x, t)v_t(x, t) \Big|_0^l$$

$v(x, t)$  тебраниш тенгламасини ечими эканлигини эсда тутган ҳолда, интеграл остидаги ифода айнан 0 га тенг эканлигини аниқлаймиз. Чегаравий шартларни  $t$  бўйича дифференциаллаб

$$v_t(0, t) \equiv 0 \equiv v_t(l, t)$$

ни ҳосил қиламиз. Бундан ҳулоса: интеграл ташқарисидаги қўшилувчиси 0 га тенг. Демак  $E'(t) \equiv 0$  ёки

$$E(t) = \int_0^l \left[ (v_t(x, t))^2 + a^2 (v_x(x, t))^2 \right] dx \equiv const$$

22

### 1-чи чегаравий масала ягоналиги

Умуман олаганда биз ёпиқ [1.3] тенгламар билан ифодаланувчи системада энергия сақланиш қонунининг яна бир кўринишига эга бўлдик — энергия сони доимийдир. Кўришиб турибдики

$$E(t) = E(t) = \int_0^l \left[ (v_t(x, t))^2 + a^2 (v_x(x, t))^2 \right] dx$$

Бошланғич шартлардан қуйидагига эга бўламиз.

$$v_t(x, 0) = v_x(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq l,$$

23

### 1-чи чегаравий масала ягоналиги

Демак,  $E(0) = 0 \Rightarrow E(t) \equiv 0$

Интеграл остидаги функцияларнинг манфий бўлмаганлиги  $v_t(x, t) \equiv v_x(x, t) \equiv 0$  га тенг эканлиги аниқланади. Бундан  $v \equiv \text{const}$ , бошланғич шартлардан эса  $v \equiv 0$

эканлиги келиб чиқади. Теорема исботланди.

Эслатма: 
$$\begin{cases} v_x(0, t) = 0 \\ v_x(l, t) = 0 \end{cases}$$

иккинчи тур чегаравий шартларгага бўлган масала учун ҳам барча тасдиқларимиз ўринли. Теореманинг исботи ўзгармайди, фақат интеграл ташқарисидаги қўшилувчи нолга тенг эканлиги бошқа усулда. Бундаг ташқари, теореманинг барча тасдиқлари аралаш қўринишдаги чегаравий шартлар учун ҳам ўринлидир.

24

### Саволлар.

1. Ярим тўғри чизикдаги бир жинсли чегаравий шарт билан берилган иккинчи чегаравий масала қўйилишини келтиринг.
2. Иккинчи чегаравий масаланинг Даламбер формуласи бўйича ечимини келтиринг.
3. Ўзгарувчиларни алмаштириш усули.
4. Бир жинсли чегаравий шартлар билан берилган бир жинсли тебраниш тенгламаси учун биринчи чегаравий масалани келтиринг.
5. Штурм – Лиувил масаласи.
6. Мавжудлик теоремаси.
7. Умумий 1 – чегаравий масалани қўйилишини келтиринг.
8. Умумий 1 – чегаравий масала ягоналиги.

25

### Математик физика тенгламалари маърузалар

#### Маъруза № 4. Мавзу:

**Энергия интегралининг тебраниш  
тенгламаси учун чегаравий масала  
ечимининг ягоналиги**

1

#### Маъруза № 4

**Энергия интегралининг тебраниш  
тенгламаси учун чегаравий масала  
ечимининг ягоналиги**

#### Режа:

1. Маълумотлар характеристикаларда берилган масала. Интеграл тенгламаларнинг эквивалент системаси.
2. Характеристикаларда берилган ечимнинг мавжудлиги.
3. Маълумотлар характеристикаларда берилган масаланинг ягоналиги.

## Таянч иборалар

чегаравий масала,  
характеристика,  
интеграл тенглама,  
тебраниш тенгламаси,  
энергия интегралли



### 1. Маълумотлар характеристикаларда берилган масала. Интеграл тенгламаларнинг эквивалент системаси.

Куйидаги масалани қараймиз:

$$[1.4] \begin{cases} (1) & u_{xy}(x, y) = a(x, y)u_x(x, y) + b(x, y)u_y(x, y) + \\ & + f(x, y, u(x, y)), \quad 0 < x < l_1, \quad 0 < y < l_2 \\ (2) & u(x, 0) = \phi(x), \quad 0 \leq x \leq l_1; \\ (3) & u(0, y) = \varphi(y), \quad 0 \leq y \leq l_2; \end{cases}$$

Бу гиперболик типдаги чизиqli бўлмаган тенглама учун берилган масала **Гурса масаласи** деб аталади. Илгари берилган таърифга кўра (1) тенгламанинг характеристикалари бу  $dx dy = 0$  тенгламани қаноатлантирувчи функциялар бўлади. Бу эса  $x = const$ ,  $y = const$  кўринишдаги тўғри чизиqliлар оиласини билдиради. Шундай қилиб, бизнинг  $u(x, y)$  функциямизнинг  $x=0$ ,  $y=0$  характеристикалардаги маълумотлар билан берилади.

### 1. Маълумотлар характеристикаларда берилган масала. Интеграл тенгламаларнинг эквивалент системаси.

**Таъриф:**  $U(x, y)$  функция [1.4] масаланинг счими деб аталади, агарда  $u(x, y) \in C^2 \{0, l_1\} \times \{0, l_2\}$

ва (1) – (3) шартларни қаноатлантирилса.

Берилган масаланинг счими мавжудлиги ва ягонлигини бир неча этапларда ишботлаймиз. Дастлаб биз [1.4] масалани қандайдир чизиqli бўлмаган интеграл тенгламалар системасига эквивалент эканлигини кўрсатамиз.

Фараз қилайли,  $U(x, y)$  функция [1.4] масаланинг счими бўлсин. У ҳолда (1) тенгламани дастлаб  $y$  бўйича кейин  $x$  бўйича интеграллаб, куйидагини ҳосил қиламиз:

$$u_x(x, y) = u_x(x, 0) + \int_0^y a(x, \eta) u_x(x, \eta) d\eta + \int_0^y b(x, \eta) u_y(x, \eta) d\eta + \int_0^y f(x, \eta, u(x, \eta)) d\eta;$$

$$u(x, y) = u(0, y) + u(x, 0) - u(0, 0) + \int_0^x \int_0^y a(\xi, \eta) u_x(\xi, \eta) d\eta d\xi + \int_0^x \int_0^y b(\xi, \eta) u_y(\xi, \eta) d\eta d\xi + \int_0^x \int_0^y f(\xi, \eta, u(\xi, \eta)) d\eta d\xi \quad (1.7)$$

Иккита янги функцияларни киритамиз  $\begin{cases} v(x, y) = u_x(x, y) \\ w(x, y) = u_y(x, y) \end{cases}$

У ҳолда, (2)–(3) бошланғич шартларни қўллаб, (1.7) тенгламани куйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$u(x, y) = \varphi(0, y) + \phi(x, 0) - \phi(0) + \int_0^x \int_0^y [a(\xi, \eta)v(\xi, \eta) + b(\xi, \eta)w(\xi, \eta)] d\xi d\eta + \int_0^x \int_0^y f(\xi, \eta, u(\xi, \eta)) d\xi d\eta \quad (1.8)$$

Буни  $x$  бўйича дифференциаллаб, куйидагини ҳосил қиламиз:

$$v(x, y) = \phi'(x) + \int_0^y [a(x, \eta)v(x, \eta) + b(x, \eta)w(x, \eta)] d\eta + \int_0^y f(x, \eta, u(x, \eta)) d\eta \quad (1.9)$$

Худди шундай  $u$  бўйича дифференциаллаимиз:

$$w(x, y) = \varphi'(y) + \int_0^x [a(\xi, y)v(\xi, y) + b(\xi, y)w(\xi, y)]d\xi + \int_0^y f(\xi, y, u(\xi, y))d\xi \quad (1.10)$$

Демак, агар  $u(x, y)$  [1.4] масалани ечими бўлса  $u$  ҳолда (1.8) – (1.10) тенгламаларини қаноатлантирувчи  $v(x, y)$ ,  $w(x, y)$  функциялар мавжуд бўлади. Тескариси: (1.8) – (1.10) тенгламаларнинг ечимлари бўлган  $u$ ,  $v, w$  узлуксиз функцияларнинг мавжудлигидан  $v = u_x$ ;  $w = u_y$

эканлиги келиб чиқади. Шунингдек бевосита дифференциаллашдан  $u(x, y)$  функциялар [1.4] масалани ечими эканлигини текшириб кўриш мумкин.

## 2. Характеристикаларда берилган ечимнинг мавжудлиги.

**Теорема [1.5]: (Мавжудлик теоремаси)**

Қуйидаги тўртта шарт бажарилган бўлсин:

1.  $a(x, y)$ ,  $b(x, y) \in C\{[0; l_1] \times [0; l_2]\}$
2.  $f(x, y, p) \in C\{[0; l_1] \times [0; l_2] \times E\}$

яъни, бизлар  $u(x, y)$  функцияни  $p$  ихтиёрий қиймат қабул қилувчи ўзгарувчи билан алмаштирдик

3.  $|f(x, y, p_1) - f(x, y, p_2)| \leq L|p_1 - p_2|$ ,  
 $\forall x \in [0; l_1], \forall y \in [0; l_2], \forall p_1, p_2 \in E$

$p$  ўзгарувчи бўйича Литшиц шартидир

4.  $\phi(x) \in C^1[0; l_1]$ ,  $\varphi(y) \in C^1[0; l_2]$ ,  $\phi(0) = \varphi(0)$

У ҳолда [1. 4] масаланинг ечими мавжуд.

**Исбот.** [1.4] масала (1.8)-(1.10)га эквивалентлигини ҳисобга олиб, (1.8)-(1.10)ни қаноатлантирувчи  $(x, y)$ ,  $v(x, y)$ ,  $w(x, y)$  узлуксиз функциялар мавжудлигини исботлаймиз. Бу функцияларни итерациялар кетма-кетлиги ёрдамида топамиз. Кетма-кет итерациялар процессини қуйидагича кўрамиз:

$$\begin{cases} u_0(x, y) = v_0(x, y) = w_0(x, y) = 0 \\ u_{n+1}(x, y) = \varphi(y) + \phi(x) - \phi(0) + \int_0^x \int_0^y [a(\xi, \eta)v_n(\xi, \eta) + b(\xi, \eta)w_n(\xi, \eta)]d\eta d\xi + \\ + \int_0^x \int_0^y f(\xi, \eta, u_n(\xi, \eta))d\eta d\xi \\ u_{n+1}(x, y) + \varphi'(y) + \int_0^y [a(x, \eta)v_n(x, \eta) + b(x, \eta)w_n(x, \eta)]d\eta + \int_0^y f(x, \eta, u_n(x, \eta))d\eta \\ w_{n+1}(x, y) + \varphi'(y) + \int_0^x [a(\xi, y)u_n(\xi, y) + b(\xi, y)w_n(\xi, y)]d\xi + \int_0^x f(\xi, y, u_n(\xi, y))d\xi \end{cases}$$

Бу процессни яқинлашувчи эканлигини исботлаймиз. Бунинг учун  $u_n, v_n, w_n$  кетма-кетликларнинг ҳадлари орасидаги фарқларни баҳолаймиз.

$u_n$  учун итерация таърифидан ва теореманинг (3) шартларидан қуйидаги тенгсизлик келиб чиқади:

$$|u_{n+1} - u_n| \leq \int_0^x \int_0^y [ |a(\xi, \eta)| |v_n(\xi, \eta) - v_{n-1}(\xi, \eta)| + |b(\xi, \eta)| |w_n(\xi, \eta) - w_{n-1}(\xi, \eta)| ] d\xi d\eta + \\ + \int_0^x \int_0^y L |u_n(\xi, \eta) - u_{n-1}(\xi, \eta)| d\xi d\eta$$

Фараз қилайлик:  $(x, y) \in \{[0; l_1] \times [0; l_2] \times E\}$  да

$$M = \max \{ \max |a(x, y)|, \max |b(x, y)|, L \} \quad \text{Шунда:}$$

$$|u_{n+1} - u_n| \leq M \int_0^x \int_0^y [ |v_n(\xi, \eta) - v_{n-1}(\xi, \eta)| + \\ + |w_n(\xi, \eta) - w_{n-1}(\xi, \eta)| + |u_n(\xi, \eta) - u_{n-1}(\xi, \eta)| ] d\xi d\eta \quad (1.11)$$



$v_n, w_n$  функциялар учун ҳам худди шундай:

$$|u_{n+1} - u_n| \leq M \int_0^y [|u_n(x, \eta) - u_{n-1}(x, \eta)| + |w_n(x, \eta) - w_{n-1}(x, \eta)| + |u_n(x, \eta) - u_{n-1}(x, \eta)|] d\eta \quad (1.12)$$

$$|u_{n+1} - u_n| \leq M \int_0^x [|u_n(\xi, y) - u_{n-1}(\xi, y)| + |w_n(\xi, y) - w_{n-1}(\xi, y)| + |u_n(\xi, y) - u_{n-1}(\xi, y)|] d\xi \quad (1.13)$$

Итерация процессининг барча элементлари узлуксиз функциялар бўлганлиги сабабли, бундан  $|u_n|, |v_n|, |w_n|$  функция қандайдир  $H$  ўзгармас билан чегараланганлиги келиб чиқади.

11

Кетма-кетликнинг нольга тенг бўлган ҳадларнинг таърифидан

$$|u_2 - u_1| \leq M, |v_2 - v_1| \leq M, |w_2 - w_1| \leq M$$

келиб чиқади. Буни қўлаб куйидаги айирмани баҳолаймиз:

$$|u_2 - u_1| \leq M \int_0^x \int_0^y 3Hd\xi d\eta = 3HMxy \leq 3HM \frac{(x+y)^2}{2}$$

$$|v_2 - v_1| \leq M \int_0^y 3Hd\eta = 3HM y \leq 3HM (x+y)^2$$

$$|w_2 - w_1| \leq M \int_0^x 3Hd\xi = 3HMx \leq 3HM (x+y)$$

12

Кетма – кетликни текис яқинлашувчи эканлигини исботлаш учун мажорант қатор кўришга тўғри келади, лекин дастлаб куйидаги баҳони исботлаймиз.

$$|u_n(x, y) - u_{n-1}(x, y)| \leq 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(x+y)^2}{2};$$

$$|v_n(x, y) - v_{n-1}(x, y)| \leq 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(x+y)^{n-1}}{(n-1)!};$$

$$|w_n(x, y) - w_{n-1}(x, y)| \leq 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(x+y)^{n-1}}{(n-1)!};$$

Бу ерда  $K = 2 + I_1 + I_2;$

13

**Исботни индукция билан кўрамиз.**

Индукция базаси. Юқорида исботланганидек  $n=2$  учун ўринли

**Индукция фарази.** Фараз қилайлик  $n$  учун ўринли.

$n+1$  учун исботлаймиз. **Индуктив ўтиш.**

Индукция фаразидан фойдаланиб  $|u_{n+1} - u_n|$  айирмани баҳолаймиз:

$$|u_{n+1} - u_n| \leq M \int_0^x \int_0^y \left[ 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(\xi+\eta)^n}{n!} + 2 \cdot 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(\xi+\eta)^{n-1}}{(n-1)!} \right] d\xi d\eta \leq$$

$$\leq 3HM^n K^{n-2} \left[ \int_0^x \frac{(\xi+\eta)^{n+1}}{(n+1)!} y d\xi + 2 \int_0^x \frac{(\xi+\eta)^n}{n!} y d\xi \right]$$

Интегрални ҳисоблайлик. Бунда бошланғич интеграл чегараларини қўйишда қуйи чегарани ташлаб юборамиз. Уларни қўшилувчилари манфий бўлиб, юқоридаги айирма учун шундай баҳони юқори чегара асосида ҳосил қиламиз:

14

$$|u_{n+1} - u_n| \leq 3HM^n K^{n-2} \left[ \frac{(x+y)^{n+2}}{(n+2)!} + 2 \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)!} \right] =$$

$$3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)!} \left[ \frac{x+y}{n+2} + 2 \right] \leq$$

$$\leq \left\{ \frac{x+y}{n+2} + 2 \leq l_1 + l_2 + 2 = K \right\} \leq 3HM^n K^{n-1} \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Шундай қилиб  $u_n$  кетма-кетлик учун индукция фарази исботланган.

Қолган иккита кетма-кетлик учун баҳонинг исботи шунга ўхшаш бўлади.

$$|u_{n+1} - u_n| \leq M \int_0^y \left[ 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(\xi+\eta)^n}{n!} + 2 \cdot 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(\xi+\eta)^{n-1}}{(n-1)!} \right] d\eta \leq$$

$$\leq 3HM^n K^{n-2} \left[ \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)!} + 2 \frac{(x+y)^n}{n!} \right] = 3HM^n K^{n-2} \frac{(x+y)^n}{n!} \left[ \frac{x+y}{n+1} + 2 \right] \leq$$

$$\leq 3HM^n K^{n-1} \frac{(x+y)^n}{n!}$$

Демак иккинчи баҳо ҳам тўғри. Учинчи баҳонинг исботи ҳам шу кўринишда бўлади, шунинг учун уни ташлаб кетамиз. Энди  $u_n, v_n, w_n$  кетма-кетликларни текис яқинлашувчи эканлигини исботлаймиз.

Кўришиб турибдики бундай кетма-кетликнинг ҳар бир ҳадини тегинли қаторнинг қисмий йиғиндисига шаклида ифодалаш мумкин.

$$u_n(x, y) = \sum_{m=1}^n (u_m(x, y) - u_{m-1}(x, y));$$

$$v_n(x, y) = \sum_{m=1}^n (v_m(x, y) - v_{m-1}(x, y));$$

$$w_n(x, y) = \sum_{m=1}^n (w_m(x, y) - w_{m-1}(x, y));$$

Биринчи қаторнинг қўшилувчилари учун биз баҳони исботлаган эдик.

$$|u_n(x, y) - u_{n-1}(x, y)| \leq 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(x+y)^n}{n!} \leq$$

$$\leq 3HM^{n-1} K^{n-2} \frac{(l_1+l_2)^n}{n!} = C \frac{a^n}{n!}, \quad C, a = \text{const.}$$

Маълумки,

$\sum_{n=1}^{\infty} C \frac{a^n}{n!}$  қатор яқинлашувчи. Буздан Вейерштрасс аломатига кўра  $u_n$  кетма-кетликни текис яқинлашувчиси ҳосил қиламиз.

Қўшилувчиларнинг узлуксизлигидан лимитик функциянинг узлуксизлиги келиб чиқади.

Шунга ўхшаш қолган икки кетма-кетлик учун ҳам кўрсатиш мумкин:

$$v_n(x, y) \Rightarrow v(x, y) \in C\{[0; l_1] \times [0; l_2]\};$$

$$w_n(x, y) \Rightarrow w(x, y) \in C\{[0; l_1] \times [0; l_2]\};$$

## 2. Характеристикаларда берилган ечимнинг мавжудлиги.

Энди биз  $n \rightarrow \infty$

да лимитни ҳисоблаш итерацион жараёнини ёзишга ҳақлимиз. Бу эса ушбу тенгламалар системасининг ечими бўлган  $u, v, w$

функцияларнинг мавжудлигини билдиради. Бу тенгламалар системасини бошланғич [1.4]га эквивалент деб олсак теорема бутунлай исботланади. Теорема исботланди.  $\square$

## 3. Маълумотлар характеристикаларда берилган масаланинг ягоналиги.

Шундай қилиб [1.4] масаланинг мавжудлигини исботладик. Энди унинг ягоналигини исботладик-равнанки бу (1.8)-(1.10) интеграл тенгламалар системаси ечимининг ягоналигига эквивалентдир.

**Теорема 1.6 (Ягоналик)** *Фараз қилайлик  $\{u_1(x, y), v_1(x, y), w_1(x, y)\}, \{u_2(x, y), v_2(x, y), w_2(x, y)\}$*

*Икки функциялар системаси мавжуд бўлиб, улар (1-8)-(1-10) интеграл тенгламалар системасининг ечимлари бўлсин ва унда [1.4] тенгламанинг ечими мавжудлиги ҳақидаги теоремани (1)-(4) шартлари бажарилган бўлсин, у ҳолда*

$$\begin{aligned} U(x, y) &= u_1(x, y) - u_2(x, y), & V(x, y) &= v_1(x, y) - v_2(x, y), \\ W(x, y) &= w_1(x, y) - w_2(x, y) \end{aligned} \quad \text{функциялар}$$

$\Pi_{u_i} = \{[0; l_1] \times [0; l_2]\}$  тўғри тўртбурчакда айнан 0 га тенг бўлади.

**Исбот.** Шундай қилиб  $u_1, u_2$  (1.8) интеграл тенгламани ечими бўлсин.

$$\begin{aligned} u_1(x, y) &= \varphi(y) + \phi(x) - \phi(0) + \\ &+ \int_0^x \int_0^y [a(\xi, \eta)v_1(\xi, \eta) + b(\xi, \eta)w_1(\xi, \eta)] d\eta d\xi + \\ &\int_0^x \int_0^y f(\xi, \eta, u_1(\xi, \eta)) d\eta d\xi; \\ u_2(x, y) &= \varphi(y) + \phi(x) - \phi(0) + \\ &+ \int_0^x \int_0^y [a(\xi, \eta)v_2(\xi, \eta) + b(\xi, \eta)w_2(\xi, \eta)] d\eta d\xi + \\ &+ \int_0^x \int_0^y f(\xi, \eta, u_2(\xi, \eta)) d\eta d\xi. \end{aligned}$$

Бирдан иккинчисини айириб ва  $f(x, y, p)$ .

учун Липшиц шартини қўллаб куйидагини ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned} |u_2 - u_1| &\leq \int_0^x \int_0^y [M|v_2(\xi, \eta) - v_1(\xi, \eta)| + \\ &+ M|w_2(\xi, \eta) - w_1(\xi, \eta)| + M|u_2(\xi, \eta) - u_1(\xi, \eta)|] d\eta d\xi \Rightarrow \\ |U(x, y)| &\leq \int_0^x \int_0^y [M|V(\xi, \eta)| + M|W(\xi, \eta)| + M|U(\xi, \eta)|] d\eta d\xi \quad (1.14) \end{aligned}$$

Шунга ўхшаш натижа  $V(x, y), W(x, y)$  функциялар учун ҳам ўринли:

$$\begin{aligned} |V(x, y)| &\leq \int_0^y [M|V(x, \eta)| + M|W(x, \eta)| + M|U(x, \eta)|] d\eta; \\ |W(x, y)| &\leq \int_0^x [M|V(\xi, y)| + M|W(\xi, y)| + M|U(\xi, y)|] d\xi. \end{aligned}$$

Бундан ушбу функциялар  $\Pi$  тўғри тўртбурчакда 0 га тенглиги келиб чиқишини исботлаймиз. Дастлаб улар  $\Pi_{x_0, y_0} = \{0; x_0\} \times \{0; y_0\}$  тўғри тўртбурчакда 0 га тенглигини кўрсатамиз. Бу ерда  $x_0, y_0$  куйидаги шартларни қаноатлантиради:

$$\begin{cases} 3x_0 y_0 M < 1; \\ 3x_0 M < 1; \\ 3y_0 M < 1. \end{cases}$$

Фарз қилайлик:

$$\bar{U} = \max_{\Pi_{x_0, y_0}} |U(x, y)|; \bar{V} = \max_{\Pi_{x_0, y_0}} |V(x, y)|; \bar{W} = \max_{\Pi_{x_0, y_0}} |W(x, y)|$$

Умумийлиكنи чегараласдан,  $\bar{U} \geq \max\{\bar{V}, \bar{W}\}$

бўлишини фарз қилсамиз. Бу ҳолда (1.14) тенгсизликдан куйидаги тенгсизлик келиб чиқади:



23


$$|U(x, y)| \leq M \int_0^x \int_0^y [\bar{U} + \bar{V} + \bar{W}] ds \leq 3Mx_0 y_0 \bar{U}, (x, y) \in \Pi_{x_0, y_0} \Rightarrow \bar{U} \leq 3Mx_0 y_0 \bar{U}.$$

$3x_0 y_0 M < 1$  бўлганлиги сабабли, бу фақат

$\bar{U} = 0$  да бажарилади. Бундан кўришиб турибдики  $U(x, y), V(x, y), W(x, y)$  функциялар

$\Pi_{x_0, y_0}$  да айнан 0 га тенг. Кейинги қадамда биз шундай  $x_1$  ни оламизки,

$$\begin{cases} 3(x_1 - x_0) y_0 M < 1; \\ 3(x_1 - x_0) M < 1; \\ 3y_0 M < 1. \end{cases}^{24}$$



ва уни  $\Pi_{x_1, y_0}$  тўғри тўртбурчакда қараймиз. У ҳолда (1.14) тенгсизлик куйидаги кўринишга эга:

$$|U(x, y)| \leq M \int_{x_0}^x \int_0^y [\bar{U} + \bar{V} + \bar{W}] ds, (x, y) \in \Pi_{x_1, y_0}$$

Олдинги қадамга ўхшаш ҳаракат қилиб  $U(x, y), V(x, y), W(x, y)$

Функциялар тўғри тўртбурчакда айнан 0 га тенглигини ҳосил қиламиз. Шундай мулоҳазаларни давом этиб, чекли сонли қадамлардан кейин бу функцияларнинг  $\Pi_{l_1, y_0}$  да 0 га тенг,

Сўнгра эса  $\Pi_{l_1, l_2}$  да ҳам нольга тенг эканлигини кўрсатиш мумкин.

Теорема исботланди. □



25

## Саволлар.

1. Энергия интегралли
2. Маълумотлар характеристикаларда берилган масала.
3. Гурса масаласи.
4. Характеристикаларда берилган ечимнинг мавжудлиги.
5. Мавжудлик теоремаси.
6. Литиш шarti.
7. Умумий 1 – чегаравий масала учун ягоналик теоремаси



26



**Маъруза № 5**  
Мавзу:  
**«Қўшма дифференциал оператор.**  
**Риман усули.**  
**Лимитга ўтиш шаклидаги**  
**умумлашган ечимлар »**

**Режа:**

- 1. Қўшма дифференциал оператор**
- 2. Чизиқли алгебрадаги қўшма оператор билан боғланиш.**
- 3. Риман усули.**
- 4. Лимитга ўтиш шаклидаги умумлашган ечимлар**
- 5. Интеграллик айният маъносидаги умумлашган ечимлар**

**Таянч иборалар:** оператор,  
дифференциал оператор, қўшма оператор, чегаравий масала, Грин формуласи, Риман усули, лимит, Даламбер формуласи, Пуассон тенгламаси.

### **1. Қўшма дифференциал оператор.**

$E^n$  фазони қараймиз. Фараз қилайлик

$$x = (x_1, \dots, x_n)$$

бир сидра ўзгарувчилар,  $u(x)$  эса  $n$  ўзгарувчи функция бўлсин.

Таъриф: Бирор  $u(x) \in C^2(E^n)$  функциядан  $L[u]$  дифференциал оператор қўйидагича аниқланади:

$$L[u] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) u_{x_i} + c(x)u \quad (1.15)$$

Бу ерда  $a_{ij}, b_i \in C^2(E^2)$ ,  $c(x)$  қандайдир функциялар.  
 тартибли хусусий ҳосила дифференциаллаш  
 тартибига боғлиқ бўлмаганлиги сабабли

$a_{ij}(x) = a_{ji}(x)$  бир бирига тугирликни қабул қилинади.

**Таъриф. Ҳар**  $L[u]$  **дифференциалоператорга**  
**қандай** **узғаро** **бир қийматли мослик бўйича келувчи**  
 **$M[v]$  қўшма оператор олиш мумкин.**

$$M[v] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij}(x))_{x_i x_j} - \sum_{i=1}^n (b_i(x))_{x_i} + c(x)v$$

Таъриф. Агар  $L[u] = M[v]$  бўлса оператор ўз-ўзига  
 бўлса оператор ўз-ўзига қўшма оператор дейил

визга қуидаги формула керак  
 бўлади .

$$vL[u] - uM[v] = \sum_{i=1}^n (p_i(x))_{x_i} \quad (1.16)$$

Бу ерда  $p_i(x) = \sum_{j=1}^n [va_{ij}u_{x_j} - u(a_{ij}v)_{x_j}] + b_i uv$ .

Бу формулани исботлаш учун  $p_i(x)$  ни (1.16) нинг  
 ўнг томонига қўямиз ва қўшилувчиларни гуруҳлайми

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (p_i(x))_{x_i} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [va_{ij}u_{x_j} - u(a_{ij}v)_{x_j}] + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [(va_{ij})_{x_i} u_{x_j} - u_{x_i} (a_{ij}v)_{x_j}] + \\ &+ \sum_{i=1}^n [vb_i u_{x_i} + u(b_i v)_{x_i}] + cuv - cuv = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n va_{ij}u_{x_j} + \sum_{i=1}^n vb_i u_{x_i} + cuv - \\ &- \left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u(a_{ij}v)_{x_j} + \sum_{i=1}^n u(b_i v)_{x_i} + cuv \right) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [(va_{ij})_{x_i} u_{x_j} - u_{x_i} (a_{ij}v)_{x_j}] = \\ &vL[u] - uM[v] + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [(va_{ij})_{x_i} u_{x_j} - u_{x_i} (a_{ij}v)_{x_j}] \end{aligned}$$

Қолган иккиланган йиғинди 0 га тенг –бу  
 қўшилувчилар индексларининг симметриклигидан  
 келиб чиқади. Бу ердан (1.16) формула тўғрилиги  
 келиб чиқади.

## 2. Чизиқли алгебрадаги қўшма оператор билан боғланиш.

Чизиқли алгебрада  $A$  операторга қўшма  $A^*$   
 операторни деб қуйидаги  $(Au, v) = (u, A^*v)$   
 муносабат айтилади. Бу  $E^n$  дан олинган барча  
 $u, v$  лар учун бажарилиши керак эди. Бизнинг  
 таърифимиз шу берилган таъриф билан

қанчалик мос келишини кўриб чиқамиз.

**Мисол 1.**  $\Omega \subset E^3$  бўлсин ва скаляр кўпайтма  
 қуйидагича аниқлансин :

$$(f, g) = \iiint_{\Omega} fgd \tau, f, g \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$$

у ҳолда  $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$   $u, v|_{\Sigma} = 0$ ,

( $\Sigma$  –  $\Omega$  нинг чегараси) бўлган функциялар учун  
 қуйидаги  $(v, L[u]) = (M[v], u)$  ифода тўғри бўлсин

Буни кўрсатамиз

$$\begin{aligned}
 (v, L[u]) - (M[v], u) &= \iiint_{\Omega} (vL[u] - uM[v]) d\tau = \{ (1.16) \} = \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial p_1}{\partial x_1} + \frac{\partial p_2}{\partial x_2} + \frac{\partial p_3}{\partial x_3} \right) d\tau = \\
 &= \{ \vec{P} = (p_1, p_2, p_3) \} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{P} d\tau = \{ \text{Остроградский-Гаусс формуласи} (5.3) \} = \\
 &= \iint_{\Sigma} (\vec{P}, \vec{n}) d\sigma = \{ \vec{n} = (n_x, n_y, n_z) \} = \iint_{\Sigma} (p_1 n_x + p_2 n_y + p_3 n_z) d\sigma = 0
 \end{aligned}$$

$p_i |_{\Sigma} = 0, u, v$  учун чегаравий шартдан келиб чиқади.

**Мисол 2.** Қўшма оператор учун оддий мисол бу Лаплас оператори ҳисобланади, масалан  $E^3$  да

$$L[u] = \Delta u = u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + u_{x_3 x_3} \quad \text{бўлади Бу ерда}$$

$$M[u] = \Delta v \quad \text{текшириш осон.}$$

### 3. Риман усули.

$E^2$  фазод  $u(x, y)$  функция учун қуйидаги

дифференциалланувчи операторни қараймиз:

$$L[u] = u_{xy} + a(x, y)u_x(x, y) + b(x, y)u_y(x, y) + c(x, y)u(x, y)$$

Таърифга кўра, унга қўшма оператор қуйидаги кўринишга эга:

$$M[v] = u_{xy} - (a(x, y)v)_x - (b(x, y)v)_y + c(x, y)v$$

Шундай қилиб, (1.15) формулада

$$a_{11} = a_{22} = 0, \quad a_{12} = a_{21} = \frac{1}{2}, \quad b_1 = a, \quad b_2 = b, \quad c = c.$$

Кўрииб турибдики (1.16) формуладаги  $P_1, P_2$

лар қуйидагича ҳисобланади:

$$p_1 = \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv, \quad p_2 = \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv;$$

Энди  $OXY$  текислигида  $y = f(x)$  эгри чизиқ берилган

бўлсин, ва унда  $\forall x$  лар учун  $f'(x) < 0$  Унинг

графикини  $L_f$  билан белгилаймиз: нўқталари

$f(x)$  функция графикидан юқорида ётган ярим

текисликни  $R_f^+$  деб белгилаймиз:

$$R_f^+ = \{(x, y) : y > f(x)\},$$

Қуйидаги чегаравий масалани (шуни таъкидлаш лозимки, бу масала гиперболик типдаги тенглама учундир) кўриб чиқамиз:

$$[1.5] \quad \begin{cases} (1) & L[u] = F(x, y), & (x, y) \in R_f^+; \\ (2) & u(x, y) = \phi(x, y), & (x, y) \in L_f; \\ (3) & \frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = \psi(x, y), & (x, y) \in L_f; \end{cases}$$

( $L[u]$  (1.17) формуласи билан аниқланади.)

Келтирилган чегаравий масаланинг ечимини  $R_f^+$  да

излаймиз. Унинг ихтиёрий  $A(x_0, y_0) \in R_f^+$  нўқтада

қандай қилиб ҳисобланилишини кўрсатиб берамиз.

Бунинг учун биз  $A$  нўқтани  $L_f$  эгри чизиқ билан

координата ўқларига параллел бўлган кесмалар

воситасида бирлаштирамиз ва у орқали кесишув

нуқталари  $B(x, y_0)$  ва  $C(x_0, y)$  ни ҳосил қиламиз.

AB, AC кесмалар ҳамда BC ёй орасида ҳосил бўлган контурни  $L$  деб, унинг ички қисмини  $D$  билан белгилаймиз. Қўшма дифференциал оператори  $[P, Q]$  нинг (бунда  $v$  - муаян бир функция). (1.16) формуласидан фойдаланамиз.

$$\iint_D (vL[u] - uM[v]) ds = \iint_D \left( \frac{\partial p_1}{\partial x} + \frac{\partial p_2}{\partial y} \right) ds$$

Бунинг ўнг қисмини ўзгартириш учун эгри чизикли интеграллар учун Грин формуласидан фойдаланамиз:

$$\int_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) ds$$

Бу ҳолда қуйидагига эга бўламиз.

$$\iint_D (vL[u] - uM[v]) ds = \int_L -p_2 dx - p_1 dy =$$

(контур қисмлари координата ўқларига параллел)

$$\int_B^C \left\{ \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy - \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx \right\} + \int_C^A \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy + \int_B^A \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx \quad (1.18)$$

Маълумки,

$$\int_C^A \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy + \int_B^A \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx = \int_C^A \underbrace{\left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right]}_{I_{cy}} dy + \int_B^A \underbrace{\left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right]}_{I_{cx}} dx$$

Бунгача биз  $v$  функцияни оддийгина икки қарра узлуксиз дифференциалланувчи функция деб белгиланган эдик. Энди  $M[v] = 0$  бўлишини аниқроқ айтганда қуйидаги масаланинг ечими бўлиши керак:

$$\begin{cases} (4) & v_{xy} - (a(x, y)v)_x - (b(x, y)v)_y + c(x, y)v = 0, \quad x \leq x_0, y \leq y_0; \\ (5) & v(x_0, y) = \exp\left\{ \int_{y_0}^y a(x_0, s) ds \right\}, \quad y \leq y_0; \\ (6) & v(x, y_0) = \exp\left\{ \int_{x_0}^x b(s, y_0) ds \right\}, \quad x \leq x_0; \end{cases}$$

Бу масала [1.4] кўринишдаги характеристикалар ёрдамида берилган маълумотларга эга бўлган масаладир. Олдинги бўлимларда кўрсатган эдикки унинг ечимидан исбот бўлган ва ягона бўлгани  $(x, y)$  функция мавжуд. Бу функция бизга маълум деб ҳисоблаймиз ва айнан шу функциядан фойдаланамиз.

Биринчи бошланғич тенгламадан  $F(x, y)$  функцияни кўйган ҳолда  $u(x, y)$  учун (1.18) ифодага қайтамыз.

$$\iint_D v(x, y)F(x, y)ds = \int_B^C \left\{ \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy + \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx \right\} + I_{CA} + I_{BA}$$

$I_{CA}$   $I_{BA}$  интегралларда координаталаридан бири фиксирланганидан фойдаланамиз.  $v(x, y)$  учун

(4) шартдан  $x=x_0$  бўлса,  $v_y - av = 0$  бўлишини осон аниқлаш мумкин. Шундай қилиб:

$$I_{CA} = \int_C^A \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy = \int_C^A \left[ \frac{1}{2}(vu)_y - u(v_y - av) \right] dy = \frac{1}{2}(uv) \Big|_A - \frac{1}{2}(uv) \Big|_C$$

Худди шундай,  $y = y_0$  бўлганда  $u_x - bu = 0$

эканлигини кўрсатиш мумкин. Демак,

$$I_{BA} = \int_B^A \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx = \int_B^A \left[ \frac{1}{2}(vu)_x - u(v_x - bv) \right] dx = \frac{1}{2}(uv) \Big|_A - \frac{1}{2}(uv) \Big|_B$$

Шундай қилиб, (1.18) ифодани қуйидагича ёзиш мумкин.

$$\iint_D v(x, y)F(x, y)ds = \int_B^C \left\{ \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy + \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx \right\} + uv \Big|_A - \frac{1}{2}(uv) \Big|_C - \frac{1}{2}(uv) \Big|_B.$$

Бундан  $A(x_0, y_0)$  нуқтада  $u(x, y)$  функциясини

қийматини аниқлаш мумкин:

$$u(x_0, y_0)v(x_0, y_0) = - \int_B^C \left\{ \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy - \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx \right\} + \frac{1}{2}(uv) \Big|_C + \frac{1}{2}(uv) \Big|_B + \iint_D v(x, y)F(x, y)ds$$

$v(x, y)$  нинг (5), (6) чегаравий шатрлардан  $v(x_0, y_0) = 1$  эканлиги келиб чиқади. У ҳолда

$$u(x_0, y_0) = - \int_B^C \left\{ \left[ \frac{1}{2}(vu_y - uv_y) + auv \right] dy - \left[ \frac{1}{2}(vu_x - uv_x) + buv \right] dx \right\} + \frac{1}{2}(uv) \Big|_C + \frac{1}{2}(uv) \Big|_B + \iint_D v(x, y)F(x, y)ds$$

ҳосил бўлади.

Бу  $u(x_0, y_0)$  учун якуний формуладир. Контурдаги хусусий ҳосилалар  $u(x, y)$  бизга ноаниқ эканлиги кўриниши мумкин. Уларни (2), (3) чегаравий шартлардан топиш мумкинлигини кўрсатамиз:

$$\begin{cases} u(x, f(x)) = \phi(x, f(x)); \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x, f(x)) = \varphi(x, f(x)); \end{cases}$$

$L_f$  га уринманинг бирлик вектори  $\vec{\tau}$

қуйидаги кўринишга эга:

$$\vec{\tau} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{1+(f'(x))^2}}; \frac{f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} \right\}$$

Бундан қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = \frac{\partial u}{\partial n} \frac{1}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}}$$

$\frac{\partial u}{\partial \tau}$  қуйидаги ўзгартиришлардан топилади.

$$\frac{\partial}{\partial n} u(x, f(x)) = u_x(x, f(x)) + u_y(x, f(x))f'(x) = \sqrt{1+(f'(x))^2} \frac{\partial u}{\partial \tau}(x, y).$$

Маълумки,

$$\frac{\partial y}{\partial n} = (\vec{n}, \text{grad} u).$$

$L_j$  га нормалнинг,  $\vec{\tau}$  векторга ортогонал бўлган бирлик вектори қуйидагича ҳисобланади:

$$\vec{n} = \left\{ \frac{f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}}; -\frac{1}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} \right\}$$

Бундан:

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = \frac{\partial u}{\partial n} \frac{f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{1+(f'(x))^2}}$$

Юқоридагиларга асосланиб, чегаравий шартлардан контурда  $u(x, y)$  ни топиш учун системани ҳосил қиламиз.

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \phi(x, f(x)) = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} f'(x) \\ \phi(x, f(x)) = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} \end{cases}$$

Унинг детерминанти ҳеч қаерда 0 га тенг эмас.

Бундан келиб чиқадики,  $u_x(x, y)$   $u_y(x, y)$  лар мавжуд ва улар бир қийматли аниқланиши мумкин.

Шундай қилиб, биз (1.19) формула тўғрилигини асосладик. Уни ҳосил қилиш учун қўлланиладиган усул **Риман усули** дейилади.

**Эслатма:** Даламбер формуласи (1.19)

формуланинг хусусий ҳолидан иборат узлуксиз мумлаштирилган ечим. Шундай ҳоллар бўладики,

амалий масалаларнинг ечимлари бўлади.

Бундай ечимлар Ушбу курсдаги стандарт формулалар ёрдамида ҳосил қилиб бўлмайди.

Аммо, уларни масалан, оддий ечимларнинг чегарасидек тасвирлаш мумкин.

#### 4. Лимитга ўтиш шаклидаги умумлашган ечимлар

**Умумий ёндошув:**  $L[u]=0$  тенгламадан топиш лозим бўлган  $u$  функция берилган ва бунда шу функцияг баъзи бир  $F$  ва  $\Phi$  функциялар кўринишида шартлар қўйилган бўлсин. Агар бу масала ечимга эга бўлмаса, масалан,  $F \notin C^2, \Phi \notin C^2$  бўлганлиги туфайли бу ҳолда биз текис яқинлашувчи кетма-кетликлар  $F_n \rightarrow F, \Phi_n \rightarrow \Phi$  ни тузамиз. Бу ерда  $F \notin C^2, \Phi \notin C^2$ . Шунда агар  $F_n$  ва  $\Phi_n$  функцияларга мос келувчи ечим  $(u_n)$  мавжуд бўлса сифатида  $u_n$  функцияларнинг лимитини оламиз:

$$u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$$

Бунда  $u_n$  кетма-кетлик  $u$  га текис яқинлашиш шarti бажарилган.

**Мисол.** Бизларга берилган гиперболик тенглама учун Коши масаласини кўриб чиқамиз:

$$\begin{cases} u_n = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, 0 < t \leq T; \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty; \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

Маълумки агар  $\phi \in C^2(E), \psi \in C^1(E)$  бўлса ечим Даламбер формуласи билан берилган бўлади?

$$u(x, t) = \frac{\phi(x-at) + \phi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

Фараз қилайлик бизларга худди шундай масалада  $\bar{\phi}, \bar{\psi}$  функция фақатгина узлуксиз бўлса, яъни биз Даламбер формуласидан фойдалана ололмаймиз.  $0 < t \leq T$  полосада фикр юритамиз.  $[-d; d]$  кесмадан ташқарида  $\bar{\phi} = \bar{\psi} = 0$  бўлишини талаб қиламиз. Бу ерда маълум бир ўзгармас. Бундай хосса  $\bar{\phi}, \bar{\psi} \in [-d; d]$   $d \supp$  каби белгиланади. Фараз қилайликки шундай  $\phi_n(x), \psi_n(x)$  функциялар мавжуд бўлиб,  $\phi_n \in C^2(E), \psi_n \in C^1(E)$  шунингдек  $|x| \geq 2d$  учун  $\bar{\phi}_n(x) = \bar{\psi}_n(x) = 0$ , ҳамда  $[-2(d+aT); 2(d+aT)]$  кесмада

$$\begin{cases} \bar{\phi}_n(x) \rightarrow \bar{\phi}(x); \\ \bar{\psi}_n(x) \rightarrow \bar{\psi}(x). \end{cases}$$

$\bar{\phi}_n, \bar{\psi}_n$  функцияларга мос келувчи Коши масаласининг ечими учун Даламбер формуласи ўринлидир.

$$u_n(x, t) = \frac{\bar{\phi}_n(x-at) + \bar{\phi}_n(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \bar{\psi}_n(\xi) d\xi \rightarrow u_n(x, t) \in C^2\{E \times [0; T]\}$$

Бундай функцияларнинг лимитини бизлар ечим деб номлаймиз.

$$\bar{u}(x, t) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x, t)$$

Аниқлашни тўғри деб ҳисоблаш мумкин агар биз

$$\Pi = \{(x, t) : -2d - aT \leq x \leq 2d + aT, 0 \leq t \leq T\}$$

Тўғри бурчақда  $u_n(x, t)$  кетма-кетликнинг текис яқинлашишини кўрсата олсак (равшанки тўғри тўрт бурчақдан ташқарида кетма-кетликнинг барча ҳадлари 0 га айнан тенг). Бунинг учун  $u_n$  фундаментал кетма-кетлик эканлигини, яъни

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists M : \forall m > M, \forall p > 0 \quad |u_{m+p}(x, t) - u_m(x, t)| < \varepsilon \quad \forall (x, t) \in \Pi$$

Бу айирмани Даламбер формуласи орқали баҳолаймиз.

$$|u_{m+p}(x, t) - u_m(x, t)| \leq \frac{|\phi_{m+p}(x+at) - \phi_m(x+at)|}{2} + \frac{|\phi_{m+p}(x-at) - \phi_m(x-at)|}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-at}^{x+at} |\psi_{m+p}(\xi) - \psi_m(\xi)| d\xi$$

Ҳосил қилинган йиғиндини ҳар қандай илгаридан берилган  $\varepsilon$  дан кичик қилиш мумкин –бу текис яқинлашиш шартидан, демак  $\phi_n, \psi_n$  кетма-кетликларнинг фундаменталлигидан келиб чиқади. Шундан ҳосил қиламизки

$$u_n(x, t) \Rightarrow \bar{u}(x, t), (x, t) \in \Pi$$

бу ерда

$$\bar{u}(x, t) \in C[\Pi]$$

Бундан ташқари  $u_n(\pm(2d + aT), t) = 0$ , бўлгани учун  $u(\pm(2d + aT), t) = 0$ , ва  $\Pi$  тўғри бурчақдан ташқарида  $\bar{u}(x, t) = 0$  бўлади.

Шундай тарзда тузилган функция лимитик ўтиш шаклидаги умумлаштирилган ечим дейилади. Бу ечи ягонами деган савол туғилади (чунки биз  $\phi_n, \psi_n$  кетма-кетликларни ихтиёрий равишда танлаган эдик)? Бу саволга жавоб бериш учун бизлар ихтиёрий икки  $\phi_n^1, \phi_n^2$  ва  $\psi_n^1, \psi_n^2$  жуфт кетма-кетлик оламиз ва улар

$$\begin{cases} \phi_n^1 \Rightarrow \bar{\phi}, & \phi_n^2 \Rightarrow \bar{\phi}; \\ \psi_n^1 \Rightarrow \bar{\psi}, & \psi_n^2 \Rightarrow \bar{\psi}; \end{cases} \quad \text{бўлади.}$$

Фараз қилайликки бу кетма-кетликларга мос равишда Даламбер формуласи бўйича ҳосил қилинган  $u_n^1$  ва  $u_n^2$  кетма-кетликлар ҳадларининг лимитларидан иборат бўлган

$\bar{u}^{-1}(x, t), \bar{u}^{-2}(x, t)$  икки ечимлар тўғри келсин

$\bar{u}^{-1}(x, t) \equiv \bar{u}^{-2}(x, t)$  исботлаймиз. Бунинг учун уларнинг айирмасини баҳолашимиз керак

$$\bar{u}^{-1}(x, t) - \bar{u}^{-2}(x, t) = \bar{u}^{-1}(x, t) - \bar{u}^{-2}(x, t) \leq |u_n^1(x, t) - u_n^2(x, t)| + |u_n^2(x, t) - u_n^1(x, t)| + |u_n^2(x, t) - u_n^1(x, t)|$$

$u_n^1$  ва  $u_n^2$  функцияларнинг мос равишда

$\bar{u}^{-1}$  ва  $\bar{u}^{-2}$  функцияларга текис яқинлашиши



сабабли ушбу айирманинг биринчи ва учинчи кўшилувчилари нолга интилади чунки  $\phi_n^1, \phi_n^2$  ва  $\psi_n^1, \psi_n^2$  кетма-кетликларга мос равишда яна ўша функциялар  $\Phi$  ва  $\Psi$  яқинлашади. Бу ердан  $\bar{u}^{-1}(x, t)$  ва  $\bar{u}^{-2}(x, t)$  функцияларнинг айнан тенглиги келиб чиқади.

## 6. Интеграллик айният маъносидаги умумлаш ечимлар.

Умумлашган ечимлар қўлланилишининг бошқа мисоли сифатида Пуассон тенгламасидаги  $\Delta u = -f(x, y, z)$  функция икки марта Дифференциалланмайдиган ҳолат, яъни нормал ечим мавжуд бўлмаган ҳолат бўлиши мумкин (чунки ҳамма вақт  $\Delta u \in C^2$ )

**Умумий ёндашув.**  $\Sigma$  чегарага эга бўлган  $\Omega \in E^3$  соҳада  $u(x, y, z)$  функциялар  $L[u] = F$  тенглама билан аниқланадиган бўлсин, бу ерда

$$L[u] = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{i,j}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^3 b_i(x) u_{x_i} + c(x) u$$

шунда бурчакга боғланган оператор қуйидагича берилади

$$M[v] = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (a_{i,j}(x) v)_{x_i x_j} - \sum_{i=1}^3 (b_i(x) v)_{x_i} + c(x) v$$

Бизлар фақат шунақ  $\mathcal{V}$  функцияларни қараймизки, улар учун лимитда тўлиқ қуйидаги шарт бажарилиши керак. Маълумки агар  $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$  бўлса (1.16) формула ўринли бўлади

$$\iiint_{\Omega} (vL[u] - uM[v]) d\tau = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \bar{\rho} d\tau = \iint_{\Sigma} (\bar{\rho}, \bar{n}) d\sigma$$

$\mathcal{V}$  га қўйилган шартлардан  $v_x, v_y, v_z$  функциялар демак  $\bar{\rho}$  вектор функция ҳам  $\Sigma$  да 0 га

айланишини ҳосил қиламиз. Бундан келиб чиқадики

$$\iiint_{\Omega} (vL[u] - uM[v]) d\tau = 0$$

$L[u] = F$  эканлигидан фойдаланамиз

$$\iiint_{\Omega} vF d\tau = \iiint_{\Omega} uM[v] d\tau \quad (1.20)$$

$u$  функция учун ҳосил қилинган ифода интеграл ўхшашлик маъносидаги умумлаштирилган ечим дейилади. Шундай қилиб биз узлуксиз дифференциалланиш талабини  $\mathcal{V}$  функцияга ўтказиб, шунингдек бу функция қатъий  $\Omega$  ичида ётувчи соҳадагина 0 га тенг бўлмаслиги шартини талаб этиб  $u$  функция учун тенгламани ўзгартирдик.

Саволлар.

1. Дифференциал оператор.
2. Қўшма дифференциал оператор.
3. Чизиқли алгебрадаги қўшма оператор билан боғланиш.
4. Қўшма дифференциал оператор мисол келтиринг.
5.  $L[u]$  дифференциалланувчи операторни ёзинг.
6.  $L[u]$  дифференциалланувчи оператор қўшма оператор қандай кўринишга эга
7.  $L[u]$  дифференциалланувчи оператор учун чегаравий масалани келтиринг.
8. Эгри чизиқли интеграллар учун Грин формуласини ёзинг.
9. Лимитта ўтиш шаклидаги умумлашган ечимлар. Умумий ёндашув.
10. Гиперболик тенглама учун Коши масаласини келтиринг
11. Даламбер формуласини ёзинг.
12. Интеграллик айният маъносидagi умумлаш ечимлар. Умумий ёндашув.
13. Пуассон тенгламасини келтиринг.

## Математик физика тенгламалари маърузалар

### Маъруза № 6.

#### Маъзу:

### Иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси

### Маъруза № 6

#### Иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси

#### Режа:

1. Фазода иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасини чиқарилиши
2. Бир фазовий ўзгарувчи билан берилган иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси. Асосий масалаларнинг қўйилиши
3. Биринчи чегаравий масала ечимининг мавжудлиги. Ўзгарувчиларни ажратиш усули.

### Таянч иборалар

*Фурье қонуни*

*Остраградский-Гаусс формуласи, Фазода иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси,*

*Чегаравий шартлар,*

*Бошланғич шартлар,*

*Биринчи чегаравий масала,*

*Иккинчи чегаравий масала,*

*Ярим тўғри чизиқдаги масала,*

*Коши масаласи*

## 1. Фазода иссиқлик ўтказувчанлик

### тенгламасини чиқарилиши

Уч ўлчовли фазода бирор иссиқлик ўтказувчи ва координаталари

$(x, y, z)$  булган иктиёрий  $M$  нуктанинг температураси  $t$  вақт моментида

$u(x, y, z, t)$  функция куришида берилувчи жисми караймиз.  
Маълумки, иссиқлик потоки вектори учун  $\vec{W}$   
куйдаги Фурье қонуни деб аталувчи формула уринлидир.

$$\vec{W} = -k \operatorname{grad} u$$

Бу ерда  $k(x, y, z)$  - иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентни.

Агар жисм  $E^3$   
 $\Omega$  соҳанинг чегараси  $\Sigma$  бўлади.

Шунда жисмининг иссиқлик миқдори  $t$  вақт моментида  
куйдаги формула билан ҳисобланади:

$$[t_1; t_2] \quad (Q(t_1) = Q_1, Q(t_2) = Q_2)$$

вақт ораллиғини караймиз. Шунда

$$Q_2 - Q_1 = \iiint_{\Omega} c(M)\rho(M)u(M, t_2)d\tau_M - \iiint_{\Omega} c(M)\rho(M)u(M, t_1)d\tau_M$$

бўлади.

Иссиқлик миқдорининг ўзгариши ташқаридан иссиқлик оқиб  
келиш натижасида ва баъзи ички манбанинг (стокларнинг) ҳаракати  
туфайли рўй беради:

$$Q_2 - Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} \left[ - \iint_{\Sigma} (\vec{W}, \vec{n}) dv \right] dt + \int_{t_1}^{t_2} \left[ \iiint_{\Omega} F(M, t) d\tau \right] dt$$

Биринчи интеграл учун Остроградский-Гаусс формуласини  
қўлаймиз ва ўрта қиймат ҳақидаги формулани эса иккинчи  
интеграл учун қўлаймиз:

$$Q_2 - Q_1 = - \int_{t_1}^{t_2} \left[ \iiint_{\Omega} (\operatorname{div} \vec{W}) d\tau \right] dt + (t_1 - t_2) \iiint_{\Omega} F(M, t_1) d\tau$$

Бу ерда  $t_1 \in [t_1; t_2]$  га қарашли.

Лагранж формуласидан куйидаги силлик (буни  
фараз қиламиз)  $u$  функция учун фойдаланамиз:

$$u(M, t_2) - u(M, t_1) = u_t(M, t_3)(t_2 - t_1), \quad t_3 \in [t_1; t_2]$$

Бундан куйидагини ҳосил қиламиз:

$$Q_2 - Q_1 = \iiint_{\Omega} c(M)\rho(M)u(M, t_2)d\tau_M - \iiint_{\Omega} c(M)\rho(M)u(M, t_1)d\tau_M =$$

$$= (t_2 - t_1) \iiint_{\Omega} c(M)\rho(M)u_t(M, t_3)d\tau_M$$

$$\text{Демак,} \quad (t_2 - t_1) \iiint_{\Omega} c(M)\rho(M)u_t(M, t_3)d\tau_M =$$

$$= - \int_{t_1}^{t_2} \left[ \iiint_{\Omega} (\operatorname{div} \vec{W}) d\tau_M \right] dt + (t_1 - t_2) \iiint_{\Omega} F(M, t_1) d\tau$$

Энди ҳамма интеграл учун умумлаштирилган ўрат қиймат формулани қўлаймиз:

$$c(M_1)\rho(M_1)u_t(M_1, t_3)V_\Omega(t_2 - t_1) = -\operatorname{div} \vec{W} \Big|_{M=M_2}^{t=t_2} V_\Omega(t_2 - t_1) + F(M_3, t_4)V_\Omega(t_2 - t_1).$$

Бунда  $t_3 \in [t_1; t_2]; M_1, M_2 \in \Omega$ ,

$V_\Omega - \Omega$  нинг ҳажми бўлади.

$V_\Omega(t_2, t_1)$  га исқартириб,  $\Omega$  дан олинган бирор бир  $M_1, M_2$  нуқталар учун қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$c(M_1)\rho(M_1)u_t(M_1, t_3)V_\Omega(t_2 - t_1) = -\operatorname{div} \vec{W} \Big|_{M=M_2}^{t=t_2} + F(M_3, t_4)$$

8

Энди бирор  $M_0$  нуқтагача  $\Omega$  ни қиссак,

$[t_1, t_2]$  кесма ҳам  $t_0$  нуқтагача қисилади. Бундан кўринадики  $M_1, M_2$  нуқталар  $M_0$  га ўтади,  $t_3, t_4, t_5$  лар эса  $t_0$  га. Бундан лимитга ўтганда қуйидаги ҳосил бўлади:

$$c(M_0)\rho(M_0)u_t(M_0, t_0) = -\operatorname{div} \vec{W} \Big|_{M=M_0}^{t=t_0} + F(M_0, t_0)$$

$\vec{W}$  учун Фурье қонунини қўллаб қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{W} &= \operatorname{div}(-k \operatorname{grad} u) = -\frac{\partial}{\partial x} k \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} k \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial z} k \frac{\partial u}{\partial z} \Rightarrow \\ \Rightarrow c(M_0)\rho(M_0)u_t(M_0, t_0) &= \frac{\partial}{\partial x} k \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} k \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} k \frac{\partial u}{\partial z} + F(M_0, t_0) \end{aligned}$$

9

$M_0, t_0$  нуқталарни ихтиёрий олганимиз сабабли, ҳосил қилинган формулани бутун  $[t_1, t_2]$  ва

$\Omega$  соҳа учун ёйиш мумкин:

$$\begin{aligned} c(x, y, z)\rho(x, y, z)u_t(x, y, z, t) &= \frac{\partial}{\partial x} (k(x, y, z)u_x(x, y, z, t)) + \\ &+ \frac{\partial}{\partial y} (k(x, y, z)u_y(x, y, z, t)) + \\ &+ \frac{\partial}{\partial z} (k(x, y, z)u_z(x, y, z, t)) + F(x, y, z, t) \end{aligned}$$

Бу ифода **фазода иссиқлик утказувчанлик тенгламаси** деб номланади.  $c, \rho, k$  ларни константа да деб олиб, қуйидаги тенглик ҳосил қиламиз:

$$u_t = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + f(x, y, z, t), \quad a^2 = \frac{k}{c\rho}, \quad f = \frac{F}{c\rho} \quad (2.1)$$

10

Агар  $u, f$

фақат  $x$  ва  $t$  ўзгарувчилари билан боғлиқ бўлса, у ҳолда бу тенглик қуйидагича ёзилади:

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad (2.2)$$

Физик интерпретацияда бир жинсли юпқа етержинда иссиқлик ўтказувчанлик (ёйилиш) тенгламасидир. (2.2) тенгламани биз кейинчалик **иссиқлик утказувчи тенгламаси** деб юритамиз.

Аналогик фикрлашни бошқа бир физик процеслар учун ҳам ўтказишимиз мумкин, масалан диффузия учун. Агар  $u(x, y, z, t)$  фазода газнинг концентрацияси бўлса, у ҳолда **диффузия тенгламаси** қуйидагича бўлади:

$$cu_t = \operatorname{div}(D \operatorname{grad} u) + F(x, y, z, t)$$

$D$  – *diffuziya koeffitsiyenti*

$F$  – *biror bir funktsiya*

11

2. Бир фазовий ўзгарувчи билан берилган иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси. Асосий масалаларнинг қўилиши

Қуйидаги тенгламани қараб чиқамиз:

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t \leq T$$

Агар бизга стержиннинг бошланғич вақт momentiдаги температураси маълум бўлса, у ҳолда биз бошланғич шартга эга бўламиз:

$$u(x, 0) = \phi(x), \quad 0 \leq x \leq l$$

Агар четларида температурани ўзгаришини билсак, у ҳолда айрим чегаравий шартга хосил қиламиз:




12

Агар четларида температурани ўзгаришини билсак, у ҳолда айрим чегаравий шартлар хосил қиламиз:

$$x = l, \quad 0 \leq t \leq T \quad \begin{cases} (1) u(l, t) = \mu_2(t) - \text{birinchi chegaraviy shart} \\ (2) u_x(l, t) = \nu_2(t) - \text{ikkinchi chegaraviy shart} \\ (3) u_x(l, t) = -\lambda_2 [u(l, t) - \theta_2(t)] - \text{uchinchi chegaraviy shart} \end{cases}$$

$$x = 0, \quad 0 \leq t \leq T \quad \begin{cases} (4) u(0, t) = \mu_1(t) - \text{birinchi chegaraviy shart} \\ (5) u_x(0, t) = \nu_1(t) - \text{ikkinchi chegaraviy shart} \\ (6) u_x(0, t) = -\lambda_1 [u(0, t) - \theta_1(t)] - \text{uchinchi chegaraviy shart} \end{cases}$$



13

Бу шартлардан бир нечтасини танлаб ҳар хил типли масалаларни ҳосил қиламиз:

**Биринчи чегаравий масала**


$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t \leq T \\ u(0, t) = \mu_1(t), \quad 0 \leq t \leq T \\ u(l, t) = \mu_2(t), \quad 0 \leq t \leq T \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad 0 \leq x \leq l \end{cases}$$



14

Иккинчи чегаравий масала

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t \leq T \\ u_x(0, t) = \nu_1(t), \quad 0 \leq t \leq T \\ u_x(l, t) = \nu_2(t), \quad 0 \leq t \leq T \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad 0 \leq x \leq l \end{cases}$$



15



Ярим тўғри чизиқдаги масала

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x,t), & x > 0, 0 < t \leq T \\ u(0,t) = \mu(t), & 0 \leq t \leq T \\ u(x,0) = \phi(x), & x \geq 0 \end{cases}$$

Коши масаласи

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x,t), & -\infty < x < +\infty, 0 < t \leq T \\ u(x,0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

16

Биринчи чегаравий масала ечимининг  
мавжудлиги

Ўзгарувчиларни ажратиш усули.

Биринчи чегаравий масалага кенгрок тўхталиб ўтамыз:

$$[2.1] \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x,t), & 0 < x < l, 0 < t \leq T \\ u(0,t) = \mu_1(t), & 0 \leq t \leq T \\ u(l,t) = \mu_2(t), & 0 \leq t \leq T \\ u(x,0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

17

Ечимнинг мавжуд ва ягоналигини қараб ўтамыз, шу билан бирга турхунлигини ва Гринн функциясини қўллашни қараймиз.

Биринчи чегаравий масаланинг ечими нима. Аниқки, биржинсли иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси ҳолатида  $\tilde{u}(x,t)$

:узилишга эга бўлган функциялар туплами қаноатлантиради

$$\tilde{u}(x,t) = \text{const}, (x,t) \in Q_T = \{(x,t) : (0;l) \times (0;T)\};$$

$$\tilde{u}(0,t) = \mu_1(t); 0 \leq t \leq T;$$

$$\tilde{u}(l,t) = \mu_2(t); 0 \leq t \leq T;$$

$$\tilde{u}(x,0) = \phi(x); 0 \leq x \leq l.$$

18

Таъриф.  $u(x,t)$  функция [2.1] иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси учун 1-чегаравий масаласининг ечими дейилади, агар у қуйидаги 3 шартни қаноатлантирса:

$$1. u \in C[\overline{Q}_T]$$

$$2. u_t, u_{xx} \in C[Q_T]$$

$$3. u(x,t) \text{ [2.2] шартларни қаноатлантиради}$$

19

Бир жинсли иссиқлик ўтазувчанлик тенгламаси нолинчи чегаравий шартлар билан берилган биринчи чегаравий масала учун ечимни топамиз:

$$[2.2] \quad \begin{cases} (1) u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, 0 < t \leq T; \\ (2) u(0, t) = 0, & 0 \leq t \leq T; \\ (3) u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T; \\ (4) u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Ечимни қуйидаги йўл билан аниқлаймиз, аввало берилган тенгламани алмаштириш ёрдамида бирор  $u(x, t)$  функцияни тузатамиз, кейин эса, бошланғич шартларга қўйилган маълум бир чекланишларда биз тузган функция 1-чи чегаравий масаланинг ечими бўлишини исботлаймиз.

20

Янги функцияни аниқлаймиз:  $v(x, t) = X(x)T(t)$

Функциямизни иссиқлик ўтазувчанлик тенгламасига қўйиб куйидагини ҳосил қиламиз:  $X(x)T'(t) = a^2 X''(x)T(t)$ .

Тенгликнинг икки томонини ҳам  $a^2 X(x)T(t)$  га бўламиз:

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

Ўнг ва чап томондаги функциялар ҳар хил ўзгарувчиларга боғлиқ бўлганлиги туфайли, аниқки уларнинг ҳар иккаласи ҳам бирор константага тенг бўлади, биз уни  $-\lambda$  билан белгилаймиз:

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

21

Бундан 2 та тенгламага эга бўламиз:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0; \quad (2.3)$$

$$T'(t) + a^2 \lambda T(t) = 0. \quad (2.4)$$

$v(x, t)$  функциямиз учун чегаравий шартларни ёзиб оламиз:

$$\begin{cases} v(0, t) = 0; \\ v(l, t) = 0. \end{cases} \quad t \in [0; T]$$

22

Куйидагини ҳосил қиламиз: 
$$\begin{cases} X(0) = 0 \\ X(l) = 0. \end{cases}$$

(2.3)ни ҳосил бўлган система билан бирлаштирадик,

**Штурм-Лиувилл масаласини** ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0; \\ X(0) = 0; \\ X(l) = 0. \end{cases}$$

Барча  $\lambda$  ларни топиш талаб қилинади.

23

Дифференциал тенглама курсидан маълумки,

$$\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2, n \in N \\ X_n(x) = c_n^1 \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right), n \in N \end{cases}$$

$\lambda_n$  ни (2.4) га қўйиб, қуйидаги кўринишдаги тенгликни ҳосил қиламиз:  $T_n'(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = 0$ .

Ечим  $T_n = c_n^2 \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\}$  бўлади.

$X_n(x)$  ва  $T_n(t)$  ни бирлаштириб қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$v_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = c_n \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\}$$

Қайд этиб ўтаемизки, ҳамма шундай функциялар (1) иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасининг ечими ва (2), (3) чегаравий шартларни қаноатлантиради;  $u(x, t)$  функцияни қаторнинг йиғиндиси сифатида аниқлаймиз:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(x, t)$$

Таъкидлаб ўтаемизки бу чегаравий шартларни қаноатлантиради. Константаларни шундай таълаймизки, бошланғич шартлар бажарилсин:

$$\phi(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right)$$

Тенгликни  $\sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right)$  га кўпайтирамиз ( $n$ -бутун).

$x \rightarrow S$  алмаштириш оламиз ва  $s$  бўйича интеграллаймиз:



$$\int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi m}{l} s\right) ds = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_0^l \sin\left(\frac{\pi m}{l} s\right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds.$$

$$\int_0^l \sin\left(\frac{\pi m}{l} x\right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) dx = \begin{cases} 0, n \neq m, \\ \frac{l}{2}, n = m. \end{cases} \Rightarrow \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi m}{l} s\right) ds = \frac{l}{2} c_m \Rightarrow$$

$$c_m = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi m}{l} s\right) ds$$

Натижада  $u(x,t)$  учун куйидаги формулани ҳосил қиламиз:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \left( \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \exp\left\{-\alpha^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\}. \quad (2.5)$$

## Саволлар.

1. Фурье қонуни
2. Остраградский-Гаусс формуласи
3. Фазода иссиқлик утказувчанлик тенгламаси
4. Чегаравий шартлар
5. Бошланғич шартлар
6. Биринчи чегаравий масала
7. Иккинчи чегаравий масала
8. Ярим тўғри чизикдаги масала
9. Коши масаласи
10. Биринчи чегаравий масалани ечимнинг таърифи.

Маъруза № 7.

Мавзу:

Максимум принципи



Маъруза № 7  
Максимум принципи

Режа:

1. Бир фазовий ўзгарувчи билан берилган иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси. Мавжудлик теоремаси
2. Иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси учун максимум принципи
3. Биринчи чегаравий масалани ечимининг ягоналиги.
4. Биринчи чегаравий масалани ечимининг турғунлиги.

Таянч иборалар

иссиқлик ўтказувчанлик  
тенгламаси,  
фазовий ўзгарувчи,  
максимум принципи,  
чегаравий масала,  
ягоналик,  
турғунлик



1. Бир фазовий ўзгарувчи билан берилган иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси. Мавжудлик теоремаси

Бизга маълумки иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси учун биринчи чегаравий масаланинг ечими куйидагича:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \left| \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\} \right. \quad (2.5)$$

Теорема 2.1(мавжудлик)

Фараз қилайлик бизга  $\phi(x)$

функция берилган ва у куйидаги шартларни қаноатлантирсин:

$$1) \phi(x) \in C^1[0,l] \quad 2) \phi(0) = \phi(l) = 0$$

У холда (2.5) формула [2.2] чегаравий масалала учун ечимлар синфини аниқлайди.



**Исботи.** (1)  $u(x,t)$  функциямиз  $\bar{Q}_T = [0,l] \times [0,T]$

соҳада узлуксиз эканини кўрсатишимиз керак.

$$|u(x,t)| \leq \sum |v_n(x,t)| \leq \sqrt{2} \sum_{n=1}^{\infty} |\phi_n|$$

Бу ерда 
$$\phi_n = \sqrt{\frac{2}{l}} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds$$

Агар бизлар  $\sum_{n=1}^{\infty} |\phi_n|$  қаторни яқинлаштишни кўрсатсак, шунда Вейерштрасс аломатига кўра  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x,t)$

қатор текис яқинлашувчи бўлади.

5

Олинган  $v_n(x,t)$  функция узлуксиз бўлганлиги сабабли  $u(x,t)$  функциямиз ҳам узлуксиз бўлади, чунки бу функциямиз узлуксиз функциялардан тузилган текис яқинлашувчи бўлган қатор билан аниқланади. Энди  $\phi_n$  функцияни қараймиз.

Агарда бу функцияни интегралласак қуйидагича бўлади.

$$\begin{aligned} \phi_n &= \sqrt{\frac{2}{l}} \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = \{ \text{бўлаклар интеграллаймиз} \} \\ &= \sqrt{\frac{2}{l}} \frac{1}{\pi n} \phi(s) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \Big|_0^l + \sqrt{\frac{2}{l}} \int_0^l \phi'(s) \left(\frac{l}{\pi n}\right) \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds = \\ &= \frac{1}{n} \int_0^l \phi'(s) \sqrt{\frac{2}{l}} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds. \end{aligned}$$

6

$$\bar{\phi}_n = \int_0^l \phi'(s) \sqrt{\frac{2}{l}} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds$$

белгилаш оламиз.

Ортонормалланган функциялар системасига таълуқли бўлган Бессел тенгсизликдан фойдалансак бизлар қуйидаги тенгсизликка келамиз:

$$\left\{ \sqrt{\frac{2}{l}} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \right\}_{n=1}^{\infty} :$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \bar{\phi}_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \int_0^l \phi'(s) \sqrt{\frac{2}{l}} \cos\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right)^2 \leq \int_0^l (\phi'(s))^2 ds$$

Энди бизлар  $\sum_{n=1}^{\infty} |\phi_n|$  қатор учун алмаштириш олишимиз мумкин

7

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\phi_n| = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} |\bar{\phi}_n| \leq \left\{ ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \right\} \leq \frac{l}{\pi} \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \bar{\phi}_n^2 \right)$$

Қавс ичидаги 1-қатор маълумки яқинлашувчи иккинчи қаторнинг яқинлаштишни хозиргина кўрсатдик.

Бундан хулоса Фурье коэффициентларидан иборат бўлган

$\sum_{n=1}^{\infty} |\phi_n|$  қатор яқинлашувчи. Демак илгари кўрсатганимиздек

$u(x,t)$  функциямиз узлуксизлигини исботладик.

8

(2) Энди бизлар  $Q_T$  соҳада  $u_t, u_{xx}$  бўйича хосилаларнинг мавжудлиги ва узлуксизлигини исботлашимиз керак. Барча  $0 < x < l, t_0 < t < T$

(бу эрда  $t_0$  қандайдир ихтиёрий мусбат сон) лар учун  $u_{xx}$  функциямиз мавжуд эканлигини масалан курсатамиз. Шунда бизлар

$u_{xx}$  функциямиз  $Q_T$  тўплам устида мавжуд эканлигини исботлай оламиз. Энди бизлар (2.5) формула билан берилган  $u(x, t)$  функциямизни 2 марта  $x$  бўйича дифференциаллаймиз.

У ҳолда

$$u_{xx}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n \sqrt{\frac{2}{l}} \left( -\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 \right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \cdot e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t}$$

хосил бўлади.  $e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t}$  кўпайтувчимиз бизларга

$t_0 < t < T$  да можарант қаторининг текис яқинлашувчилигини

беради. Бу ердан бизлар қуйидаги хулосага келамиз: юқорида берилган  $u_{xx}(x, t)$  қатор  $Q_T$  соҳада текис яқинлашувчилиги ва мавжудлиги келиб чиқади. Энди  $u_{xx}(x, t)$  ни узлуксизлигини кўрсатишимиз керак. Бу хулоса

$$\sum_{n=1}^{\infty} (v_n(x, t))_{xx}$$

қаторни ҳар бир ҳадини узлуксизлигидан келиб чиқади.

(3) Энди  $u(x, t)$

функциямиз [2.2] чегаравий масаланинг барча шартларини қаноатлантиради, чунки уни кўринишини чиқарганда бу шартлардан фойдаланган эдик.

## 2. Иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси учун максимум принципи

$Q_T = \{(x, t) : (0, l) * (0, T)\}$  тўпламни қарайлик.

$\Gamma_T = \overline{Q_T} \setminus Q_T$  тўпламнинг чегараси. Бизлар  $u(x, t)$

функциямиз ўзининг мах қийматига  $\Gamma_T$

чегарада эришади, агарда у иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасини қаноатлантирса.

**Теорема 2.2(мах принципи):** Агар  $u(x, t) \in C[\overline{Q_T}]$

$$u_t, u_{xx} \in C[Q_T]$$

$Q_T$  соҳада  $u_t = a^2 u_{xx}$  бўлсин, у ҳолда

$$\max_{Q_T} u(x, t) = \max_{\Gamma_T} u(x, t)$$

$$\min_{Q_T} u(x, t) = \min_{\Gamma_T} u(x, t)$$

**Исбот.** Бизлар мах га чегарада эришишини кўрсатишимиз керак. Тескариси: фараз қиламиз  $\max_{\Gamma} u(x,t) = M$  ва шундай  $(x_0, t_0) \in Q_T$

мавжудки, шу нуқтада функциянинг қиймати:

$$u(x_0, t_0) = M + \varepsilon, \varepsilon > 0$$

Энди янги  $v(x,t)$  функцияни қўйидагича аниқдаймиз:

$$v(x,t) = u(x,t) - \frac{\varepsilon}{2T}(t-t_0) \quad (2.6)$$

Бундан қўйидаги тенгликни ҳосил қилиш осон:

$$v(x_0, t_0) = u(x_0, t_0) = M + \varepsilon$$

Бундан ташқари,  $t \in [0, T]$  бўлганда

$$\left| \frac{\varepsilon}{2T} * (t-t_0) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{булганлиги сабабли}$$

$$\max_{\Gamma} v(x,t) = \max_{\Gamma} \left[ u(x,t) - \frac{\varepsilon}{2T}(t-t_0) \right] \leq M + \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{тенгсизлик ўринлидир.}$$

Демак шундай  $(x_1, t_1) \in Q_T$  нуқта мавжудки бу нуқтада  $v(x,t)$

функциямиз мах га эришади. Икки марта дифференциалланувчи функциянинг максимумнинг зарурий шартига кўра

$$\begin{cases} v_t(x_1, t_1) \geq 0 \\ v_{xx}(x_1, t_1) \leq 0 \end{cases}$$

Агар  $t_1 = T$  бўлса тенгсизликлар қатий бўлади.

Энди биз (2.6) тенгликни иккала томонини  $t$  бўйича 2 марта дифференциаллашдан қўйидагини ҳосил қиламиз:

$$u_t(x,t) = v_t(x,t) + \frac{\varepsilon}{2T}$$

14

Энди  $x$  бўйича 2 марта дифференциаллаб қўйидагини ҳосил қиламиз:

$$u_{xx}(x,t) = v_{xx}(x,t)$$

Юқорида ёзилган тенгсизликлар системасидан қўйидаги тенгсизликларни ҳосил қиламиз:

$$u_t(x_1, t_1) = v_t(x_1, t_1) + \frac{\varepsilon}{2T} > 0 \geq a^2 v_{xx}(x_1, t_1) = a^2 u_{xx}(x_1, t_1)$$

бу эса иссиқлик ўтказувчанлик теғламасига зид. Биз қарама-қаршиликга

келдик. Демак бизлар нотўғри фараз қилган эдик. Шунинг учун

$$\max_{Q_T} u(x,t) = \max_{\Gamma} u(x,t)$$

ва биринчи қисм исботлади.

15

Теореманинг 2-қисмини исботлаш учун  $u(x,t)$

функциядан  $w(x,t) = -u(x,t)$

функцияга ўтиш керак. Ҳосил булган функция максимумга эришган нуқталарда  $u(x,t)$

функция минимал қийматларга эришади. Теорема исботланди.

Чегаравий масалаларга максимум принципини қўлласак, қўйидагини ҳосил қиламиз.

16



Энди

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, x \in (0, l), t \in (0, T) \\ u(0, t) = \mu_1(t), t \in [0, T] \\ u(l, t) = \mu_2(t), t \in [0, T] \\ u(x, 0) = \phi(x), x \in [0, l] \end{cases}$$

У холда

$$\max_{Q_T} u(x, t) = \max \left\{ \max_{t \in [0, T]} \mu_1(t), \max_{t \in [0, T]} \mu_2(t), \max_{x \in [0, l]} \phi(x) \right\}$$

Бу тенглик оддий физикавий маънога эга. Стерженнинг температураси унинг чегараларидаги ва бошлангич вақт моментидаги температурасидан баланд бўшлиши мумкин эмас.

17

### 3. Биринчи чегаравий масалани ечимининг ягоналиги.

**Теорема 2.3 (ягоналик).** Бизга  $u_1(x, t), u_2(x, t)$  функциялар

$$u_i \in C[\overline{Q_T}], \quad \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, \frac{\partial u_i}{\partial t} \in C(Q_T), \quad i = 1, 2$$

синфдан олинган бўлиб, бу функцияларнинг иккаласи ҳам [2.1] чегаравий масаланинг эчими бўлса, шунда қуйидаги тенглик ўринли

$$u_1(x, t) \equiv u_2(x, t)$$

$$[2.1] \quad \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), 0 < x < l, 0 < t \leq T \\ u(0, t) = \mu_1(t), 0 \leq t \leq T \\ u(l, t) = \mu_2(t), 0 \leq t \leq T \\ u(x, 0) = \phi(x), 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

**Исботи:** Янги  $v(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$  функция киритамиз. Шунда  $v \in C[\overline{Q_T}]$ ,  $v_t, v_{xx} \in C(Q_T)$  бўлиши аниқ. Бу функциямиз қуйидаги масаланинг эчими бўлади

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx}, x \in (0, l), t \in (0, T) \\ v(0, t) = 0, t \in [0, T] \\ v(l, t) = 0, t \in [0, T] \\ v(x, 0) = 0, x \in [0, l] \end{cases}$$

19

$v(x, t)$  функция учун мах принципининг барча шартлари бажарилиши аниқ. Демак мах принципини қўллаганимизд

$$\begin{cases} \max_{Q_T} v(x, t) = \max_{\Gamma} v(x, t) = 0 \\ \min_{Q_T} v(x, t) = \min_{\Gamma} v(x, t) = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow v(x, t) \equiv 0 \Rightarrow u_1(x, t) \equiv u_2(x, t)$$

теорема исботланди.

20

#### 4. Биринчи чегаравий масала тургунлиги.

**Лемма 1.** Бизларга  $u_1(x, t)$  ва  $u_2(x, t)$

функциялар берилган ва куйидаги шартлар бажарилсин:

$$u_i \in C[\bar{Q}_T], \quad \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, \frac{\partial u_i}{\partial t} \in C[\bar{Q}_T], \quad i=1,2 \quad \text{ва}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t} \geq a^2 \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, x \in (0, l), t \in (0, T), i=1,2 \\ u_1(0, t) \geq u_2(0, t), t \in [0, T] \\ u_1(l, t) \geq u_2(l, t), t \in [0, T] \\ u_1(x, 0) \geq u_2(x, 0), x \in [0, l] \end{cases}$$

ўринли бўлса, у холда  $\bar{Q}_T$  соҳада  $u_1(x, t) \geq u_2(x, t)$

21

**Исботи.** Яна  $v(x, t) = u_2(x, t) - u_1(x, t)$  бунда

$v \in C[\bar{Q}_T], v_t, v_{xx} \in C[Q_T]$  шу билан биргаликда

$$\begin{cases} v_t = a^2 u_{xx}(x, t), x \in (0, l), t \in (0, T) \\ v(0, t) \geq 0, t \in [0, T] \\ v(l, t) \geq 0, t \in [0, T] \\ v(x, 0) \geq 0, x \in [0, l] \end{cases}$$

ўринли. Энди бизлар мах принципининг 2-қисмидан фойдаланамиз:

$$\min_{\bar{Q}_T} v(x, t) = \min_{\Gamma} v(x, t) \geq 0 \quad \text{демак хулоса}$$

$$u_1(x, t) \geq u_2(x, t), (x, t) \in \bar{Q}$$

Лемма исботланди.

22

**Теорема 2.4** (тургунлик). Бизга  $u_1(x, t), u_2(x, t)$  функциялар

берилган ва куйидаги шартлар:  $u_i \in C[\bar{Q}_T], \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, \frac{\partial u_i}{\partial t} \in C[Q_T], i=1,2$

$$\begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}, x \in (0, l), t \in (0, T), i=1,2 \\ u_i(0, t) = \mu_1^i(t), t \in [0, T], i=1,2 \\ u_i(l, t) = \mu_2^i(t), t \in [0, T], i=1,2 \\ u_i(x, 0) = \phi_i(x), x \in [0, l], i=1,2 \end{cases}$$

ўринли бўлса, у холда

$$\max_{\bar{Q}} |u_1(x, t) - u_2(x, t)| =$$

$$\max \left\{ \max_{t \in [0, T]} |\mu_1^1(t) - \mu_1^2(t)|, \max_{t \in [0, T]} |\mu_2^1(t) - \mu_2^2(t)|, \max_{x \in [0, l]} |\phi_1(x) - \phi_2(x)| \right\}$$

тенглик ўринли

23

**Исботи:**  $v(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$

алмашгириш оламиз.

У холда

$$v \in C[\bar{Q}_T]$$

$$v_t, v_{xx} \in C[Q_T]$$

$$v_t = a^2 u_{xx}(x, t), x \in (0, l), t \in (0, T)$$

тенгликлар ўринли.

24

Қуйидагича белгилашларни оламыз:

$$\varepsilon = \max \left\{ \max_{t \in [0, T]} |\mu_1^1(t) - \mu_1^2(t)|, \max_{t \in [0, T]} |\mu_2^1(t) - \mu_2^2(t)|, \max_{x \in [0, J]} |\phi_1(x) - \phi_2(x)| \right\} \varepsilon > 0$$

Бу тенгликдан  $\max_t |v(x, t)| \leq \varepsilon$  келиб чиқади.

Демак  $-\varepsilon \leq v(x, t) \leq \varepsilon$   $\Gamma$  тўғри чизигда бажарилади:  
 $(-\varepsilon, v(x, t))$  ва  $(v(x, t), \varepsilon)$

функциялар учун 1-леммани қўлласак

$$-\varepsilon \leq u_1(x, t) - u_2(x, t) \leq \varepsilon$$

$Q_T$  соҳада бўлади.  
**ТЕОРЕМА ИСБОТЛАНДИ.**

25

### Саволлар.

1. Иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси учун биринчи чегаравий масаланинг эчими келтиринг
1. Мавжудлик теоремаси
2. Ягоналик теоремаси
3. Тургунлик теоремаси

26



## Маъруза № 8.

### Мавзу:

## Умумий чегаравий масала ечимининг ягоналиги

### Маъруза № 8

## Умумий чегаравий масала ечимининг ягоналиги

### Режа:

1. Умумий чегаравий масаланинг қўйилиши қўйидагича.
2. Коши масаланинг ечимининг мавжудлиги.
3. Коши масаласи ечимининг мавжудлиг теоремасининг исботи.

## Таянч иборалар

чегаравий масала,  
шартлар,  
ягоналик теоремаси,  
Коши масаласи

### 1. Умумий чегаравий масала ечимининг ягоналиги

$$[2.3] \begin{cases} u_t = a u_{xx} + f(x,t); & 0 < t \leq T, \quad 0 < x < l; \\ \alpha_1 u(0,t) - \alpha_2 u_x(0,t) = p(t); & 0 \leq t \leq T; \\ \beta_1 u(l,t) + \beta_2 u_x(l,t) = q(t); & 0 \leq t \leq T; \\ u(x,0) = \varphi(x); & 0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

Бу эрда  $\alpha_1 + \alpha_2 > 0$ ;  $\beta_1 + \beta_2 > 0$ . -манфий бўлмаган

ўзгармаслар. Бу ўзгармаслар учун қуйидаги шарт бажарилиши керак.

$$\alpha_1 + \alpha_2 > 0; \quad \beta_1 + \beta_2 > 0;$$

Бу чегаравий масала учун қуйидаги теорема уринли.

**Теорема 2.5 (ягоналик).** Фараз қилайлик  $Q_T$  соҳада  $u_1, u_2(x, t)$  функциялар аниқланган бўлсин. Бу функциялар қуйидаги шартларни қаноатлантиради:

$$u_i, \frac{\partial u_i}{\partial x} \in C[\bar{Q}_T], \frac{\partial u_i}{\partial x} \Big|_{x=0}, \frac{\partial u_i}{\partial t} \in C[Q_T], \quad i = 1, 2,$$

ва бир хил [2.3] чегаравий масаланинг счимлари бўлсин.

Шунда  $Q_t$  соҳада

$$u_1(x, t) = u_2(x, t)$$

**Исбот.** Ҳар доимдагидек  $v(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$

функцияни киритамиз. Бу функция учун қуйидаги шартлар бажарилади:

$$v, v_x \in C[\bar{Q}_T], v_t, v_{xx} \in C[Q_T] \quad \text{ва} \quad v(x, t)$$

функциямиз қуйидаги чегаравий масалани эчими бўлади:

$$\begin{cases} v_t = aIv_{xx} & 0 < t \leq T, \quad 0 < x < l; \\ \alpha_1 v(0, t) - a_2 v_x(0, t) = 0; & 0 \leq t \leq T; \\ \beta_1 v(l, t) + \beta_2 v_x(l, t) = 0; & 0 \leq t \leq T; \\ v(x, 0) = 0; & 0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

1-чи тенгламани иккала томонини  $2v$  кўпайтирамиз

$$2vv_t = \frac{\partial}{\partial t}(vI), \quad \text{инобатта олсак, қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз:}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(vI(x, t)) = 2aIv(x, t)v_{xx}(x, \tau)$$

Функцияларнинг тенглигидан аниқ интегралларнинг тенглиги ҳам келиб чиқади:

$$\int_0^l \int_0^t \frac{\partial}{\partial \tau}(vI(x, \tau)) d\tau dx = 2aI \int_0^l \int_0^t v(x, \tau)v_{xx}(x, \tau) d\tau dx,$$

Бу тенгликнинг унғ томонида бизлар интеграллаш тартибини ўзгартира олаамиз:

$$\int_0^l \int_0^t \frac{\partial}{\partial \tau}(vI(x, \tau)) d\tau dx = 2aI \int_0^t \left[ \int_0^l v(x, \tau)v_{xx}(x, \tau) dx \right] d\tau. \quad (2.7)$$

Бочланғич шартдан фойдалансак, қуйидаги тенгликга келамиз:

$$\int_0^l \int_0^t \frac{\partial}{\partial \tau}(vI(x, \tau)) d\tau dx = \int_0^l (vI(x, \tau)) dx. \quad (2.7) \text{ ни ўнғ томонидаги}$$

ички интегрални бўлаклаб интеграллаймиз:

$$\int_0^l vI(x, \tau)v_{xx}(x, \tau) dx = v(x, \tau) v_x(x, \tau) \Big|_0^l - \int_0^l (v_x(x, t))I dx.$$

чегаравий шартлардан фойдалансак эса, ихтиёрий  $t \in [0, T]$  учун:

$$v(l, t)v_x(l, t) = \begin{cases} 0, & \text{агар } \beta_1 = 0, \beta_2 > 0; \\ 0, & \text{агар } \beta_1 > 0, \beta_2 = 0; \\ -\frac{\beta_1}{\beta_2} v(l, t), & \text{агар } \beta_1 > 0, \beta_2 > 0. \end{cases}$$

$$v(0,t)v_x(0,t) = \begin{cases} 0, & \text{агар } \alpha_1 = 0, \alpha_2 > 0; \\ 0, & \text{агар } \alpha_1 > 0, \alpha_2 = 0; \\ -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} vI(0,t), & \text{агар } \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0. \end{cases}$$

Бундан хулоса, агар қуйидаги белгилаш киритсак:

$$P(\tau) = v(x,\tau)v_x(x,\tau)|_0^l = v(l,\tau)v_x(l,\tau) - v(0,\tau)v_x(0,\tau),$$

шунда  $P(\tau) \leq 0, \forall \tau \in [0; T]$ .

демак [2.7] тенгликни қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин.

$$\int_0^l vI(x,t) dx - 2aI \int_0^l P(\tau) d\tau + 2aI \int_0^l \int_0^l v_x^2(x,\tau) dx d\tau = 0$$

9

Биринчи ва учинчи йиғиндилар манфий эмас. Иккинчи интегралнинг манфий эмаслиги  $P(\tau)$

функциянинг мусбат эмаслигидан келиб чиқади. Демак бизлар учта манфий бўлмаган функциянинг йиғиндиси 0 га тенг эканлигини кўрсатдик. Демак ҳар биттаси 0 га тенг деб хулоса қиламиз. Теоремани исботини бошланишда бизлар  $v(x,t)$

функциямиз узлуксиз эканлигини кўрсатган эдик. Иккинчи томондан

$$\int_0^l vI(x,t) dx = 0 \quad \text{тенг. Демак} \quad v(x,t) \equiv 0$$

$$\text{Хулоса қилиб айтганда:} \quad u_2(x,t) \equiv u_1(x,t).$$

Теорема исботланди.

10

### Коши масаланинг ечимининг мавжудлиги.

Бир жинсли Коши масаласини қараймиз:

$$\begin{cases} (1) & u_t = au_{xx}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad 0 < t < T; \\ (2) & u(x,0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad [2.4]$$

[2.4] 1-чегаравий масалани ечимини топаётганимиздек бу эрда ҳам олдин маълум бир алмаштиришларни ўтказамиз. Сўнгра эса ҳосил бўлган функция ечим эканлигини кўрсатамиз.

$$v(x,t) = X(x)T(t).$$

$v(x,t)$  функциядан иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасини қаноатлантиришини талаб қиламиз:

$$T''(t)X(x) = aIX''(x)T(t).$$

11

Иккала томонини  $aIX(x)T(t)$  га бўламиз,

шунда ҳосил бўлган тенгликлар қуйидагича:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2T(t)} = -\lambda^2;$$

Бу эрда  $\lambda = \text{const} > 0$  иккита тенглама ҳосил бўлади:

$$X''(x) + \lambda^2 X(x) = 0; \quad (2.8)$$

$$T''(t) + a^2 \lambda^2 T(t) = 0. \quad (2.9)$$

$X(x) = e^{i\lambda x}$  функция (2.8), тенгламанинг ечими бўлади. Худди шундай қилиб

$T(t) = e^{-a\lambda t}$  функция (2.9) тенгламанинг ечими бўлади.

$$\text{Демак} \quad v(x,t) = e^{i\lambda x - a\lambda t}$$

биринчи тенгламанинг ечими бўлади.

$$u_\lambda = A(\lambda)e^{i\lambda x - a|\lambda|t} \quad \text{функция ҳам ечим бўлади}$$

(  $A(\lambda)$  -қандайдир функция)

Энди якуний функция қўйдагича аниқланади

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(\lambda)e^{i\lambda x - a^2\lambda^2 t} d\lambda$$

бошланғич шартлани қаноатлантиришини талаб қиламиз

$$u(x,0) = \varphi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(\lambda)e^{i\lambda x} d\lambda$$

Энди, Фурье алмаштиришга назариясинидан келиб чиққан холда  $A(\lambda)$  қўйдагича топамиз

$$A(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda s} \varphi(s) ds$$

13

Шундай қилиб бизлар  $u(x,t)$ :

функция учун қўйдаги кўринишини ҳосил қиламиз

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda s} \varphi(s) ds \right] e^{i\lambda x - a|\lambda|t} d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{i\lambda(x-s) - a|\lambda|t} d\lambda \varphi(s) ds.$$

$u(x,t)$ : учун ечим шундай кўринишга эга:

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \varphi(s) ds. \quad (2.10)$$

$$G(x,s,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\}, \quad \text{белгилаш киритасак:}$$

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x,s,t) \varphi(s) ds.$$

14

$G(x,s,t)$  функциямиз иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасини  $s$ -фиксирланган бўлганда қаноатлантиришини кўрсатамиз:

$$G_x(x,s,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \left(-\frac{2(x-s)}{4a^2 t}\right);$$

$$G_t(x,s,t) = \frac{1}{2\sqrt{4\pi a^2 t^3}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} + \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \left(-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t^2}\right)$$

$$G_{xx}(x,s,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \left(\frac{(x-s)^2}{4a^2 t^2} - \frac{1}{4a^2 t}\right) + \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \left(-\frac{2}{4a^2 t}\right)$$

$$G(x,s,t) = a^2 G_{xx}(x,s,t) \quad \text{эканлигини текшириш осон.}$$

Энди бизлар ҳосил булган функциямизни қандайдир бошланғич шартларда мавжуд эканлигини куришимиз керак.

15

### Коши масаласи ечимининг мавжудлик теореманинг исботи

**Теорем 2.6 (мавжудлик теоремаси).** [2.4] Коши масаланинг бошланғич шартларини  $\varphi(x)$  ёрдамида аниқлан бўлсин ва  $\varphi(x) \in C(\mathbb{R}), |\varphi(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}$  Шунда 2.10 формула билан аниқлан.

$u(x,t)$  функция  $x \in \mathbb{R}, t > 0$  булганда узлуксиз булади,

$u_t, u_{xx}$  узлуксиз хосилаларга эга, агарда  $x \in \mathbb{R}, t > 0$

булса, ва иссиқлик ўтказувчанлик тенгламани қаноатлантиради.

$x \in \mathbb{R}, t > 0$  ва  $\forall x_0 \in \mathbb{R} \lim_{\substack{t \rightarrow 0^+ \\ x \rightarrow x_0}} u(x,t) = \varphi(x_0)$  лар учун

16

**Изоҳ:** Теореманинг охириги шарти куйидаги маънога эга.

$$u(x,t) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \varphi(s) ds, & t > 0; \\ \varphi(x), & t = 0. \end{cases}$$

$$(x,t) : x \in R, t \geq 0$$

да узлуксиз эканлигини билдиради.

### ИСБОТ

1. Аввалам бор  $u(x,t)$  функциямиз  $x \in R, t > 0$

узлуксиз эканлигини кўрсатамиз. Бунинг учун функциямиз

$$\Pi_{L,t_0,T} = \{(x,t) : -L < x < L; t_0 < t < T\}$$

тўғри тўрт бурчакда узлуксиз эканлигини кўрсатишимиз керак.

Бу ерда  $L, t_0, T$  - мусбат константалар. Интеграл

остигади функция  $\Pi_{L,t_0,T}$  тўғри тўрт бурчакда узлуксиз

$u(x,t)$  функция  $\Pi_{L,t_0,T}$  да узлуксиз эканлигини исботлаш

учун 2.10 формулада булган интеграл текис якинлашувчи эканлигини кўрсатишимиз керак. Текис якинлашишининг

Вейерштрасс аломатидан фойдаланиш учун шундай  $F(s)$

функцияни қуриш керакки, бу функция куйидаги шартларни қаноатлантирсин:

$$\begin{cases} |G(x,s,t)| \leq F(s) \forall x,t \in \Pi_{L,t_0,T}; \\ \int_{-\infty}^{+\infty} F(s) ds & \text{интеграл якинлашувчи} \end{cases}$$

бунинг учун хар хил  $s$ -лар учун экспонентанинг даражасини баҳолаш керак. Агар  $s \leq -2L$

$$\frac{(x-s)^2}{t} \geq \frac{(L+s)^2}{T} \Rightarrow -\frac{(x-s)^2}{4a^2 t} \geq -\frac{(L+s)^2}{4a^2 T};$$

$$\text{Агар } |s| \leq 2L \quad -\frac{(x-s)^2}{4a^2 t} \leq 0;$$

Агар  $s \geq 2L$

$$\frac{(x-s)^2}{t} \geq \frac{(L-s)^2}{T} \Rightarrow -\frac{(x-s)^2}{4a^2 t} \leq -\frac{(L-s)^2}{4a^2 T};$$

Энди  $t_0 \leq t \leq T$  булсин. Шунда 2.10 интегралда берилган

биринчи купайтирувчи учун куйидаги тенгсизликни ёзиш мумкин

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \leq \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t_0}} \quad \text{Демак}$$

$$|G(x,s,t)| \leq F(s) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t_0}}, & |s| \leq 2L; \\ \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t_0}} \exp\left\{-\frac{(L-s)^2}{4a^2 T} + \frac{L^2}{4a^2 T}\right\}, & s \geq 2L; \\ \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t_0}} \exp\left\{-\frac{(L+s)^2}{4a^2 T} + \frac{L^2}{4a^2 T}\right\}, & s \leq -2L; \end{cases}$$



бу ерда  $\frac{L^2}{4a^2T}$  функцияни даража курсаттичга кўчириб ёзганимизнинг сабаби куйидагича:  $F(s)$  функциямиз узлуксиз булиши учун кўшган функциямиз баҳолашга таъсир килмайди.

$\int_{-\infty}^{+\infty} F(s) ds$  яқинлашувчи тугрисидаги далолатни экспонент беради.

Шундай қилиб  $|\varphi(x)|$  функциянинг чегараланганлигини ҳисобга олиб 2.10 формулада булган интеграл остидаги ифоданинг модулини юқоридан  $MF(s)$  функция орқали баҳолай олаёламиз. Бу функциядан олинган интеграл эса яқинлашувчи. Демак Вейерштрасс аломатига кўра 2.10 формулада берилган интеграл текис яқинлашувчи. Яъни  $u(x,t)$  функциямиз  $\Pi_{L,t_0T}$  да тугритуртбурчакда узлуксиз эканлигини исботладик.

2. Энди бизлар юқорида кўрсатилган  $\Pi_{L,t_0T}$  тугритуртбурчак устида  $u_{xx}$  функциямиз узлуксиз эканлигини кўрсатишимиз керак.  $G(x,s,t)$  функциямизнинг кўринишидан фойдаланиб куйидаги тенгликка келамиз.

$$\begin{aligned} |G_{xx}(x,s,t)| &= \left| \frac{(x-s)^2}{4a^4t^2} G(x,s,t) - \frac{1}{2a^2t} G(x,s,t) \right| \leq \\ &\leq F(s) \left[ \frac{1}{2a^2t_0} + \frac{L^2 + 2Ls + s^2}{4a^2t_0^2} \right] = F_1(s). \end{aligned}$$

каве ичида ёзилган 2-хаднинг суратидаги ёзилган қўшхад  $F(s)$  функциянинг интегралига таъсир килмайди. Шунда куйидаги ифодани ҳосил қиламиз.

$$\begin{aligned} u_{xx}(x,t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} G_{xx}(x,s,t) \varphi(s) ds \leq \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |G_{xx}(x,s,t)| |\varphi(s)| ds \leq M \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(s) ds < \infty \end{aligned}$$

Демак ҳосилдан олинган интеграл текис яқинлашувчи. Хулоса қилиб айтганда  $u_{xx}(t)$

функциямиз ҳам узлуксиз. Худди шундай қилиб  $u_t$  функциямиз ҳам узлуксиз функция эканлигини қуришимиз мумкин.

3.  $G(x,s,t)$  функциямиз исиклик утказувчанлик тенгламани каноатлантирувчи функция эканлигини юқорида курсатган эдик.

Бу ерда

$$\begin{aligned} u_t(x,t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} G_t(x,s,t) \varphi(s) ds = \\ &= a^2 u_{xx}(x,t) = a^2 \int_{-\infty}^{+\infty} G_{xx}(x,s,t) \varphi(s) ds \end{aligned}$$

яъни  $u(x,t)$

функциямиз исиклик утказувчанлик тенгламага мос келади.

4. Демак

$$\forall x_0 \in R \lim_{\substack{t \rightarrow 0^+ \\ x \rightarrow x_0}} u(x, t) = \varphi(x_0)$$

$$\forall x_0 \forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall x, t : t, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |u(x, t) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$$

Энди бизлар  $x_0$  нуктани ва ихтиёрий  $\varepsilon > 0$

сон фиксирлаймиз  $\varphi(x)$  функциямиз узлуксизлигидан

$$\exists \Delta : |x - x_0| < \Delta \Rightarrow |\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{4}$$

келиб чиқади

Энди  $|u(x, t) - \varphi(x_0)|$  қараймиз

$$\begin{aligned} |u(x, t) - \varphi(x_0)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} G_t(x, s, t) \varphi(s) ds - \varphi(x_0) \right| \leq \\ &\leq \left| \int_{-\infty}^{x_0 - \Delta} G(x, s, t) \varphi(s) ds \right| + \left| \int_{x_0 + \Delta}^{+\infty} G(x, s, t) \varphi(s) ds \right| + \\ &\left| \int_{x_0 - \Delta}^{x_0 + \Delta} G(x, s, t) (\varphi(s) - \varphi(x_0)) ds \right| + \left| \int_{x_0 - \Delta}^{x_0 + \Delta} G(x, s, t) \varphi(x_0) ds - \varphi(x_0) \right| \end{aligned}$$

### $J_1, J_2, J_3$ ва $J_4$ -лар

билан интегралларни белгиласак, қуйидагиларни ҳосил қилами:

Бизлар  $J_3$  ифодани баҳолаймиз.

$\Delta$  ораликда  $|\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{4}$  - булганлиги сабабли ва

$\int_{-\infty}^{+\infty} G ds = 1$  булганлиги сабабли қўйидагини ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned} |J_3| &= \left| \int_{x_0 - \Delta}^{x_0 + \Delta} G(x, s, t) (\varphi(s) - \varphi(x_0)) ds \right| \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{4} \int_{x_0 - \Delta}^{x_0 + \Delta} G(x, s, t) ds \leq \frac{\varepsilon}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, s, t) ds \end{aligned}$$

Бундан  $|J_3| \leq \frac{\varepsilon}{4}$  Энди  $|x - x_0| < \delta_1 < \frac{\Delta}{2}$

талаб қиламиз. Келажакда олинган баҳолар фақат шунақа  $x$ -лар учун.

$$\begin{aligned} |J_4| &= \left| \int_{x_0 - \Delta}^{x_0 + \Delta} G(x, s, t) \varphi(x_0) ds - \varphi(x_0) \right| \leq \\ &\leq |\varphi(x_0)| \left| \int_{x_0 - \Delta}^{x_0 + \Delta} G(x, s, t) ds - 1 \right| = \left\{ z \leftrightarrow \frac{s-x}{\sqrt{4a^2 t}} \right\} = \\ &= |\varphi(x_0)| \left| \int_{\frac{x_0 - \Delta - x}{\sqrt{4a^2 t}}}^{\frac{x_0 + \Delta - x}{\sqrt{4a^2 t}}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} dz - 1 \right| \end{aligned}$$

Энди бизлар  $t$  ни камайтирсак шунда интегралнинг қуйидаги чегараси  $-\infty$  га, юқоридаги чегарасига  $+\infty$  интилади. Шунинг учун

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} dz = 1 \quad \text{бўлганлиги сабабли,}$$

$$\exists \delta_2 : t < \delta_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |J_4| \leq \left| \varphi(x_0) \left| \int_{\frac{x_0 - \Delta - x}{\sqrt{4a^2t}}}^{\frac{x_0 + \Delta - x}{\sqrt{4a^2t}}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} dz - 1 \right| \right| \leq \frac{\varepsilon}{4}$$

ўринли

29

Энди  $|J_1|$  баҳолаймиз.

$$|J_1| = \left| \int_{-\infty}^{x_0 - \Delta} G(x, s, t) \varphi(s) ds \right| \leq \int_{-\infty}^{x_0 - \Delta} \frac{1}{4\pi a^2 t} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} ds$$

$$M ds = \left\{ z \leftrightarrow \frac{-(x-s)}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \right\} = \frac{M}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{-x+x_0-\Delta}{\sqrt{4a^2t}}} e^{-z^2} dz$$

Демак шундай  $\delta_3$  мавжудки  $\forall t < \delta_3$  бўлганда

$$|J_1| \leq \frac{\varepsilon}{4} \quad \text{бўлади. Худди шундай}$$

$$|J_2| \text{ — баҳолаш мумкин.}$$

30

Шундай қилиб

$$|u(x, t) - \varphi(x_0)| \leq |J_1| + |J_2| + |J_3| + |J_4| \leq \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall x_0 \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3) :$$

$$\forall x, t : t, |x - x_0| < \delta$$

$$|u(x, t) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$$

Теорема тулиқ исботланди.

31

**Натижа1:** Агарда теореманинг барча шартлари

$$(\varphi(x) \in C(R), |\varphi(x)| \leq M) \quad \text{бажарилса, демак биз}$$

$u(x, t)$

функциямиз чегараланган эканлигини хулоса қилишимиз мумкин.

$$|u(x, t)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, s, t) |\varphi(s)| ds \right| \leq M \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, s, t) ds = M.$$

32



**Нагижа2:** Худди шундай килиб  $(R \times R^+)$  фазода  $u(x, t)$

функциямиз чексиз узлуксиз эканлигини хосил қилишимиз мумкин.

$$\frac{\partial^p u}{\partial x^k \partial t^m}(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^p G}{\partial x^k \partial t^m}(x, s, t) \varphi(s) ds, \quad (k + m = p)$$

бу интеграл эса текис яқинлашувчи булиб, бунга теорема исботидаги тасдиқлар орқали курсатиши мумкин.



33

**Нагижа3:** Коши масаласидаги шартларни қабул қилиб, биз иссиқлик тарқалишининг "чексиз" тезлигига эга буламиз.

Фараз қилайлик

$$\varphi(x) = u(x, 0) \quad \text{узлуксиз функциямиз}$$

$[a, b]$  ораликдан бошқа барча жойда нолга тенг булсин.  
У ҳолда қуйидагига эга буламиз.

$$u(x, t) = \int_a^b G(x, s, t) \varphi(s) ds > 0$$

$\forall t > 0, \forall x \in R$



34

Саволлар:

1. Умумий чегаравий масаланинг қўйилиши
2. Ягоналик теоремаси
3. Коши масаласи



35

## Математик физика тенгламалари маърузалар

### Маъруза № 9.

#### Мавзу:

Ярим тўғри чизикда иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси учун биринчи ва иккинчи чегаравий масаланинг ечимини мавжудлиги. Биринчи чегаравий масала учун Грин функцияси

### Маъруза № 9

#### Режа:

1. Коши масаласи ечимининг ягоналиги.
2. Ярим тўғри чизикда қўйдаги биринчи чегаравий масала.
3. Ярим тўғри чизикда қўйдаги иккинчи чегаравий масала.
4. Биринчи чегаравий масала учун Грин функцияси
5. Грин функциясининг хоссасалари

### Таянч иборалар

Коши масаласи,  
мавжудлик теоремаси,  
ягоналик теоремаси,  
иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси,  
биринчи чегаравий масала,  
Коши масаласи,  
иккинчи чегаравий масала,  
Грин функцияси

#### 1. Коши масаласи ечимининг ягоналиги

Юкорида бизлар чегараланган ва узлуксиз бошлангич шартлар учун Коши масаланинг ечимини мавжудлигини исботлаган эдик. Энди юкоридаги шартларда бизлар ягоналик теоремасини исботлаймиз.

**Теорема 2.7 (ягоналик).** Коши масаласи берилган булсин. Фараз килайлик  $(R \times R^+)$  фазода бизларга 2 та узлуксиз  $u_1, u_2(x, t)$

функциялар берилган булсин ва улар [2.4] масаланинг ечимлари булиб, қуйидаги шартларни қаноатлантирсин.

$$|u_i(x, t)| \leq M, \forall (x, t) \in R \times \bar{R}^+;$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t}, \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \in C(R \times R^+) \quad i=1,2$$

шунда

$$u_1(x, t) = u_2(x, t) \forall (x, t) \in (R \times \bar{R}^+)$$

**Исбот:** Янги функция киритамиз.  $u(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t)$

Аниқки бу функция ҳам узлуксиз функция булади ва куйидаги шартларни канаотлантиради.

$$\begin{cases} u_t, u_{xx} \in C(R \times \bar{R}^+); \\ u_t = a^2 u_{xx}; \\ u(x,0) = 0, \forall x \in R \\ |u(x,t)| \leq 2M, \forall (x,t) \in (R \times \bar{R}^+); \end{cases}$$

Теоремани исботлаш учун  $u(x,t)$  функциямыз айнан полга тенг эканлигини исботлашимиз керак. Бунинг учун кандайдир ихтиёр  $(x_0, t_0)$

нуктада полга тенг эканлигини курсатип керак. Бунинг учун 2 та константа  $L$  ва  $T$  оламыз. Уларни шундай қилиб олиш керакки улар куйидаги тугритурбурчакка қарашли бўлсин. Бу ерда  $\Pi_{L,T}$

-тугритурбурчакнинг чегараси бўлсин.

$$\Pi_{L,T} = \{(x,t) : |x| \leq L, 0 \leq t \leq T\},$$

$$v_t^L, v_{xx}^L \in C[\Pi_{L,T}];$$

$$v_t^L = a^2 v_{xx}^L \in C[\Pi_{L,T}]; v^L(x,t) = \frac{4M}{L^2} \left( \frac{x^2}{2} + a^2 t \right)$$

Юқорида бизлар  $u(x,t)$  функция учун баҳоларни олган эдик. Шундан хулоса қилиб айтганда  $\Pi_{L,T}$  чегара устида  $v^L(x,t) \geq u(x,t)$  булади.

Энди максимум принцидан фойдалансак,

$$v^L(x,t) \geq u(x,t) \forall (x,t) \in \Pi_{L,T}.$$

$$-v^L(x,t) \leq u(x,t) \forall (x,t) \in \Pi_{L,T}.$$

Бундан

$$|u(x_0, t_0)| \leq v^L(x_0, t_0) = \frac{4M}{L^2} \left( \frac{x_0^2}{2} + a^2 t_0 \right)$$

Энди  $L$  н чексизликка интилтирсак куйидагига эга буламиз.

$$|u(x_0, t_0)| \leq v^\infty(x_0, t_0) = 0$$

Теорема исботланди.

### Ярим тўғри чизикда кўйдаги биринчи чегаравий масала.

Ярим тўғри чизикда кўйдаги биринчи чегаравий масалани кўриб чиқамиз:

$$[2.5] \begin{cases} u_u = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0; \\ u(0,t) = 0, & t \geq 0; \\ u(x,0) = \phi(x), & x \geq 0. \end{cases}$$

бу ерда  $\phi(x) = 0$  Бутун Ҳақиқий ўқда бошланғич шартни берувчи

$\phi(x)$  функцияни тоқ қилиб давом эттириб ечимни топамиз:

$$\Phi(x) = \begin{cases} \phi(x), & x \geq 0; \\ -\phi(-x), & x < 0. \end{cases}$$

Мос равишда қўйдаги Коши масаласини кўриб чиқамиз:

$$[2.6] \begin{cases} U_t = a^2 U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0; \\ U(0, t) = 0, & t \geq 0; \\ U(x, 0) = \Phi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Унинг ечими бизга маълум:

$$U(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds.$$

Айтайлик  $(x, t) \in (\bar{R}^+ \times \bar{R}^+)$  да  $u(x, t) = U(x, t)$

Бу функция [2.5] нинг ечими эканлигини кўрсатамиз. Коши масаласининг қўйилишига кўра,

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0; \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0. \end{cases}$$

эканлиги маълум. Чегаравий шартни бажарилишини текшираемиз:

$$u(0, t) = U(0, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{s^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds.$$

Интеграл остида жуфт ва тоқ функцияларнинг қўшайтмаси тўрибди, шунинг учун у нолга тенг. Чегаравий шарт бажарилаяди. энди ечим учун тўлиқ формулани оламиз:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds =$$

$$= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} (-\phi(-s)) ds + \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \phi(s) ds =$$

$$= -\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x+s)^2}{4a^2 t}\right\} \phi(s) ds + \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \phi(s) ds =$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \left[ \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} - \exp\left\{-\frac{(x+s)^2}{4a^2 t}\right\} \right] \phi(s) ds.$$

Демак,

$$u(x, t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \left[ \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} - \exp\left\{-\frac{(x+s)^2}{4a^2 t}\right\} \right] \phi(s) ds. \quad (2.11)$$

бу ярим тўғри чизикда биринчи чегаравий масаланинг ечими бўлади.

### Ярим тўғри чизикда иккинчи чегаравий масала

Ярим тўғри чизикда иккинчи чегаравий масала қўйдаги кўринишга эга:

$$[2.7] \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0; \\ u_x(0, t) = 0, & t \geq 0; \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0. \end{cases}$$

Яна ечимни топиш учун бошланғич шартни берувчи функцияни энди жуфт қилиб давом эттираемиз:

$$\Phi(x) = \begin{cases} \phi(x), & x \geq 0; \\ \phi(-x), & x < 0. \end{cases}$$

Бошланғич шартни ўзгартриб, қўйдаги қоши масаласини оламеиз:

$$\begin{cases} U_t = a^2 U_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0; \\ U(0, t) = 0, & t \geq 0; \\ U(x, 0) = \Phi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Худди шундай унинг ечими

$$U(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds$$

функция бўлади.

Айтайлик  $(x, t) \in (\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+)$  да  $u(x, t) = U(x, t)$  бўлсин.

$$\text{Яна } \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0; \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0. \end{cases}$$

Эканлиги аниқ.

13

Чегаравий масаланинг бажарилишини текширамеиз:

$$u_x(x, t) = U_x(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \left(-\frac{(x-s)}{2a^2 t}\right) \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds \Rightarrow$$

$$u_x(0, t) = U_x(0, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \left(\frac{s}{2a^2 t}\right) \exp\left\{-\frac{s^2}{4a^2 t}\right\} \Phi(s) ds \quad \forall t \geq 0.$$

Ҳосил бўлган интеграл остида 2 та жуфт ва битта тоқ функциянинг қўшайтмаси турибди, демак у нольга айланади. Чегаравий шарт бажарилмоқда. [2.7] нинг ечимни учун қўйдаги формулани ҳосил қиламеиз:

14

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x+s)^2}{4a^2 t}\right\} \phi(s) ds + \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} \phi(-s) ds = \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \left[ \exp\left\{-\frac{(x-s)^2}{4a^2 t}\right\} + \exp\left\{-\frac{(x+s)^2}{4a^2 t}\right\} \right] \phi(s) ds. \end{aligned}$$

Бу ярим тўғри чизиқда 2-чегаравий масаланинг ечимидир.

15

**Биринчи чегаравий масала учун Грин функцияси.**

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0; \\ u(0, t) = 0, & 0 \leq t \leq T; \\ u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T; \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Маълумки, унинг ечими қўйдаги кўринишга эга:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \left( \int_0^l \phi(s) \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) ds \right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\}.$$

16



Уни Коши масаласини ечишда куллаганимиздай бошқача кўринишда ифодалашимиз мумкин:

$$u(x, t) = \int_0^l G(x, s, t) \phi(s) ds,$$

$$G(x, s, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \sin\left(\frac{\pi n}{l} s\right) \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right) \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t\right\}. \quad (2.12)$$

-бу биринчи чегаравий масала учин Грин функциясиدير .

### Грин функциясининг хоссалари

1-хосса.  $G(x, s, t) = G(s, x, t)$ .

Бу хосса Грин функциясининг таърифидан келиб чиқади.

2-хосса.  $G(x, s, t) \in C^\infty(R \times R \times R^+)$ .

**Исботи:**

$(x, s, t)$  нуктада узлуксизлигини исботлаймиз. Бунинг учун,  $t > t_0$  да Вейерштрасс аломатига кўра текис яқинлашувчи эканлигини айтиб ўтиш етарли, чунки уни экспоненталардан иборат яқинлашувчи қатор билан чегаралаш мумкин:

$$|G(x, s, t)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \exp\left\{-a^2 \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t_0\right\}.$$

Дифференциалланувчиликни исботлаш учун, Ҳосилалардан иборат қатор текис яқинлашишини таъкидлаш етарли, чунки дифференциаллаш натижасида яни кўпайтувчилар сифатида фақатгина полиномлар Ҳосил бўлади. Улар Ҳалақит бермайди, экспонента барибир яқинлашувчиликни таъминлайди.

3-хосса.

$$\begin{cases} G_t = a^2 G_{xx}; \\ G_t = a^2 G_{ss}; \end{cases}$$

Биринчи тенгламани (2.12) формулани дифференциаллаш орқали, иккинчи тенгламани эса 1-хоссадаги тенгламани дифференциаллаш орқали текшириш мумкин.

4-хосса.  $G(x, s, t) \geq 0$ ,  $x, s \in [0; l]$ ,  $t > 0$ .

**Исботи:** Иштиёрий  $(x, s_0, t)$  нукта учун исботлаймиз.

$\phi_h(x)$  функция  $(s_0 - h, s_0 + h)$  интервалда қандайдир  $\tilde{\phi}(x)$

мусбат функцияга, интервалдан ташқарисида эса 0 га тенг бўлсин:

$$\phi_h(x) = \begin{cases} \tilde{\phi}(x) > 0, & x \in (s_0 - h, s_0 + h); \\ 0, & x \in [0, l] \setminus (s_0 - h, s_0 + h). \end{cases}$$

Бундан ташқари, қуйдаги шартларни қаноатлантирсин:

$$\begin{cases} \phi_h(x) \in C[0; l]; \\ \int_0^l \phi_h(x) dx = 1. \end{cases}$$

ва [2.2] турдаги қандайдир чегаравий масала учун бошланғич шартни берсин .  
У Ҳолда бу чегаравий масаланинг счими бўлган  $u_h(x, t)$

функция куйидаги формула билан аниқланади:

$$u_h(x, t) = \int_0^l G(x, s, t) \phi_h(x) ds = \int_{s_0-h}^{s_0+h} G(x, s, t) \phi_h(s) ds =$$

$$= G(x, \theta, t) \int_{s_0-h}^{s_0+h} \phi_h(s) ds = G(x, \theta, t), \theta \in (s_0 - h; s_0 + h). \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} G(x, \theta, t) = \lim_{h \rightarrow 0} u_h(x, t) \Rightarrow$$

$$G(x, s_0, t) = \lim_{h \rightarrow 0} u_h(x, t). \quad (2.12)$$

21

$$u_h(0, t) \equiv 0 \equiv u_h(l, t):$$

бўлган холда максимал қиймат принципини қулаймиз:

$$\min_{\substack{x \in [0; l] \\ t \in [0; T]}} u_h(x, t) = \min \{0, 0, \min_{x \in [0; l]} \phi(x)\} = 0.$$

(2.13) га кўра,  $G(x, s_0, t)$ .

манфий эмаслигини аниқлаймиз.  
4-хосса исботланди.

22

### Саволлар.

1. Коши масаласи
2. Ягювалик теоремаси
3. Мавжудлик теоремаси
4. Иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси учун биринчи чегаравий масаланинг келтиринг.
5. Ярим тўғри чизикда 1-чи чегаравий масаланинг счимини келтиринг.
6. Иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси учун иккинчи чегаравий масаланинг келтиринг.
7. Ярим тўғри чизикда 2-чи чегаравий масаланинг йсчимини келтиринг.
8. Биринчи чегаравий масала учун Грин функцияси ёзинг.
9. Грин функциясининг 1-чи хоссасини исботланг.
10. Грин функциясининг 2-чи хоссасини исботланг.
11. Грин функциясининг 3-чи хоссасини исботланг.
12. Грин функциясининг 4-чи хоссасини исботланг.

23

# Математик физика тенгламалари маърузалар

## Маъруза № 10.

### Эллиптик типдаги тенгламалар

#### Мавзу:

### Лаплас ва Пуассон тенгламалари. Грин формуласи

## Маъруза № 10

### Лаплас ва Пуассон тенгламалари. Грин формуласи

#### Режа:

1. Лаплас ва Пуассон тенгламалари.  
Чегаравий масалаларнинг қўйилиши.  
Лаплас тенгламасининг фундаментал  
ечими.
2. Биринчи Грин формуласи.
3. Гриннинг иккинчи формуласи.
4. Гриннинг учинчи формуласи.

## Таянч иборалар

Лаплас,  
Пуассон,  
Грин,  
тенглама,  
фундаментал ечим,  
формула

1. Лаплас ва Пуассон тенгламалари. Чегаравий масалаларнинг  
қўйилиши. Лаплас тенгламасининг фундаментал ечим

$E^3$  фазога қарашли қандайдир  $\Omega$  очик соҳанинг чегараси  
 $\Sigma$  бўлсин. Худди шундай,  $E^2$  фазодаги қандайдир  
 $D$  очик соҳа чегараси  $L$  бўлсин.

Иссиқликни ўтказувчанлик тенгламасини қараймиз:

$$u_t(x, y, z, t) = a^2 \Delta u(x, y, z, t) + f_1(x, y, z),$$
$$(x, y, z) \in \Omega; \quad \Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz};$$

$$u_t(x, y, t) = a^2 \Delta u(x, y, t) + f_2(x, y),$$
$$(x, y) \in D; \quad \Delta u = u_{xx} + u_{yy}.$$



Стационар иссиқлик процесс ҳолидаги ( $u_t \equiv 0$ ) эллиптик тенгламани тузимиз:  $\Delta u = -f$

Бу ҳолда умумий кўринишидан куйидаги икки тип тенглама ҳосил бўлади:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -f(x, y, z) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -f(x, y) \end{cases} \quad E^2, E^3 \text{ фазода Пуассон тенгламаси}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \end{cases} \quad E^2, E^3 \text{ фазода Лаплас тенгламаси}$$

Бу тенгламалар кўпинча турли стационар физик майдонларни таърифлашда ёрдам беради.

**Таъриф.**  $u(x, y, z)$  функция  $\Omega$  соҳада гармоник дейилади, агар

$$u \in C^2(\Omega) \text{ ва } \Omega \text{ да } \Delta u \equiv 0$$

Комплекс ўзгарувчи функция аналитиклигидан, икки ўзгарувчи гармоник функцияни тузиш мумкин. Агар  $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$

аналитик бўлса,  $v$  функция учун Коши-Риман хоссалари бажарилади:

$$\begin{cases} u_x(x, y) = v_y(x, y) \\ u_y(x, y) = -v_x(x, y) \end{cases}$$

Юқоридаги тенгламани  $x$  бўйича, пастки тенгламани  $y$

бўйича дифференциаллаймиз:

$$\begin{cases} u_{xx}(x, y) = v_{xy}(x, y) \\ u_{yy}(x, y) = -v_{xy}(x, y) \end{cases} \Rightarrow u_{xx} + u_{yy} = 0$$

Худи шундай тенгламани  $v$  функция учун ҳосил қилиш мумкин. Бундан хулоса қилиш мумкинки,  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

-аналитик функция бўлса,  $u$  ҳолда,  $u, v$ - гармоник функция бўлади.

Кейинчалик биз  $E^3$  фазода куйидаги масалаларни қараймиз:

Дирихле ички масаласи

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u(x, y, z) = \mu(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

Нейман ички масаласи

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z) = v(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

Дирихле ташқи масаласи

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in E^3 \setminus \bar{\Omega} \\ u(x, y, z) = \mu(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

Нейман ташқи масаласи

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in E^3 \setminus \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z) = v(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

Берилган масалаларни Пуассон тенглиги учун қўллаш табиийдир. Бундан ташқари, икки ўлчовли аналоглар ҳам мавжуд. Масалан:

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in D; \\ u(x, y, z) = \mu(x, y, z), & (x, y, z) \in L \end{cases}$$

$E^2$  -фазада Дирихле ички масаласи

$$u(x, y, z) = \frac{1}{R_{MM_0}} = \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} \quad \text{функцияни карайлик}$$

$R_{MM_0} = M(x, y, z)$  ва  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  нукталар орасидаги масофа

Келтирилган функция  $E^3 \setminus M_0$  соҳада Лаплас тенгласининг ечими бўлишини исботлаймиз.

$$u_x = -\frac{1}{2} \frac{2(x-x_0)}{R_{MM_0}^3} = -\frac{x-x_0}{R_{MM_0}^3}; u_{xx} = -\frac{3(x-x_0)^2}{R_{MM_0}^5} - \frac{1}{R_{MM_0}^5}$$

$$u_y = -\frac{1}{2} \frac{2(y-y_0)}{R_{MM_0}^3} = -\frac{y-y_0}{R_{MM_0}^3}; u_{yy} = -\frac{3(y-y_0)^2}{R_{MM_0}^5} - \frac{1}{R_{MM_0}^5}$$

$$u_z = -\frac{1}{2} \frac{2(z-z_0)}{R_{MM_0}^3} = -\frac{z-z_0}{R_{MM_0}^3}; u_{zz} = -\frac{3(z-z_0)^2}{R_{MM_0}^5} - \frac{1}{R_{MM_0}^5}$$

$$\Rightarrow \Delta \frac{1}{R_{MM_0}} = \frac{3(x-x_0)^2 + 3(y-y_0)^2 + 3(z-z_0)^2}{R_{MM_0}^5} - \frac{3}{R_{MM_0}^5} \equiv 0$$

$E^2$  фазода қуйидаги текпириш осон:

$$u(x, y) = \ln \frac{1}{R_{MM_0}} \quad \text{функция}$$

$E^2 \setminus M_0$  соҳада Лаплас тенгласининг ечими бўлади. Бу ерда

$$R_{MM_0} = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$$

Бу функциялар Лаплас тенгласининг фундаментал ечими дейилади.

### Биринчи Грин формуласи.

Фараз қилайлик  $\Sigma$  чекли сондаги ёпиқ қисмлардан иборат бўлиб, ҳар бир нуктада уринмага эга бўлиб, бу уринмалар координата ўқларига параллел бўлса, шунда улар ё чекли сондаги нукталарда кесилса ё кесилишдан ҳосил бўлган ёпиқ оралиқлар чекли бўлади. У ҳолда  $\Omega$  соҳа учун  $\vec{A}(x, y, z) = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$

бу ерда  $P, Q, R \in C^1(\bar{\Omega})$

Остроградский-Гаусс формуласи ўринли:

$$\iint_{\Sigma} (\vec{A}, \vec{n}) d\sigma = \iiint_{\Omega} \text{div} \vec{A} d\tau \quad (3.1)$$

$u(x, y, z)$  ва  $v(x, y, z) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ ,  $\vec{A} = u \text{grad} v$

берилган бўлсин. Шунда (3.1) формулага қўра:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \text{div}(u \text{grad} v) d\tau &= \iint_{\Sigma} (u \text{grad} v, \vec{n}) d\sigma = \\ &= \left\{ (\text{grad} v, \vec{n}) = \frac{\partial v}{\partial n}; \text{div}(u \text{grad} v) = (\text{grad} u, \text{grad} v) + u \Delta v \right\} = \\ \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma &\Rightarrow \\ \iiint_{\Omega} ((\text{grad} u, \text{grad} v) + u \Delta v) d\tau &= \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma. \quad (3.2) \end{aligned}$$

Ҳосил бўлган формула Гриннинг биринчи формуласи дейилади.

### 3. Гриннинг иккинчи формуласи.

Биринчи Грин формуласидан  $u$  ва  $v$  функцияларнинг ўрнини алмаштираемиз. Ҳосил бўлган айтиятни (3.2) дан айирсак, Гриннинг иккинчи формуласи келиб чиқади:

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) d\tau = \iint_{\Sigma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma \quad (3.3)$$

### 4. Гриннинг учинчи формуласи.


Юқорида кўрсатганимиздек

$$v = \frac{1}{R_{MM_0}} = \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}$$

$E^3$  фазода Лаплас тенгласининг ечими дейилади.

$M_0 \in \Omega$  нуқтани фиксирлаймиз ва уни  $\mathcal{E}$  радиусли  $\Sigma_3$

сфера билан айлангайриб оламиз. Шунда  $v \in C^2(\bar{\Omega}_\varepsilon), \Omega_\varepsilon = \Omega \setminus S_{M_0}(\varepsilon)$ .



Қандайдир  $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$  функция оламиз.  $\Omega_\varepsilon$

соҳа учун Гриннинг иккинчи формуласини ёзамиз:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega_\varepsilon} (u\Delta v - v\Delta u) d\tau &= \iint_{\Sigma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma + \\ &+ \iint_{\Sigma_\varepsilon} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma \Rightarrow \{\Delta u \equiv 0\} \Rightarrow \\ &- \iint_{\Omega_\varepsilon} \frac{1}{R_{MM_0}} \Delta u(M) d\tau_M = \iint_{\Sigma} \left( u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n}(M) \right) d\sigma_M + \\ &+ \iint_{\Sigma_\varepsilon} \left( u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n}(M) \right) d\sigma_M. \end{aligned}$$

$\varepsilon \rightarrow 0$  иккинчи икки қаррали интегрални қараймиз.

Маълумки, бирлик  $\vec{n}$  нормал  $\Sigma_\varepsilon$  сферанинг  $\{x, y, z\}$

нуқтасида қуйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} &\left\{ \frac{x-x_0}{R_{MM_0}}, \frac{y-y_0}{R_{MM_0}}, \frac{z-z_0}{R_{MM_0}} \right\} \text{ бундан,} \\ \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) &= \left( \vec{n}, \text{grad} \frac{1}{R_{MM_0}} \right) = \\ &= \frac{(x-x_0)^2}{R_{MM_0}^4} + \frac{(y-y_0)^2}{R_{MM_0}^4} + \frac{(z-z_0)^2}{R_{MM_0}^4} = \frac{1}{R_{MM_0}^2} = \frac{1}{\varepsilon^2}. \end{aligned}$$

Унда бу интеграл куйидаги кўринишга эга бўлади:

$$\iint_{\Sigma_\varepsilon} \left( u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\Sigma_\varepsilon} u d\sigma - \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\Sigma_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma =$$

$$= u(M'_\varepsilon) \frac{4\pi\varepsilon^2}{\varepsilon^2} - \frac{\partial u}{\partial n} (M''_\varepsilon) \frac{4\pi\varepsilon^2}{\varepsilon} = 4\pi u(M'_\varepsilon) - 4\pi\varepsilon \frac{\partial u}{\partial n} (M''_\varepsilon),$$

Бу ерда  $M''_\varepsilon, M'_\varepsilon$  — нуқталар  $\sum_\varepsilon$  сферада олинган.

$\frac{\partial u}{\partial n}$  чегаравийликни ҳисобга олган ҳолда  $\varepsilon$  нолга интилади:

$$4\pi u(M'_\varepsilon) - 4\pi\varepsilon \frac{\partial u}{\partial n} (M''_\varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 4\pi u(M_0)$$

17

Қушлувчиларни маълум бир қисмини ўнг томонга ўтказиб,

$u(M_0)$  учун куйидаги формулани ҳосил қиламиз:

$$4\pi u(M_0) = - \iiint_{\Omega} \frac{1}{R_{MM_0}} \Delta u(M) d\tau_M - \iint_{\Sigma} \left[ u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} (M) \right] d\sigma_M \quad (3.4)$$

Бу Гриннинг учинчи формуласи деб аталади.

18

$E^2$  фазода аналогик таҳлиллар олиб бориб, иккинчи ва учинчи Грин формулалари учун икки ўлчовли аналоглар ҳосил қилиш осон:

$$\iint_D (u \Delta v - v \Delta u) ds = \int_L \left( u \frac{\partial u}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dl.$$

$$2\pi u(M_0) = - \iint_D \ln \left( \frac{1}{\rho MM_0} \right) \Delta u ds - \int_L \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho MM_0} \right) - \ln \frac{1}{\rho MM_0} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dl$$

19

## Саволлар:

1. Лаплас тенгламаси.
2. Пуассон тенгламаси.
3. Чегаравий масалаларнинг қўйилиши.
4. Лаплас тенгламасининг фундаментал ечими.
5. Биринчи Грин формуласи.
6. Гриннинг иккинчи формуласи.
7. Гриннинг учинчи формуласи.

20

## Математик физика тенгламалари маърузалар

Маъруза № 11.

Мавзу:

Гармоник функцияларнинг  
хоссалари. Максимум принципи.  
Дирихле масаласи

1

Маъруза № 3

Гармоник функцияларнинг хоссалари.  
Максимум принципи.  
Дирихле масаласи

**Режа:**

1. Гармоник функция хоссалари
2. Гармоник функциялар учун максимум принципи.
3. Дирихле ички масаласининг ечими ягоналиги ва турғунлиги
4. Дирихле ташки масаласи ечими ягоналиги. Фазода Дирихле ташки масаласи

2

**Таянч иборалар**

Гармоник функция,  
Дирихле ички, ташки масаласи,  
Фазода Дирихле ташки масаласи

3

### 1. Гармоник функция хоссалари

**Таъриф.** Агар  $u$  функция  $u \in C^2(\Omega)$  ва  $\forall x \in \Omega$  учун

$\Delta u = 0$  бўлса,  $\Omega$  соҳада гармоник дейилади.

1-хосса. Агар  $v$  функция  $\Omega$  да гармоник бўлса, у ҳолда  $\iint_{\Sigma} \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma = 0$   
бўлади, бу ерда  $\tilde{\Sigma}$  :  $\Omega$  да ётувчи ихтиёрий ёшиқ сирт.

Исботи.

$\tilde{\Sigma}$  билан чегараланган соҳа учун Гриннинг (3.2) 1-формуласида

$v \equiv 1$  ни олаемиз. (равшанки,  $v$  -гармоник функция). Демак

$$\iint_{\tilde{\Sigma}} \frac{dv}{dn} d\sigma = 0$$


4



2-хосса. (Ўрта қиймаг ҳақидаги теорема)  $u$  функция  $\Omega$  да гармоник бўлсин ва  $\Omega$  да ётувчи маркази  $M_0$  нўқтада радиуси  $a$  га тенг ихтиёрий  $\Sigma_a$  сфера учун

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Sigma_a} u(p) d\sigma_p \quad (3.5)$$

формула ўриши.



**Исбот.**

$\Sigma_a$  сферанинг ички соҳаси учун Гриннинг учинчи формуласи (3.4) ни ёзамиз:

$$\begin{aligned} 4\pi u(M_0) &= - \iint_{\Sigma_a} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} \right] d\sigma = \left\{ \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) = -\frac{1}{a^2} \right\} = \\ &= \frac{1}{a^2} \iint_{\Sigma_a} u d\sigma + \iint_{\Sigma_a} \frac{1}{a^2} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma \end{aligned}$$

Гармоник функциянинг 1-хоссасига кўра иккинчи интеграл нолга айланади ва шу билан (3.5) формула исботланди.

6

3-хосса : Агар  $u$  функция-  $\Omega$  да гармоник бўлса, бу ҳолда  $u$  да чексиз дифференциалланувчи бўлади.

**Исботи .**

$u(M_0) = u(x, y, z)$  ( $P(P_x, P_y, P_z) \in \Sigma_a$ ) учун Гриннинг 3-формуласини ёза

$$\begin{aligned} 4\pi u(x, y, z) &= - \iint_{\Sigma} \left[ u(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{\sqrt{(x-P_x)^2 + (y-P_y)^2 + (z-P_z)^2}} \right) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{\sqrt{(x-P_x)^2 + (y-P_y)^2 + (z-P_z)^2}} \frac{\partial u(P)}{\partial n} \right] d\sigma_p \quad (3.4) \end{aligned}$$

Кўриниб турибдики: агар  $M$  нўқта  $\Sigma$  нинг чегарасида ётмаса, у ҳолда интеграл тагидаги функция  $x$  (худди шундай  $y$  ва  $z$ ) аргументлари бўйича чексиз дифференциалланувчи.

Маълумки, бу ҳолда бутун интеграл, демак,  $u(M)$  функция ҳам чексиз дифференциалланувчи функция.

7

## 2 Гармоник функциялар учун максимум принципи.

**Теорема 3.1 (Максимум принципи)**

Агар функция  $u \in C(\Omega)$  ва  $\Omega$  да гармоник бўлса, бу ҳолда  $u$  ўзининг максимум(минимум) ига соҳанинг чегарасида эришади.

$$\max_{M \in \Omega} u(M) = \max_{M \in \Sigma} u(M);$$

$$\min_{M \in \Omega} u(M) = \min_{M \in \Sigma} u(M);$$

8

**Исботи:** фараз қилайлик  $u(M)$  функция масала, бирор  $M_0$

ички нўқтада максимумга эришсин:  $u(M_0) = \max_{M \in \Omega} u(M)$

у ҳолда (3.5) ўрта қиймаат формуласига кўра ( $a$ -етарлича кичик сон)

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Sigma_a} u(P) d\sigma_P \leq \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Sigma_a} u(M_0) d\sigma = u(M_0)$$

$u$  функция узлуксиз бўлгани учун, у ҳолда  $u(P) \equiv u(M_0)$   
(яъни максимум бутун сферада эришилади).

Бу алмашгиришларни етарлича марта давом эттириб, максимум чегарада ҳам эришишини ҳосил қиламиз.

### 3. Дирихле ички масаласининг ечими ягоналиги ва турғунлиги

Бу ерда ва кейин ҳам  $\mu, \nu$  лар қандайдир берилган функциялар.

**Таъриф:**  $u(x, y, z)$  функция Дирихле ички масаласининг ечими дейилади, агар у қўйидаги шартларни қаноатлантирса:

$$(3.1) \begin{cases} (1) u(x, y, z) \in C(\Omega), u \in C^2(\Omega) \\ (2) \Delta u(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in \Omega \\ (3) u(x, y, z) = \mu(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

$\Omega$  да узлуксиз ва гармоник ечимнинг ягоналик ҳақидаги теоремани исботлаймиз.

**Теорема. 3.2 (ягоналиги теоремаси)**  $u_1(x, y, z), u_2(x, y, z)$

функция [3.1] Дирихле ички масаласининг ечимлари бўлсин. У ҳолда

$$u_1(x, y, z) = u_2(x, y, z); \forall (x, y, z) \in \bar{\Omega}$$

**Исботи:**  $v = u_1 - u_2$  янги функцияларни аниқлаймиз. Осон қуринадики, у  $\bar{\Omega}$  да узлуксиз,  $\Omega$  да гармоник ва  $v(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in \Sigma$ .

У ҳолда  $v$  функция учун максимум принципининг ҳамма шартларини қаноатлантирган ва бундан қўйидаги келиб чиқади:

$$\left. \begin{aligned} \max_{\Omega} v = \max_{\Sigma} v = 0 \\ \min_{\Omega} v = \min_{\Sigma} v = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow v(x, y, z) \equiv 0, (x, y, z) \in \Omega$$

теорема исботланди.

Энди Дирихле ички масаласини ечими турғунлигини кўрсатамиз. Лекин ундан аввал қўйидаги леммани исбот қиламиз:

**Лемма 1.**  $u_1(x, y, z), u_2(x, y, z)$

функциялар қуйидаги учта шартларни қаноатлантирсин:

1.  $u_1, u_2 \in C(\bar{\Omega})$ ;
2.  $u_1, u_2 - \Omega$  да гармоник
3.  $u_1(x, y, z) \geq u_2(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma$

У ҳолда  $u_1 \geq u_2, \forall (x, y, z) \in \Omega$

**Исботи:**

$$v = u_1 - u_2 \quad \text{функцияни қараймиз. У ҳолда}$$

$$\forall (x, y, z) \in \Sigma, \quad v(x, y, z) \geq 0$$

Минимум принциддан фойдаланиб (равшанки барча шартлар бажарилган)

$$\bar{\Omega} \quad \text{да} \quad \min_{\Omega} v = \min_{\Sigma} v \geq 0 \Rightarrow u_1 \geq u_2 \quad \text{ни ҳосил қиламиз.}$$

Лемма исботланди.



**Теорема 3.3 (тургунлик теоремаси).**

$u_1(x, y, z), u_2(x, y, z)$  функциялар қўйидаги шартларни қаноатлантирсин:

$$\begin{cases} (1) u_1, u_2 \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega); \\ (2) \Delta u_1(x, y, z) = \Delta u_2(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in \Omega; \\ (3) u_i(x, y, z) = \mu_i(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma, i = 1, 2. \end{cases}$$

У ҳолда  $\max_{\Omega} |u_1 - u_2| \leq \max_{\Sigma} |\mu_1 - \mu_2|$  бўлади.



**Исботи.**

$$\varepsilon = \max_{\Sigma} |\mu_1 - \mu_2|, v = u_1 - u_2$$

Белгилаш оламиз. У ҳолда  $v$  функция  $\Omega$  да гармоник,

$$-\varepsilon \leq v \leq \varepsilon; (x, y, z) \in \Sigma,$$

У ҳолда  $(-\varepsilon, v)$  ва  $(\varepsilon, v)$  функциялар жуфти учун леммани қўллаб (равшанки унинг шартлари бажарилади)  $\bar{\Omega}$  да

$$-\varepsilon \leq v \leq \varepsilon; (x, y, z) \in \bar{\Omega} \Rightarrow |u_1 - u_2| \leq \varepsilon \quad \text{ни оламиз.}$$

теорема исботланди.



**Натяжа.**

$u_n(x, y, z)$  функциялар кетма-кетлиги, ҳар бир функция ҳамда  $u(x, y, z)$

мас  $\sum u_n = \mu$ ,  $\Omega$  да  $u = \mu$  Дирихле масаласи ечими бўлсин. У ҳолда

$\mu_n$  нинг текис яқинлашишидан  $\Sigma$  да  $\mu_n(\mu_n \rightarrow \mu)$ ,  $\Omega$  да  $u_n \Rightarrow u$

келиб чиқади.

**Эслатма.** Исботланган теорема икки улчамли ҳол учун тўлиқ ўринли.

Бунга ишонч ҳосил қилиш учун шунга ухшаш мулоҳазалар юритиш керак.

Энди Дирихли масаласининг бошқа варианты-

Дирихле ташқи масаласини қараймиз.





**4. Дирихле ташки масаласи ечими  
ягоналиги  
Фазода Дирихли ташки масаласи**

**Таъриф.**  $u(x, y, z)$  функция фазодаги Дирихле ташки масаласининг ечими дейлади, агар у қўйидаги шартларни қаноатлантирса:

$$\begin{cases} (1) u(x, y, z) \in C(E^3 \setminus \Omega); \\ (2) \Delta u(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in E^3 \setminus \bar{\Omega}; \\ (3) u(x, y, z) = \mu(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma. \\ (4) u(x, y, z) \Rightarrow 0, (x, y, z) \rightarrow \infty \end{cases}$$

Узлуксиз ечимнинг ягоналигини исботлаймиз:  
17

**Теорема 3.4 (ягоналиг теоремаси).**

$u_1, u_2(x, y, z)$  функциялар қўйидаги шартларни қаноатлантирсин:

$$\begin{cases} (1) u_1, u_2(x, y, z) \in C(E^3 \setminus \Omega); \\ (2) \Delta u_1(x, y, z) = \Delta u_2(x, y, z), (x, y, z) \in E^3 \setminus \bar{\Omega}; \\ (3) u_1, u_2(x, y, z) = \mu(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma. \\ (4) u_1, u_2(x, y, z) \Rightarrow 0, (x, y, z) \rightarrow \infty \end{cases}$$

У ҳолда  $u_1(x, y, z) = u_2(x, y, z), (x, y, z) \in \Sigma^3 \setminus \bar{\Omega}$  бўлади.

**Исботи.**

$v(x, y, z) = u_1(x, y, z) - u_2(x, y, z)$  бўлсин. У ҳолда

$v$  функция теореманинг  $\mu(x, y, z) = 0$

шартини қаноатлантиради.

$v \equiv 0$  эканлигини исботлаймиз;  
Тескарисини фарз қилайлик, яъни,

$\exists M_0(x_0, y_0, z_0) \in E^3 \setminus \bar{\Omega} : v(x_0, y_0, z_0) = A > 0$  бўлсин.

У ҳолда текис яқинлашиш таърифига кўра  $M_0$

нўқтани тўла уз ичига олувчи  $R$  радиусли шундай  
 $\Sigma_R$  сфера мавжудки  $|v(x, y, z)| \leq \frac{A}{2}, (x, y, z) \in \Sigma_R$

Бу ҳолда  $\max_{\Sigma_R} v(x, y, z) \leq \frac{A}{2};$

$\min_{\Sigma_R} v(x, y, z) \geq -\frac{A}{2}.$  бўлади.

$v$  функция га  $\Omega_R$  очик соҳада максимал қиймат принципини қўлаб (бу соҳа ташқарисидан  $\Sigma_R$  билан, ичкарисидан-  $\Sigma$  билан чегараланган):

$$\begin{cases} \max_{\Omega} v = \max_{\Sigma \cup \Sigma_R} v \leq \frac{A}{2}; \\ \min_{\Omega} v = \min_{\Sigma \cup \Sigma_R} v \leq -\frac{A}{2}; \end{cases} \Rightarrow |v(x_0, y_0, z_0)| \leq \frac{A}{2}. \quad \text{ни оламиз.}$$

$v(x_0, y_0, z_0) = A$  билан қарама-қаршиликга келамиз.  $v$  ҳолда

$v(x, y, z) = 0$  эканлиги келиб чиқади. Теорема исботланди. Туртинчи шарт муҳим роль уйнаётганини куйидаги мисолда курсатамиз.

21

**Мисол.**  $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 < a^2$ ;

$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ . бўлсин.

Энди қуйидаги Дирихли ташки масаласини қараймиз.

1.  $u \in C(E^3 \setminus \bar{\Omega})$ ;

2.  $u = E^3 \setminus \bar{\Omega}$

3.  $u(x, y, z) = C = \text{const}, (x, y, z) \in \Sigma$ . да гармоник функция

Осон кўриш мумкинки  $u_1(x, y, z) = C$  ва  $u_2(x, y, z) = \frac{Ca}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

функциялар берилган масаланинг ечимлари бўлади, лекин  $u_1 \neq u_2$

шунинг учун бу қўйилган шартлар масала ечими ягоналигига зид.

22

## Саволлар

1. Гармоник функция таърифи.
2. Гармоник функция хоссалари.
3. Максимум принципи теоремаси.
4. Дирихле ички масаласининг ечими ягоналиги теоремаси.
5. Дирихле ички масаласининг ечими тургунлиги теоремаси.
6. Дирихли ташки масаласининг ечими таърифи.
7. Дирихле ташки масаласи ечими ягоналиги теоремаси.

23

**Маъруза № 12.**

**Мавзу:**  
**Текисликда Дирихленинг ташқи масаласи**

**Маъруза № 12**  
**Текисликда Дирихленинг ташқи масаласи**

**Режа:**

1. Ягоналик теоремаси.
2. Нейманнинг ички масаласи
3. Нейманнинг ички масаласи ечилиши учун зарурий шартлар.
4. Ечимнинг ягоналиги.
5. Лаплас тенгламаси учун Грин функцияси ва унинг хоссалари

**Таянч иборалар**

*Ягоналик теоремаси,  
Нейманнинг ташқи масаласи,  
Лаплас тенгламаси,  
Грин функцияси,  
Грин функцияси хоссалари*

**Текисликда Дирихленинг ташқи масаласи**

**Таъриф:** Агар  $u(x, y)$  функция куйидаги шартларни қаноатлантирса, шунда текисликда Дирихле ташқи масаласининг счими дейилади:

$$[3.3] \begin{cases} (1) & u(x, y) \in C(E^2 \setminus D), \quad u \in C^2(E^2 \setminus \bar{D}) \\ (2) & \Delta u(x, y) = 0, \quad (x, y) \in E^2 \setminus \bar{D} \\ (3) & u(x, y) = \mu(x, y), \quad (x, y) \in L \\ (4) & |u(x, y)| \leq C = \text{const}, \quad (x, y) \in E^2 \setminus \bar{D} \end{cases}$$

**3.5. теорема (ягонлик).** Фараз қиламиз,  $u_1, u_2(x, y)$

шундай функциялар бўлсинки, улар учун

$$\begin{cases} (1) & u_1, u_2(x, y) \in C(E^2 \setminus D), \quad u \in C^2(E^2 \setminus \bar{D}) \\ (2) & \Delta u_1(x, y) = \Delta u_2(x, y), \quad (x, y) \in E^2 \setminus \bar{D} \\ (3) & u_1, u_2(x, y) = \mu(x, y), \quad (x, y) \in L \\ (4) & |u_i(x, y)| \leq C_i = \text{const}, \quad i = 1, 2; \quad (x, y) \in E^2 \setminus \bar{D} \end{cases}$$

У ҳолда  $E^2 \setminus \bar{D}$  фазода  $u(x, y) = u_1(x, y) = u_2(x, y)$  бўлади

**Исбот:**

Фараз қиламиз,  $u = u_1 + u_2$  Унда  $v$  учун:

$$v(x, y) = 0, \quad (x, y) \in L, \quad |v(x, y)| \leq C = c_1 + c_2 \quad \text{Исбот қиламизки,}$$

$$v(x, y) \equiv 0, \quad (x, y) \in E^2 \setminus \bar{D}$$

Тескарисини фараз қиламиз: шундай  $M^*(x^*, y^*), (x^*, y^*) \in E^2$  мавжудки,  $v(x^*, y^*) = A > 0$ . У ҳолда шундай  $a$ -ни оламизки, маркази

$M_0(x_0, y_0, z_0)$  нуқтада бўлган  $L_a$  айлана тўлиғича

$D$  да ётсин ва шундай  $R$  танлаймизки  $L_R$  айлана

$D$  соҳани ҳам  $M^*$  нуқтани ҳам ўзида сақласин.

Ушбу

$$w_R(x, y) = C \frac{\ln \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}}{\ln \frac{R}{a}} \quad \text{функцияни аниқлаймиз}$$

**Кўрииб турибдики,**

- 1)  $w_R(x, y) \in C(E^2 \setminus D)$
- 2)  $w_R(x, y)$  функция  $E^2 \setminus \bar{D}$  соҳада гармоник функция.
- 3)  $L$  чегарада  $w_R(x, y) \geq 0$  бўлади.
- 4)  $L_R$  чегарада  $w_R(x, y) = C$  бўлади.

Бу ердан 
$$\begin{cases} |v(x, y)| \leq w_R(x, y), & (x, y) \in L \\ |v(x, y)| \leq C = w_R(x, y), & (x, y) \in L_R \end{cases}$$

келиб чиқади.

Максимумлар принципини қўлаб, ичкаридан  $L$  билан ва ташқаридан

$L_R$  билан чегараланган  $D_{L_R}$  соҳада

$$|v(x, y)| \leq w_R(x, y), \quad (x, y) \in D_{L_R} \quad \text{ни ҳосил қиламиз. Бу ердан}$$

$$|v(x^*, y^*)| \leq w_R(x^*, y^*) = w_R(x, y) = C \frac{\ln \sqrt{(x^*-x_0)^2 + (y^*-y_0)^2}}{\ln \frac{R}{a}}$$

$R$ ни чексизликка интилтириб,

$$|v(x^*, y^*)| \leq w_\infty(x^*, y^*) = 0 \quad \text{ни ҳосил қиламиз.}$$

Бу эса,  $v(x^*, y^*) = A$  яън фаразимиз қилганимиз нотўғрилигини

исботлайди. Демак,  $v(x, y) \equiv 0$

эканлиги келиб чиқади. Теорема исботланди.

(4) шарт муҳим эканини кўрсатувчи мисол келтирамиз:

**Мисол:**

Фараз қилайлик:  $D : x^2 + y^2 < b^2$

$D : x^2 + y^2 = b^2$

Дирхлеининг тапқи масаласини қуйдагича қўямиз:

$$\begin{cases} \Delta u \equiv 0, & E^2 \setminus \bar{D} \\ u(x, y) = C = \text{const}, & (x, y) \in L \end{cases}$$

Осонгина текшириб кўриш мумкинки,  $u_1(x, y) = C$  ва

$$u_2(x, y) = C + \ln \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{b}$$

функциялар берилган масаланинг ечимлари бўлади. Аммо  $u_2$  функция ҳеч қандай ўзгармас билан чегараланмаган, шунинг учун ҳам масаланинг бундай қўйилишида ягоналик бузиляпти.

### Нейманнинг ички масаласи

**Таъриф:** Агар  $E^3$  фазода аниқланган  $u(x, y, z)$  функция қуйдаги 3 та [3.4] масаланинг шартларини қаноатлантирса, шунда  $u$  Нейман ички масаласининг ечими дейилади:

$$[3.4] \begin{cases} (1) & u(x, y, z) \in C^1(\bar{\Omega}), & u \in C^2(\Omega) \\ (2) & \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ (3) & \frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z) = v(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

Шунга диққатингизни қаратинки,  $u$  функция  $\bar{\Omega}$  соҳада ва унинг 1-чи тартибли ҳоделасилари билан биргаликда узлуксиз бўлиши кераклиги талаб қилинмоқда, ва бу билан Дирхле масаласидан фарқ қилади. Чунки, Дирхле масаласида фақат  $u$  функциянинг узлуксизлиги талаб этилган эди.

### Нейманнинг ички масаласи ечилиши учун

#### бўлган зарурий шарт

Фараз қиламиз,  $u$  функция [3.4] масаланинг ечими ва  $v$  – ихтисрий икки марта дифференциалланувчи функция бўлсин. Бу функциялар учун Гриннинг 2-чи формуласини қўлаймиз:

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\tau = \iint_{\Sigma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma$$

$v \equiv 1$  бўлганда қуйдаги ҳосил бўлади:

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \iint_{\Sigma} v(x, y, z) d\sigma = 0 \quad (3.6)$$

(3.6) тенглик Нейман ички масаласининг ечилиши учун зарурий шарт дейилади. Нейман масаласи ечимининг ягоналигини исботлаймиз. Осонгина кўриш мумкинки, агар  $u$  функция ([3.4]) масаланинг ечими бўлса, унда  $(u + \text{const})$  ҳам ечимдир. Буни тривиал бир қийматли эмаслик деб атаймиз. Фақат шундай бир қийматли эмаслик бўлиши мумкинлигини исботлаймиз.

### Ечимнинг ягоналиги

#### 3.6. теорема (ягоналик теоремаси)

Фараз қиламиз,  $u_i(x, y, z)$ ,  $i = 1, 2$  учун:

- 1)  $u_i \in C^1(\bar{\Omega})$
- 2)  $\bar{\Omega}$  соҳада  $u_i$  гармоник функция
- 3)  $\frac{\partial u_i}{\partial n}(x, y, z) = v(x, y, z)$ ,  $(x, y, z) \in \Sigma$  ўринли.  
У ҳолда  $u_1 - u_2 \equiv \text{const}$

(бу шуни билдирадики,

$v \equiv 0$  фақатгина тривиал ечим мавжуд).



**Исбот:** Гриннинг 1-формуласини ихтиёрй икки марта дифференциалланувчи  $u$  ва  $v$  функциялар учун ёзамиз:

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - \text{grad}^2 u) d\tau = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma$$

$u_1 - u_2$  функция [3.4] масаланинг  $v \equiv 0$  бўлган ҳолдаги счимидир. Грин формуласида  $u = v = u_1 - u_2$  дейлик. Унда

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (u\Delta v - \text{grad}^2 u) d\tau &= \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma \\ \Rightarrow \iiint_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) d\tau &= 0 \Rightarrow u_x \equiv u_y \equiv u_z \equiv 0 \Rightarrow u \equiv \text{const} \end{aligned}$$

Теорема исботланди.

13

### Лаплас тенгламаси учун Грин функцияси ва унинг хоссалари

$E^3$  фазода аниқланган гармоник  $u$  функция учун Гриннинг 3-формуласини ёзиб оламиз:

$$u(M) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[ \frac{1}{R_{MP}} \frac{\partial u}{\partial n} - u(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) \right] d\sigma_P \quad (3.7)$$

Бу ерда -  $P \in \Sigma, M \in \Omega$

Демак биз  $u(M)$  функция учун ифода олдик. Уни Дирихле ва Нейман масалалари учун қўлашга ҳаракат қиламиз. Гриннинг 2-чи формуласини ёзиб оламиз.

14

Бунда  $v$  функция  $\Omega$  соҳада гармоник бўлган функция:

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - \text{grad}^2 u) d\tau = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma$$

$u$  ва  $v$  функциялар гармоник, демак,

$$\iint_{\Sigma} \left[ u(P) \frac{\partial v}{\partial n} - v(P) \frac{\partial u}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) \right] d\sigma_P = 0 \quad (3.8)$$

(3.7) формуладан (3.8) формулани айириб,

$$u(M) = \iint_{\Sigma} \left[ \left( \frac{1}{4\pi} + u(P) \right) \frac{\partial v}{\partial n}(P) - u(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi R_{MP}} + v(P) \right) \right] d\sigma_P$$

15

ни ҳосил қиламиз.

$$G(M, P) = \frac{1}{4\pi R_{MP}} + v(P) \quad \text{дейлик.}$$

Унда

$$u(M) = \iint_{\Sigma} \left[ G(M, P) \frac{\partial v}{\partial n}(P) - u(P) \frac{\partial G}{\partial n}(M, P) \right] d\sigma_P$$

Демак,  $u(M)$  функция учун ихтиёрй гармоник функция иштирак этган янги формула ҳосил қилдик. Уни ўзгартириб, турли счимларни ҳосил қилиш мумкин.

16

**Мисол:**

1) Агар  $G|_{P \in \Sigma} = 0$  бўлса, у ҳолда

$$u(M) = - \iint_{\Sigma} u(P) \frac{\partial G}{\partial n}(M, P) d\sigma_P$$

Биз [3.1] Дирихле масаласининг ечими учун формула ҳосил қилдик

2) Агар

$$\tilde{G}: \left. \frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} \right|_{P \in \Sigma} = 0, \quad \text{бўлса, у ҳолда}$$

$$u(M) = \iint_{\Sigma} \tilde{G}(M, P) \frac{\partial v}{\partial n}(P) d\sigma_P$$

Демак, биз Дирихле ва Нейман масалаларини ечимларини топиш йўллари соддалаштирдик, чунки бу масалаларни уларга мос Грин функцияларига олиб келдик. Энди аниқ таъриф берамиз.

17

**Таъриф:** Агар

$$1) \quad \frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial \eta^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial \zeta^2} = 0, \quad \forall P \in \Omega, \quad P \neq M$$

$$2) \quad G(M, P) \text{ куйидаги кўринишда: } G(M, P) = \frac{1}{4\pi R_{MP}} + v \quad (3.9)$$

бу ерда  $v - \Omega$  соҳадаги гармоник функция.

$$3) \quad G(M, P)|_{P \in \Sigma} = 0 \quad \text{шунда}$$

$$G(M, P): M(x, y, z), \quad P(\xi, \eta, \zeta) \in \bar{\Omega}$$

функция Дирихле ички масаласи учун Грин функцияси дейилади.

Яъни,  $v$  функцияга куйидаги талаблар қўйилади:

$v - \Omega$  соҳада гармоник функция ва

$$v|_{\Sigma} = -\frac{1}{4\pi R_{MP}}$$

18

## Саволлар

1. Дирихле ташқи масаласининг ечимининг таърифи.
2. Ягоналик теоремаси
3. Нейманнинг ички масаласининг таърифи
4. Ечимнинг ягоналик теоремаси
5. Дирихле ички масаласи учун Грин функциясининг таърифи

19

# Математик физика тенгламалари маърузалар

## Маъруза № 13.

### Мавзу: Грин функциянинг хоссалари. Иккиланган қатлам потенциалли



1

## Маъруза № 13

### Грин функциянинг хоссалари. Иккиланган қатлам потенциалли

#### Режа

1. Грин функциянинг 1-чи хоссаси
2. Грин функциянинг 2-чи хоссаси
3. Оддий ва иккиланган қатлам потенциалли. Бирлик зичлик билан берилган иккиланган қатлам потенциалли



2

## Таянч иборалар

Грин функцияси,  
1-чи хосса,  
2-чи хосса,  
оддий ва иккиланган қатлам потенциалли




3

### 1. Грин функциянинг 1-чи хоссаси

$$G(M, P) > 0, \quad M, P \in \Omega, \quad P \neq M.$$

Исбот:  $\Omega$  ичида бирор  $M_0(\cdot)$  нуқтани оламиз. Етарлича кичик  $a$  радиуси ва маркази  $M_0$  да булган сферани ҳамда  $\Sigma$  ва  $\Sigma_a$  уртасидаги  $\Omega_a$  соҳани қараймиз.



$\Omega_a$  соҳада  $M_0, P$  ўзгаришларга боғлиқ бўлган Грин функцияни қуриб чиқайлик. У ҳолда  $\Omega_a$  гармоникдир. Демак, тах қиймат принципининг барча шартлари бажарилади.  $G_a(M_0, P)$  учун ушбу ифода уриши: (3.9)



4



### 1. Грин функциянинг 1-чи хоссаси

$$G(M_0, P) = \frac{1}{4\pi R_{M_0 P}} + v(P), \quad \text{бу ерда} \quad \frac{1}{4\pi R_{M_0 P}} \xrightarrow{R \rightarrow 0} \infty$$

$v$  эса  $\Omega$  да гармоник (демак чегараланган) функция булгани учун, шундай  $a$  ни олиш мумкинки,

$$G | P \in \Sigma_a < 0 \quad \text{уридли булади.}$$

$$G(M, P) | P \in \Sigma = 0 \text{ булгани учун} \quad G(M_0, P) \geq 0$$

ифода  $\Omega_a$  даги  $\forall P$  учун ўринли.

$G$  функция константа бўлмагани учун, у  $\Omega_a$  ичида минимумга (яъни 0 кийматга) эришмайди. У холда ( $a$  ни  $\infty$  кичрайтириш мумкин булгани учун)

$\Omega$  даги ихтиёрий нуқталар учун  $P \neq M \quad G(M, P) > 0$  уридли. Тасдиқ уридли.

5

### 2. Грин функциянинг 2-чи хоссаси

$$G(M, P) = G(P, M) \quad \forall M, P \in \Omega, \quad M \neq P \quad (3.10)$$

Исбот:  $M_1, M_2$  нуқталарни фиксирлаймиз – улар  $\Omega$  даги 2 та ҳар хил ихтиёрий нуқталар.  $G(M_1, M_2) = G(M_2, M_1)$  ни исботлаш етарли.

Белгилаш киритамиз:

$$u(\xi, \eta, \zeta) = G(M_1, P);$$

$$v(\xi, \eta, \zeta) = G(M_2, P).$$

$\Sigma_\varepsilon^1$  етарлича кичик  $\varepsilon$  радиусли сфера ( $\Omega_\varepsilon^1$  – унга мос шар) булиб,  $M_1$  (уни ураб турсин,  $\Sigma_\varepsilon^2$  эса мос холда  $M_2$  (у) учун сфера ва шар булсин.  $\Omega_\varepsilon$  –  $\Omega$  соҳанинг ички қисми булсин ва  $\Omega_\varepsilon^1, \Omega_\varepsilon^2$  шарлар бу соҳага тегишли бўлмасин.  $u$  ва  $v$  функциялар учун Гриннинг 2 – формуласини ёзиб оламиз (Грин аниқланишга хўра  $\Omega_\varepsilon$  да улар гармоник функциялар) ва куйидагига эга буламиз.

6

### 2. Грин функциянинг 2-чи хоссаси

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega_\varepsilon} (u\Delta v - v\Delta u) dr &= \iint_{\Sigma} \left( u \frac{dv}{dn} - v \frac{du}{dn} \right) d\sigma + \iint_{\Sigma_1^1} \left( u \frac{dv}{dn} - v \frac{du}{dn} \right) + \\ &+ \iint_{\Sigma_2^2} \left( u \frac{dv}{dn} - v \frac{du}{dn} \right) d\sigma \Rightarrow \left\{ G | P \in \Sigma \Rightarrow u | \Sigma = v | \Sigma = 0 \right\} \Rightarrow \\ &\iint_{\Sigma_1^1} \left[ G(M_1, P) \frac{\partial G(M_2, P)}{\partial n} - G(M_2, P) \frac{\partial G(M_1, P)}{\partial n} \right] d\sigma_p + \\ &+ \iint_{\Sigma_2^2} \left[ G(M_1, P) \frac{\partial G(M_2, P)}{\partial n} - G(M_2, P) \frac{\partial G(M_1, P)}{\partial n} \right] d\sigma_p = 0 \end{aligned} \quad (3.11)$$

7

### 2. Грин функциянинг 2-чи хоссаси

1 – интегрални 1 – хўшловувчини кўриб чиқамиз.  $\varepsilon \rightarrow 0$  да (3.9) даги  $G(M_2, P)$  функция ифодасида қатнашувчи  $u$  ва  $v$  функциялар  $\Sigma_\varepsilon^1$  да гармоник ва чегараланган функциялар (масалан:  $\frac{\partial G(M_1, P)}{\partial n}$   $C_1$  ва  $C_2$  константар билан чегараланган). У холда ушбуга эга буламиз:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} G(M_1, P) \frac{\partial G(M_2, P)}{\partial n} d\sigma_p &\leq \iint_{\Sigma} \frac{1}{4\pi R_{M_1 P}} \left| \frac{\partial G(M_1, P)}{\partial n} \right| d\sigma_p \leq \\ &\leq \frac{C_1}{4\pi R_{M_1 P}} - c_1 c_2 \left| d\sigma \right| = \iint_{\Sigma} \left| \frac{c_1}{4\pi \varepsilon} + c_1 c_2 \right| d\sigma_p = c_1 \varepsilon + 4\pi c_1 c_2 \varepsilon^2 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

8

## 2. Грин функциянинг 2-чи хоссаси

2-хўшпиловчи эса мураккаброк.  $G(M_1, P)$  функция учун (3,9) ифодадан фойдаланиб, уни 2 га интегралга ажратамиз:

$$\iint_{\Sigma_e^1} G(M_2, P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi R_{M_1 P}} \right) d\sigma + \iint_{\Sigma_e^1} G(M_2, P) \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma_P$$

$\varepsilon$  кичрайиши билан 2 – интеграл ҳам 0 га интилади. (юқориди келтирилган тушунтиришларга кўра)

$$\frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi R_{M_1 P}} \right) \text{ кўнайтувчини текшираемиз. Таърифга кўра: } \frac{\partial f}{\partial n} = (\vec{n}, \text{grad } f)$$

Бизнинг ҳолда

$$\vec{n} = \left\{ \frac{(\xi - x)}{R_{M_1 P}}, \frac{(\eta - y)}{R_{M_1 P}}, \frac{(\zeta - z)}{R_{M_1 P}} \right\}, \text{grad } \frac{1}{R_{M_1 P}} = \left\{ \frac{(\xi - x)}{R_{M_1 P}^3}, \frac{(\eta - y)}{R_{M_1 P}^3}, \frac{(\zeta - z)}{R_{M_1 P}^3} \right\}$$

## 2. Грин функциянинг 2-чи хоссаси

Бундан келиб чиқадики,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{M_1 P}} \right) &= \frac{1}{4\pi R_{M_1 P}^2} \Rightarrow \iint_{\Sigma_e^1} G(M_2 P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi R_{M_1 P}} \right) \partial \sigma_P = \\ &= \frac{1}{4\pi \varepsilon^2} \iint_{\Sigma_e^1} G(M_2 P) \partial \sigma_P = \end{aligned}$$

= {уртача киймаг хақидаги (5.2) формула} =

$$= \frac{G(M_2 P')}{4\pi \varepsilon^2} \iint_{\Sigma_e^1} \partial \sigma \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} G(M_2, M_1)$$

## 2. Грин функциянинг 2-чи хоссаси

(3.11) формуладаги 2 – интеграл биринчисидан ўзгарувчини алмаштириш ва ишорасини алмаштириш орқали ҳосил қилинади. Шунга ухшаш фикр юритиб, у  $G(M_1, M_2)$  га интилишни топамиз. Бу ердан қуйидаги формулага эга бўламиз:

$$G(M_2, M_1) - G(M_1, M_2) = 0$$

Бу формула  $\Omega$  даги барча хар хил  $M_1, M_2$  ( $\cdot$ ) учун тўғридир. Тасдиқ исботлади.

## 3. Оддий ва иккиланган қатлам потенциали. Бирлик

### зичлик билан берилган иккиланган қатлам потенциал

Шунилай қилиб, текислик ва фазодаги Лаплас тенгламасининг ечимлари қуйидагича:

$$E^3 : \frac{1}{R_{MP}}; \quad E^2 : \ln \frac{1}{\rho_{MP}},$$

Бу ерда  $M(x, y, z)$  – фиксирланган нуқта,  $P(\xi, \eta, \zeta)$  – ўзгарувчи.

Фараз қилайлик  $\Sigma$  бу  $M$  нуқгани ўз ичига оладиган  $\Omega$  сохани чегаралаб турувчи қандайдир ёпиқ сирт бўлсин.  $E^3$  да қуйидаги функцияни қараб чиқайлик:

$$v(M) = \iint_{\Sigma} g(P) \frac{1}{R_{MP}} \partial \sigma_P$$

ва унга **оддий қатлам потенциал** деб ном қўямиз.

### 3. Оддий ва иккиланган қатлам потенциали

Ва шу билан бир қаторда қўйидаги функцияни қараймиз:

$$u(M) = - \iint_{\Sigma} f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) d\sigma_P$$

ва бу функцияга **иккиланган қатламнинг потенциали** деган ном қўямиз. Қўйидаги нарсани кўрсатамиз:

$$\forall M \notin \Sigma \quad \Delta u \equiv \Delta v \equiv 0$$

13

### 3. Оддий ва иккиланган қатлам потенциали

$$\begin{aligned} \Delta_M v &= \Delta_M \iint_{\Sigma} g(P) \frac{1}{R_{MP}} d\sigma_P = \\ &= \iint_{\Sigma} g(P) \Delta \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) d\sigma_P = 0 \quad \text{чунки} \quad \Delta \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) \equiv 0 \end{aligned}$$

Иккиланган қатлам потенциали учун натижа худди шунақа:

$$\begin{aligned} \Delta_M u &= \Delta_M \iint_{\Sigma} f(P) \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{R_{MP}} d\sigma_P = \\ &= \iint_{\Sigma} f(P) \frac{\partial}{\partial n} \Delta \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) d\sigma_P = 0 \end{aligned}$$

14

### 3. Оддий ва иккиланган қатлам потенциали

Тежисликда потенциал тушунчасини аниқлайлик.  $L - M(x, y, z)$  ни ўраб турувчи ёпиқ эгри чизик бўлсин:

$$v(M) = \int_L g(P) \ln \frac{1}{\rho_{MP}} dl_P \quad \text{оддий қатлам потенциали.}$$

$$u(M) = - \int_L f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) dl_P$$

иккиланган қатлам потенциали.

15

### 3. Оддий ва иккиланган қатлам потенциали

Шундай қилиб, потенциаллар гармоник функциялардир. Бундан келиб чиқадики, уларни, баъзи масалаларни ечишда, масалан Нейман масаласини ечишда қўллаш мумкин, бунинг учун мос  $g$  ва  $f$  функцияларни танлаймиз ва бу функцияларни мос потенциалларнинг зичликлари деб атаймиз.

16

## Саволлар

1. Грин функциянинг 1-чи хоссаси
2. Грин функциянинг 2-чи хоссаси
3. Оддий ва иккиланган қатлам потенциалли.



## Математик физика тенгламалари маърузалар

### Маъруза № 14.

#### Мавзу:

### Потенциал хоссалари



### Маъруза № 14 Потенциал хоссалари

#### Режа:

1. Иккиланган қатлам потенциалли
2. Потенциаллар хоссалари.



## Таянч иборалар

*Иккиланган қатлам потенциалли,  
потенциаллар хоссалари,  
Дирихленинг ички масаласи*



### 1. Иккиланган қатлам потенциали

Текисликда иккиланган қатлам потенциални бирмунча батафсил кўриб чиқамиз.

$$u(M) = - \int_L f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) dl_P \quad (3.12)$$

Фараз қиламиз  $L$  эгри чизиқ ва унга ўтказилган уринмалар (маълум маънода) узлуксиздир. Шундан келиб чиқан ҳолда

### 1. Иккиланган қатлам потенциали

$$\begin{aligned} & - \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) : \\ & \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) = \left\{ \rho_{MP} = \sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2} \right\} = \\ & = - \frac{1}{\rho_{MP}} \frac{1}{2} \frac{2(\xi-x)}{\rho_{MP}} = - \frac{\xi-x}{\rho_{MP}^2}, \\ & \frac{\partial}{\partial \eta} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) = - \frac{\eta-y}{\rho_{MP}^2}, \end{aligned}$$

### 1. Иккиланган қатлам потенциали

$$\begin{aligned} \overline{MP} = \{\xi-x, \eta-y\} & \Rightarrow - \frac{\partial}{\partial n} \left( \ln \frac{1}{\rho_{MP}} \right) = - \left( \vec{n}, \text{grad} \ln \left( \frac{1}{\rho_{MP}} \right) \right) = \\ & = \left( \vec{n}, \frac{\overline{MP}}{\rho_{MP}^2} \right) = \rho_{MP} \Rightarrow u(M) = \int_L f(P) \frac{\cos \angle(\overline{MP}, \vec{n})}{\rho_{MP}} dl_P \end{aligned} \quad (3.13)$$

Зичлиги 1 га тенг бўлган потенциал бўлсин.

$$u_e(M) = \int_L \frac{\cos \angle(\overline{MP}, \vec{n})}{\rho_{MP}} dl_P$$


### 1. Иккиланган қатлам потенциали

Қутб координатаси системасидан фойдаланиб ҳисоблаймиз.  $M$  нуқта орқали маълум битта ўқ ўтказамиз ва ундан фбурчакларни ҳисоблаймиз.  $L$  эгри чизиқнинг  $P$  нуқтасидан унга ўтказилган уринма билан шу ўқ ўртасидаги бурчакни  $[0, \pi/2]$  оралиқда  $\alpha$  бурчаги деб белгилаймиз. Шунда қуйидаги мунособатлар тўғри бўлади.

$$\begin{aligned} \angle(\overline{MP}, \vec{n}) &= \frac{\pi}{2} - \phi - \alpha \Rightarrow \cos \angle(\overline{MP}, \vec{n}) = \sin(\phi + \alpha) \Rightarrow \\ \Rightarrow u_e(M) &= \int_L \frac{\sin(\phi + \alpha)}{\rho_{MP}} dl_P \end{aligned} \quad (3.14)$$



### 1. Иккиланган қатлам потенциали



8

### 1. Иккиланган қатлам потенциали

$P(\varepsilon, \eta)$  нукта координатларида, тўғри бурчакли координатлар системасида кутб координатлар системасига ўтаемиз.

$$\xi = r(\phi) \cos \phi;$$

$$\eta = r(\phi) \sin \phi;$$

$$\begin{aligned} d\xi &= [(r'(\phi) \cos(\phi) - r(\phi) \sin(\phi))] d\phi \\ d\eta &= [(r'(\phi) \sin(\phi) + r(\phi) \cos(\phi))] d\phi \end{aligned} \quad (*)$$

Расмдан кўришиб турибдики

$$\begin{cases} d\xi = -dl \cos \alpha; \\ d\eta = dl \sin \alpha; \end{cases}$$

9

### 1. Иккиланган қатлам потенциали

(3.14) даги интеграл остидаги функцияни ўзгартирамиз.

$$\begin{aligned} \sin(\phi + \alpha) dl &= \sin \phi \cos \alpha dl + \cos \phi \sin \alpha dl = \\ &= \begin{cases} d\xi = -dl \cos \alpha \\ d\eta = dl \sin \alpha \end{cases} = \cos \phi d\eta - \sin \phi d\xi = (*) = \\ &= (\cos \phi \sin \phi' + r' \cos^2 \phi - r' \sin \phi \cos \phi + r \sin^2 \phi) d\phi = \\ &= r d\phi \Rightarrow \cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n}) dl = r(\phi) d\phi \Rightarrow \\ &\Rightarrow u_e(M) = \int_L \frac{r(\phi)}{r(\phi)} d\phi = 2\pi \end{aligned}$$

10

### 1. Иккиланган қатлам потенциали

Худди шундай ўзгартиришлар асосида нукта сохадан ташқарида ёки унинг чегарасида ётган бўлса куйидаги мунособатлар ўришли бўлишини ҳосил қиламиз:

$$u_e(M) = \begin{cases} \pi, & M \in L \\ 0, & M \notin D \end{cases}$$

Шундай қилиб

$$u_e(M) = \begin{cases} 2\pi, & M \in D \\ \pi, & M \in L \\ 0, & M \notin \overline{D} \end{cases} \quad (3.15)$$

11

## 2. Потенциаллар хоссалари

Энди зичлиги 1 га тенг бўлган потенциал яфодасини билган ҳолда бизнинг бошланғич потенциалимизнинг баъзи хоссаларини чиқарамиз. Бунинг учун куйидаги таъриф керак бўлади.

**Таъриф**  $\int_l F(P, M) dl_P$  интеграл  
 $M_0 \in L$  нуктада текис яқинлашувчи дейилади, агар  
 $\forall \varepsilon > 0 \exists V(M_0)$   $-M_0$  нуктанинг атрофи ва  
 $l \in L$  ёй шунчақаким,  $\int_l F(P, A) dl_P$  интеграл  
 $\forall A \in V(M_0)$  яқинлашувчи бўлса ва  $\left| \int_l F(P, A) dl_P \right| \leq \varepsilon$

## 2. Потенциаллар хоссалари

Куйидаги теоремадан исботсиз фойдаланамиз.

**Теорема: 3.7**

$F(P, M)$  функция  $P \neq M$   
 ҳамма нукталарда узлуксиз бўлсин. Шунда  $\int_l F(P, M) dl_P$

интеграл текис яқинлашадиган нукталарда узлуксиз функциядан иборат бўлади.  $L$  чегарада  $M_0$  нуктани олиб

$u(M) - f(M_0)u_e(M)$  функцияни кўриб чиқамиз.

## 2. Потенциаллар хоссалари

**Теорема: 3.8**

(3.12) даги  $f(P)$  функция  $M_0$  нуктада узлуксиз бўлса

$u(M) - f(M_0)u_e(M)$

функция  $M_0$  нуктада узлуксиз бўлади.

## 2. Потенциаллар хоссалари

**Исбот:**

$$\begin{aligned} u(M) - f(M_0)u_e(M) &= (3.13) = \\ &= \int_L f(P) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n})}{\rho_{MP}} dl_P - \\ &- \int_L f(M_0) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n})}{\rho_{MP}} dl_P = \\ &= \int_L (f(P) - f(M_0)) \frac{\cos \angle(\overrightarrow{MP}, \vec{n})}{\rho_{MP}} dl_P \end{aligned}$$

## 2. Потенциаллар хоссалари

Бизнинг функциямыз узлуксизлигидан  $\forall \varepsilon > 0$

$M_0$  нуктанинг шундай атрофи мавжуд эканлиги келиб чиқади. У ерда

$$|f(P) - f(M_0)| \leq \varepsilon$$

Демак маркази  $M_0$  нуктада бўлган кутб координатларига ўтиб биз томонимиздан эгри чизикга қўйилган шартларда

$$(f(P) - f(M_0)) \frac{\cos \angle(\overline{MP}, \vec{n})}{\rho_{MP}} dl_P = \int_L (f(P) - f(M_0)) d\phi \leq \varepsilon \int_L d\phi = 2\pi\varepsilon$$

хосил қиламиз.  
Теорема исботланди.

16

## 2. Потенциаллар хоссалари

Энди  $u_p(M)$  функция учун (3.15) формуладан фойдаланиб теорема даъвосини ҳисобга олиб  $u(M)$  функция  $M_0$  нуктадаги қуриниши

$u_e(M)f(M_0)$  функциянинг қўринишига тенг эканлигини ҳосил қиламиз.  
Биз биринчи натижани ҳосил қилдик.

17

## 2. Потенциаллар хоссалари

1.Натижа

$$u_{\text{внутр}}(M_0) = \lim_{\substack{M \rightarrow M_0 \\ M \in D}} u(M)$$

$$u_{\text{внеш}}(M_0) = \lim_{\substack{M \rightarrow M_0 \\ M \in D}} u(M)$$

Шунда

$$u_{\text{внутр}}(M_0) = \lim_{\substack{M \rightarrow M_0 \\ M \in D}} (u(M) + \pi f(M_0));$$

$$u_{\text{внеш}}(M_0) = \lim_{\substack{M \rightarrow M_0 \\ M \in D}} (u(M) - \pi f(M_0))$$

18

## 2. Потенциаллар хоссалари

Шундай қилиб, потенциални контурда шундай тасвирлаш мумкин.

$$u(M_0) = \frac{u_{\text{внутр}}(M_0) + u_{\text{внеш}}(M_0)}{2}$$

Натижа 2.

агар  $f(P)$  функция  $L$  узлуксиз бўлса,  $u(M)$  функция  $M \in L$

узлуксиз бўлади.

Исб

Биз контурда

$$f(M)u_e(M) = \pi f(M); \quad u(M) - f(M_0)u_e(M) = \psi(M)$$

Узлуксиз функцияга эга бўламиз. Шунда  $u(M)$  функция қўйидаги қўринишга келади.

$$u(M) = \pi f(M) + \psi(M)$$

19



## Фойдаланиладиган асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар рўйхати

### Асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар

- 1.Тихонов А.Н.,Самарский А.А. Уравнения математической физики. М. “Наука”.1972.
- 2.Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М. “Наука”.1988.
- 3.Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными. М. “Наука”.1961.
- 4.Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. М. “Наука”.1982.
- 5.Салоҳиддинов М. Математик физика тенгламалари.Т. “Ўзбекистон”.2002.

### Қўшимча адабиётлар

- 6.Бицадзе А.В., Калининченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической физики. М. “Наука”.1977.
- 7.Владимиров В.С., Михайлов В.П., Вашарин А.А., Каримова Х.Х., Сидоров Ю.В., Шабунин М.И. Сборник задач по уравнениям математической физики. М. “Наука”.1982.
- 8.Бицадзе А.В. Некоторые классы уравнений в частных производных. М. “Наука”.1981.
- 9.Владимиров В.С. Обобщенные функции в математической физике. М. “Наука”.1979.
- 10.Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа. М.1985.
- 11.Смирнов М.М. Задачи по уравнениям математической физики. М. “Наука”.1975.
- 12.Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. М. “Наука”.1980.
- 13.Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений. М. Из-во МГУ.1984.
- 14.Тешабоева Н.Х. Математик физика усуллари.Т.1966.
- 15.Годунов С.К. Уравнения математической физики. М. “Наука”.1971.
16. Рид М., Саймон Б. Методы современной математической физики, Т. 1-4. 1977- 1982, <http://www.mcme.ru>, <http://lib.mexmat.ru>
17. Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. М. 1970. <http://www.mcme.ru>, <http://lib.mexmat.ru>

## Matematik fizika tenglamalari fanidan glossariy.

**Xususiy xosilali differensial tenglama** deb bir nechta o'zgaruvchili noma'lum funktsiyaga, uning argumentlari va turli tartibli xususiy xosilalariga nisbatan tenglamalarga aytiladi. Xususiy xosilali differensial tenglamaning **tartibi** deb bu tenglamaga kiruvchi xosilalarning eng yuqori tartibiga aytiladi.

Kvazichizikli tenglamalar

$$a_1(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + a_n(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_n} = f(x_1, \dots, x_n, u).$$

Ko'rinishga ega.

Agar  $f(x_1, \dots, x_n, u) \neq 0$  bo'lsa u xolda tenglama **bir jinsli tenglama** bo'lmaydi, aks xolda  $f(x_1, \dots, x_n, u) = 0$  balsa, tenglama **bir jinsli tenglama** bo'ladi.

**Ikkinchi tartibli xususiy xosilali tenglama** yuqori tartibli xosilalarga nisbatan chiziqli deyiladi, agar bu tenglama faqat birinchi tartibli xosilalarni o'z ichida saqlasa.

**Xarakteristik tenglama**  $a(dy)^2 - 2b dx dy + c(dx)^2 = 0$ .

**Xususiy hosilali umumiy tenglama** deb  $F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy}) = 0$  tenglamaga aytiladi.

**Tenglama chiziqli deyiladi**, agar u nafaqat yuqori tartibli hosilalari  $u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$  ga nisbatan balki u funktsiya va uning birinchi tartibli hosilalariga nisbatan chiziqli bo'lsa. Agar  $f \equiv 0$  bo'lsa shunda

$$a_{11} u_{xx} + 2a_{12} u_{xy} + a_{22} u_{yy} + b_1 u_x + b_2 u_y + cu + f = 0$$

tenglama **bir jinsli tenglama** aks holda **bir jinsli bo'lmagan tenglama** deb aytiladi.

**Xususiy hosilali umumiy tenglama** deb  $F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy}) = 0$  tenglamaga aytiladi.

**Tenglama chiziqli deyiladi**, agar u nafaqat yuqori tartibli hosilalari  $u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$  ga nisbatan balki u funktsiya va uning birinchi tartibli hosilalariga nisbatan chiziqli bo'lsa.

$$E(t) = \int_0^l \left[ (v_t(x, t))^2 + a^2 (v_x(x, t))^2 \right] dx \text{ funktsiyaga } \mathbf{energiya integrali} \text{ deyiladi}$$

Biror  $u(x) \in C^2(E^n)$  funksiyadan  $L[u]$  **differensial operator** qo'yidagicha aniqlanadi:

$$L[u] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) u_{x_i} + c(x) u$$

Agar  $L[u] = M[v]$  bo'lsa operator **o'z-o'ziga qo'shma operator** deyiladi.

Chiziqli algebrada **A operatorga qo'shma**  $A^*$  operator deb quyidagi  $(Au, v) = (u, A^*v)$  munosabat aytiladi.

**Grin formulasi** deb  $\int_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) ds$  ga aytiladi.

Koshi masalasining yechimi uchun **Dalamber formulasi**

$$u_n(x, t) = \frac{\phi_n(x-at) + \phi_n(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \Rightarrow u_n(x, t) \in C^2\{E \times [0; T]\}$$

**Fur'ye qonuni**  $\vec{W} = -k \text{ grad } u$  ga aytiladi.

$k(x, y, z)$  - issiqlik o'tkazuvchanlik koeffisienti.

Fazoda issiqlik utkazuvchanlik tenglamasi deb,

$$c(x, y, z)\rho(x, y, z)u_t(x, y, z, t) = \frac{\partial}{\partial x}(k(x, y, z)u_x(x, y, z, t)) + \frac{\partial}{\partial y}(k(x, y, z)u_y(x, y, z, t)) + \frac{\partial}{\partial z}(k(x, y, z)u_z(x, y, z, t)) + F(x, y, z, t)$$

tenglamaga aytiladi.

$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t)$  bir jinsli yupqa sterjinda **issiqlik o'tkazuvchanlik** (yoyilish) tenglamasi.

**Diffuziya tenglamasi** quyidagicha:

$cu_t = \text{div}(D\text{gradu}) + F(x, y, z, t)$ ,  $D$  – diffuziya koeffitsiyenti,  $F$  – biror bir funktsiya .

**Shturm-Liu vill masalasi:** 
$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0; \\ X(0) = 0; X(l) = 0. \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -f(x, y, z), \quad E^3 \text{ fazoda Puasson tenglamasi.}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -f(x, y), \quad E^2 \text{ fazoda Puasson tenglamasi.}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad E^3 \text{ fazoda Laplas tenglamasi.}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad E^2 \text{ fazoda Laplas tenglamasi.}$$

$u(x, y, z)$  funktsiya  $\Omega$ , soxada **garmonik funktsiya** deyiladi, agar

$u \in C^2(\Omega)$  va  $\Omega$  da  $\Delta u \equiv 0$  shartlar bajarilsa.

**Dirixle ichki masalasi** 
$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u(x, y, z) = \mu(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

**Neyman ichki masalasi** 
$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z) = v(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

**Dirixle tashqi masalasi** 
$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in E^3 \setminus \bar{\Omega} \\ u(x, y, z) = \mu(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

**Neyman tashqi masalasi** 
$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in E^3 \setminus \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z) = v(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma \end{cases}$$

**Grinning ikkinchi formulasi:**

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) d\tau = \iint_{\Sigma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma$$

**Grinning uchinchi formulasi:**

$$4\pi u(M_0) = -\iiint_{\Omega} \frac{1}{R_{MM_0}} \Delta u(M) d\tau_M - \\ -\iint_{\Sigma} \left[ u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MM_0}} \right) - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n}(M) \right] d\sigma_M$$

**Oddiy qatlam potentsiali:**

$$v(M) = \iint_{\Sigma} g(P) \frac{1}{R_{MP}} \partial\sigma_P$$

**Ikkilangan qatlamning potentsiali:**

$$u(M) = -\iint_{\Sigma} f(P) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{R_{MP}} \right) \partial\sigma_P$$